

20
45 X

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
adicacion : 00028933 00000003 Folios: 22
Fecha (AMD): 2000-10-30 10:26:02
razite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Procedencia: 0000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Santafé de Bogotá, D.C.

02-01-444 -

Re.: Expediente No. 00 - 28.933

Solicitud de Patente

En relación con la última providencia recaída en este expediente, le manifiesto lo siguiente:

1.- Debidamente traducida, la copia oficial de la solicitud de patente básica inglesa No. 9909041.7 ya fue presentada con mi escrito fechado el 9 de Mayo del 2000.

2.- Se acompaña el arte final por triplicado.

3.- Modifico el título de la invención en la siguiente forma:

"NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABETICOS CON BASE EN HIDRATO DE HIDROCLORURO"


4.- Acompaño texto completo, en tamaño oficio, de la descripción, reivindicaciones, extracto y dibujos.

5.- Tanto en la descripción como en la reivindicación 1 se ha incluido la fórmula estructural (I).


- 6.- También se ha incluido esta fórmula en el resumen.
- 7.- Se modifica la reivindicación 12.
- 8.- Por motivo de lo anterior, acompaño nueva carátula, extracto, tarjeta de archivo temático y tarjeta de propietario.

Le solicito darle curso a esta petición.

De Ustedes atentamente,



GERMAN CASTILLO GRAU




T.P. No. 2978 del C.S.J.

NUEVOS FÁRMACOS

Esta invención se refiere a un nuevo fármaco, a un procedimiento para la preparación del fármaco y al uso del fármaco en medicina.

La solicitud de patente europea con el número de publicación 0.306.228 se refiere a ciertos derivados de tiazolidinadiona descritos como poseedores de actividad hipoglucemian-
te e hipolipemiente. El compuesto del ejemplo 30 del documen-
to EP 0.306.228 es 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)-
etoxil]bencil]tiazolidina-2,4-diona (en lo sucesivo 'Compuesto
(I)'), de fórmula:



La solicitud de patente internacional con el número de publicación WO94/05659 describe ciertas sales de los compuestos del documento EP 0.306.228 y en particular la sal de ácido maleico.

Las solicitudes de patentes internacionales con los números de publicación WO99/31093, WO99/31094 y WO99/31095 describen, en cada caso, distintos hidratos de Compuesto (I).

Ahora se ha descubierto que el Compuesto I existe en forma de una nueva sal de hidrocloreuro que está dihidratada. Este nuevo dihidrato de la sal de hidrocloreuro (también denominada aquí en lo sucesivo "Hidrato de Hidrocloreuro") es particularmente adecuado para preparación en masa y manipulación. La nueva forma se puede preparar por un procedimiento eficiente, económico y reproducible, particularmente adecuado para preparación a gran escala.

El nuevo Hidrato de Hidrocloreuro también tiene propiedades farmacéuticas útiles y, en particular, se indica que es útil para el tratamiento y/o la profilaxis de diabetes mellitus, condiciones asociadas con diabetes mellitus y ciertas complicaciones de la misma.

Por consiguiente, la presente invención proporciona dihidrato de hidrocloreuro de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)-amino)etoxil]bencil]tiazolidina-2,4-diona, caracterizado por que:

(i) proporciona un espectro infrarrojo que contiene picos a 3.392, 2.739, 1.751, 1.325 y 713 cm^{-1} ; y/o

(ii) proporciona un modelo de difracción de rayos X a través de polvo (XRPD) que contiene picos a 9,1, 12,0, 15,7, 16,3 y 19,8°2θ.

En un aspecto favorecido, el Hidrato de Hidrocloruro
5 proporciona un espectro infrarrojo sustancialmente de acuerdo con la Figura I.

En un aspecto favorecido, el Hidrato de Hidrocloruro proporciona un modelo de difracción de rayos X a través de polvo (XRPD) sustancialmente de acuerdo con la Figura II.

10 El Hidrato de Hidrocloruro puede existir en ciertas formas deshidratadas que se convierten reversiblemente en el Hidrato de Hidrocloruro cuando entran en contacto con agua, ya sea en forma líquida o de vapor. La presente invención abarca todas las formas rehidratables reversiblemente del
15 Hidrato de Hidrocloruro. Preferiblemente, se proporciona la forma hidratada que se ha caracterizado anteriormente.

La presente invención abarca el Hidrato de Hidrocloruro aislado en forma pura o cuando está mezclado con otros materiales.

20 Así, en un aspecto se proporciona el Hidrato de Hidrocloruro en forma aislada.

En un aspecto adicional se proporciona el Hidrato de Hidrocloruro en forma pura.

Todavía en otro aspecto adicional se proporciona el Hidrato de Hidrocloruro en forma cristalina.
25

La invención también proporciona un procedimiento para preparar Hidrato de Hidrocloruro, caracterizado porque 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona (Compuesto I) se trata con ácido clorhídrico acuoso y,
30 después de esto, se recupera el compuesto requerido.

Adecuadamente, el ácido clorhídrico acuoso se forma mezclando ácido clorhídrico concentrado y agua o un disolvente orgánico apropiado, tal como etanol desnaturalizado o propan-2-ol, o mezclas de ellos.

35 Adecuadamente, la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, pero se puede emplear cualquier temperatura conveniente que proporcione el producto requerido.

• En un aspecto, el Hidrato de Hidrocloruro se prepara de la siguiente manera:

(i) se trata 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]-bencil]tiazolidina-2,4-diona en propan-2-ol acuoso con ácido clorhídrico acuoso a una temperatura elevada, tal como una temperatura en el intervalo de 60°C a 80°C, adecuadamente 65°C a 75°C, por ejemplo 75°C;

(ii) la solución se enfría a temperatura ambiente, por ejemplo 25°C;

10 (iii) la solución se siembra con el Hidrato de Hidrocloruro, preferiblemente la temperatura de la reacción se reduce además a una temperatura en el intervalo de 0 a 5°C para completar la cristalización.

En el procedimiento mencionado anteriormente, la cantidad total de agua en la mezcla de reacción está preferiblemente en el intervalo de 15% a 50% p/v, adecuadamente 25% a 40% p/v, por ejemplo 27% p/v.

Se apreciará que en los procedimientos mencionados anteriormente el ácido clorhídrico puede ser sustituido por cualquier fuente adecuada de iones hidrocloruro, siempre que la cantidad de agua en la reacción sea adecuada para la formación del Hidrato de Hidrocloruro. La cantidad adecuada de agua es generalmente al menos dos equivalente molares y generalmente un exceso sobre ésta, por ejemplo una cantidad equivalente a la utilizada en los procedimientos mencionados anteriormente.

La recuperación del compuesto requerido generalmente comprende cristalización utilizando un disolvente apropiado tal como agua o etanol desnaturalizado acuoso.

30 La cristalización se lleva a cabo generalmente a temperatura baja o ambiental, tal como en el intervalo de 0 a 30°C, por ejemplo 25°C; alternativamente, la cristalización puede iniciarse a una temperatura elevada, tal como en el intervalo de 30°C a 60°C, por ejemplo 50°C, y completarse después dejando que la temperatura del disolvente descienda a la temperatura ambiente o a baja temperatura, tal como en el intervalo de 0 a 30°C, por ejemplo 25°C. La cristalización

puede iniciarse por siembra con cristales del Hidrato de Hidrocloruro, pero esto no es esencial.

El Compuesto (I) se prepara de acuerdo con procedimientos conocidos, tales como los descritos en los documentos EP 0.306.228 y WO94/05659. Las memorias descriptivas de los documentos EP 0.306.228 y WO94/05659 se incorporan aquí como referencias.

Cuando se utiliza aquí, la expresión "profilaxis de condiciones asociadas con diabetes mellitus" incluye el tratamiento de condiciones tales como resistencia a insulina, tolerancia disminuida a la glucosa, hiperinsulinemia y diabetes gestacional.

Diabetes mellitus significa preferiblemente diabetes mellitus de Tipo II.

Las condiciones asociadas con diabetes incluyen hiperglucemia y resistencia a la insulina y obesidad. Otras condiciones asociadas con diabetes incluyen hipertensión, enfermedad cardiovascular, especialmente aterosclerosis, ciertos trastornos alimentarios, en particular la regulación del apetito y la ingesta de alimentos en individuos que padecen trastornos asociados con una infra-alimentación, tales como anorexia nerviosa, y trastornos asociados con una alimentación excesiva, tales como obesidad y bulimia. Condiciones adicionales asociadas con diabetes incluyen el síndrome ovárico policístico y resistencia a insulina inducida por esteroides.

Las complicaciones de condiciones asociadas con diabetes mellitus abarcadas aquí incluyen enfermedad renal, especialmente enfermedad renal asociada con el desarrollo de diabetes de tipo II incluyendo nefropatía diabética, glomerulonefritis, esclerosis glomerular, síndrome nefrótico, nefroesclerosis hipertensiva y enfermedad renal en fase terminal.

Como se ha mencionado anteriormente, el compuesto de la invención tiene propiedades terapéuticas útiles: Por consiguiente, la presente invención proporciona el Hidrato de Hidrocloruro para uso como una sustancia terapéutica activa.

Más particularmente, la presente invención proporciona

3651 K

Hidrato de Hidrocloruro para uso en el tratamiento y/o la profilaxis de diabetes mellitus, condiciones asociadas con diabetes mellitus y ciertas complicaciones de las mismas.

El Hidrato de Hidrocloruro se puede administrar tal cual o, preferiblemente como una composición farmacéutica que comprende también un vehículo farmacéuticamente aceptable. La formulación de Hidrato de Hidrocloruro es generalmente la descrita para el Compuesto (I) en las publicaciones mencionadas anteriormente.

10 Por consiguiente, la presente invención también proporciona una composición farmacéutica que comprende Hidrato de Hidrocloruro y un vehículo farmacéuticamente aceptable para el mismo.

Normalmente el Hidrato de Hidrocloruro se administra en una forma de dosificación unitaria.

El compuesto activo se puede administrar por cualquier ruta adecuada, pero habitualmente por ruta oral o parenteral. Para tal uso, el compuesto se empleará normalmente en forma de una composición farmacéutica en asociación con un vehículo, diluyente y/o excipiente farmacéutico, aunque la forma exacta de la composición dependerá naturalmente del modo de administración.

Las composiciones se preparan por mezcla y se adaptan adecuadamente para administración oral, parenteral o tópica, y por tanto pueden estar en forma de comprimidos, cápsulas, preparaciones líquidas orales, polvos, granulados, tabletas, pastillas, polvos reconstituibles, soluciones o suspensiones inyectables o infundibles, supositorios y dispositivos transdérmicos. Se prefieren las composiciones administrables oralmente, en particular las composiciones orales conformadas, ya que son más convenientes para uso general.

Los comprimidos y cápsulas para administración oral se presentan habitualmente en una dosificación unitaria, y contienen excipientes convencionales tales como agentes aglutinantes, cargas, diluyentes, agentes de prensado, lubricantes, disgregantes, colorantes, saborizantes y agentes humectantes. Los comprimidos se pueden revestir de acuerdo con métodos

bien conocidos en la técnica.

Las cargas adecuadas para usar incluyen celulosa, manitol, lactosa y otros agentes similares. Disgregantes adecuados incluyen almidón, polivinilpirrolidona y derivados de almidón tales como sal sódica de glicolato de almidón. Los lubricantes adecuados incluyen, por ejemplo, el estearato de magnesio. Los agentes humectantes farmacéuticamente aceptables incluyen el lauril-sulfato de sodio.

Las composiciones orales sólidas se pueden preparar por métodos convencionales de mezclado, carga, prensado o similares. Se pueden utilizar repetidas operaciones de mezclado para distribuir el agente activo uniformemente en las composiciones que emplean grandes cantidades de cargas. Por supuesto, tales operaciones son convencionales en la técnica.

Las preparaciones líquidas orales pueden estar, por ejemplo en forma de suspensiones, soluciones, emulsiones, jarabes o elixires, acuosos u oleosos, o se pueden presentar como un producto seco para reconstituirlo con agua u otro vehículo adecuado antes de su uso. Tales preparaciones líquidas pueden contener aditivos convencionales tales como agentes de suspensión, por ejemplo sorbitol, jarabe, metilcelulosa, gelatina, hidroxietilcelulosa, carboximetilcelulosa, gel de estearato de aluminio o grasas comestibles hidrogenadas, agentes emulsionantes, por ejemplo lecitina, monooleato de sorbitán o goma arábiga; vehículos no acuosos (que pueden incluir aceites comestibles), por ejemplo, aceite de almendras, aceite de coco fraccionado, ésteres oleosos tales como ésteres de glicerina, propilenglicol, o alcohol etílico; conservantes, por ejemplo, p-hidroxibenzoato de metilo o propilo o ácido sórbico, y si se desea, agentes saborizantes o colorantes convencionales deseados.

Para administración parenteral, se preparan formas de dosificación unitaria fluidas que contienen un compuesto de la presente invención y un vehículo estéril. El compuesto, dependiendo del vehículo y la concentración, o bien puede suspenderse, o disolverse. Las soluciones parenterales normalmente se preparan disolviendo el compuesto activo en un

vehículo y esterilizando por filtración antes de cargarlo en un vial o ampolla adecuado y sellarlo. Ventajosamente, también se disuelven adyuvantes tales como un anestésico local, conservantes y tampones en el vehículo. Para intensificar la
5 estabilidad, la composición se puede congelar después de cargarla en el vial y el agua puede separarse bajo vacío.

Las suspensiones parenterales se preparan sustancialmente de la misma manera excepto que el compuesto activo se suspende en el vehículo en lugar de disolverse y se esteriliza
10 por exposición a óxido de etileno antes de suspenderlo en el vehículo estéril. Ventajosamente, se incluye un agente tensioactivo o humectante en la composición para facilitar la distribución uniforme del compuesto activo.

Como es práctica habitual, las composiciones normalmente
15 irán acompañadas de instrucciones escritas o impresas para uso en el tratamiento médico interesado.

Como se utiliza aquí, la expresión "farmacéuticamente aceptable" abarca compuestos, composiciones e ingredientes tanto para uso humano o veterinario: por ejemplo, la expresión
20 "sal farmacéuticamente aceptable" abarca una sal veterinariamente aceptable.

La presente invención proporciona además un método para el tratamiento y/o la profilaxis de diabetes mellitus, condiciones asociadas con diabetes mellitus y ciertas complicaciones de las mismas, en un ser humano u otro animal mamífero,
25 que comprende administrar una cantidad eficaz y no tóxica del Hidrato de Hidrocloruro a un ser humano u otro animal mamífero que tenga necesidad de ello.

Convenientemente, el ingrediente activo se puede administrar como una composición farmacéutica definida aquí en lo
30 que antecede, y esto constituye un aspecto particular de la presente invención.

Además, el Hidrato de Hidrocloruro se puede utilizar en combinación con otros agentes antidiabéticos tales como secretagogos de insulina, por ejemplo sulfonilureas, biguanidas, tales como metformina, inhibidores de alfa-glucosidasas,
35 tales como acarbosa, beta-agonistas, e insulina, tales como

39 254

los descritos en los documentos WO98/57649, WO98/57634, WO98/57635 o WO98/57636. Los otros agentes antidiabéticos, sus cantidades y los métodos de administración son como los descritos en las publicaciones mencionadas anteriormente. La
5 formulación del Hidrato de Hidrocloruro y sus dosificaciones en dichas combinaciones son generalmente los descritos para el Compuesto (I) en las publicaciones mencionadas anteriormente.

En un aspecto adicional, la presente invención propor-
10 ciona el uso de Hidrato de Hidrocloruro para la fabricación de un medicamento para el tratamiento y/o la profilaxis de diabetes mellitus, condiciones asociadas con diabetes mellitus y ciertas complicaciones de las mismas.

En el tratamiento y/o la profilaxis de diabetes mellitus, condiciones asociadas con diabetes mellitus y ciertas complicaciones de las mismas, el Hidrato de Hidrocloruro se
15 puede tomar en dosis, tales como las descritas en las publicaciones mencionadas anteriormente.

No se indican efectos toxicológicos adversos en los tratamientos mencionados anteriormente para los compuestos de la
20 invención.

Los siguientes ejemplos ilustran la invención pero no la limitan en absoluto.

Preparación de dihidrato de hidrocloruro de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona
25

Ejemplo 1: Se suspendió 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona (4 g) en agua (25 ml), y se añadió ácido clorhídrico concentrado (4 ml), formando una solución clara, y después una suspensión densa.
30 Después de 1 hora, la suspensión se diluyó con agua (10 ml), el producto bruto se filtró y después se lavó con etanol desnaturalizado (20 ml). El producto bruto se agitó en éter dietílico (50 ml), se filtró y se secó a 50°C para dar el compuesto del título (3,1 g, 63%).
35

Ejemplo 2: Se suspendió 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona (4 g) en etanol des-

naturalizado (40 ml), y se añadió ácido clorhídrico concentrado (4 ml), formando una solución. Se añadió agua (40 ml) y la suspensión resultante se enfrió a 0°C y se agitó durante 3 horas. El producto se filtró, se lavó con acetona (2 x 10 ml) y se secó a 50°C para dar el compuesto del título (3,91 g, 82%).

Ejemplo 3: Una mezcla de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona (5,0 g), propan-2-ol (75 ml) y agua (20 ml) se agitó y se calentó a 75°C. Se añadió ácido clorhídrico acuoso (2,8 M, 10 ml) y la mezcla se agitó durante 15 minutos, momento en el que se observó una solución clara. Después de enfriar a 25°C, se añadieron cristales de siembra de dihidrato de hidrocloreuro de rosiglitazona y la mezcla se enfrió a 0-5°C y se agitó durante 2 horas. El producto se recogió por filtración, se lavó con propan-2ol (20 ml) y se secó bajo vacío durante 16 horas para dar el Hidrato de Hidrocloreuro como un sólido cristalino blanco (4,8 g).

DATOS CARACTERIZANTES: Se generaron los siguientes datos caracterizantes para el Hidrato de Hidrocloreuro:

A. Contenido de agua

Este dato se determinó como 8,4% p/p utilizando un aparato Karl Fischer (valor teórico para dihidrato 8,37% p/p).

B. Cloro iónico

Este dato se determinó como 8,5% p/p (valor teórico para el dihidrato 8,26% p/p).

C. Infrarrojo

El espectro de absorción infrarroja de una dispersión del Hidrato de Hidrocloreuro en aceite mineral se obtuvo utilizando un espectrómetro Nicolet 710 FT-IR a una resolución de 2 cm⁻¹. Los datos se digitalizaron a intervalos de 1 cm⁻¹. El espectro obtenido se indica en la Figura I. Las posiciones de los picos son las siguientes: 3.392, 3.139, 3.094, 2.739, 1.758, 1.751, 1.706, 1.643, 1.632, 1.610, 1.583, 1.545, - 1.513, 1.412, 1.357, 1.325, 1.297, 1.265, 1.251, 1.216, - 1.179, 1.152, 1.138, 1.110, 1.080, 1.053, 1.033, 1.010, 985, 953, 931, 909, 827, 822, 812, 769, 739, 724, 713, 660, 620,

#56
X

604, 593, 562, 539, 529 y 508 cm^{-1} .

D. Difracción de rayos X a través de polvo (XRPD)

El modelo de XRPD del Hidrato de Hidrocloruro se indica más adelante en la Figura II y, en la Tabla I, se proporciona un resumen de los ángulos de XRPD y de las distancias reticu-
5 lares calculadas características del Hidrato de Hidrocloruro.

Se utilizó un difractómetro de rayos X a través de polvo, Bruker AXS D8 Advance (fuente de rayos X de Cu) para generar el modelo utilizando las siguientes condiciones de ad-
10 quisición.

	Ánodo de tubo:	Cu
	Tensión del generador:	40 kV
	Corriente del generador:	40 mA
	Ángulo inicial:	$2,0^{\circ}2\theta$
15	Ángulo final:	$35,0^{\circ}2\theta$
	Tamaño del paso:	$0,02^{\circ}2\theta$
	Tiempo por paso:	2,5 s

Tabla I

Ángulos de difracción de rayos X a través de polvo y
distancias reticulares calculadas, característicos del
Hidrato de Hidrocloruro

5

10

15

20

25


30

Ángulo de difracción (°2θ)	Distancia reticular (Angstroms)
9,1	9,75
12,0	7,37
15,7	5,64
16,3	5,42
18,2	4,88
18,6	4,77
19,8	4,48
20,9	4,24
21,6	4,11
22,8	3,89
24,1	3,69
24,7	3,60
25,4	3,50
26,0	3,42
27,5	3,24
27,7	3,21
28,7	3,11
31,4	2,84
31,6	2,83
32,1	2,79
33,1	2,71
33,6	2,66
34,6	2,59

4508

REIVINDICACIONES

1. El dihidrato de hidrocloreuro de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona, de fórmula:



caracterizado porque:

- 5 (i) proporciona un espectro infrarrojo que contiene picos a 3.392, 2.739, 1.751, 1.325 y 713 cm^{-1} ; y/o
- (ii) proporciona un modelo de difracción de rayos X a través de polvo (XRPD) que contiene picos a 9,1, 12,0, 15,7, 16,3 y 19,8°2 θ .
- 10 2. Un hidrato según la reivindicación 1, que proporciona un espectro infrarrojo sustancialmente de acuerdo con la Figura I.
3. Un hidrato según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que proporciona un modelo de difracción de rayos X a través de polvo (XRPD) sustancialmente de acuerdo con la
- 15 Figura II.
4. Un hidrato según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en forma aislada.
5. Un hidrato según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en forma pura.
- 20 6. Un hidrato según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en forma cristalina.
7. Un procedimiento para preparar un hidrato según la reivindicación 1, caracterizado porque la 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona (Compuesto I) se trata con una fuente adecuada de iones contrarios de hidrocloreuro y una cantidad apropiada de agua para que se
- 25 forme el Hidrato de Hidrocloreuro; y, después de esto, se recupera el compuesto requerido.
- 30 8. Una composición farmacéutica, que comprende una cantidad eficaz y no tóxica de un hidrato según la reivindicación 1, y un vehículo farmacéuticamente aceptable para el mismo.
9. Un hidrato según la reivindicación 1, para uso como
- 35 una sustancia terapéutica activa.
10. Un hidrato según la reivindicación 1, para uso en el tratamiento y/o la profilaxis de diabetes mellitus, condi-

45/4

ciones asociadas con diabetes mellitus y ciertas complicaciones de las mismas.

11. El uso del hidrato para la fabricación de un medicamento para el tratamiento y/o la profilaxis de diabetes mellitus, condiciones asociadas con diabetes mellitus y ciertas complicaciones de las mismas.


12. Hidratos conforme a las reivindicaciones 1 a 11 administrables en dosis eficaz no tóxica para el tratamiento y/o profilaxis de la diabetes mellitos, condiciones asociadas y complicaciones de la misma en seres humanos.

45 60
16

RESUMEN

NUEVO FÁRMACO

Dihidrato de hidrocloreuro de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidina-2,4-diona, de fórmula:




que se caracteriza porque:


(i) proporciona un espectro infrarrojo que contiene picos a 3.392, 2.739, 1.751, 1.325 y 713 cm^{-1} ; y/o

(ii) proporciona un modelo de difracción de rayos X a través de polvo (XRPD) que contiene picos a 9,1, 12,0, 15,7, 16,3 y 19,8°2 θ ; un procedimiento para preparar dicho compuesto, una composición farmacéutica que contiene dicho compuesto y el uso de dicho compuesto en medicina.

X62

Figura II. Modelo de difracción de rayos X a través del polvo del hidrato de hidrociluro.






61

1/2

Figura I. Espectro de infrarrojos del hidrato de hidroccloruro.



HCl X

Castillo Grau & Associates

LAW OFFICES
P.O. BOX 251473
BOGOTA, COLOMBIA

Expediente No. 00 - 28.933

Solicitud de Patente

Contiene arte final por triplicado

nota:

Los Artes 6x6 cm y 12x12cm, fueron
retrados para Archivar y publicar,
respectivamente, Marzo 19/02