

24
56

piridina, 5-isoxazolilo, etileniloxi, o etinilo, dicho fenilo y piridina optativamente sustituidos con 1-3 halógeno, CN, OH, CF₃, alquilo de C₁₋₆, o alcoxi de C₁₋₆;

iii) acilo de C₁₋₆ optativamente sustituido con 1-3 grupos de halógeno, OH, SH, alcoxi de C₁₋₆, naftalenoxi, fenoxi, amino, acilamino de C₁₋₆, hidroxilamino, alcoxilamino, aciloxi de C₁₋₆, fenilo, piridina, alquilcarbonilo de C₁₋₆, alquilamino de C₁₋₆, dialquilamino de C₁₋₆, hidroxiaciloxi de C₁₋₆, alquilsulfenilo de C₁₋₆, ftalimido, maleimido, succinimido, dichos fenoxi, fenilo y piridina optativamente sustituidos con 1-3 grupos halo, OH, CN, alcoxi de C₁₋₆, amino, acilamino de C₁₋₆, CF₃ o alquilo de C₁₋₆; o

iv) benzoilo optativamente sustituido con 1-3 grupos de halógeno, OH, alcoxi de C₁₋₆, alquilo de C₁₋₆, CF₃, alcanilo de C₁₋₆, amino o acilamino de C₁₋₆ y todas las demás variables son las descritas aquí.

Aún otra realización de la presente invención se realiza cuando X₁ representa O y todas las demás variables son las descritas aquí.

Una realización preferida de la presente invención se realiza cuando la fórmula estructural es la III: