

5. PERIODO DE 10 DIAS
 Indicador: 337251 00000000 Folios: 7
 Fecha (UTC): 2020-03-25 16:03:26
 Tipo: 102 PATENTES 3 1 REGISTRO/ 444 SEQUESTR
 Dependencia: 2120 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

306

3. Llamo su atención al hecho de que la copia debidamente certificada de la primera solicitud presentada para el invento arriba nombrado respecto de la cual

367

reclamo prioridad, a saber la solicitud británica número 9914977.5 de 1999, junto con la traducción correspondiente a las legalizaciones y reivindicaciones, fueron presentadas a ese Despacho mediante memorial de 11 de Agosto de 2000.

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,


JOSE ANTONIO LLOREDA

T.P. 10.784

Código 231

Nota: Se retiran los folios
169 Tarjeta de propietario
170 Tarjeta de archivo temático
171 Extracto para Publicación
202040

Expediente No		00.047.291	No de Folio
Item		No de Unidades	✓
1	CD		
2	DVD		
3	REVISTA		
4	LIBRO		
5	PERIODICO		
6	DISQUETES		
7	SOBRE DE MANILA	1	✓
8	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA		
9	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO		
10	OTROS:		

Observaciones:

contiene Arte final

DERIVADOS DE FENIL SUSTITUIDOS COMO ACTIVADORES DEL
RECEPTOR ACTIVADO POR EL PROLIFERADOR DE LA PEROXISOMA

CAMPO DE LA INVENCION

5 La presente invención se refiere a ciertos
compuestos novedosos. En particular la presente invención
se refiere a compuestos que activan el subtipo delta del
receptor activado por el proliferador de la peroxisoma
humana ("hPPAR δ "). La presente invención se refiere también
10 a un método para preparar y usar los compuestos novedosos y
métodos para usar los activadores del hPPAR δ .

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

15 Varios factores de riesgo independientes, han
sido asociados con la enfermedad cardiovascular. Estos
incluyen la hipertensión, niveles de fibrinógeno
incrementados, altos niveles de triglicéridos, colesterol
LDL elevado, colesterol total elevado, y bajos niveles de
20 colesterol HDL. Los inhibidores de la HMG CoA reductasa
("estatinas") son útiles para el tratamiento de condiciones
caracterizadas por los altos niveles de LDL-c. Se ha
demostrado que la reducción del LDL-c no es suficiente para
reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular en
25 algunos pacientes, particularmente aquellos con niveles de