



FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1 SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una Solicitud		
2 SOLICITANTE	Nombre NIHON NOHYAKU CO, LTD Dirección 125 Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo, Japón Nacionalidad o Domicilio Tokyo, Japón Lugar de Constitución JAPON Teléfono _____ Fax _____ E mail _____	IDENTIFICACIÓN CC ☐ NT ☐ CE ☐ Otro ☐ Cual _____ Numero <u> </u>
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre GERMAN CUBILLOS MENDOZA Dirección Calle 17 No 8-49, Torre A, Oficina 408, Bogotá, Colombia Teléfono 2432835 Fax 2848489 E mail nannetti@colnet.co	IDENTIFICACIÓN CC ☒ NT ☐ CE ☐ Otro ☐ Cual _____ Numero <u>19 397 479</u> TP <u>38 422</u> C S J
4 Número de expediente <u>00 083069</u>		
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada <u>Desisto de las reivindicaciones primera a sexta. Presento nuevo capítulo reivindicatorio como sigue (Ver siguientes folios)</u> _____ _____ _____ _____		
6 Comprobante de pago No <u>07 - 24,314</u> Fecha <u>Marzo 28 de 2007</u>		
7 Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredite la existencia y representación legal de las partes cuando sean personas jurídicas		
8 NOMBRE <u>GERMAN CUBILLOS MENDOZA</u> FIRMA  CC <u>19 397.479</u> TP <u>38 422</u> C S J		
Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario ver reverso de esta página		

REIVINDICACIONES

1. Un derivado (tiona) de aminoquinazolinona sustituido caracterizado porque está representado por la fórmula general (I), o una sal del mismo:



en donde R es un átomo de hidrógeno; un grupo hidroxilo; un grupo formilo; grupo alquilo (C₁₋₁₂); un grupo halo (C₁₋₆)alquilo; un grupo hidroxil(C₁₋₆)alquilo; un grupo alquénilo (C₂₋₆); un (C₂₋₆) grupo alquinilo; un grupo alcoxilo (C₁₋₆); un grupo halo (C₁₋₆) alcoxilo; un grupo alcoxi (C₁₋₆)alquilo (C₁₋₃); un grupo alcoxi (C₁₋₆)alcoxi(C₁₋₃)alquilo(C₁₋₃); un grupo alquiltio(C₁₋₆); un grupo halo(C₁₋₆)alquiltio; un grupo alquilsulfinilo (C₁₋₆); un grupo alquilsulfonilo (C₁₋₆); un grupo alquiltio (C₁₋₆) alquilo (C₁₋₃); un grupo dialcoxi(C₁₋₆)alquilo(C₁₋₃) en el cual los grupos alcoxilos (C₁₋₆) pueden ser iguales o diferentes; un grupo alquil(C₁₋₆)amino sin sustituir; un grupo alquil(C₁₋₆)amino sustituido que posee uno o dos sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se selecciona del grupo que consiste de grupo alquilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆) alquilo, grupo alquénilo (C₂₋₆) y grupo alquinilo (C₂₋₆); un grupo ciano C₁₋₆)alquilo; un grupo alquilcarbonilo (C₁₋₆); un grupo alcoxycarbonilo(C₁₋₆); un grupo hidroxycarbonil(C₁₋₃)alquilo; un grupo alcoxycarbonil(C₁₋₆)alquilo (C₁₋₃); un grupo aminocarbonilo sin sustituir; un grupo aminocarbonilo sustituido que posee uno o dos sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de grupo alquilo (C₁₋₆), grupo alquénilo (C₂₋₆) y grupo alquinilo (C₂₋₆); un grupo cicloalquil(C₂₋₆)alquilo(C₁₋₃); un


grupo fenil(C₁₋₃) alquilo sin sustituir; un grupo fenil(C₁₋₃) alquilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alquilo, grupo alcoxilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alcoxilo, (C₁₋₆) grupo alquiltio y grupo halo(C₁₋₆)alquiltio; un grupo fenilcarbonilo sin sustituir; un grupo fenilcarbonilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se selecciona del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo(C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alquilo, grupo alcoxilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alcoxilo, grupo (C₁₋₆) alquiltio y grupo halo(C₁₋₆)alquiltio; un grupo feniltio sin sustituir; un grupo feniltio sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo(C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alquilo, grupo alcoxilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alcoxilo, grupo alquiltio (C₁₋₆), y grupo halo(C₁₋₆)alquiltio; un grupo fenilsulfonilo sin sustituir; un grupo fenilsulfonilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se selecciona del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alquilo, grupo alcoxilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alcoxilo, grupo alquiltio (C₁₋₆) y grupo halo(C₁₋₆)alquiltio; un grupo fenil(C₁₋₆) alquilsulfonilo sin sustituir; un grupo fenil(C₁₋₆) alquilsulfonilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alquilo, grupo alcoxilo (C₁₋₆), grupo halo(C₁₋₆)alcoxilo, grupo alquiltio (C₁₋₆) y grupo halo(C₁₋₆)alquiltio; grupo feniloxycarbonilo sin sustituir; un grupo feniloxycarbonilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden

ser iguales o diferentes y se selecciona del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquilo, grupo alcoxilo (C_{1-6}), grupo halo (C_{1-6})alcoxilo, grupo alquiltio (C_{1-6}) y grupo halo(C_{1-6})alquiltio; un grupo feniloxi(C_{1-3})alquilo sin sustituir, un grupo feniloxi(C_{1-3})alquilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo (C_{1-6}), (C_{1-6})grupo halo(C_{1-6})alquilo, grupo alcoxilo (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alcoxilo, grupo alquiltio (C_{1-6}) y grupo halo(C_{1-6})alquiltio; un grupo fenil(C_{2-6})alquenilo sin sustituir, un grupo fenil(C_{2-6})alquenilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupos ciano, grupo alquilo(C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquilo, grupo alcoxilo (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alcoxilo, grupo alquiltio (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquiltio y grupo alquilendioxilo (C_{1-2}); un grupo fenil (C_{2-6})alquinilo sin sustituir; un grupo fenil (C_{2-6})alquinilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo(C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquilo, grupo alcoxilo (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alcoxilo, grupo alquiltio (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquiltio y grupo alquilendioxilo (C_{1-2}); un grupo fenil(C_{2-4})alquinil(C_{1-3})alquilo sin sustituir; un grupo fenil(C_{2-4})alquinil(C_{1-3})alquilo sustituido que posee en el anillo 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo nitro, grupo ciano, grupo alquilo (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquilo, grupo (C_{1-6})alcoxilo, grupo halo (C_{1-6})alcoxilo, grupo alquiltio (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquiltio y grupo alquilendioxilo (C_{1-2}); un grupo 1, 3-dioxolan-2-il(C_{1-3})alquilo; o un grupo ftalimido(C_{1-6})alquilo, R^1 es un anillo

heterocíclico de 5- o 6- miembros que posee 1 a 3 heteroátomos que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste del átomo de oxígeno, átomo de azufre y átomo de nitrógeno, dicho anillo heterocíclico puede tener 1 a 5 sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste de átomos de halógeno, grupo ciano, grupo alquilo (C_{1-6}), grupo halo(C_{1-6})alquilo y grupo alcoxilo (C_{1-6}) , y el átomo de nitrógeno en el anillo heterocíclico puede formar un grupo N-óxido,

Y es el átomo de un oxígeno o un átomo de azufre,

Z es



(en donde R^2 es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo (C_{1-6}) o un grupo halo(C_{1-6})alquilo), y R^3 es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo (C_{1-6}), un grupo formilo, un grupo alquilcarbonilo (C_{1-3}) o un grupo halo(C_{1-3})alquilcarbonilo),

X puede ser igual o diferente, y es un grupo halo (C_{1-10}) alquilo; y n es un entero de 1 a 4.

2. Una composición que comprende como ingrediente activo un derivado (tiona) de aminoquinazolinona sustituido o una sal del mismo de acuerdo con la reivindicación 1.

720 - 6

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 00-083069-00009-0000

Fecha: 2007-05-03 14:49:30 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 2 PATENTES Evt: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 6

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 24,314
: MARZO 26 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
MORISOL ROSALES	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	59310045	26/03/2007	3,268.000.00

***** CONCEPTO *****

RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	99,000.00
	TOTAL :	\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____