

x) benzoilo optativamente sustituido con 1-3 grupos de halógeno, OH, alcoxi de C1-6, alquilo de C1-6, CF₃, alcanoilo de C1-6, amino o acilamino de C1-6;

xi) pirrolilcarbonilo optativamente sustituido con 1-3 de alquilo de C1-6;

xii) aciloxiacetilo de C1-2 donde el acilo se sustituye optativamente con amino, alquilamino de C1-6, dialquilamino de C1-6, 4-morfolino, 4-aminofenilo, 4-(dialquilamino)fenilo, 4-(glicilamino)fenilo; o

R5 y R6 tomados junto con cualquier átomo interviniente pueden formar un anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros que contiene átomos de carbono y 1-2 heteroátomos independientemente elegidos de O, S, SO, SO₂, N, o NR₈;

R7 representa

i) hidrógeno, halógeno, (CH₂)_pheterociclilo de C₅₋₁₀, CN, CO₂R, CON(R)₂, CHO, (CH₂)₀₋₃NHAc, C(=NOR), OH, alcoxi de C1-6, alquilo de C1-6, alquenilo, hidroxil alquilo de C1-6, (CH₂)₁₋₃NHC(O)alquilo de C1-6, (CH₂)₀₋₃N(alquilo de C1-6)₂, NHCO₂R, -OCO alquilo de C1-6;