

69344

(6,0 mg) de rutenio(III) y periodato de sodio (856 mg) a 0 °C, el precipitado se mezcló a la misma temperatura durante 2 horas. Luego de diluir la mezcla con hexanol y eter, la mezcla se extrajo con hexanol. Los extractos orgánicos se lavaron con saladar, se secaron sobre anhidro de sulfato de magnesio, se filtraron, y luego se concentraron al vacío. La cromatografía de destello (sílice, hexanol: acetato de etilo = 1:1) del residuo proporcionó el EJEMPLO DE REFERENCIA 18 (438 mg).

MS (FAB⁺) m/z: 266 (MH⁺).

HRMS (FAB⁺) para C₉H₁₆NO₆S (MH⁺): calculado, 266,0698; encontrado, 266,0730.

EJEMPLO DE REFERENCIA 19

5-Bromo-2-[(1 α ,5 α ,6 β)-3-t-butoxicarbonil-6-Ciano-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-il]piridina.

A una suspensión de hidruro de sodio (60% de dispersión de aceite, 2,24 g) en dimetoxietano (110 mL) se agregó una solución de 5-bromo-2-piridilacetonitrilo (5,0 g) en dimetoxietano (20 mL)