

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611

TELEFAX: (57) (1) 317-0211 (57) (1) 310-4995

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Radicacion : 02056452 00000002 Folios: 34
Fecha (AMD): 2002-09-12 10:20:35
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 02.056.452
Solicitante : SANKYO COMPANY, LIMITED
Asunto : Solicitud de patente para "COMPLEJO QUE
COMPRENDE FACTOR INHIBIDOR DE
OSTEOCLASTOGÉNESIS Y POLISACÁRIDO"
Fecha de solicitud : 28 de junio de 2002.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 13481, notificado por fijación en lista del 25 de julio de 2002.

2. Mediante el oficio número 13481 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Cesión de inventores. Presento junto con este escrito el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, debidamente legalizado, junto con su respectiva traducción oficial.

2.2. Copia Certificada. Presento con este escrito copia certificada de la solicitud de patente japonesa número 2001-198985 del 29 de junio de 2001 junto con su respectiva traducción de su descripción, reivindicaciones y carátula, en la cual se basa la reivindicación de la prioridad.

2.3. Cesión del derecho de prioridad. Presento con este memorial el documento en que la sociedad Snow Brand Milk Products, la cual fue solicitante junto con la sociedad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Sankyo Company, Limited de la solicitud de patente japonesa de la cual se reivindica prioridad, cede su derecho de prioridad a la sociedad Sankyo Company, Limited y la autoriza para que presente en Colombia como única solicitante la solicitud de patente de la referencia.

3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Bogotá, **12 SEP 2002**
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

MR
COLO 01579-801-001-1
MRE/MRE/
ID-000012/WPCL1579

4.

CAVELIER

ABOGADOS
EDIFICIO SISKI
CARRERA 4ª N° 72-35
BOGOTÁ, 8 - COLOMBIA.

CESION

Yo, (nosotros), abajo firmado (s)
Shinichi Yamamoto, Junichi Okada,
Atsushi Kurihara, Taku Numazawa,
Junichi Kondo, Eisuke Tsuda,
Shinichi Mochizuki, Hirotaka Nishi &
Hideki Miyazaki
domiciliado (s) en
c/o SANKYO CO., LTD., 2-58 Hiromachi 1-chome
Shinagawa-ku, Tokio 140-8710, Japon.

declaro(amos) bajo juramento ser unico(s) y
verdadero(s) inventor(es) de la invención:
"Complejo que comprende factor inhibidor de
osteoclastogenesis y polisacáride"

declaro(amos) así mismo que cedo(emos) y
transfiero(erimos), sin limitación, a favor de la
sociedad SANKYO COMPANY, LIMITED

constituída y existente de conformidad con las
leyes de Japon

domiciliada en 5-1, Nihonbashi Honcho
3-chome, Chuo-ku, Tokio 103-8426, Japon

todos los derechos inherentes a dicha invención y
que la citada Compañía queda facultada para
solicitar en su nombre la patente correspondiente
en la República de Colombia.

ASSIGNMENT

I (we), the undersigned
Shinichi Yamamoto, Junichi Okada,
Atsushi Kurihara, Taku Numazawa,
Junichi Kondo, Eisuke Tsuda,
Shinichi Mochizuki, Hirotaka Nishi &
of Hideki Miyazaki
c/o SANKYO CO., LTD., 2-58 Hiromachi 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710, Japan

state(s) under oath to be sole and
true inventor(s) of the invention:
"A Complex Comprising OCIF and Poly-
saccharide"

state as well, that assign, without reservations
or limitations in favour of
SANKYO COMPANY, LIMITED

a corporation constituted and existing in
conformity with the laws of Japan

domiciled in 5-1, Nihonbashi Honcho
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8426,
Japan

all rights inherent to said invention and that
the above mentioned company hereby is
enabled to apply, in its name, for
the corresponding patent in the Republic
of Colombia.

Dado y firmado hoy / Given and signed this

en/in

Shinichi Yamamoto
Firma Shinichi Yamamoto Signature

Junichi Okada
Firma Junichi Okada Signature

Atsushi Kurihara
Firma Atsushi Kurihara Signature

Taku Numazawa
Firma Taku Numazawa Signature

Junichi Kondo
Firma Junichi Kondo Signature

Eisuke Tsuda
Firma Eisuke Tsuda Signature

Shinichi Mochizuki
Firma Shinichi Mochizuki Signature


Hirotaka Nishi
Firma Hirotaka Nishi Signature

Hideki Miyazaki
Firma Hideki Miyazaki Signature

4

400

1.2



98 AB
Registration No. 922
8938


NOTARIAL CERTIFICATE

I, NOTARY, duly authorized, admitted and practising at Tokyo, Japan, DO HEREBY CERTIFY THAT:

The signatures that appear at the foot of foregoing document are the genuine and authentic signatures of Shinichi Yamamoto, Junichi Okada, Atsushi Kurihara, Taku Numazawa, Junichi Kondo, Eisuke Tsuda, Shinichi Mochizuki, Hirotaka Nishi and Hideki Miyazaki.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereto subscribed my name and affixed my seal of office.

JUL 5 2002



Akira Kitani
AKIRA KITANI
NOTARY

平成 14 年 登 簿 第

922 号

100

100

99

99

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN

This public document

2. has been signed by Toshiaki HOUKIN

3. acting in the capacity of Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau

4. bears the seal/stamp of

Certified

5. at Tokyo

6. JUL 5 2002

7. by the Ministry of Foreign Affairs

8. 02 - N^o 001892

9. Seal/stamp:

10. Signature:



S. Hagiwara

Shinichi HAGIWARA

For the Minister for Foreign Affairs



104¹

TRADUCCIÓN OFICIAL 122/2002 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL, REALIZADA POR EDUARDO CALADO NOGUERA, TRADUCTOR OFICIAL APROBADO POR RESOLUCIÓN 541 DEL 27 DE FEBRERO DE 1976 POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y MEDIANTE EL CUAL SHINICHI YAMAMOTO, JUNICHI OKADA, ATSHSHI KURIHARA, TAKU NUMAZAWA, JUNICHI KONDO, EISUKE TSUDA, SHINICHI MOCHIZUKI, HIROTAKA NISHI Y HIDEKI MIYAZAKI, DOMICILIADOS EN c/o SANKYO CO., LTD., 2-58 HIROMACHI 1-chome Shinagawa-ku, Tokio 140-8710, Japón INVENTORES ÚNICO Y VERDADEROS DE LA INVENCION: "COMPLEJO QUE COMPRENDE FACTOR INHIBIDOR DE OSTEOCLASTOGENESIS Y POLISACÁRIDO, DECLARA POR EL PRESENTE QUE CEDE DICHA INVENCION A SANKYO COMPANY, LIMITED, EMPRESA ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE JAPÓN, DOMICILIADA EN 5-1, NIHONBASHI HONCHO, 3-chome, Chuo-ku, Tokio 103-8426, Japón, JUNTO CON TODOS LOS DERECHOS INHERENTES Y QUE DICHA COMPAÑÍA QUEDA FACULTADA PARA SOLICITAR EN SU NOMBRE LA PATENTE CORRESPONDIENTE EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. DADO Y FIRMADO HOY (DATO EN BLANCO)


FIRMADO: SHINICHI YAMAMOTO FIRMADO: JUNICHI OKADA. ATSHUSHI KURIHARA, TAKU NUMAZAWA, JUNICHI KONDO, EISUKE TSUDA, SHINICHI MOCHIZUKI, HIROTAKA NISHI, HIDEKI MIYAZAKI.

REGISTRO 922

CERTIFICADO NOTARIAL

Yo, notario debidamente autorizado y practicante en Tokio, Japón, por el presente certifico que las firmas que aparecen al pie del documento precedente son las firmas genuinas y auténticas de

1



102
~~0033~~
102

SHINICHI YAMAMOTO, JUNICHI OKADA, ATSHSHI KURIHARA, TAKU
NUMAZAWA, JUNICHI KONDO, EISUKE TSUDA, SHINICHI MOCHIZUKI,
HIROTAKA NISHI Y HIDEKI MIYAZAKI.

En testimonio de lo cual, he firmado y fijado mi sello oficial.

5 de julio de 2002. Firmado: Akira Kitani, notario

Sello: Oficina de Asuntos Jurídicos de Tokio, notario. 1-1,
2Chome Uchisaiwaicho, Chiyoda-Ku, Tokio, Japón.

CERTIFICADO

Por el presente se certifica que la firma que arriba aparece ha
sido escrita por notario debidamente autorizado por la Oficina de
Asuntos Jurídicos de Tokio y que el sello oficial que aparece
sobre la misma es genuino. Fecha 5 de julio de 2002.

Toshiaki HOUKIN

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE TOKIO

APOSTILLA:

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. Japón .Este documento público
2. ha sido firmado por Toshiaki HOUKIN
3. quien actúa en su calidad de DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE TOKIO
4. lleva el sello/estampilla de (dato en blanco)

CERTIFICADO

5. en Tokio

6. el 5 de julio de 2002

103
3
~~0160~~
7. por el Ministerio de Relaciones Exteriores

8. Número 02- No. 001892

9. Sello: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, JAPÓN

10. Firma: Shinichi HARIWARA, a nombre del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

COLO-01579-801-001-1

WPCL002G. ID 3677

Bogotá, 9 de septiembre de 2002.

Eduardo Calado

Eduardo Calado Noguera

TRADUCTOR OFICIAL

INGLES - ESPAÑOL - INGLES

Res. 541 Febrero de 1999

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

EDUARDO CARRO


017620

CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2002 SEP -9 P 1:15

JUAN
SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.



COBO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. (CIRCULO DE LOS ANTERIORES) BR

Carla María Carrero

IDENTIFICADOS CON C.D. NO (S)

ES (SON) AUTÉNTICA(S)

SANTA FE DE BOGOTÁ, 09 SEP 2002

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

104
0101
104

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2001年 6月29日

出願番号
Application Number:

特願2001-198985

[ST.10/C]:

[JP2001-198985]


出願人
Applicant(s):

三共株式会社
雪印乳業株式会社

2002年 4月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3025659

100

105
105
0102

【書類名】 特許願
【整理番号】 2001091KW
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 A61K 38/19
C07K 14/52

【発明者】
【住所又は居所】 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内
【氏名】 山本 真一

【発明者】
【住所又は居所】 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内
【氏名】 岡田 純一

【発明者】
【住所又は居所】 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内
【氏名】 栗原 厚

【発明者】
【住所又は居所】 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内
【氏名】 沼沢 琢

【発明者】
【住所又は居所】 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内
【氏名】 近藤 淳一

【発明者】
【住所又は居所】 栃木県河内郡南河内町祇園2-13-1 ダイアパレス
自治医大5番館407
【氏名】 津田 英資

【発明者】
【住所又は居所】 栃木県河内郡南河内町緑5丁目22番6号
【氏名】 望月 伸一

【特許出願人】
【識別番号】 000001856

12

【氏名又は名称】 三共株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000006699

【氏名又は名称】 雪印乳業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100081400

【弁理士】

【氏名又は名称】 大野 彰夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010216

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704937

【プルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】OCIF及びデキストラン硫酸の複合体

【特許請求の範囲】

【請求項1】

破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体が、1:1乃至1:8の分子比で結合する、破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体。

【請求項2】

多糖類又はその誘導体がデキストラン硫酸である、請求項1に記載の複合体。

【請求項3】

デキストラン硫酸の平均分子量が1800乃至6000である、請求項2に記載の複合体。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか一つに記載の複合体を有効成分として含有する骨代謝異常症治療剤。

【請求項5】

破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体を混合して保温し、次いで遊離の多糖又はその誘導体を除去することを特徴とする、破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体の製造法。

【請求項6】

アルカリ性条件下において破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体を保温する、請求項5に記載の製造法。

【請求項7】

pH10乃至11の条件下において破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導

18



108

0105
108

体を保温する、請求項6に記載の製造法。

【請求項8】

ゲル濾過により遊離の多糖又はその誘導体を除去することを特徴とする、請求項5乃至7のいずれか一つに記載の製造法。

【請求項9】

多糖又はその誘導体がデキストラン硫酸である、請求項5乃至8のいずれか一つに記載の製造法

【請求項10】

請求項5乃至9のいずれか一つに記載の製造法により得られることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか一つに記載の複合体。

【請求項11】

請求項10に記載の複合体を有効成分として含有する骨代謝異常症治療剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、破骨細胞形成抑制因子 (Osteoclastogenesis Inhibitory Factor : 以下、「OCIF」という。 : WO96/26217号公報参照)、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体が、1 : 1乃至1 : 8の分子比で結合する、破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体、該複合体を有効成分として含有する骨代謝異常症治療剤、OCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体を混合して保温し、次いで遊離の多糖又はその誘導体を除去することを特徴とする、OCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体の製造法等に関する。

【0002】

【従来の技術】

骨は生体内カルシウムの約99%を保持し、骨形成と骨吸収による血中カルシ

2-

ウム濃度の恒常性の維持に重要な役目を果たしている。骨吸収の過程で主な働きを担う破骨細胞が異常に形成又は活性化されると骨吸収が促進して血中カルシウム濃度が上昇し高カルシウム血症となる。癌が骨に転移するとサイトカイン類の分泌が異常となり高カルシウム血症を呈することが知られているが、この過程においても破骨細胞による骨吸収促進が血中カルシウム濃度の上昇をもたらしている。癌性高カルシウム血症を伴う癌患者の予後は概して不良である。

【0003】

また、慢性関節リウマチ等のリウマチや変形性関節症においては、破骨細胞の異常な形成又は活性化が骨や関節に見られる諸症状の主要な原因のひとつとして知られている。慢性関節リウマチ等のリウマチや変形性関節症は激しい痛みを伴うため患者の生活に著しい不利益をもたらす。

【0004】

さらに、閉経後の女性ホルモン分泌低下や加齢により骨吸収と骨形成の平衡が骨吸収側へ継続的に傾斜した場合、骨密度が低下し骨粗鬆症を発症するが、この際にも骨吸収を担うのは破骨細胞である。骨粗鬆症の危険性が高い高齢患者が骨折した場合は寝たきりとなる可能性が高く、社会的な課題となっている。

【0005】

従来、これらの病態に対してはエストロゲン等のホルモン補充療法や破骨細胞の活動を抑制するビスフォスフォネート類及びカルシトニン類などの治療剤が使用されてきた。しかし、ホルモン類は発癌危険性を高める上、子宮内膜症の誘発や性器からの異常出血等の副作用の懸念がある。ビスフォスフォネート類はカルシウムと結合し易いので骨に蓄積されることが知られているが、骨の強度をどの程度改善しているのかに疑問を持つ研究者もあり、腎障害の危険性も報告されている。カルシトニン類は骨密度の上昇が一過性であり、休薬によるリバウンドやヒト以外の動物に由来する汎用カルシトニンのヒト体内における免疫原性又は抗原性の発現及び抗体出現による薬効の低下が指摘されてきた。血中カルシウム濃度上昇の要因である骨吸収は破骨細胞が担っているが、これらの既存の薬剤はいずれも破骨細胞の形成を抑制する作用は持たず、高カルシウム血症および骨代謝異常症の根本的な治療を行なうのにじゅうぶんな薬剤とは言い難い。

【0006】

OCIFは破骨細胞前駆細胞が破骨細胞への分化及び成熟破骨細胞による骨吸収活性を阻害する内因性蛋白質として知られている（WO96/26217号公報等参照）。OCIFにより骨吸収の主役である破骨細胞自体の形成及び成熟破骨細胞による骨吸収活性を抑制することができれば、骨吸収に起因する上記疾病を根本的に治療することが可能となるものと期待された。しかし、OCIFは等電点が9付近にある塩基性蛋白質であり、循環血液中からは速やかに消失する。

【0007】

WO2000/24416号公報には、OCIFと多糖類又はその誘導体を混合することにより、OCIFの血中滞留性を改善し、その薬効を高める手法が開示されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

発明者らは、OCIFの血中滞留性を更に改善するべく鋭意研究を行った結果、OCIF及び多糖の誘導体であるデキストラン硫酸をアルカリ性条件下で処理することにより得られた、OCIF及び多糖の誘導体であるデキストラン硫酸の複合体の血中滞留性が、従来公知のOCIF及びデキストラン硫酸からなる組成物のそれと比較して、有意に改善されていることを見出し、本発明を完成した。

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明は、

(1)

破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体が、1:1乃至1:8の分子比で結合する、破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体、

(2)

多糖類又はその誘導体がデキストラン硫酸である、(1)に記載の複合体、

(3)

17

デキストラン硫酸の平均分子量が1800乃至6000である、(2)に記載の複合体、

(4)

(1)乃至(3)のいずれか一つに記載の複合体を有効成分として含有する骨代謝異常症治療剤、

(5)

破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体を混合して保温し、次いで遊離の多糖又はその誘導体を除去することを特徴とする、破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体の製造法、

(6)

アルカリ性条件下において破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体を保温する、(5)に記載の製造法、

(7)

pH10乃至11の条件下において破骨細胞形成抑制因子、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体を保温する、(6)に記載の製造法、

(8)

ゲル濾過により遊離の多糖又はその誘導体を除去することを特徴とする、(5)乃至(7)のいずれか一つに記載の製造法、

(9)

多糖又はその誘導体がデキストラン硫酸である、(5)乃至(8)のいずれか一つに記載の製造法、

(10)

(5)乃至(9)のいずれか一つに記載の製造法により得られることを特徴とする、(1)乃至(3)のいずれか一つに記載の複合体、及び、

(11)

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

(10)に記載の複合体を有効成分として含有する骨代謝異常症治療剤、に関する。

【0010】

【発明の実施の形態】

本発明のOCIF、その類縁体又はその変異体は、WO96/26217号公報若しくはWO97/23614号公報に記載された方法により、動物の組織、動物の体液若しくは動物細胞の培養液等からタンパク質として抽出精製された天然型として、又はOCIF、その類縁体若しくはその変異体をコードするポリヌクレオチドを含有するベクターで形質転換された動物細胞や大腸菌等の宿主細胞が生産する遺伝子組換え型として、得ることができる。

【0011】

本発明のOCIF、その類縁体及びその変異体の起源は特に限定されないが、好適にはヒト、ラット、マウス、ウサギ、イヌ、ネコ、ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等の哺乳動物又はニワトリ、ガチョウ、シチメンチョウ等の鳥類由来であり、より好適にはヒトOCIFである。

【0012】

また、本発明のOCIF及びその類縁体は、一本鎖のポリペプチドとして生産されるが、非還元条件下におけるSDS-PAGEによる分子量は約60000又は約120000であり(WO96/26217号公報参照)、好適には分子量約120000の2量体である。

【0013】

本発明において、OCIF類縁体とは、ヒトOCIF cDNAをプローブとするハイブリダイゼーション法により、動物細胞、体液又は組織由来のcDNAライブラリーより得ることができるポリヌクレオチドにコードされたタンパク質であり、そのようなOCIF類縁体としてOCIF2、OCIF3、OCIF4、OCIF5(いずれも、WO96/26217号公報参照)、ヒト以外の動物由来のOCIF等を例示することができる。そのようなOCIF類縁体は、ヒトOCIF cDNAをプローブとしたハイブリダイゼーション法によりOCIF類縁体をコードするcDNAを得、発現ベクターへ挿入し、該ベクターで宿主細胞を

10-10-10



形質転換し、発現させることにより、得ることができる（WO96/26217号公報参照）。

【0014】

本発明において、OCIF変異体とは、ヒトOCIFと1又は2以上のアミノ酸が置換、欠失、付加又は挿入され且つOCIF活性を有するタンパク質を意味する。そのようなOCIF変異体は、OCIF又はその類縁体をコードするヌクレオチドに、PCR法、遺伝子組換え法、又は、制限酵素等のエキソ型ヌクレアーゼ若しくはエンド型ヌクレアーゼを用いた切断法により、1又は2以上のヌクレオチドの置換、欠失、付加及び／又は挿入を行い、次いで得られたヌクレオチド変異体を挿入した発現ベクターで動物細胞又は大腸菌等の宿主細胞を形質転換し、該宿主細胞の発現するタンパク質画分から常法に従って精製することにより、得ることができる。

【0015】

また、ヒトOCIFのアミノ酸配列のカルボキシ末端から相当部分を欠失させた、短鎖型OCIFにもOCIF本来の生物活性を保持している分子が知られている（WO96/26217号公報及びWO97/23614号公報参照）。本発明のOCIF変異体には、OCIF活性を有する短鎖型OCIFも包含される。そのような短鎖型OCIFのアミノ末端には、必要に応じて、メチオニンが付加され得る。

【0016】

さらに、OCIFは免疫グロブリンのFcドメイン等との融合タンパク質としても活性を保持している例が知られており（WO97/23614号公報参照）、本発明のOCIF変異体にはそのようなOCIFの融合タンパク質も包含される（WO97/23614号公報参照）。

【0017】

また、OCIFは水溶性ポリマー等の化学修飾を受けるとその活性に改善が見られることが知られており、本発明のOCIF変異体はそのような化学修飾OCIFをも包含する。化学修飾OCIFとしては、ポリエチレングリコールが結合したOCIFを例示することができる（WO97/23614号公報参照）。



【0018】

このような本発明のOCIF変異体としては、OCIF-C19S、OCIF-C20S、OCIF-C21S、OCIF-C22S、OCIF-C23S、OCIF-DCR1、OCIF-DCR2、OCIF-DCR3、OCIF-DCR4、OCIF-DDD1、OCIF-DDD2、OCIF-CL、OCIF-CC、OCIF-CDD2、OCIF-CDD1、OCIF-CCR4、OCIF-CCR3、OCIF-CBst、OCIF-CSph、OCIF-CBsp、OCIF-CPst（以上、WO96/26217号公報参照）、muOPG[22-401]-Fc、muOPG[22-194]-Fc、muOPG[22-185]-Fc、muOPG[22-180]-Fc、muOPG[22-401]、muOPG[22-401]C195、muOPG[22-401]C202、muOPG[22-401]C277、muOPG[22-401]C319、muOPG[22-401]C400、muOPG[22-185]、muOPG[22-194]、muOPG[22-200]、muOPG[22-212]、muOPG[22-293]、muOPG[22-355]、huOPG[22-401]-Fc、huOPG[22-201]-Fc、huOPG[22-401]-Fc P26A、huOPG[22-401]-Fc Y28F、huOPG[22-401]、huOPG[27-401]-Fc、huOPG[29-401]-Fc、huOPG[32-401]-Fc、MuOPG met[22-194]、MuOPG met[22-194] 5k PEG、MuOPG met[22-194] 20k PEG、HuOPG met[22-194] P25A、HuOPG met[22-194] P25A 5k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 20k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 31k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 57k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 12k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 20k 分岐PEG、HuOPG met[22-194] P25A 8k PEG ダイマー、HuOPG met[22-194] P25A ジスルフィド架橋（以上、WO97/23614号公報参照）等を例示する

10

10-10-10



ことができ、好適には、OCIF-C19S、OCIF-C20S、OCIF-C21S、OCIF-C22S、OCIF-C23S、OCIF-DCR1、OCIF-DCR2、OCIF-DCR3、OCIF-DCR4、OCIF-DDD1、OCIF-DDD2、OCIF-CL、OCIF-CC、OCIF-CD2、OCIF-CDD1、OCIF-CCR4、OCIF-CCR3、OCIF-CBst、OCIF-CSph、OCIF-CBsp、OCIF-CPst、 μ OPG[22-401]-Fc、 μ OPG[22-194]-Fc、 μ OPG[22-185]-Fc、 μ OPG[22-180]-Fc、 μ OPG[22-401]C195、 μ OPG[22-401]C202、 μ OPG[22-401]C319、 μ OPG[22-401]C400、 μ OPG[22-194]、 μ OPG[22-200]、 μ OPG[22-212]、 μ OPG[22-293]、 μ OPG[22-355]、huOPG[22-401]-Fc、huOPG[22-201]-Fc、huOPG[22-401]-Fc P26A、huOPG[22-401]-Fc Y28F、huOPG[22-401]、huOPG[27-401]-Fc、huOPG[29-401]-Fc、huOPG[32-401]-Fc、MuOPG met[22-194] 5k PEG、MuOPG met[22-194] 20k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 5k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 20k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 31k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 57k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 12k PEG、HuOPG met[22-194] P25A 20k 分岐PEG、HuOPG met[22-194] P25A 8k PEGダイマー、HuOPG met[22-194] P25A ジスルフィド架橋である。

【0019】

本発明のOCIF、その類縁体及びその変異体には、糖鎖が付加していてもよい。糖鎖が付加したOCIF、その類縁体又はその変異体としては、動物細胞が生産する組換え型OCIF、動物組織等から単離された天然型のOCIF等を例

1914-1915



示することができる。糖鎖が付加したOCIF、その類縁体及びその変異体の生産に適した動物細胞としては、チャイニーズ・ハムスター・オヴァリー (Chinese Hamster Ovary: 以下、「CHO」という。) 細胞等の哺乳動物細胞を例示することができる。ちなみに、糖鎖が付加していない、遺伝子組換え型のOCIF、その類縁体及びその変異体の生産に適した細胞としては、大腸菌等の原核細胞等を例示することができる。

【0020】

本発明において、多糖又はその誘導体とは、単糖がグリコシド結合することにより生じる重合体（グルカン）又はその誘導体であり、好適には構成単糖が2種類以上からなるヘテロ多糖（ヘテログリカン）又はその誘導体である。具体的には、天然型の多糖又はその誘導体としては、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、デルマタン酸、ヘパラン酸、ケラタン酸、カラギーナン、ペクチン、ヘパリン等を例示することができ、合成型の多糖又はその誘導体としては、デキストラン硫酸等を例示することができ、好適にはデキストラン硫酸である。

【0021】

本発明において、デキストラン硫酸とはデキストラン硫酸又はその塩であり、好適にはデキストラン硫酸ナトリウムである。デキストラン硫酸ナトリウムとしては、デキストラン硫酸ナトリウムイオウ5（名糖産業（株）製）、デキストラン硫酸ナトリウム5000、デキストラン硫酸10000（ともに、和光純薬（株）製）等を例示することができる。

【0022】

デキストラン硫酸の分子量は次のようにして算出される；

1) デキストランの分子量の測定

デキストランの極限粘度（極限粘度の測定法は、第十三改正、日本薬局方 解説書、廣川書店刊（1998）、デキストラン40の項参照）より、下記の佐藤の式により算出することができる（第十三改正、日本薬局方 解説書、廣川書店刊（1998）、デキストラン40の項参照）。

$$\text{極限粘度} = 9.00 \times 10^{-4} \times \text{分子量}^{0.50}$$

1941-1942

2) イオウ含量の測定

日本薬局方(第十四改正、じほう刊(2001)、デキストラン硫酸イオウ5の項参照)記載の方法によりデキストラン硫酸上のイオウ含量を重量%として測定した。

【0023】

デキストランの構成単位であるグルコースの分子量は本来180であるが、デキストラン分子中ではグルコースが $\alpha-1, 6$ 結合しているため、デキストラン分子中のグルコースの実質的な分子量は180から水1分子分の分子量を差し引いた値、すなわち162である。

【0024】

デキストラン硫酸においては、上述のようなデキストラン分子中のグルコースの有する酸素1原子が SO_3Na (1グラム当量103)に置換されているので、イオウの置換度(以下、単に「置換度」という。)は下記式により表される

$$\text{イオウ含量(重量\%)} = \{32 \times \text{置換度} \div (162 + 102 \times \text{置換度})\} \times 100$$

3) デキストラン硫酸の分子量の算出

上述の通りデキストランの構成単位であるグルコースの実質的な分子量は162であるので、下記式によりデキストラン硫酸の分子量を算出することができる

$$\text{分子量} = \text{デキストランの分子量} \times (162 + 102 \times \text{置換度}) \div 162$$

デキストラン硫酸は一定の分子量分布を有していることが知られており、本発明においては、デキストラン硫酸の平均分子量をもってその分子量に代える。

【0025】

本発明において好適に使用されるデキストラン硫酸ナトリウムイオウ5(名糖

24

1943-1944



産業（株）製の、上記2）に従って算出されたイオウ置換度（平均値±標準偏差）は 0.32 ± 0.01 （ $n=7$ ）であり、上記1）乃至3）に従って算出された分子量（平均値±標準偏差）は 1950 ± 70 （ $n=7$ ）である。同じく好適なデキストラン硫酸であるデキストラン硫酸ナトリウム5000（和光純薬（株）製）は分子量5000である。

【0026】

本発明において使用される多糖又はその誘導体の平均分子量は、特に限定されるものではないが、好適な多糖又はその誘導体である、デキストラン硫酸の平均分子量は通常1500乃至12000の範囲であり、より好適には1800乃至6000である。

【0027】

本発明の多糖又はその誘導体は、そのまま使用してもよいが、精製、分画したものを使用してもよい。

【0028】

本発明の提供する、OCIF、その類縁体及びその変異からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体における両者の分子比は、本発明のOCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質：多糖又はその誘導体＝1：1乃至1：10であり、好適には1：1乃至1：8であり、より好適には1：1乃至1：6であり、より一層好適には1：1乃至1：4である。

【0029】

上述の通り、OCIFは2量体を形成することが知られており（WO96/26217号公報参照）、OCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質は、ホモ又はヘテロ2量体や、単量体3つ以上からなるホモ又はヘテロ多量体であり得るが、本発明における当該分子比は、OCIF、その類縁体及びその変異からなる群から選択される1又は2以上の物質単量体（モノマー）1分子当たりの多糖又はその誘導体の分子数として計算される。

【0030】

本発明のOCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又

1918-1919



は2以上の物質並びに並びに多糖又はその誘導体の複合体は、両者を水溶液中にて保温すること等により得ることができる。両者を水溶液中で保温する場合、OCIF、その類縁体及びその変異体の水溶液中の濃度範囲は、上限が10乃至50mg/ml、下限が0.1乃至5mg/mlであり、好適な範囲は1乃至20mg/ml、より好適な範囲は5乃至10mg/mlである。多糖又はその誘導体の該水溶液中の濃度範囲は、上限が200mg/ml乃至1000mg/ml、下限が0.1乃至100mg/mlであり、好適な範囲は10乃至500mg/ml、より好適な範囲は100乃至200mg/mlである。該水溶液のpHは、上限がpH11乃至12、下限がpH6乃至10であり、好適な範囲はpH10乃至11である。該水溶液を保温する温度は、上限が37乃至50℃、下限が0乃至4℃であり、好適な範囲は4乃至37℃であり、より好適な範囲は4乃至10℃である。

【0031】

本発明のOCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体は、OCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体が、共有結合、イオン結合、配位結合等の化学的結合、又は、疎水性的相互作用、水素結合、静電的相互作用、親和性結合等の非化学的結合により互いに結合したものである。

【0032】

該複合体は、遊離の多糖又はその誘導体を含有していない。

【0033】

遊離の多糖又はその誘導体を除去する方法としては、通常、精製、単離及び分画の操作に適用される手段であれば特に限定されるものではないが、例えば、イオン交換クロマトグラフィー、吸着クロマトグラフィー、分配クロマトグラフィー、ゲル濾過（分子ふるい）クロマトグラフィー、疎水クロマトグラフィー、アフィニティクロマトグラフィー、結晶化、塩析、限外濾過等を挙げることができ、好適にはゲル濾過クロマトグラフィー（以下、単に「ゲル濾過」という。）、限外濾過等を挙げることができる。

1981-12-22

【0034】

また、本発明のOCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体は、等電点の測定、糖含量の測定、抗体による定量等により、原料であるOCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質と区別することができる。

【0035】

等電点は等電点電気泳動により常法に従って測定することができる。OCIFは塩基性タンパク質でありその等電点はpH9付近に観測されるが、デキストラン硫酸の如き多糖又はその誘導体が結合すると等電点が低下するので、OCIF、その類縁体又はその変異体と、それら及び多糖又はその誘導体の複合体を区別することが可能である。

【0036】

糖含量はフェノール硫酸法による中性糖の定量法を用いて好適に測定することができる。多糖又はその誘導体が結合したOCIFの糖含量は元のOCIFに比して増加するので、OCIF、その類縁体又はその変異体と、それら及び多糖又はその誘導体の複合体を区別することが可能である。

【0037】

本発明の多糖又はその誘導体と特異的に結合する抗体を用い、OCIF、その類縁体又はその変異体中、並びに、それら及び多糖又はその誘導体の複合体中に含有される多糖又はその誘導体を定量することにより、両者を区別することができる。

【0038】

OCIF、その類縁体及びその変異体は、抗OCIFモノクローナル抗体を用いたELISA法等を用いて測定することができる。該ELISAに適した抗OCIFモノクローナル抗体としては、ハイブリドーマOI-19 (FERM BP-6420) の生産する抗体、ハイブリドーマOI-4 (FERM BP-6419) の生産する抗体、ハイブリドーマOI-26 (FERM BP-6421) の生産する抗体等を例示することができる (WO99/15691号公報参

CONFIDENTIAL

照)。ハイブリドーマO I - 19又はO I - 4の生産する抗体はO C I F単量体(モノマー)体及び2量体(ホモダイマー)と結合し、ハイブリドーマO I - 26の生産する抗体はO C I F 2量体(ホモダイマー)と特異的に結合する。このような抗体を用いて常法に従ってE L I S A測定を行うことができる(W O 99 / 15691号公報参照)。

【0039】

O C I F、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体の、ヒト又は動物体内における血中滞留性は、ヒト又は動物に投与して一定時間が経過した後、血液を採取し、血液中又は血清中における、該複合体の濃度を、抗O C I Fモノクローナル抗体を用いた上述の如きE L I S A法等を用いて測定し、算出することが可能である(W O 99 / 15691号公報参照)。

【0040】

本発明の提供するO C I F、その類縁体及びその変異体からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体は、骨代謝異常症の予防又は治療に有効である。

【0041】

本発明において、骨代謝異常症とは、一次性骨粗鬆症(老人性骨粗鬆症、閉経後骨粗鬆症及び特発性若年性骨粗鬆症)、内分泌骨粗鬆症(甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症、クッシング症候群及び末端肥大症)、性機能低下に伴う骨粗鬆症(下垂体機能低下症、Klinefelter症候群及びTurner症候群)、遺伝性及び先天性形態の骨粗鬆症(骨形成不全、ホモシスチン尿症、メッケス症及びライリー・デイ症候群)、重力負荷軽減又は四肢の固定や不動化による骨減少症、パジェット病、骨髄炎、骨喪失による感染性病巣、固形腫瘍(乳癌、肺癌、腎臓癌、前立腺癌等)に起因する高カルシウム血症、血液学的悪性疾患(多発性骨髄腫、リンパ腫及び白血病)、特発性高カルシウム血症、甲状腺機能亢進症又は腎臓機能不全に伴う高カルシウム血症、ステロイド投与に起因する骨減少症、他の薬物(メトトレキサート及びシクロスポリンA等の免疫抑制剤、ヘパリン及び抗てんかん薬)投与に起因する骨減少症、腎臓機能不全に伴う骨減



少症、外科手術、消化器疾患（小腸障害、大腸障害、慢性肝炎、胃切除、原発性胆汁性肝硬変及び肝硬変）に伴う骨減少症、慢性関節リウマチ等の各種リウマチによる骨減少症、慢性関節リウマチ等の各種リウマチによる骨破壊及び関節破壊、ムチランズ型リウマチ、変形性関節症、歯周骨喪失、癌の骨転移（骨溶解性転移）、外傷性負傷、ゴシェ病、鎌状赤血球貧血、全身性紅性狼創若しくは非外傷性負傷に伴う骨壊死又は骨細胞死、腎性骨異常栄養症等の骨異常栄養症、低アルカリフォスファターゼ血症、糖尿病に伴う骨減少症、栄養障害又は摂食障害に伴う骨減少症、その他の骨減少症等である。

【0042】

本発明のOCIF、その類縁体及びその変異からなる群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体を含む組成物は、ヒト又はヒト以外の動物に対し、医薬として経口又は非経口により安全に投与され得る。医薬としての投与形態は、疾患の種類、疾患の程度、症状、年齢、性別、体重等に応じて適宜選択することができる。例えば、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、シロップ剤は経口投与され、注射剤は単独で若しくはブドウ糖、アミノ酸等の通常の補液と混合して静脈内投与されるか又は単独で筋肉内投与、皮下投与、皮内投与、腹腔内投与され、貼付剤は経皮投与され、点鼻剤は経鼻投与され、粘膜適用剤は経粘膜投与若しくは口腔内投与され、坐剤は直腸内投与される。これらの製剤は、常法に従い、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、矯味矯臭剤、溶解補助剤、懸濁剤、着色剤、pH緩衝剤、防腐剤、ゲル化剤、界面活性剤、コーティング剤等、医薬の製剤分野において通常使用し得る公知の補助剤を用いて製剤化することができる。

【0043】

錠剤の形態に成形するには、担体として当該分野で公知のものを広く使用できる。そのような担体としては、例えば、乳糖、白糖、塩化ナトリウム、ブドウ糖、尿素、澱粉、炭酸カルシウム、カオリン、結晶セルロース、ケイ酸等の賦形剤；水、エタノール、プロパノール、単シロップ、ブドウ糖液、澱粉液、ゼラチン溶液、カルボキシメチルセルロース、セラック、メチルセルロース、リン酸カリウム、ポリビニルピロリドン等の結合剤；乾燥澱粉、アルギン酸ナトリウム、寒



天末、ラミナラン末、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸モノグリセリド、澱粉、乳糖等の崩壊剤、白糖、ステアリン、カカオバター、水素添加油等の崩壊抑制剤；第4級アンモニウム塩基、ラウリル硫酸ナトリウム等の吸収促進剤；グリセリン、澱粉等の保湿剤；澱粉、乳糖、カオリン、ベントナイト、コロイド状ケイ酸等の吸着剤；精製タルク、ステアリン酸塩、硼酸末、ポリエチレングリコール等の潤沢剤等を挙げることができる。また、錠剤は必要に応じ通常の剤皮を施した錠剤、例えば、糖衣錠、ゼラチン被包錠、腸溶被錠、フィルムコーティング錠、二重錠、多層錠等とすることができる。

【0044】

丸剤の形態に成形するには、担体として当該分野で公知のものを広く使用できる。そのような担体としては、例えば、ブドウ糖、乳糖、カカオバター、澱粉、硬化植物油、カオリン、タルク等の賦形剤；アラビアゴム末、トラガント末、ゼラチン、エタノール等の結合剤；ラミナラン寒天等の崩壊剤等を挙げることができる。

【0045】

坐剤の形態に成形するには、担体として当該分野で公知のものを広く使用できる。そのような担体としては、例えば、ポリエチレングリコール、カカオバター、高級アルコール、高級アルコールのエステル類、ゼラチン、半合成グリセリド等を挙げることができる。

【0046】

注射剤として調製される場合には、液剤及び懸濁剤は殺菌され、且つ血液と等張であることが好ましい。これら液剤、乳剤および懸濁剤の形態に成形するには、希釈剤として当該分野で公知のものを広く使用でき、例えば、水、エタノール、プロピレングリコール、エトキシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等を挙げることができる。なお、この場合、血液との等張性を保つのに十分な量の食塩、ブドウ糖、グリセリン等を医薬製剤中に含有せしめてもよく、また通常の溶解補助剤、緩衝剤、無痛化剤、pH調整剤、安定化剤、可溶化剤等を添加して

30

1941-1942



1941-1942

もよい。注射剤は凍結乾燥品であってもよい。

【0047】

また、必要に応じて着色剤、保存剤、香料、風味剤、甘味剤、他の医薬等を含
有せしめてもよい。

【0048】

これらの医薬製剤中に含まれるOCIF、その類縁体及びその変異体からなる
群から選択される1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体の量は
、特に限定されるものではないが、通常0.1乃至70重量%であり、好適には
1乃至30重量%である。

【0049】

本発明の提供するOCIF、その類縁体及びその変異体からなる群から選択さ
れる1又は2以上の物質並びに多糖又はその誘導体の複合体の投与量は、症状、
年齢、体重、投与形態、剤形等に依存するが、通常成人に対して1日当たり、投
与量の上限が30乃至1000mg、下限が0.001乃至0.03mgであり
、好適な範囲は0.03乃至30mgである。

【0050】

本発明の提供する医薬の投与回数は、投与形態、剤形等に依存するが、数日に
1回、1日1回、又は1日数回である。

【0051】

【実施例】

以下に、実施例及び試験例を挙げ、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明
はこれらに限定されるものではない。

実施例1. OCIF及びデキストラン硫酸の複合体の調製(I)

WO96/26217号公報記載の方法に従って得られた、分子量約1200
00の遺伝子組換え型ヒトOCIF(2量体)を、0.15M塩化ナトリウムを
含有する10mMリン酸ナトリウム緩衝液(pH10.5)へ、2、5、6.5
、10、12.5、20又は50mg/mlの濃度に溶解せしめた。この水溶液
に、デキストラン硫酸ナトリウムイオウ5(名糖産業(株)製;以下、「DS5

1000-1000



125
125
0122

」という。)を、終濃度40、100、130、150、200、400、510又は1000mg/mlとなるように溶解し、水酸化ナトリウムを添加してpH10.5又は11に調製した。得られた水溶液を4、7又は37℃にて1、3、6、18、24、48、72、144又は288時間保温した。

【0052】

保温後の水溶液4mlを、0.3M塩化ナトリウムを含有する10mMリン酸ナトリウム緩衝液(pH6)で予め平衡化したゲルろ過カラムSuperdex 200pg(カラム内径16mm×長さ60cm:排除限界分子量130万:Amersham Pharmacia Biotech社製)へ添加し、該緩衝液により流速2ml/minで溶出させた。紫外分光光度計を用いて280nmの吸収をモニターし、保持時間約28乃至36分の溶出液を分取した。OCIF2量体と結合していない遊離のDS5は保持時間約50乃至70分に溶出された。上記ゲル濾過は室温にて行った。

【0053】

得られたOCIF及びDS5の複合体を含有する画分を-60℃にて凍結保存した。

【0054】

なお、本実施例に記載された各処方の反応条件を下記の表1にまとめた。

【0055】

【表1】

処方名	DS5 濃 度 (mg/ml)	OCIF 濃 度 (mg/ml)	温 度 (℃)	pH	保温時間 (時間)
処方1	130	6.5	4	10.5	18
処方2	510	6.5	4	10.5	18
処方3	130	6.5	4	11	18
処方4	100	5	4	10.5	18

処方5	100	5	4	10.5	72
処方6	100	5	4	10.5	48
処方7	100	5	4	10.5	144
処方8	100	5	4	10.5	288
処方9	400	20	4	10.5	18
処方10	200	10	4	10.5	18
処方11	100	5	4	10.5	18
処方12	40	2	4	10.5	18
処方13	1000	12.5	4	10.5	18
処方14	1000	50	4	10.5	18
処方15	1000	12.5	4	10.5	18
処方16	1000	5	4	10.5	18
処方17	1000	2	4	10.5	18
処方18	150	5	37	10.5	1
処方19	150	5	37	10.5	3
処方20	150	5	37	10.5	6
処方21	150	5	37	10.5	24
処方22	150	5	7	10.5	18

実施例2. OCIF及びデキストラン硫酸の複合体の調製(II)

実施例1記載のヒトOCIF(2量体)を、0.15M塩化ナトリウムを含有する10mMリン酸ナトリウム緩衝液(pH10.5)へ、5mg/mlの濃度に溶解せしめた。この水溶液に、分子量5000のデキストラン硫酸ナトリウム(和光純薬(株)製:以下、「DS5000」という。)を、終濃度150mg/mlとなるように溶解し、水酸化ナトリウムを添加してpH10.5に調製した。得られた水溶液を4℃にて24時間保温した。

【0056】

保温後の水溶液4mlを、0.3M塩化ナトリウムを含有する10mMリン酸ナトリウム緩衝液(pH6)で予め平衡化したゲルろ過カラムSuperdex

100-11111



200 pg (カラム内径16mm×長さ60cm:排除限界分子量130万:Amersham Pharmacia Biotech社製)へ添加し、該緩衝液により流速2ml/minで溶出させた。紫外分光高度計を用いて λ 280nmの吸収をモニターし、保持時間約28乃至36分の溶出液を分取した。OCIFと結合していない遊離のDS5000は保持時間約40乃至65分に溶出された。上記ゲル濾過は室温にて行った。

【0057】

得られたOCIF及びDS5000の複合体を含有する画分を -60°C にて凍結保存した。

【0058】

なお、本実施例に記載された処方の反応条件を下記の表2にまとめた。

【0059】

【表2】

処方名	DS5000 濃 度 (mg/ml)	OCIF 濃 度 (mg/ml)	温 度 ($^{\circ}\text{C}$)	pH	保温時間 (時間)
処方23	150	5	4	10.5	24

参考例1. OCIF及びデキストラン硫酸ナトリウムからなる組成物の調製

WO96/26217号公報の実施例2又は3記載の方法に従い、OCIF及びデキストラン硫酸ナトリウム(分子量5000又は10000)からなる組成物試料を調製した。

【0060】

分子量約120000のヒトOCIF(2量体)を、0.15M濃度の塩化ナトリウム及び0.01%のポリソルベート80を含有する10mMリン酸ナトリウム緩衝液(pH10.5)へ、0.25mg/mlの濃度に溶解せしめた。こ

38

1944-1945

1944-1945

の水溶液に、実施例2記載のDS5000（和光純薬（株）製）又は分子量10000のデキストラン硫酸ナトリウムであるDS10000（和光純薬（株）製：以下、「DS10000」という。）を、終濃度1又は4mg/mlとなるように溶解し、水酸化ナトリウムを添加してpH7に調整した。得られた水溶液を4℃にて24時間保温した。

【0061】

得られたOCIF及びDS5000又はDS10000からなる組成物は速やかに下記試験例1へ今日した。

なお、本参考例に記載された各参考処方の反応条件を下記の表3にまとめた。

【0062】

【表3】

処方名	デキストラン硫酸		OCIF	温度	pH	保温時間
	種類	濃度	濃度	(℃)		(時間)
		(mg/ml)	(mg/ml)			
参考処方1	DS5000	4	0.25	4	7	2.4
参考処方2	DS10000	1	0.25	4	7	2.4

実施例3. 等電点の測定

実施例1記載の遺伝子組換え型ヒトOCIF（2量体）及び実施例1記載で得られたOCIF及びDS5の複合体（処方22）を、等電点電気泳動ゲルIEF PAGE mini（pH範囲3乃至10：岩城硝子（株）製）に添加し、該装置の説明書の記載に従って所定の電圧を印加した。電気泳動終了後、ゲルをクマシーブルー染色した。

【0063】

その結果、OCIFの等電点は約pI9であり、一方OCIF及びDS5の複合体（処方22）の等電点は約pI6.5であった。



実施例4. OCIF及びデキストラン硫酸の複合体におけるOCIF並びにデキストラン硫酸の定量と両者の分子比の算出

1) パーオキシダーゼで標識した抗ヒトOCIFモノクローナル抗体OI-4原液の調製

当該抗体の酵素標識は、EZ-Link Maleimide Activated Horseradish Peroxidase Kit (ピアース社製) を用い、該キットのプロトコルIIに従って行った。

【0064】

精製された抗ヒトOCIF抗体(WO99/15691号公報参照)OI-4を10mMリン酸緩衝液(pH7.6)を用いて1mg/mlとなるように希釈したもの1mlに、上記キットに添付されたN-スクシニミジル-S-アセチルチオ酢酸を、ジメチルフォルムアミドにて使用直前に10mg/mlとなるように溶解したもの4 μ lを添加し、室温にて30分間保温した。ここに、予め5mgのヒドロキシルアミン塩酸塩を上記キットに添付されたMaleimide Conjugation Buffer100 μ lへ使用直前に溶解した溶液20 μ lを添加した後、室温にて2時間保温した。当該反応液を、予め30mlのMaleimide Conjugation Bufferで平衡化した、上記キットに添付されたポリアクリルアミド脱塩カラム(容積10ml)へ付し、Maleimide Conjugation Bufferで溶出し、0.5mlずつ分取した。当該抗体を含む7乃至10番目の画分を合併した。ここに、上記キットに添付されたEZ-Link Maleimide Activated Horseradish Peroxidase 5mgを500 μ lの蒸留水に溶解したもの100 μ lを添加し、室温にて1時間保温した後、等容のグリセロールを添加し、-20℃にて保存した。

【0065】

最終的に得られた溶液を、パーオキシダーゼで標識した抗ヒトOCIFモノクローナル抗体OI-4(以下、「POD-OI-4」という。)の原液とした。

2) OCIFの定量

1941-1942



0127
130

実施例1及び2並びに参考例1に記載の各処方におけるOCIF量を、抗OCIFモノクローナル抗体を用いたELISA法により測定した。

【0066】

96穴マイクロタイタープレート (Maxisorp: NUNC社製) 上の各ウェルに、抗ヒトOCIFモノクローナル抗体OI-26 (WO99/15691号公報参照) を0.1M NaHCO₃ 溶液へ5 µg/mlとなるように溶解せしめたもの100 µlを分注し、シールして4℃にて1晩静置した。

【0067】

0.1%ポリソルベート20を含有するPBS (pH7.4) 250 µlで、各ウェルを3回洗浄した。

【0068】

希釈緩衝液 (組成: 0.2M Tris-塩酸、40% Block Ace (雪印乳業 (株) 製)、0.1%ポリソルベート20: pH7.4) 20 µlを各ウェルへ添加し、室温にて20分間保温した。

被検試料を希釈緩衝液を用いて適宜希釈した。検量線作成のための標準溶液には既知濃度のOCIFを含有する希釈緩衝液を、対照には希釈緩衝液を、それぞれ用いた。各被検試料50 µlを各ウェルへ分注した。

【0069】

各ウェルに、1) で得られたPOD-OI-4の原液を[0.1M Tris-塩酸、40% Block Ace (雪印乳業 (株) 製)、0.1%ポリソルベート20 (pH7.4)] で1500倍希釈したもの50 µlを添加し、室温にて2時間静置した。

【0070】

反応後、0.1%ポリソルベート20を含有するphosphate buffered saline (以下、「PBS」という。: pH7.4) 250 µlで、各ウェルを4回洗浄した。

【0071】

0.1Mクエン酸と0.2Mリン酸水素2ナトリウムを混合し、基質溶解液とした (pH4.5)。

