

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
GERMÁN CASTILLO GRAU
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 09149186
Trámite 011
Evento 378
Actuación 519 **E 1 4 1 7 5**
Oficio
Folios 021

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT/US2008/156781

Fecha de Presentación Internacional 18/06/2008

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1. <u>Descripción:</u>	Folios: 5 a 94	30/12/2009
1.2. <u>Reivindicaciones:</u>	Folios: 95 a 106	30/12/2009
1.3. <u>Prioridad:</u>	US 60/936.736	21/06/2007

2. Análisis de la prioridad:

La prioridad de la presente solicitud corresponde al objeto reivindicado.

3. Objeto de la invención:

Título de la solicitud: SALES AMINO DEL ÁCIDO [4,6-BIS(DIMETILAMINO)-2-(4-(4-TRIFLUOROMETIL)BENZAMIDO)BENCIL]PIRIMIDIN-5-IL]ACÉTICO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LAS MISMAS Y SUS USOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MEDIADAS POR CRTH-2.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un compuesto antagonista de SRTH2 para el tratamiento de trastornos tales como rinitis alérgica, asma alérgica, broncoconstricción, dermatitis atópica o trastornos inflamatorios

sistémicos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona sales de amina de ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético de fórmula I.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D239/48; A61P11/06; A61K31/33.

4. Excepciones de patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación(es): 56 a 62 (Fls. 103 a 105) que se refiere(n) a un método para tratamiento, prevención o alivio de uno o más síntomas de una enfermedad mediada por CRTH2, no es (son) patentable(s) porque es un método exceptuado de patentabilidad.

5. De la solicitud de patente

5.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, la reivindicación 1 no está definiendo la forma cristalina por su patrón de difracción de rayos X ni la sal de la forma cristalina. Tampoco especifica cuál o cuáles solvatos se están reclamando.

De otro lado, se observa que las reivindicaciones 19, 28, 38 y 47 hacen referencia a las figuras, lo cual le resta claridad al capítulo. Cabe recordar que la protección mediante patente se le otorga a lo que esté revelado en las reivindicaciones y no a lo que se encuentre en la descripción, anexos, figuras, tablas, etc.

En el capítulo reivindicatorio se encuentran términos que no son concisos como por ejemplo: “aproximadamente”, “solvente”, “temperatura predeterminada”, “anti-solvente” (no se especifica a cuál se refiere), entre otros.

6. Determinación del estado de la técnica:

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica es la de presentación de la solicitud prioritaria 21/06/2007.

Teniendo en cuenta la fecha indicada, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Se encontraron como anterioridades que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2004/096777	Pyrimidine derivatives useful for the treatment of diseases mediated by CRTH2	11/11/2004
D2	Libro	Farmacia Remington ¹	1995

D1 (Fls. 152 a 157): divulga compuestos derivados de pirimidina de fórmula I y sus sales farmacéuticamente aceptables con actividad antagonista de CRTH2.

1 A.R. Gennaro. “Remington Farmacia”. 19 ed. Ed. Médica Panamericana. 1995. Pp 230-235, 245, 2226-2234.

D2 (Fls.158 a 166): divulga algunas generalidades sobre polimorfismo y sales farmacéuticas.

7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

7.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente solicitud de patente reivindica lo siguiente: una sal de forma cristalina, que comprende una amina farmacéuticamente aceptable y ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético de la fórmula I o un hidrato o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

El análisis de nivel inventivo del producto reclamado se realizó mediante la aproximación problema-solución en polimorfos (Patenting Polymorphs at the European Patent Office) posición que ha adoptado la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos del análisis de la patentabilidad de las formas polimórficas.

Al respecto la Dra. Sofia Papathoma ha señalado que para analizar la patentabilidad de un polimorfo se debe:

1. Determinar el arte previo más cercano.
2. Determinar la(s) diferencia(s) técnica(s) de la invención con respecto al estado del estado de la técnica más cercano.
3. Determinar el efecto técnico obtenido por las diferencias técnicas de la invención con respecto al estado de la técnica más cercano.
4. Establecer el problema técnico objetivo a solucionar con base al estado de la técnica más cercano.
5. Comprobar que el problema técnico objetivo de la solicitud fue solucionado.
6. Evaluar si habría sido obvio solucionar el problema técnico objetivo por la invención reivindicada.

Según la aproximación mencionada, el arte previo es normalmente el documento que divulga el mismo compuesto, ya sea en un cristal diferente o una forma no cristalina o no definida. Asimismo, se ha definido que para determinar el problema técnico se debe usar el criterio objetivo, basándose en lo que realmente está indicado en la solicitud y teniendo en cuenta el arte previo más cercano.

Ahora bien, según la doctora Papathoma, en el caso de polimorfos, se ha determinado que los problemas técnicos más comunes son: (i) Obtener una forma física alternativa de un compuesto conocido y que logre el mismo efecto técnico u (ii) obtener una forma alternativa de un compuesto conocido y que proporción es una propiedad mejorada o diferente (ej. Biodisponibilidad, estabilidad, solubilidad, etc.). De igual manera, señala que es conocido que: (i) Los polimorfos difieren en sus propiedades (ej. Punto de fusión, densidad, estabilidad química, rango de solubilidad y disolución, (ii) la investigación sistemática de un compuesto para determinar si el mismo es propenso al polimorfismo es una rutina en los estudios de preformulación y (iii) cada compuesto tiene diferentes formas polimórficas y el número de formas conocidas depende del tiempo y dinero invertido en la investigación del compuesto.

En este orden de ideas, el nivel inventivo será reconocido si: (i) Se obtiene un efecto inesperado del polimorfo reivindicado sobre el arte previo más cercano o (ii) la práctica rutinaria era insuficiente para encontrar un polimorfo de un compuesto conocido.

Hechas las anteriores precisiones, procede esta Oficina a realizar el estudio de nivel

inventivo bajo los criterios ya mencionados:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características técnicas esenciales	D1	D2
ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético	ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético	No menciona
Sal de forma cristalina	Sales	Polimorfismo, formación de sales, solvatos

- Determinación del estado de la técnica más cercano:

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan el compuesto ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético, sus sales farmacéuticamente aceptables, sus solvatos, hidratos y ésteres (D1: Ej. 7-2, pág. 93, Fl. 156, pág. 41, líneas 16 a 25, 27 a 29).

- Determinación de las diferencias técnicas de la invención con respecto al estado de la técnica más cercano

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1 consiste en que no se especifican los datos de DRX.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el documento D2 consiste en que no se especifica el principio activo.

- Determinación del efecto técnico obtenido por las diferencias técnicas de la invención con respecto al estado de la técnica más cercano

El efecto que logra obtener formas cristalinas y solvatos del compuesto de fórmula I es que se obtiene un producto con mejor afinidad y selectividad a CRTH2, pero este efecto no fue demostrado ni comparado con el arte anterior en la presente solicitud.

- Establecer el problema técnico objetivo a solucionar con base en el estado de la técnica más cercano

¿Cómo modificar el compuesto ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético conocido en el documento D1 para que sea más afín y selectivo a CRTH2?

- Comprobar si el problema técnico objetivo de la solicitud fue solucionado

No hay datos en la descripción de selectividad del compuesto ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético o de sus sales de forma cristalina que le puedan brindar algún efecto sorprendente.

Además, la formación de sales cristalinas del compuesto ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético, es una práctica normal en la investigación de productos farmacéuticos, tal como se puede

constatar en el documento D2 (Fls. 158 a 166).

Evaluar si habría sido obvio solucionar el problema técnico objetivo por la invención reivindicada

Según la Farmacia de Remington (ver página: 2227, folio: 162) la tarea inicial del preformulador consiste en determinar si la sustancia química evaluada existe en más de una forma cristalina. Una vez demostrado que un compuesto existe en más de una forma cristalina se dispone de numerosas técnicas para identificar las distintas fases polimórficas presentes y una de ellas es la difracción de polvo con rayos X.

Cuando se ha determinado que un fármaco existe en más de una forma cristalina es necesario establecer las condiciones en las cuales puede producirse cada una de esas formas. El disolvente de cristalización, la velocidad de cristalización y otros factores pueden determinar que predomine una forma de cristal (ver página: 2229, folio: 163. En cuanto a la formación de sales y selección de los agentes formadores de sal, se tienen en cuenta: la estabilidad química y física, la higroscopicidad, el grado de flujo y la solubilidad (ver página: 2233, folio: 165).

La persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada con la tarea de proveer una sal de forma cristalina del ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético con la actividad deseada, puede darse cuenta que a partir de los documentos D1 y D2, dicho compuesto puede estar en forma solvatada, polimórfica y de sal.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por la sal de forma cristalina reivindicada en relación con lo conocido en el arte anterior, la solución al problema técnico parece ser obvia a la luz de los documentos D1 y D2.

Conclusión:
La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). Las reivindicaciones 2 a 55 no mencionan alguna característica que le aporte un efecto sorprendente al compuesto ácido [4,6-bis(dimetilamino)-2-(4-(4-trifluorometil)benzamido)bencil]pirimidin-5-il]acético, por lo cual se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

En cuanto a las reivindicaciones 63 a 72 que reclaman un proceso para la preparación de una sal de las reivindicaciones 1 a 52 se puede decir que no aportan alguna característica distinta a lo conocido por una persona del oficio normalmente versada en la materia por lo cual no presentan algún efecto técnico sorprendente y revelan lo que usualmente se realiza en investigación y producción de sales cristalinas.

8. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004/096777	1 a 55, 63 a 72	Nivel Inventivo
D2	Farmacia Remington	1 a 55, 63 a 72	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días

contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 14 AGO 2012

Elaborado por: Lina Patricia Forero T.
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso R.

OK

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property
Organization
International Bureau



(43) International Publication Date
11 November 2004 (11.11.2004)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2004/096777 A1

(51) International Patent Classification⁷: **C07D 239/42**,
403/12, 405/12, 401/12, 407/12, 403/04, 403/14, 239/34,
239/48, A61K 31/506, A61P 11/06

Hyogo 657-0024 (JP). SEKI, Masanori [JP/JP]; 7-17-202,
Sanjo-sakae-machi, Nara-shi, Nara 630-8126 (JP). SHIN-
TANI, Takuya [JP/JP]; 4-24-1, Seikadai, Seika-cho,
Soraku-gun, Kyoto 619-0238 (JP).

(21) International Application Number:

PCT/EP2004/003910

(74) Common Representative: **BAYER HEALTHCARE AG**; Law and Patents, Patents and Licensing, 51368
Leverkusen (DE).

(22) International Filing Date: 14 April 2004 (14.04.2004)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
03009384.3 25 April 2003 (25.04.2003) EP

(71) Applicant (for all designated States except US): **BAYER HEALTHCARE AG** [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): **LY, Tai-wel** [CA/JP];
329-1-211, Kodono-cho, Nara-shi, Nara 630-8441 (JP).
KORIYAMA, Yuji [JP/JP]; 5-13-6-102, Jingu, Nara-shi,
Nara 630-0804 (JP). **YOSHINO, Takashi** [JP/JP];
1-1-17-101, Saidaiji, Nogami-cho, Nara-shi, Nara
631-0833 (JP). **SATO, Hiroki** [JP/JP]; 4-7-4-102, Jingu,
Nara-shi, Nara 631-0804 (JP). **TANAKA, Kazuho**
[JP/JP]; 15-1-301, Konyama-cho, Yamato, Koriyama-shi,
Nara 639-1148 (JP). **SUGIMOTO, Hiromi** [JP/JP];
4-25-2-B201, Sakuragaoka, Seika-cho, Soraku-gun, Ky-
oto 619-0232 (JP). **MANABE, Yoshihisa** [JP/JP]; 4-8-19,
Suzaku, Nara-shi, Nara 631-0806 (JP). **BACON, Kevin**
[GB/JP]; 5-15-912, Koyo-cho, Naka, Higashinada-ku,
Kobe-shi, Hyogo 658-0032 (JP). **URBAHNS, Klaus**
[DE/JP]; 6-3-1-301, Kusugaoka-cho, Nada-ku, Kobe-shi,

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every
kind of national protection available): AE, AG, AL, AM,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.


(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every
kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), Euro-
pean (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

— with international search report

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guid-
ance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the begin-
ning of each regular issue of the PCT Gazette.

(54) Title: PYRIMIDINE DERIVATIVES USEFUL FOR THE TREATMENT OF DISEASES MEDIATED BY CRTH2



(57) Abstract: The present invention relates to a pyrimidine derivative of the formula (I) and salts thereof which is useful as an active ingredient of pharmaceutical preparations. The pyrimidine derivative of the present invention has excellent CRTH2 (G-protein-coupled chemoattractant receptor, expressed on Th2 cells) antagonistic activity and can be used for the prophylaxis and treatment of diseases associated with CRTH2 activity, in particular for the treatment of allergic diseases, such as asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, and allergic conjunctivitis; eosinophil-related diseases, such as Churg-Strauss syndrome and sinusitis; basophil-related diseases, such as basophilic leukemia, chronic urticaria and basophilic leukocytosis in human and other mammals; and inflammatory diseases characterized by T lymphocytes and profuse leukocyte infiltrates such as psoriasis, eczema, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, COPD (chronic obstructive pulmonary disorder) and arthritis.

PYRIMIDINE DERIVATIVES USEFUL FOR THE TREATMENT OF DISEASES MEDIATED BY CRTH2

DETAILED DESCRIPTION OF INVENTION

TECHNICAL FIELD

The present invention relates to a pyrimidine derivative which is useful as an active ingredient of pharmaceutical preparations. The pyrimidine derivative of the present invention has CRTH2 (G-protein-coupled chemoattractant receptor, expressed on Th2 cells) antagonistic activity and can be used for the prophylaxis and treatment of diseases associated with CRTH2 activity, in particular for the treatment of allergic diseases, such as asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, and allergic conjunctivitis; eosinophil-related diseases, such as Churg-Strauss syndrome and sinusitis; basophil-related diseases, such as basophilic leukemia, chronic urticaria and basophilic leukocytosis in human and other mammals; and inflammatory diseases characterized by T lymphocytes and profuse leukocyte infiltrates such as psoriasis, eczema, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, COPD (chronic obstructive pulmonary disorder) and arthritis.

BACKGROUND ART

CRTH2 is a G-protein-coupled chemoattractant receptor, expressed on Th2 cells (Nagata et al. *J. Immunol.*, **162**, 1278-1286, 1999), eosinophils and basophils (Hirai et al., *J. Exp. Med.*, **193**, 255-261, 2001).

Th2-polarization has been seen in allergic diseases, such as asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis and allergic conjunctivitis (Romagnani S. *Immunology Today*, **18**, 263-266, 1997; Hammad H. et al., *Blood*, **98**, 1135-1141, 2001). Th2 cells regulate allergic diseases by producing Th2 cytokines, such as IL-4, IL-5 and IL-13 (Oriss et al., *J. Immunol.*, **162**, 1999-2007, 1999; Viola et al., *Blood*, **91**, 2223-2230, 1998; Webb et al., *J. Immunol.*, **165**, 108-113, 2000; Dumont F.J., *Exp. Opin. Ther. Pat.*, **12**, 341-367, 2002). These Th2 cytokines directly or indirectly induce migration, activation, priming and prolonged survival of effector cells, such as eosinophils and basophils, in allergic diseases (Sanz et al., *J. Immunol.*, **160**, 5637-5645, 1998; Popc et al., *J. Allergy Clin. Immunol.*, **108**, 594-601, 2001; Teran L.M., *Clin. Exp. Allergy*, **29**, 287-290, 1999).

PGD₂, a ligand for CRTH2, is produced from mast cells and other important effector cells in allergic diseases (Nagata et al., *FEBS Lett.* **459**, 195-199, 1999; Hirai et al., *J. Exp. Med.*, **193**, 255-261, 2001). PGD₂ induces migration and activation of Th2 cells, eosinophils, and basophils, in human cells via CRTH2 (Hirai et al., *J. Exp. Med.*, **193**, 255-261, 2001; Gervais et al., *J.*

{4-(dimethylamino)-2-[4-({[(4-nitrobenzyl)oxy]carbonyl}amino)benzyl]pyrimidin-5-yl}acetic acid;

{4,6-dichloro-2-[4-(2-naphthoylamino)benzyl]pyrimidin-5-yl}acetic acid;

N-(4-({[5-(2-amino-2-oxoethyl)-4-chloro-6-(dimethylamino)pyrimidin-2-yl]methyl}phenyl)-2-naphthamide;

5 N-(4-({[4-chloro-6-(dimethylamino)-5-(1H-tetrazol-5-ylmethyl)pyrimidin-2-yl]methyl}phenyl)-2-naphthamide;

and their tautomeric and stereoisomeric form, and salts thereof.

The pyrimidine derivative of the formula (I) shows excellent CRTH2 antagonistic activity. They are, therefore, suitable especially for the prophylaxis and treatment of diseases associated with
10 CRTH2 activity.

More specifically, the pyrimidine derivative of the formula (I) are effective for the treatment or prevention of allergic diseases such as asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis and allergic conjunctivitis.

Compounds of the formula (I) are also useful for the treatment or prevention of diseases such as
15 Churg-Strauss syndrome, sinusitis, basophilic leukemia, chronic urticaria and basophilic leukocytosis, since such diseases are also related to CRTH2 activity.

Further, the present invention provides a medicament, which includes one of the compounds, described above and optionally pharmaceutically acceptable excipients.

The Alkyl per se and "alk" and "alkyl" in alkoxy, alkanoyl, alkylcarbonyl, alkylthio, alkylamino,
20 alkylaminocarbonyl, alkylaminosulphonyl, alkylsulphonylamino, alkoxycarbonyl, alkoxycarbonyl-amino and alkanoylamino represent a linear or branched alkyl radical having generally 1 to 6, preferably 1 to 4 and particularly preferably 1 to 3 carbon atoms, representing illustratively and preferably methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, tert-butyl, n-pentyl and n-hexyl.

Alkoxy illustratively and preferably represents methoxy, ethoxy, n-propoxy, isopropoxy, tert-
25 butoxy, n-pentoxy and n-hexoxy.

Alkanoyl illustratively and preferably represents acetyl and propanoyl.

Alkylamino represents an alkylamino radical having one or two (independently selected) alkyl substituents, illustratively and preferably representing methylamino, ethylamino, n-propylamino,

155

The reaction may be carried out in a solvent including, for instance, halogenated hydrocarbons such as dichloromethane, chloroform and 1,2-dichloroethane; ethers such as diethyl ether, isopropyl ether, dioxane and tetrahydrofuran (THF) and 1,2-dimethoxyethane; aromatic hydrocarbons such as benzene, toluene and xylene; alcohols such as methanol, ethanol, 1-propanol, isopropanol and tert-butanol, water and others. Optionally, two or more of the solvents selected from the listed above can be mixed and used.

The reaction temperature can be optionally set depending on the compounds to be reacted. The reaction temperature is usually, but not limited to, about 0°C to 180°C and preferably about 20°C to 100°C. The reaction may be conducted for, usually, 30 minutes to 48 hours and preferably 1 hour to 24 hours.

Compounds of the formula (I-j-1) can be synthesized by the Method [A], [B], [C], [D], [E], [F], [G], [H] or [I] described above.

Typical salts of the compound shown by the formula (I) include salts prepared by reaction of the compounds of the present invention with a mineral or organic acid, or an organic or inorganic base. Such salts are known as acid addition and base addition salts, respectively.

Acids to form acid addition salts include inorganic acids such as, without limitation, sulfuric acid, phosphoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydriodic acid and the like, and organic acids, such as, without limitation, p-toluenesulfonic acid, methanesulfonic acid, oxalic acid, p-bromophenylsulfonic acid, carbonic acid, succinic acid, citric acid, benzoic acid, acetic acid, and the like.

Base addition salts include those derived from inorganic bases, such as, without limitation, ammonium hydroxide, alkaline metal hydroxide, alkaline earth metal hydroxides, carbonates, bicarbonates, and the like, and organic bases, such as, without limitation, ethanolamine, triethylamine, tris(hydroxymethyl)aminomethane, and the like. Examples of inorganic bases include, sodium hydroxide, potassium hydroxide, potassium carbonate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, calcium hydroxide, calcium carbonate, and the like.

The compound of the present invention or salts thereof, depending on its substituents, may be modified to form lower alkylesters or known other esters; and/or hydrates or other solvates. Those esters, hydrates, and solvates are included in the scope of the present invention.

The compounds of the present invention can also be used in the form of prodrugs which include esters. Examples of such esters useful as prodrugs for compounds containing carboxyl groups can

A solution of methyl {4-(dimethylamino)-6-morpholin-4-yl-2-[4-(2-naphthoylamino)benzyl]pyrimidin-5-yl}acetate (0.096 g, 0.18 mmol) in MeOH (2 mL) at room temperature was treated with 1N NaOH (1 mL) and the resulting mixture was heated at 60°C for 5 hours. After cooling to room temperature, the volatiles were removed under reduced pressure and the remaining aqueous layer was washed with Et₂O and acidified with 1N HCl. The separated solids were collected by suction, rinsed with water, and dried under vacuum to give {4-(dimethylamino)-6-morpholin-4-yl-2-[4-(2-naphthoylamino)benzyl]pyrimidin-5-yl}acetic acid (0.059 g, 64% yield) as a white solid.

¹H NMR (300 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 2.90 (s, 6H), 3.17 (m, 4H), 3.43 (s, 2H), 3.65 (m, 4H), 3.86 (s, 2H), 7.34 (d, J=9 Hz, 2H), 7.59-7.68 (m, 2H), 7.72 (d, J=9 Hz, 2H), 7.99-8.10 (m, 4H), 8.56 (s, 1H), 10.37 (s, 1H), 12.20 (bs, 1H)

Molecular weight: 525.61


Mass spectrometry: 526

Melting point: 218 Z°C

Activity class: B


15 Example 7-2

[4,6-bis(dimethylamino)-2-(4-{[4-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}benzyl)pyrimidin-5-yl]acetic acid




CLAIMS

1. A pyrimidine derivative of the formula (I), its tautomeric or stereoisomeric form, or a salt, ester, or prodrug thereof:



5 wherein

R^1 represents hydrogen,



in which

n represents an integer of 0 to 6;

$-Q_1-$ represents $-NH-$, $-N(C_{1-6} \text{ alkyl})-$, or $-O-$;

Y represents hydrogen, C_{1-6} alkyl, C_{3-8} cycloalkyl optionally substituted by C_{1-6} alkyl, C_{3-8} cycloalkyl fused by benzene, aryl or heteroaryl, wherein said aryl and heteroaryl are optionally

10

234

siones de la célula unitaria por sí solas. Para saber más acerca del cristal y de la estructura molecular es necesario conocer las intensidades de las reflexiones de Bragg. Para una explicación de los factores que influyen en estas intensidades y de los métodos para medirlos, véase la 13ª edición. Véase también el capítulo 33.

Aplicaciones de la absorción de rayos X


Peso molecular. La medición de los parámetros de la célula unidad brinda un medio para determinar exactamente los pesos moleculares de los compuestos. La densidad de un cristal puede obtenerse por medio de flotación en mezclas de líquidos apropiados, cuya densidad se altera por difusión hasta que es igual a la del cristal.

$$\text{Peso molecular} = \frac{\text{Densidad} \times V_{\text{molar}} \times N_A}{Z}$$

donde N_0 es el número de *Aspergillus* (0.073×10^3) y Z es el número de *modiolites* en la célula unitaria. El volumen de la célula unitaria (V_{cu}) puede medirse con alta precisión por el método de densidad, como se hizo en esta investigación. El número de *modiolites* en la célula unitaria debe ser un número entero (12) y sus valores más comunes en los minerales orgánicos son 1, 2, 4 y 8. Cuando hay alto grado de solubilización es necesario aprovechar a la cantidad de litigina isógeno por otros medios.

[illegible]

La colección de imágenes representativa de los principales tipos de difracción permite observar la estabilidad de la estructura y química de las formas solubles de difracción y la cinética de las transformaciones de fase, se evidencian fácilmente siguiendo la desaparición, la aparición o el crecimiento de las formas solubles de difracción correspondientes a ciertos estados solidos en función del tiempo. Se observaron fácilmente como puede verse en la figura 13-7, la cinética de transformación de la lactosa está que el hidrato de teoflina mirando los



Figs. 1-5?. Trajectory de Run Prouesses et de diffusion de protons du mouvement des ions dans le plasma.

Determinación de la estructura. El cuerpo de los nucleosomas de virus medicialmente es caracterizado por técnicas de difracción de rayos X y es muy raro y su tamaño molecular es de 10 a 15 millones de daltons. El tamaño molecular de la proteína histona fundamental B2, hasta el límite superior de las proteínas globulares. En la mayoría de los casos, las determinaciones estructurales han tenido gran importancia para descubrir los errores asociados con las funciones biológicas de las distintas proteínas. En la figura 3-8 se muestran una porción de la estructura de ribonucleosoma determinada por los estudios de rayos X de Kartha, Gellie y Hartley. Esta estructura muestra la hidrofobicidad de los enlaces fosforilados en los codones de RNA.

En los últimos años, la investigación de la X ha sido uno de los campos de mayor actividad científica. Los importantes biólogos que no forman cuadros tradicionales en el sentido habitual, pero sí tienen una gran experiencia en el estudio de la X, como los doctores Haves y Lande, de la filial de la X en el departamento de Biología, han sido los que se han centrado en el estudio de la X. En los últimos años, la investigación de la X ha sido uno de los campos de mayor actividad científica. Los importantes biólogos que no forman cuadros tradicionales en el sentido habitual, pero sí tienen una gran experiencia en el estudio de la X, como los doctores Haves y Lande, de la filial de la X en el departamento de Biología, han sido los que se han centrado en el estudio de la X.

Unidos y configuraciones intraminimales. La determinación precisa de la estructura de un compuesto con enlaces giratorios y resonantes conmutarizados de la relación estructura-actividad en un diseño de drogas asistido por computadora (primera explicación más detallada véase el cap. 28).



Fig. 1. *Left*: a schematic diagram of the experimental setup. *Right*: a photograph of the experimental setup. The schematic diagram shows the experimental setup for the study of the effect of the magnetic field on the growth of the polymer. The photograph shows the experimental setup for the study of the effect of the magnetic field on the growth of the polymer.

no permita determinar una diferencia. La magnitud de los cambios en los precios de los bienes y servicios, los factores y los cambios entre los diferentes sectores, las variaciones en los salarios, los tipos de cambio, esta información es, sumamente valiosa para los países en desarrollo. Los países en desarrollo que poseen datos como éstos, tienen ventajas importantes en la elaboración y las comparaciones de estadísticas, influyen en las negociaciones de los préstamos y el comercio, y en las negociaciones de los acuerdos comerciales. Una vez compilada esta información, puede ser utilizada para el análisis fundamental para el desarrollo, la planificación, la evaluación de las necesidades, actividades, de interés fundamental para el bienestar social, y para el análisis de las necesidades físicas, ambientales, culturales y sociales. Los países en desarrollo que carecen de esta información, se encuentran en una posición desfavorable para que en el futuro puedan aprovechar las ventajas que les ofrece. Los países en desarrollo que carecen de esta información, se encuentran en una posición desfavorable para que en el futuro puedan aprovechar las ventajas que les ofrece. Los países en desarrollo que carecen de esta información, se encuentran en una posición desfavorable para que en el futuro puedan aprovechar las ventajas que les ofrece.

den a desestimar las incertidumbres. Es posible distinguir mejor entre los efectos de repulsión y de atracción al partir entre los átomos de la misma alínea de los átomos de los adyacentes. Los átomos de la misma alínea de los adyacentes, si son fuertemente unidos pueden colapsar por las potencias magnéticas, y son fuertemente unidos para correlacionar átomos de RAN con la estructura.

[illegible]

partidos de electrones y los electrones en las posiciones atómicas correspondientes por medio de las secciones sobre neutrones se usará para fases en el cálculo de las secciones de densidad electrónica con los datos de rayos X.

Para más información sobre los métodos físicos usados en esta compilación véase el capítulo 13.

Estados de la materia

El objetivo de esta sección es explicar generalidades y conceptos esenciales, con todos ellos se relacionan naturalmente con las formas de clasificación, porque estas últimas se tratan en otros capítulos. Algunos de sus principios serán más cuando el conocimiento encargado de clasificación y su finalidad debe considerar las formas de clasificación y su finalidad y procesamiento. Debe señalarse que debido a la gran variedad de temas relacionados con esta sección hay necesidad de hacer énfasis en la elección de explicaciones, principalmente en la elección de explicaciones, pero también en la elección de explicaciones. No se busca presentar el tema en forma difícil y/o profundamente, sino por el contrario, mostrar un panorama general de los estados actuales, sobre todo innovaciones de la materia.

[illegible]

Pero entre las tempestades sentimentales, la intensidad de los momentos más serenos, de felicidad, no es menor, y lo que en la práctica la más común, es que se realicen todos los días, esas horas en que, como los hermanos comunistas que nian un noble nacimiento en la cabaña de *Amable*, se desahogan por completo en la intensidad de las fuerzas irreprimibles de cada clase; los soldados tienen las más fuertes y las más nobles. El otro factor común es la temperatura. Es evidente que el aumento de la temperatura de las sustancias, éstas pasan de sólido a líquido, y así como el agua se convierte en vapor.

líderes, cambios y gases. Cuando se enfría el líquido, se incrementa la temperatura, "desordenándose" la estructura molecular. Así en lo que respecta a la temperatura, en ambientes estáticos, donde ocurren solo los efectos de un aumento de la temperatura, el agua se enfría, pero por ser un líquido, durante el proceso de cristalización, algunos compuestos, tienen una tendencia a romper una relación molecular fija de moléculas de hidrógeno, en estado cristallino sólido, que se desordenan al ser enfriados. Cuando se enfría agua como solución salina, el agua se enfría, pero no se cristaliza.

que, mediante la formación de *hidratos*, algunos de los compuestos orgánicos que forman parte de los llamados *alimentos* se vuelven *inocuos* para el organismo humano. Así, el *ácido* GluNO_2 y el *ácido* GluNO_3 se vuelven *inocuos* al ser ingeridos, ya que se convierten en *ácido* Glu y *ácido* GluNO_2 respectivamente. En el caso de los *ácidos* GluNO_2 y GluNO_3 , el *ácido* GluNO_2 se convierte en *ácido* Glu y el *ácido* GluNO_3 se convierte en *ácido* GluNO_2 . Como resultado de este proceso, los *ácidos* GluNO_2 y GluNO_3 se vuelven *inocuos* para el organismo humano. En el caso de los *ácidos* GluNO_2 y GluNO_3 , el *ácido* GluNO_2 se convierte en *ácido* Glu y el *ácido* GluNO_3 se convierte en *ácido* GluNO_2 . Como resultado de este proceso, los *ácidos* GluNO_2 y GluNO_3 se vuelven *inocuos* para el organismo humano.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

2214




Fig. 13-15. Four examples of a crystal lattice based on rings and spheres.




Fig. 13-16. One of the models of a crystal lattice based on rings and spheres.

de poder desarrollar una estructura cristalina. Con respecto a la formación de cristales, observamos que en un proceso de cristalización, cuando sólidos amorfos de una misma naturaleza se calientan a una temperatura, se forman cristales más grandes y perfectos. La cristalización incompleta o imperfecta, ya sea debido a la técnica o a la misma naturaleza del material (p.ej., los polímeros superiores naturales y sintéticos), produce a menudo la formación de cristales, vidrios o cristales líquidos. Los cristales no tienen ninguna estructura regular cristalina reconocible pero son, en cierto modo, cristales imperfectos. Muchas formas y disposiciones son posibles: globulares, filas o nubes de globulos, hebras, cilindros, etc.

Sólidos

La propiedad física más importante del estado sólido es el alto grado de orden de las sustancias como metales y minerales. La estructura puede ser cristalina y envasada o no cristalina, como en el plástico, el vidrio o los gases, que no son empaquetados o lo son sólo en parte. No obstante, estos últimos materiales tienen mucho más orden que los líquidos o los gases. Tienen también, en grados variables, algunas propiedades físicas y químicas que las confieren cierta resistencia al estrés aplicado, pero cuando el estrés alcanza determinada intensidad, se produce flujo o fractura.

Aunque existen diferentes clasificaciones, cuatro tipos principales de enlaces mantienen la unidad de los sólidos: los enlaces fuertes mantienen la unidad de los sólidos; los enlaces débiles mantienen la unidad de los sólidos; los enlaces débiles mantienen la unidad de los sólidos; los enlaces débiles mantienen la unidad de los sólidos.




Fig. 13-17. A graph showing Volume (or property related) versus Temperature. The curve shows a transition from a solid state to a liquid state, with a sharp increase in volume at the melting point.

El concepto de que un material se hace más duro y fuerte a medida que se enfría es un concepto que se ha mantenido en vigor. Por ejemplo, se llega a un punto en que el enfriamiento es suficiente para producir la ductilidad original, el material se vuelve más fuerte y resistente. Las temperaturas utilizadas permiten apenas la relajación de las áreas de tensión excesiva. Una visualización podría considerarse como un tipo de reestructuración parcial o reorganización atómica.

Polímeros

El polímero, que es la existencia de una o más formas cristalinas, amorfas o ambas, es una característica de la mayoría de las sustancias sólidas. Aplicado a los cristales se refiere a las estructuras cristalinas que pueden tener el mismo compuesto químico. En general, las distintas formas también tienen diferentes patrones de difracción de los rayos X, puntos de fusión, espectros infrarrojos y solubilidad, y este último es lo más importante en farmacia.

Particularmente, en muchos casos es que la disolución en el agua gastrointestinal es el factor limitante de la absorción, diferencias solubilidad pueden tener un gran efecto, tanto bueno como malo. Se pueden obtener formas polimórficas según determinados factores, como la temperatura de almacenamiento, el solvente de reestructuración por ser y la velocidad de enfriamiento (v. por ebe, la velocidad de cristalización) del sólido.

REFERENCIAS

1. Feynman R.P. Science 157, 601 (1971).
2. Solomonson R.P. Chem Eng Prog 71, Jan 24, 1971.
3. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 70, 3140, 1948.
4. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
5. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
6. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
7. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
8. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
9. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
10. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
11. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
12. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
13. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
14. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
15. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
16. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
17. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
18. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
19. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
20. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
21. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
22. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
23. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.
24. Pitzer K.S. J Am Chem Soc 71, 1165, 1949.

BIBLIOGRAFIA

Arden E.J. et al. Seminars and Biological Activity of Drugs, Blackwell, Boston, 1963.
Eliel E.L. Stereochemistry of Organic Compounds, McGraw-Hill, New York, 1963.
Lien, E. S.M. S.M. Effect and Drug Design, Marcel Dekker New York, 1967.

ESTRUCTURA MOLECULAR Y FARMACOLOGÍA

2215

2226.




Fig. 6D. Microfibrillas que muestran el carácter de laminado de las células para una supervisión de la forma y de una mayor expresión.

existen excepciones. Algunos compuestos pueden haberse oxidado a los coeficientes de partición que se encuentran utilizando los coeficientes de partición de los compuestos de referencia. Los resultados obtenidos en la totalidad del espectro de masas de los compuestos estudiados, pero de todos modos se ajustan con un buen grado de hidrofilicidad.

Polymerfusions

[illegible]

La tercera según para la clasificación de un sistema como polidisperso es el siguiente: los polímeros mostraron diferentes en la estructura de los cristales pero serán idénticos en los estados líquidos o en la evaporación. Al igual que los polímeros, los adenosos disminuyen también a diferentes temperaturas, aunque produciendo fenómenos de distinta producción. Con el curso del tiempo, cada uno de estos producidos tendrá un su grado en equilibrio de los sus fenómenos con composiciones de equilibrio de los sus fenómenos. Algunos estos producidos de polidispersidad malamente representan isomorfismo disminuido que que ambos sistemas se comportan en forma muy similar.



[illegible]

Fig. 13-6. Vehículo de electrificación de la Fórmula de una rueda en peristernal en un pequeño motor.

una mezcla pequeña, manteniendo el fluido durante unos minutos. Se agregan a estos ingredientes 10°C. P. y se agita. Se agregan a estos ingredientes 10°C. P. y se agita. Se agregan a estos ingredientes 10°C. P. y se agita.

2. Calcular una muestra del cumplimiento de los criterios y observar si durante el calentamiento se producen las transformaciones sólido-sólido.

3. Sublinar una pequeña cantidad de un color para inducir la transformación entre el sublinado y tener inducir la transformación entre el sublinado y tener un original mezclando ambos componentes en una mezcla original mezclando ambos componentes en una mezcla original.

de solubilidad controlada de uno de ellos. Si ambos re-

conformada hasta que la forma moléculas de

4. Mantener el grado de curvatura en una posición constante.

cantidad de solvente (tabla de su primer uso). La cantidad de solvente utilizada es importante para la preservación de muestras. Es importante utilizar el menor volumen posible de solvente para preservar las muestras. El uso de solventes durante este paso, fíjese en el manual de instrucciones.

5. Rectificar el compuesto de la sección mecánica aislado con una muestra original.

confiamiento rápido y observar una reacción anódica precipitada suscitada en una zona del licor anódico. El efecto observado puede ser atribuido con el tiempo a la influencia de la zona

Si el precipitado es un polímero diferente de los finos para evaluar la transformación de las cenizas, una transformación de fase es la solución.

Una vez establecida la presencia de polímeros se cuenta con procedimientos que permiten al

mañador preparar las diversas formas en cantidades para una evaluación ulterior y obtener la información en formas familiares.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1000 JOURNAL OF CLIMATE

1

227




Fig. 81-3. Gráfico de la densidad de absorción de la luz en función de la longitud de onda para el acetato de isobutirato.

Una vez demostrado que un compuesto existe en forma de una forma cristalina se dispone de muestras para identificar las distintas fases polimórficas. Como un de estos métodos pueden ser las mediciones de la densidad de absorción de la luz, pero existe una combinación de métodos que permite aislar e identificar cada modificación cristalina. Para confirmar la presencia de una de las formas cristalinas de un compuesto es recomendable identificar las modificaciones presentes mediante más de un método. El uso de un solo método para confirmar la presencia de polimorfos puede generar confusiones.

Atenuación. La cristalografía ofrece un método de identificación de polimorfos. Los cristales existen en formas térmicas y alotrópicas. Cuando se examinan los cristales isotrópicos, la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones, mientras que los cristales anisotrópicos se absorben con dos o tres velocidades diferentes o velocidades de reflexión diferentes. Este método requiere el conocimiento de un cristalizado con experiencia. Los sistemas de rayos X, como el difracción de rayos X, los espectros de infrarrojo, el análisis térmico y el análisis de calor, durante el calentamiento y el enfriamiento, lo que proporciona un registro permanente que puede ser examinado en forma repetida.

Además en plásticos molidos. El método de polarización, equipado con una película calcárea o roja, es también útil para la identificación de polimorfos. Un registro

de experimentación puede determinar rápidamente si existen polimorfos de grado de estabilidad de las formas alotrópicas. Las temperaturas de fusión y los puntos de fusión, los índices de refracción en diversas longitudes de onda y los índices de absorción en las longitudes de onda de absorción óptima.

Difracción de rayos X. Los materiales cristalinos en forma de polvo dan patrones de difracción característicos que consisten en picos en ciertas posiciones y con intensidades variables. Cada patrón cristalino es característico para un polímero determinado. Este método puede la ventaja con respecto a otros métodos de identificación en que la muestra se examina en la forma en la que es presentada. Se recomiendan precauciones para reducir y mantener el control del tamaño de las partículas. Se requiere una muestra muy pequeña y el método es un derivativo de un método que, utilizado por varios investigadores para identificar polimorfos en sustancias farmacéuticas.

Espectroscopia infrarroja. El espectroscopio infrarrojo para la identificación de los polimorfos. Otros métodos de espectroscopia infrarroja de un compuesto presentan espectros idénticos en solución. La técnica puede utilizarse para la identificación cualitativa y cuantitativa.

Métodos térmicos. Se utilizan las técnicas de calorimetría de flujo diferencial y el análisis térmico diferencial para la identificación de polimorfos. En ambas técnicas la pérdida o la ganancia de calor resultante de transiciones de fase o químicamente se produce en una muestra cuando se regula en función de la temperatura a medida que la muestra se calienta con una velocidad uniforme. Las transiciones de fase producen cambios en la entalpía, entalpía y entropía. Por ejemplo, la fusión, la sublimación, la transición sólido-sólido y la rotación de grupo generalmente producen efectos calóricos. Mientras que la cristalización puede producir efectos calóricos. Los análisis térmicos permiten calcular los parámetros termodinámicos para las transiciones de fase. Es posible observar cambios de color y determinar el índice de conversión de las polimerizaciones.

Dilatación. La dilatación mide el cambio de volumen causado por efectos térmicos o químicos. (Figura 81-4). El método de dilatación para seguir el comportamiento de fusión del resorte de termopares (resorte) a nivel de la dilatación de la muestra. La dilatación de la muestra de la muestra y el índice de conversión de la muestra.

La presencia de la forma metacristalina se expresó por una transición en el rango de la temperatura de 30-24°C. En la muestra se observa en la figura 81-7. La dilatación es un método sumamente imperfecto, muy expuesto y susceptible de error. La dilatación no se utiliza en forma general.

El polimorfismo a veces se estudia mediante resúmenes magnéticos con protones, resonancia magnética nuclear y microscopía electrónica.

Los polimorfos pueden clasificarse en uno de los tipos: 1) *crystallographic*, una forma polimórfica puede convertirse reversible en una a través de un medio de fusión de la temperatura o la presión, por ejemplo, el agua y el hielo; 2) *monoclinic*, una forma polimórfica es estable en cualquier condición de temperatura




Fig. 81-4. Termogramas para las formas I, II y III de SSKI 3000.

una y presión, por ejemplo, esteatitas de glicerilo. En condiciones dadas de temperatura y presión sobre una forma polimórfica será termodinámicamente estable. Sin embargo, pueden existir otras formas inestables en las mismas condiciones. Estas formas inestables se convierten en estructuras de cristales estables con el transcurso del tiempo. La primera indicación de la importancia de una modificación polimórfica en un sistema farmacéutico se observó con la robenidina. Se notó que la forma amorfa de robenidina se absorbe bien, sin embargo, cuando el compuesto en preparado en suspensión se observó una reversión de la forma inestable en una forma cristalina más estable que determinaba una absorción deficiente.

Una vez determinado que una droga existe en más de una forma cristalina es necesario establecer las condiciones en las cuales puede producirse cada una de esas formas. De este modo será posible mantener condiciones de cristalización adecuadas en los diferentes lotes para garantizar una muestra prima uniforme y aceptable. El disolvente de neutralización, la velocidad de cristalización y otros factores pueden determinar que predominie una forma de cristal. Durante la investigación preliminar para establecer esas condiciones es necesario monitorizar las formas primarias. Por ejemplo, durante las pruebas preliminares, una vez un derivado del índol se utilizaron métodos tales como calorimetría con resorte diferencial, análisis con rayos X y análisis infrarrojo para establecer la presencia de polimorfos y determinar que la preparación de estos compuestos podía llevarse a cabo en forma satisfactoria. Las figuras 81-8, 81-9 y 81-10 ilustran los datos respectivos para ambas a esta comparación. Cuando se muestra la presencia de polimorfos deben plantearse trabajos experimentales para determinar si las propiedades difieren o no en un grado suficiente como para alterar el comportamiento farmacéutico o biológico.

Las pruebas de disolución pueden utilizarse en una fase inicial para revelar diferencias en las solubilidades de equilibrio aparentes siempre que se utilice




Fig. 81-9. Difractogramas de rayos X para las formas I, II y III de SSKI 3000.

un sistema de disolventes discriminativos. La figura 81-11 ilustra los datos de disolución para dos polímeros de un derivado imidazol que demostraron una disolución similar en el medio utilizado, sin embargo, cuando se utilizó un medio de disolución discriminativo se logró demostrar diferencias en sus características de disolución. Este fenómeno se ilustra en la figura 81-12. A partir de los datos presentados para el derivado imidazol, se llegó a la conclusión de que no existían diferencias apreciables en la disolubilidad de los dos formas si se administraban por




Fig. 81-10. Espectros de absorción de las formas I, II y III de SSKI 3000.





Fig. 85.11. Computacionalmente de Urbeles, uno de los Formos 1 y 2 de Shit'at'at'at' en el lapso de 1960-1961.



SNAF X897 es una solución de cristal al 50%.

ulteriores en animales de experimentación confirman esta conclusión. La escasez de Normas relativas al aumento de la velocidad de coagulación con la estabilidad de un sólido en disolución y se expresa de la siguiente manera:

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{AD}{V_H} (C_i - C_i^*) \quad (3)$$

en donde α es el área de la interfase de disolución del sólido. D es el coeficiente de difusividad del soluto en el disolvente; V es el volumen del líquido; h es el espesor de la capa de difusión y C_1 y C_2 representan la concentración del soluto en concentraciones de saturación en el tiempo t , respectivamente. La ecuación se resuelve si:

$$\frac{dc}{dt} = \frac{cD}{l\eta_1} \quad (1)$$

para las condiciones experimentales en donde C_p y C_s . Dado que D es una propiedad de la molécula de soluto y del disolvente, este parámetro es independiente de la forma en estado sólido. Las curvaturas experimentales pueden ser seleccionadas de manera que A , V y h se mantengan constantes para medir las

desolación, el comportamiento de solubilidad de los varios polímeros del plásmico de etileno ramificado. Las figuras 8-13 y 8-14 muestran los datos obtenidos a diversas temperaturas. El comportamiento de solubilidad muestra que los distintos volúmenes obtenidos representan buenas aproximaciones de la solubilidad de las diversas formas. El intercambio de la orientación de átomos a diversas temperaturas permite observar las variaciones de solubilidad. Los datos de solubilidad, estimados a diferentes temperaturas, permiten la construcción de la forma $\log S = f(T)$ en la figura 8-15; se ilustra un gráfico en el que se relacionan los datos de solubilidad en función de la temperatura en un trazado tipo de van't Hoff. La relación en líneas rectas permite calcular los calores de la solución para las diversas formas y, además, por extrapolación, determinar un valor aproximado de la entalpía de fusión para las diferentes formas. Este valor se encuentra en la ecuación 8-1.

A temperatura y presión constantes, pueden calcularse las diferencias de energía libre entre los polímeros mediante la siguiente fórmula:

A temperatura y presión constantes, pueden calcularse las diferencias de energía libre entre los productos mediante la siguiente fórmula:

$$\Delta G_c = RT \ln \frac{C_1 \text{ Полимера A}}{C \text{ Полимера B}} \quad (5)$$

Esta ecuación relaciona la solubilidad, C_s , de las formas polimórficas a una temperatura dada, T , con




Fig. 15. La curva de absorción del prototipo C del gelatinado de chitosan en solución de NaCl y a pH 3.0. MTC , 20°C , 150 mg mL^{-1} . Símbolos: MTC , $\circ$; 20°C , $\bullet$; 15°C , Δ ; 0°C , $\ominus$.

las diferencias de energía libre. ΔG . El cuadro 8.3, también incluye las diferencias de energía libre calculadas para los polímeros. Los cambios de entalpía (ΔH) pueden determinarse para las diversas transformaciones mediante la sustrocción del valor de solubilidad de la forma estable del de la forma metastable. Además, al presentar de una temperatura dada (7), la entropía para la transición de polímeros puede evaluarse mediante la siguiente relación:

$$\Delta S, = \frac{\Delta H_{n-1} - \Delta G,}{T}$$

Los valores calculados para las transiciones también se encuentran en el cuadro 83-1. En presencia de la temperatura de transición, ΔC_p es igual a cero y es posible calcular la entropía ignorando el término ΔC_p en la ecuación 6.

Las relaciones termofísicas comprobadas por lei de la permis de que se cumple la ley de Henry. El conocimiento de estas relaciones termofísicas permite al petrolquímico seleccionar en forma más racional la forma polimérica más energética de la misma, invirtiendo para estudios farmacológicos ulteriores y además contar con una evaluación preliminar de su probable estabibilidad.

Cuando un grupo de preformulación investiga de manera inadecuada formas polimórficas de una droga pueden surgir problemas durante la etapa de desarrollo. El crecimiento de cristales en suspensiones




Fig. 10.14. Curvas de distribución de las polimerizaciones A y B del polimero de cloracetato en alcohol *n*-butílico al 55% y en agua a 30°C y 100°C. Símbolos: polimeros A, 30°C, $\square$; polimeros B, 30°C Δ ; polimeros A, 100°C, $\bullet$; polimeros B, 100°C, $\circ$.

pecto o la biodegradabilidad. Las transformaciones asociadas con alteraciones en la uniformidad, el uso producido durante la molición o la granulación que alteran las características físicas y biológicas; un respuesta farmacológica inadecuada, y la estabilidad química deficiente representan problemas típicos que pueden ponerse de manifiesto después.

Schubert

Como se muestran nuevas drayvas es importante conocer algo acerca de las características de solubilidad, especialmente en sistemas acuosos, debido que estos compresores pueden tener alguna solubilidad acerca manutención para reducir un desperfecto térmico. Además, la información de la solubilidad es esencial para el desarrollo de un método de protección discriminativo para la solución. Cuando una drayva tiene una solubilidad acerca menor de 1 mg/ml , dentro del rango de 1 mg/kg (log 1 a 2), puede existir un problema de biodegradación y deba iniciarse estudio de preformulación para minimizar este en consecuencia. La solubilidad fue evaluada de la drayva, determinando que no afecta ningún efecto tóxico en el estudio de experimentación. Para ello se colocó un extracto de drayva en un frasco justo con el solvente. El extracto de drayva a temperatura constante y la cantidad

Cuadro B3-1. *Medios de comunicación calculados para los polímeros A, B y C del polímero de cloruro de metil²*

Polymer	Temperature of injection (°C)	Color at injection, Kricheldorf	ΔS_m cal/g	ΔS_m cal/g
A	218	---	-18	-17
B	188	---	-15	-14
C	90	17.2	-105	-

* *Entomol. exp. appl.* 1999, 68, 111-120.

La luz, el color, la forma, el movimiento, el sonido, el tacto, el gusto, el olfato, el pensamiento o la luz. A veces se utilizan imágenes sobreimpresas en la luz. A veces se utilizan imágenes sobreimpresas en la luz. A veces se utilizan imágenes sobreimpresas en la luz.

Hechos y datos de la experiencia de una prueba de comprensión y una prueba de lectura son obtenidos por los estudiantes, los cuales se comparan con los resultados que se obtuvieron en las pruebas de comprensión y de lectura. Los resultados de las pruebas de comprensión y de lectura son obtenidos por los estudiantes, los cuales se comparan con los resultados que se obtuvieron en las pruebas de comprensión y de lectura. Los resultados de las pruebas de comprensión y de lectura son obtenidos por los estudiantes, los cuales se comparan con los resultados que se obtuvieron en las pruebas de comprensión y de lectura.

puesto mediante el análisis de su estructura química

puesto mediante el análisis de su estructura química. Por ejemplo, los esteres y las amidas son sensibles a degradación hidrolítica, mientras que los ácidos carboxílicos y las cetonas son susceptibles a la degradación oxidativa. Con este conocimiento preliminar es posible

presupuesto principal ni es la vía ni el mecanismo de degradación. Por lo general no se dispone de un método de análisis indicador de la estabilidad en un fase preliminar de la formulación. Puede recurrir-

capa delgada, la reflectancia difusa y el análisis termogravimétrico. Los datos de la reflectancia difusa, para obtener datos que permitan evaluar la estabilidad preliminar. A veces, la evaluación preliminar se complica por la presencia de impurezas. Es esencial que el droga en estudio sea puro antes de iniciar las pruebas de estabilidad. La presencia de impurezas puede conducir a conclusiones erróneas en la evaluación de la estabilidad.

Estabilidad de la droga. Es sumamente importante determinar la estabilidad de la sustancia química en general con la mayor rapidez posible. No se pueden obtener formas farmacéuticas estables con una

en placas de Petri abiertas en condiciones de hume

monstrando regularmente que los defectos pueden ser causados por factores físicos, la expansión de la humedad y el deterioro del quíntum.

La mayoría de las drogas son estables en todos los condiciones, estables bajo condiciones especiales de manipulación, estables con condiciones especiales de manipulación o completamente inestables. Cuando se detectan problemas de estabilidad en una droga puede ser importante determinar la vía de degradación y hacer estudios para establecer el comportamiento aditivo apropiado.

la inestabilidad de nuevas drogas. Evidentemente, ni

Dejados a la naturaleza, los hidratos probablemente se mantengan secos y protegidos del aire en un recipiente hermético. Siempre debes presumir que la nevera sigue se encuentra en un medio ambiente de formaldehído que conduzca a problemas de insubididad.

Desde el punto de vista científico, las reacciones biológicas que ocurren en las células de las plantas acuáticas pueden ser muy diferentes de las que ocurren en las células de las plantas terrestres. Las plantas acuáticas tienen que lidiar con diferentes desafíos, como la disponibilidad de nutrientes y la presencia de patógenos. Por lo tanto, es importante estudiar las reacciones biológicas en las plantas acuáticas para comprender mejor su fisiología y su ecología.

que su velocidad es proporcional a la concentración de los dos reactivos. Sin embargo, en solución acuosa, considerando que el agua generalmente se encuentra presente en exceso y en una concentración relativamente constante, estas reacciones son consideradas experimentalmente como reacciones mono-moleculares o de primer orden. Esta simplificación permite calcular el grado de descomposición en com-

diciones de experimentación precisas mediante métodos nuevos y complicados. La extrapolación de las verdades exageradas bajo condiciones de temperatura ambiente permite establecer con mayor rapidez la