

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM.
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-054279- -00003-0000

Fecha: 2010-09-16 16:45:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

Re: Expediente N° 10-054.279

**Solicitud de Patente de Invención "DERIVADOS DE 1, 2, 3-TRIAZOL PARA USO
COMO INHIBIDORES DE ESTEAROIL-COENZIMA A DESATURASA"**

Solicitante: GLAXOSMITHKLINE LLC

Nuestra Ref: P2010/000050

RESPUESTA AL OFICIO N° 8921 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 246 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2010,
(EXAMEN DE FORMA ART 12)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto emanado de ese Despacho dentro del término legal previsto en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos:

1. En respuesta a la única observación del Examinador, me permito adjuntar un nuevo Capitulo Reivindicatorio Modificado, del que han sido eliminado la condición al final de la Reivindicación 1 y el compuesto número 14 de la Reivindicación 7 quedando un total de 25 reivindicaciones. Así las cosas ajunto un recibo de pago por valor de \$390.000.00, que cubre el valor adicional por 15 reivindicaciones por encima de 10 y un recibo de pago por valor de \$114.000 correspondiente a la tasa de modificación para solicitudes en tramite.

2. Solicito al Despacho sea tenido en cuenta el nuevo pliego de Reivindicaciones en el presente trámite.

Atentamente,


CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Capitulo Reivindicatorio Modificado
Recibo por valor de \$390.000 y \$114.000.00

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto de Fórmula (I):



en donde:

X representa -CONH-, -NHCO- o -CH₂NH-;

R¹ representa: arilo de C₆₋₁₀ opcionalmente sustituido por uno, dos o tres grupos seleccionados independientemente de:

(a) alquilo de C₁₋₆, -OCH₃, haloalquilo de C₁₋₆, haloalquilo de OC₁₋₆, cicloalquilo de C₃₋₆, cicloalquilo de OC₃₋₆ o halógeno;

(b) fenilo opcionalmente sustituido por uno, dos o tres grupos seleccionados independientemente de: halógeno;

R² representa hidrógeno o alquilo de C₁₋₆; R³ representa: arilo de C₆₋₁₀ opcionalmente sustituido por uno, dos o tres grupos seleccionados independientemente de:

(a) alquilo de C₁₋₆, alqueno de C₁₋₆, alcoxi de C₁₋₆, -O(CH₂)_mR⁴, -(CH₂)_mOC(=O)R⁴, -(CH₂)_nCO₂R⁵, -(CH₂)_nOC(=O)R⁵, alquilo C₀₋₆OH, -C(=O)NHR⁶, -(CH₂)_pNHC(=O)R⁷, -O(CH₂)_qNR⁸R⁹, -OC₁₋₆alquilOH, haloalquilo de C₁₋₆, haloalquilo de OC₁₋₆, cicloalquilo de C₃₋₆, cicloalquilo de OC₃₋₆ o halógeno;

(b) oxazol;

R⁴ representa arilo de C₆₋₁₀;

R⁵ representa -H o alquilo de C₁₋₆;

R⁶ representa -H o alquilo de C₁₋₃ o alquilo C₁₋₃OH;

R⁷ representa -H o alquilo de C₁₋₃;

R⁸ representa -H o alquilo de C₁₋₃;

R⁹ representa -H o alquilo de C₁₋₃;

m representa 1-3;

n representa 0-3;

p representa 0-3; y

q representa 1-3;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de Fórmula (I) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de

conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque X representa -CONH- o -CH₂NH-. 3

3. El compuesto de Fórmula (I) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, caracterizado además porque R¹ representa fenilo opcionalmente sustituido por uno, dos o tres grupos independientemente seleccionados entre:

(a) alquilo de C₁₋₆, -OCH₃, haloalquilo de C₁₋₆, haloalquilo de OC₁₋₆, cicloalquilo de C₃₋₆, cicloalquilo de OC₃₋₆ o halógeno;

(b) fenilo opcionalmente sustituido por uno, dos o tres grupos seleccionados independientemente de: halógeno.

4. El compuesto de Fórmula (I) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizado además porque R² representa hidrógeno o alquilo de C₁₋₃.

5. El compuesto de Fórmula (I) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, caracterizado además porque R³ representa fenilo opcionalmente sustituido por uno, dos o tres grupos independientemente seleccionados entre:

(a) alquilo de C₁₋₆, alqueno de C₁₋₆, alcoxi de C₁₋₆, -O(CH₂)_mR⁴, -(CH₂)_mOC(=O)R⁴, -(CH₂)_nCO₂R⁵, -(CH₂)_nOC(=O)R⁵, alquilo C₀₋₆OH, -C(=O)NHR⁶, -(CH₂)_pNHC(=O)R⁷, -O(CH₂)_qNR⁸R⁹, -OC₁₋₆alquilOH, haloalquilo de C₁₋₆, haloalquilo de OC₁₋₆, cicloalquilo de C₃₋₆, cicloalquilo de OC₃₋₆ o halógeno;

(b) oxazol.

6. El compuesto de Fórmula (I) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, caracterizado además porque R³ representa fenilo opcionalmente sustituido por:

(i) un grupo seleccionado independientemente de -(CH₂)_nCO₂R⁵ o -C(=O)NHR⁶ y/o,

(ii) uno, dos o tres grupos seleccionados independientemente de:

(a) alquilo de C₁₋₆, alqueno de C₁₋₆, alcoxi de C₁₋₆, O(CH₂)_mR⁴, -(CH₂)_mOC(=O)R⁴, -(CH₂)_nOC(=O)R⁵, alquilo C₀₋₆OH, -(CH₂)_pNHC(=O)R⁷, -O(CH₂)_qNR⁸R⁹, alquilo OC₁₋₆OH, haloalquilo de C₁₋₆, haloalquilo de OC₁₋₆, cicloalquilo de C₃₋₆, cicloalquilo de OC₃₋₆ o halógeno;

(b) oxazol.

A

7. El compuesto de Fórmula (I) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque se selecciona entre:

N-[3,4-bis(metiloxi)fenil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,4-bis(metiloxi)fenil]-1-[(4-bromofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(4-bromofenil)metil]-5-metil-N-{4-[(fenilmetil)oxi]fenil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(4-fluorofenil)metil]-5-metil-N-{4-[(fenilmetil)oxi]fenil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(4-fluorofenil)metil]-5-metil-N-{4-[(3-metilbutil)oxi]fenil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(4-bromofenil)metil]-5-metil-N-{4-[(3-metilbutil)oxi]fenil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

5-metil-1-(fenilmetil)-N-{4-[(fenilmetil)oxi]fenil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

5-metil-N-{4-[(3-metilbutil)oxi]fenil}-1-(fenilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(2'-cloro-4-bifenilil)metil]-5-metil-N-{4-[(3-metilbutil)oxi]fenil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

5-metil-N-{4-[(3-metilbutil)oxi]fenil}-1-[(4-metilfenil)metil]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

5-metil-N-{4-[(3-metilbutil)oxi]fenil}-1-{[4-(1-metiletil)fenil]metil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,4-bis(metiloxi)fenil]-5-metil-1-[(4-metilfenil)metil]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-(2-bifenililmetil)-N-[3,4-bis(metiloxi)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,4-bis(metiloxi)fenil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-N-[4-(1,3-oxazol-2-il)fenil]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[4-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

metil 4-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il}carbonil)amino]-3-(metiloxi)benzoato;

1-[(3,4-Diclorofenil)metil]-5-metil-N-{3-[(metilamino)carbonil]fenil}-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-N-{4-[(metilamino)carbonil]fenil}-1H-1,2,3-

5

triazol-4-carboxamida;

etil 3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]benzoato;

N-[3-(acetilamino)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[4-(acetilamino)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[3-(hidroximetil)-2-metilfenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[3-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

metil 3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]-4-(metiloxi)benzoato;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

etil 4-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]fenil} acetato;

metil 4-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]-2-(metiloxi)benzoato;

metil 5-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]-2-hidroxibenzoato;

metil 3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]fenil} acetato;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-(3-hidroxifenil)-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

metil 5-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]-2-fluorobenzoato;

N-[5-(aminocarbonil)-2-(metiloxi)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida,;

metil 4-cloro-3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]benzoato;

metil 3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]-4-(metiloxo)fenil} acetato;

metil 3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil) amino]-4-fluorobenzoato;

N-[3-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1-(fenilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[4-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1-(fenilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3-(hidroximetil)-2-metilfenil]-5-metil-1-(fenilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-

298

6

carboxamida;

1-[(3,5-diclorofenil)metil]-N-[3-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-

carboxamida;

metil 3-[(1-[(3,5-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il}carbonil)amino]-4-(metiloxi)benzoato;

1-[(3,5-diclorofenil)metil]-N-[3-(hidroximetil)-2-metilfenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-{3-[(acetilamino)metil]fenil}-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[3-(1-hidroxietyl)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[4-cloro-3-(hidroximetil)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

dimetil 4-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il}carbonil)amino]-1,2-bencendicarboxilato;

metil 5-[(1-[(3,5-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il}carbonil)amino]-2-fluorobenzoato;

etil 4-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il}carbonil)amino]benzoato;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[4-(hidroximetil)-2-(metiloxi)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[4-(2-hidroxietyl)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[5-(hidroximetil)-2-(metiloxi)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,5-bis(hidroximetil)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[5-(2-hidroxietyl)-2-(metiloxi)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[2-fluoro-5-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[2-cloro-5-(hidroximetil)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,5-diclorofenil)metil]-N-[5-(hidroximetil)-2-(metiloxi)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,4-bis(hidroximetil)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-

299

carboxamida;

1-[(3,5-diclorofenil)metil]-N-[4-fluoro-3-(hidroximetil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-

triazol-4-carboxamida;

N-[3,5-bis(hidroximetil)fenil]-5-metil-1-(fenilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-

carboxamida;

N-[3,5-bis(hidroximetil)fenil]-1-[(3-clorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-

carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[3-(2-hidroxietil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-

carboxamida;

Ácido 3-[(1-[(3,4-Diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil)
amino]benzoico;

Ácido 3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil)
amino]-4-(metiloxi)benzoico;

ácido 5-[(5-metil-1-(fenilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil} amino)-1,3-
bencendicarboxílico;

Ácido 4-[(1-[(3,4-Diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil)
amino]benzoico;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-{3-[(etilamino)carbonil]fenil}-5-metil-1H-1,2,3-
triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-(3-{[(2-hidroxietil)amino]carbonil} fenil)-5-metil-1H-
1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-N-[5-[(metilamino)carbonil]-2-(metiloxi)fenil]-
1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

{3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil} amino]
fenil} metil acetato;

{3-[(1-[(3,5-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil} amino]
fenil} metil acetato;

{3-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil} amino]
fenil} metil benzoato;

{3-[(1-[(3,5-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il} carbonil)
amino]fenil} metil benzoato;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-{4-[(2-hidroxietil)oxi]fenil}-5-metil-1H-1,2,3-triazol-
4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-N-[4-(1-metiletenil)-2-(metiloxi)fenil]-1H-1,2,3-
triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[3-(1-hidroxi-1-metiletil)fenil]-5-metil-1H-1,2,3-
triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-[4-{[2-(dimetilamino)etil]oxi}-3-(hidroximetil)fenil]-

5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-{3-[(2-hidroxi)etil]fenil}-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida; y

{5-[(1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amino]benceno-1,3-diil} dimetanol;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. El compuesto de Fórmula (I) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque se selecciona entre:

N-[3,4-bis(hidroxi)metil]fenil]-5-metil-1-(fenilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,5-bis(hidroxi)metil]fenil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,4-bis(hidroxi)metil]fenil]-1-[(3-clorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,4-bis(hidroxi)metil]fenil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,5-bis(hidroxi)metil]fenil]-1-[(3-fluorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-[3,4-bis(hidroxi)metil]fenil]-1-[(3-fluorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3-clorofenil)metil]-N-[3-(hidroxi)metil]fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(4-fluorofenil)metil]-N-[3-(hidroxi)metil]fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3-clorofenil)metil]-N-[4-(hidroxi)metil]fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3-fluorofenil)metil]-N-[3-(hidroxi)metil]fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(4-fluorofenil)metil]-N-[4-(hidroxi)metil]fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3-fluorofenil)metil]-N-[4-(hidroxi)metil]fenil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

1-[(3,4-diclorofenil)metil]-N-{3-(hidroxi)metil}-5-[(metilamino)carbonil]fenil}-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida; y

N-{1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il}-4-(hidroxi)metil benzamida

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. El compuesto de Fórmula (I) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque es N-[3,5-bis(hidroximetil)fenil]-1-[(3,4-diclorofenil)metil]-5-metil-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, por lo menos junto con un portador y/o excipiente.
11. El compuesto de Fórmula (I) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque se usa en terapia.
12. El uso de un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en la elaboración de un medicamento para tratar y/o prevenir una enfermedad o afección susceptible de mejoría por medio de un inhibidor de SCD.
13. El uso de un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en la Reivindicación 12, en la elaboración de un medicamento para tratar y/o prevenir enfermedades o afecciones causadas por o asociadas con un perfil anormal de lípidos en el plasma incluyendo dislipidemia, hipoalfalipoproteinemia, hiperbetalipoproteinemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia familiar, angina, isquemia, isquemia cardíaca, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, aterosclerosis, obesidad, diabetes de tipo I, diabetes de tipo II, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y síndrome metabólico; enfermedad vascular periférica, lesión por reperfusión, restenosis angioplástica, hipertensión, complicaciones vasculares de la diabetes, trombosis, esteatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y otras enfermedades relacionadas con la acumulación de lípidos en el hígado; eczema, acné, psoriasis, envejecimiento de la piel, formación o prevención de cicatrices queloidales, y enfermedades relacionadas con la producción o las secreciones de las membranas mucosas; cáncer, neoplasia, malignidad, metástasis, tumores (benignos o malignos), carcinogenesis, hepatomas y similares; deterioro cognitivo leve (MCI), enfermedad de Alzheimer (AD), angiopatía amiloides cerebral (CAA) o demencia asociada con síndrome de Down (DS) y otras enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por la formación o acumulación de placas amiloides que comprenden A β 42.

14. El uso de un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en la Reivindicación 12, en la elaboración de un medicamento para tratar y/o prevenir acné, psoriasis, envejecimiento de la piel, dislipidemia, hipertrigliceridemia, aterosclerosis, obesidad, diabetes de tipo II, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, esteatosis hepática y/o esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

15. El uso de un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en la Reivindicación 12 en la elaboración de un medicamento para tratar y/o prevenir acné.

16. El compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque se usa para tratar y/o prevenir una enfermedad o afección susceptible de mejoría por medio de un inhibidor de SCD.

17. El compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con la Reivindicación 16, caracterizado además porque se usa para tratar y/o prevenir enfermedades o afecciones causadas por o asociadas con un perfil anormal de lípidos en el plasma incluyendo dislipidemia, hipoalfalipoproteinemia, hiperbetalipoproteinemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia familiar, angina, isquemia, isquemia cardíaca, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, aterosclerosis, obesidad, diabetes de tipo I, diabetes de tipo II, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y síndrome metabólico; enfermedad vascular periférica, lesión por reperfusión, restenosis angioplástica, hipertensión, complicaciones vasculares de la diabetes, trombosis, esteatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y otras enfermedades relacionadas con la acumulación de lípidos en el hígado; eczema, acné, psoriasis, envejecimiento de la piel, formación o prevención de cicatrices queloidales, y enfermedades relacionadas con la producción o las secreciones de las membranas mucosas; cáncer, neoplasia, malignidad, metástasis, tumores (benignos o malignos), carcinogenesis, hepatomas y similares; deterioro cognitivo leve (MCI), enfermedad de Alzheimer (AD), angiopatía amiloid cerebral (CAA) o demencia asociada con síndrome de Down (DS) y otras enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por la formación o acumulación de placas amiloidales que comprenden A β 42.

18. El compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con la Reivindicación 16, caracterizado además porque se usa en la elaboración de un medicamento para tratar y/o prevenir acné, psoriasis, envejecimiento de la piel, dislipidemia, hipertrigliceridemia, aterosclerosis, obesidad, diabetes de tipo II, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, esteatosis hepática y/o esteatohepatitis no

alcohólica (NASH).

19. El compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con la Reivindicación 16, caracterizado además porque se usa para tratar y/o prevenir acné.

20. Un método de tratar y/o prevenir una enfermedad o afección susceptible de mejoría por medio de un SCD, que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9.

21. Un método de tratar y/o prevenir enfermedades o afecciones causadas por o asociadas con un perfil anormal de lípidos en el plasma incluyendo dislipidemia, hipoalfalipoproteinemia, hiperbetalipoproteinemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia familiar, angina, isquemia, isquemia cardíaca, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, aterosclerosis, obesidad, diabetes de tipo I, diabetes de tipo II, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y síndrome metabólico; enfermedad vascular periférica, lesión por reperfusión, restenosis angioplástica, hipertensión, complicaciones vasculares de la diabetes, trombosis, esteatosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y otras enfermedades relacionadas con la acumulación de lípidos en el hígado; eczema, acné, psoriasis, envejecimiento de la piel, formación o prevención de cicatrices queloidales, y enfermedades relacionadas con la producción o las secreciones de las membranas mucosas; cáncer, neoplasia, malignidad, metástasis, tumores (benignos o malignos), carcinogenesis, hepatomas y similares; deterioro cognitivo leve (MCI), enfermedad de Alzheimer (AD), angiopatía amiloida cerebral (CAA) o demencia asociada con síndrome de Down (DS) y otras enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por la formación o acumulación de placas amiloidales que comprenden A β 42.

22. Un método de tratar y/o prevenir acné, psoriasis, envejecimiento de la piel, dislipidemia, hipertrigliceridemia, aterosclerosis, obesidad, diabetes de tipo II, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, esteatosis hepática y/o esteatohepatitis no alcohólica (NASH), que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en la Reivindicación 20.

23. Un método de tratar y/o prevenir acné, que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo como el que se reclama en la Reivindicación 20.

24. El compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque se usa en combinación con uno o más agentes activos seleccionados entre un inhibidor de éster colesterílico transferasa (inhibidores de CETP), un inhibidor de HMG-CoA reductasa, una proteína microsomal de transferencia de triglicéridos, un activador de receptor activado mediante proliferador de peroxisoma (PPAR), un inhibidor de resorción de ácidos biliares, un inhibidor de absorción de colesterol, un inhibidor de síntesis de colesterol, un fibrato, niacina, una resina de intercambio de iones, un antioxidante, un inhibidor de AcylCoA: colesterol aciltransferasa (ACAT inhibidor), un antagonista de canabinoide 1 y un secuestrante de ácidos biliares.

25. El compuesto de Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque se usa en combinación con uno o más agentes activos seleccionados entre un corticosteroide, un derivado de vitamina D3, un retinoide, un inmunomodulador, un antiandrógeno, un agente queratolítico, un antimicrobiano, un quimioterapéutico de platino, un antimetabolito, hidroxiurea, un taxano, un interruptor mitótico, una antraciclina, dactinomicina, un agente de alquilación y un inhibidor de colinesterasa.

13

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 77,765
FECHA : SEPTIEMBRE 16 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-054279- -00003-0000

Fecha: 2010-09-16 16:45:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
DLARTE RAISBEK	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	378377145	16/09/2010	3,796,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

306

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 77,780
FECHA : SEPTIEMBRE 16 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-054279- -00003-0000

Fecha: 2010-09-16 16:45:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 14

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEK	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	378377145	16/09/2010	3,796,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
			TOTAL : \$ 390,000.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

308