

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Señora



No. 10-097369- -00001-0000

Alix Carmenza Céspedes de Vergel

Fecha: 2010-10-08 17:24:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 10.097.369

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Derivados de bifenilo conformacionalmente restringido para uso como inhibidores del virus de la hepatitis c.

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, dando alcance a la solicitud radicada el pasado 9 de Agosto de 2010, presento nuevo capítulo reivindicatorio el cual precisa el alcance de la invención, y se encuentra totalmente sustentado en la descripción

En relación con la anterior modificación, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que la misma **no amplía** de manera alguna el alcance de la presente invención.

Anexos:

1. Recibo que acredita el pago de la tasa de modificación número 10-82,347

2. Copia del nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza el presentado originalmente.
3. Formulario único de modificaciones y correcciones.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

CHP/BOGDMS-#473694--P2010_000054-0390.DOC

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-097369- -00001-0000

Fecha: 2010-10-08 17:24:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

FORMULARIO UNICO DE CORREC

1

SOLICITUD DE

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación de una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Dirección: Route 206 and Providence Line Road Princeton, New Jersey
08543-4000 Estados Unidos de América

Nacionalidad o Domicilio: Estados Unidos de América

Lugar de Constitución: Estados Unidos de América

Teléfono:

Fax:

E-Mail

IDENTIFICACION

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 6o.

Teléfono: 634 1500

Fax: 376 2211

E-Mail: office.bogota@bakernet.com

IDENTIFICACION

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número 79.143.366

TP 20.281

4

Numero de expediente

10.097.369

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada

Nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza el inicialmente presentado, el cual no amplía el de manera alguna el alcance de la presente invención

6

Comprobante de Pago No.

10-82,347

Fecha

Septiembre 30 de 2010

7

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes, si fuere el caso.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE ALVARO CORREA ORDOÑEZ

FIRMA

C.C. 79.143.366

T.P. 20.281

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

2000-F03

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 82,347
FECHA : SEPTIEMBRE 30 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-097369- -00001-0000

Fecha: 2010-10-08 17:24:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 19

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
BAKER & MCKENZIE	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	139003675	30/09/2010	79,775,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00


SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES ENMENDADAS

1. Un compuesto de fórmula (I)



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque

u y u' son independientemente 0, 1, 2 ó 3;

D y E son cada uno anillos aromáticos de cinco miembros que contienen uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre;


cada R¹ y R¹ es independientemente seleccionado de alcoxi, alcoxialquilo, alcoxycarbonilo, alquilo, arilalcoxycarbonilo, carboxi, formilo, halo, haloalquilo, hidroxí, hidroxialquilo, -NR^aR^b, (NR^aR^b)alquilo, y (NR^aR^b)carbonilo;

R² y R^{2'}, junto con los átomos de carbono a los cuales se unen, forman un anillo insaturado de cinco a ocho miembros opcionalmente que contiene uno o dos heteroátomos

seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde el anillo insaturado de cinco a ocho miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes seleccionados independientemente de alcoxi, alcoxialquilo, alcoxycarbonilo, alquilo, alquilsulfonilo, arilo, arilalquilo, arilsulfonilo, carboxi, formilo, halo, haloalcoxi, haloalquilo, hidroxí, hidroxialquilo, $-NR^aR^b$, (NR^aR^b) alquilo, (NR^aR^b) carbonilo, oxo, y espirociclo;

R^3 y $R^{3'}$ son cada uno independientemente seleccionados de hidrógeno, alcoxialquilo, alcoxycarbonilo, alcoxycarbonilalquilo, alquilo, arilalcoxycarbonilo, carboxi, haloalquilo, heterociclilalquilo, hidroxialquilo, (NR^aR^b) carbonilo, y trialquilsililalcoxialquilo;

R^4 y $R^{4'}$ son cada uno independientemente seleccionados de



cada m es independientemente 0, 1 ó 2;

cada o es independiente 1, 2 ó 3;

cada s es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4;

cada X es independientemente seleccionado de O, S,

7
S(O), SO₂, CH₂, CHR⁵ y C(R⁵)₂; siempre que cuando n es 0, X se selecciona de CH₂, CHR⁵ y C(R⁵)₂;

cada R⁵ se selecciona independientemente de alcoxi, alquilo, arilo, halo, haloalquilo, hidroxilo, y -NR^aR^b, en donde el alquilo opcionalmente pueden formar un anillo de tres a seis miembros fusionado con un átomo de carbono adyacente, en donde el anillo de tres a seis miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos alquilo;

cada R⁶ se selecciona independientemente de hidrógeno y R¹⁰-C(O)-, y R¹⁰-C(S)-;

R⁷ se selecciona de hidrógeno y alquilo;


R⁸ y R⁹ son cada uno independientemente seleccionados de hidrógeno, alqueno, alcoxialquilo, alquilo, haloalquilo, y (NR^aR^b)alquilo, o,

R⁸ y R⁹, junto con el átomo de carbono al cual se unen, forman un anillo de cinco o seis miembros saturado que contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos seleccionados de NR^z, O y S; donde R^z se selecciona de hidrógeno y alquilo, y

cada R¹⁰ se selecciona independientemente de alcoxi, alcoxialquilo, alcoxycarbonilo, alcoxycarbonilalquilo, alquilo, alquilcarbonilalquilo, arilo, arilalqueno, arilalcoxi, arilalquilo, ariloxialquilo, cicloalquilo,

(cicloalquil)alquenilo, (cicloalquil)alquilo,
 cicloalquiloalquilo, haloalquilo, heterociclilo,
 heterociclilalquenilo, heterociclilalcoxi,
 heterociclilalquilo, heterocicliloalquilo, hidroxialquilo,
 $-NR^cR^d$, (NR^cR^d) alquenilo, (NR^cR^d) alquilo y (NR^cR^d) carbonilo.

2. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R^4 y $R^{4'}$ son cada uno



3. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada m es 1.

4. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada X es CH_2 .

5. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque s es 0.

6. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R^6 es $R^{10}-C(O)-$.

7. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque cada R^{10} se selecciona independientemente de ariloalquilo, (cicloalquil)alquilo, y (NR^cR^d) alquilo.

8. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque u y u' son cada uno 0.


9. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R^3 y $R^{3'}$ son cada uno hidrógeno.

10. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R^2 y $R^{2'}$, junto con los átomos a los que se unen, forman un anillo de cinco miembros que contiene opcionalmente un átomo de oxígeno o nitrógeno, en donde el anillo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de alcoxi, alcoxialquilo, alcoxycarbonilo, alquilo, alquilsulfonilo, arilo, arilalquilo, arilsulfonilo, carboxi, formilo, halo, haloalcoxi, haloalquilo, hidroxí, hidroxialquilo, $-NR^aR^b$, (NR^aR^b) alquilo, (NR^aR^b) carbonilo, y oxo.

11. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R^2 y $R^{2'}$, junto con los átomos a los que se unen, forman un anillo de siete miembros

que contiene un heteroátomo seleccionado de oxígeno y nitrógeno, en donde el anillo está opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes seleccionados independientemente de alcoxi, alcoxialquilo, alcoxicarbonilo, alquilo, alquilsulfonilo, arilo, arilalquilo, arilsulfonilo, carboxi, formilo, halo, haloalcoxi, haloalquilo, hidroxilo, hidroxialquilo, $-NR^aR^b$, (NR^aR^b) alquilo, (NR^aR^b) carbonilo, y oxo.

12. Un compuesto de fórmula (II)



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque

A está ausente o $CR^{11}R^{12}$;

G se selecciona de $CR^{11}R^{12}$, O y NR^{13} ;

J está ausente o $CR^{11}R^{12}$;

R^3 y R^4 son cada uno independientemente seleccionados de hidrógeno y $R^{10}-C(O)-$;

cada R^{10} se selecciona independientemente de arilalquilo, (cicloalquil)alquilo, y (NR^cR^d) alquilo;

cada R^{11} y R^{12} se seleccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo, y NR^aR^b- , o

R¹¹ y R¹² forman juntos un grupo oxo, o

R¹¹ y R¹², junto con el átomo de carbono al cual se unen, forman un espirociclo de tres a ocho miembros, y

cada R¹³ se selecciona independientemente de hidrógeno, alcoxialquilo, alquilo, y arilsulfonilo.

13. Un compuesto caracterizado porque es seleccionado de:

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(9-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-6-metil-6,7-dihidro-5H-dibenzo[c,e]azepin-3-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-oxo-9H-fluoren-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(9-hidroxi-7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3-metilobutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9H-fluoren-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(9-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-4-il)-5,7-dihidrodibenzo[c,e]oxepin-3-il)-1H-

imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-

metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(9-(dimetilamino)-7-(2-((2S)-1-
((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-
pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9H-fluoren-2-il)-1H-imidazol-
2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de
metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-
((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-
imidazol-5-il)-9-metil-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-
pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-
((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-
imidazol-5-il)-9H-fluoren-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-
pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(9-(dimetilamino)-7-(2-((2S)-1-
((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-
pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-metil-9H-fluoren-2-il)-1H-
imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-
metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-2-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-
(metoxycarbonil)-L-alanil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-
9-metil-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)-

1-metil-2-oxoetil)carbamato de metilo;

((1S,2R)-2-metoxi-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-O-metil-L-treonil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-metil-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato de metilo;

((1S)-3-metoxi-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-O-metil-L-homoseril)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-metil-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-(fenilsulfonil)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

(1S,1'S)-2,2'-((6-metil-6,7-dihidro-5H-dibenzo[c,e]azepina-3,9-diil)bis(1H-imidazol-4,2-diil(2S)-2,1-pirrolidinediil))bis(N,N-dietil-2-oxo-1-feniletanamina);

((1S)-2-((2S)-2-(4-(9-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-L-alanil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-4-il)-5,7-dihidro-dibenzo[c,e]oxepin-3-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)-1-metil-2-oxoetil)carbamato de metilo;

((1S)-3-metoxi-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-O-metil-L-homoseril)-2-pirrolidinil)-1H-

imidazol-5-il)-9-(fenilsulfonil)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato de metilo;

rac-((1R,2S)-2-metoxi-1-((2R)-2-(5-(7-(2-((2R)-1-(N-(metoxycarbonil)-O-metil-D-treonil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-(fenilsulfonil)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato de metilo;

((1S)-2-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-L-alanil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-(fenilsulfonil)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)-1-metil-2-oxoetil)carbamato de metilo;

(1S,2R)-2-metoxi-1-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-O-metil-L-treonil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9H-fluoren-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato de metilo;

((1S)-2-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-L-alanil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)-1-metil-2-oxoetil)carbamato de metilo;

((1S)-1-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9,9-dimetil-9H-fluoren-2-il)-1H-imidazol-2-

il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((9,9-dimetil-9H-fluoren-2,7-diil)bis(1H-imidazol-5,2-diil(2S)-2,1-pirrolidindiil((1S)-1-ciclopropil-2-oxo-2,1-etandiil)))biscarbamato de dimetilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(5-(7'-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)espiro[ciclobutan-1,9'-fluoren]-2'-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-2-((2S)-2-(5-(7'-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-L-alanil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)espiro[ciclobutan-1,9'-fluoren]-2'-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)-1-metil-2-oxoetil)carbamato de metilo;

(5,7-dihidrodibenzo[c,e]oxepina-3,9-diilbis(1H-imidazol-4,2-diil(2S)-2,1-pirrolidindiil((1S)-2-oxo-1-(tetrahydro-2H-piran-4-il)-2,1-etandiil)))biscarbamato de dimetilo;

(5,7-dihidrodibenzo[c,e]oxepina-3,9-diilbis(1H-imidazol-4,2-diil(2S)-2,1-pirrolidindiil(2-oxo-1-(tetrahydro-2H-piran-4-il)-2,1-etandiil)))biscarbamato de dimetilo;

((1S,2R)-2-metoxi-1-(((2S)-2-(4-(9-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-O-metil-L-treonil)-2-pirrolidinil)-1H-

imidazol-4-il)-5,7-dihidrodibenzo[c,e]oxepin-3-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato de metilo;

((1S)-3-metoxi-1-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxicarbonil)-O-metil-L-homoseril)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato de metilo;

(1S,1'S)-2,2'-(5,7-dihidrodibenzo[c,e]oxepina-3,9-diilbis(1H-imidazol-4,2-diil(2S)-2,1-pirrolidindiil))bis(N,N-dietil-2-oxo-1-feniletanamina);

((1S)-1-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-1-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-(2-metoxietil)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

((1S)-2-((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxicarbonil)-L-alanil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-(2-metoxietil)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)-1-metil-2-oxoetil)carbamato de metilo;

((1S,2R)-2-metoxi-1-(((2S)-2-(5-(7-(2-((2S)-1-(N-(metoxycarbonil)-O-metil-L-treonil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-9-(2-metoxietil)-9H-carbazol-2-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)propil)carbamato de metilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(4-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-4-il)dibenzo[b,d]furan-3-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo;

(dibenzo[b,d]furan-3,7-diilbis(1H-imidazol-4,2-diil(2S)-2,1-pirrolidindiil((1S)-1-ciclopropil-2-oxo-2,1-etandiil)))biscarbamato de dimetilo;

((1S)-1-(((2S)-2-(4-(7-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3,3-dimetilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-4-il)dibenzo[b,d]furan-3-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2,2-dimetilpropil)carbamato de metilo;

y

((1S)-2-hidroxi-1-(((2S)-2-(4-(7-(2-((2S)-1-((2S)-3-hidroxi-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-4-il)dibenzo[b,d]furan-3-il)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo.

14. Una composición caracterizada porque comprende

un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un portador farmacéuticamente aceptable.

15. La composición de conformidad con la reivindicación 14, caracterizada porque adicionalmente comprende uno o dos compuestos adicionales con actividad anti-VHC.

16. La composición de conformidad con la reivindicación 15, caracterizada porque al menos uno de los compuestos adicionales es un interferón o una ribavirina.

17. La composición de conformidad con la reivindicación 16, caracterizada porque el interferón se selecciona del interferón alfa 2B, interferón alfa pegilado, interferón de consenso, interferón alfa 2A, e interferón tau linfoblastoide.

18. Método para tratar una infección por VHC en un paciente caracterizado porque comprende administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo .

19. Método de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque adicionalmente comprende administrar uno o dos compuestos adicionales que tienen actividad anti-

VHC antes de, después o simultáneamente con el compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

20. Método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado porque al menos uno de los compuestos adicionales es un interferón o una ribavirina.

21. Método de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el interferón se selecciona del interferón alfa 2b, interferón alfa pegilado, interferón de consenso, interferón alfa 2A, e interferón tau linfoblastoide.