




Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

PCT



Delegatura de Propiedad Industrial

División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-116608-00000-0000

Fecha: 2010-09-21 12:45:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 210

SOLICITUD

# PATENTE DE INVENCION

10-116608

21. EXPEDIENTE No.

54. TÍTULO

DERIVADOS POLISUSTITUIDOS DE 2-HETEROARIL-6-

FENIL-IMIDAZO[1,2-a]PIRIDINAS, SU PREPARACION

Y SU APLICACION EN TERAPEUTICA

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

71. SOLICITANTE

SANOFI-AVENTIS

DOMICILIO

PARIS, FRANCIA

74. APODERADO

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén


22. BOGOTÁ, D.C.,

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

**PETITORIO**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-116608-00000-0000

Fecha: 2010-09-21 12:45:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 210**FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE  
PCT  
ENTRADA EN FASE NACIONAL****SOLICITUD DE:**

1

☒ Patente de Invención.☐ Patente de Modelo de Utilidad.☒ Capítulo I.☐ Capítulo II.

2

**SOLICITANTE  
(71)**Nombre: **SANOFI-AVENTIS**

Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia.

Dirección: 174 avenue de France,  
75013 Paris,  
FranciaDomicilio: Paris,  
Francia**IDENTIFICACIÓN**

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

3

**REPRESENTANTE  
O APODERADO**

Nombre:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Dirección:

Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono:

347 36 11

Fax:

211 86 50

E-mail:

[clientes@cavelier.com](mailto:clientes@cavelier.com)

Domicilio:

Bogotá, Colombia.

**IDENTIFICACIÓN**

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número 35.456.344T.P 23.555

4

**INVENTOR (ES)  
(72)**1. **Antonio ALMARIO GARCIA**c/o Sanofi-Aventis,  
Patent Department,  
174 avenue de France,  
75013 Paris,  
Francia3. **Yannick EVANNO**c/o Sanofi-Aventis,  
Patent Department,  
174 avenue de France,  
75013 Paris,  
Francia5. **David MACHNIK**c/o Sanofi-Aventis,  
Patent Department,  
174 avenue de France,  
75013 Paris,  
Francia2. **Danielle DE PERETTI**c/o Sanofi-Aventis,  
Patent Department,  
174 avenue de France,  
75013 Paris,  
Francia4. **Patrick LADERNOIS**c/o Sanofi-Aventis,  
Patent Department,  
174 avenue de France,  
75013 Paris,  
Francia6. **Nathalie RAKOTOARISOA**c/o Sanofi-Aventis,  
Patent Department,  
174 avenue de France,  
75013 Paris,  
Francia

5

**PCT (86)**Solicitud Internacional No. PCT/FR2009/000303Fecha: 20 de marzo de 2009Publicación Internacional No. WO 2009144395 A1Fecha: 3 de diciembre de 2009

6

**Título (54)****DERIVADOS POLISUSTITUIDOS DE 2-HETEROARIL-6-FENIL-IMIDAZO [1,2- $\alpha$ ]PIRIDINAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA**

7

**Clasificación Internacional (51)** C07D 471/004

A61P 25/00

A61P 35/00

|              |                                                                    |                     |                     |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <div>8</div> | <b>Prioridad</b>                                                   | (33) País de Origen | (32) Fecha          | (31) Número de Solicitud |
|              | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | FR                  | 21 de marzo de 2008 | 0801584                  |

9

Comprobante de pago No.: 10-67,851

Comprobante de pago No.: 10-75,689

Comprobante de pago No.: 10-75,766

Fecha: 18 de agosto de 2010

Fecha: 13 de septiembre de 2010

Fecha: 13 de septiembre de 2010

10

Anexos:

☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud por \$ 554.000.oo.

☒ Comprobante de pago por 17 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$442.000.oo.

☒ Documento que acredita la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.

☒ Poderes, si fuere el caso.

☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.

☐ Declaraciones.

☒ Copia de la solicitud internacional. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)

☒ Traducción de la solicitud internacional al castellano. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)

☐ Copia del examen preliminar efectuado por la IPEA.

☐ Traducción del examen preliminar efectuado por la IPEA.

☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.

☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.

☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico.


☒ Arte final 12x12

☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.

☒ Otros: VER HOJA DE DOCUMENTOS ANEXOS

11

## FIGURA CARACTERÍSTICA



12

Solicito la concesión de la patente,

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZFIRMA: Luiz Clemencia de Paez  
C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P. 23.555

JGG

**DOCUMENTOS ANEXOS**

1. ☒ Publicación Internacional WO 2009/144395 A1

Descripción:

Páginas 76 en el idioma original

Páginas 73 en español

Reivindicaciones: Número (s) 27

Figuras: Número (s)

2. ☒ Forma PCT/ISA/210. Informe de Búsqueda Internacional.

3. ☒ Extracto de publicación.

**NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN LA  
FASE INTERNACIONAL**

# Notaría Sexta

# 6

DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

COPIA NUMERO 9

DE LA ESCRITURA NUMERO:  
FECHA: 26/Julio/2010

383701

ACTO O CONTRATO:  
PODER ESPECIAL  
OTORGANTES:  
CAVELIER ABOGADOS  
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ



**AMPARO QUINTERO ARTURO**

**NOTARIA SEXTA**

**CARRERA 9 No. 69-31 - PBX: 317 01 00 - FAX: 314 56 41**  
**Correo Electrónico: [notaria6debgta@etb.net.co](mailto:notaria6debgta@etb.net.co)**



**ESCRITURA PUBLICA NUMERO** 3.870 - - - -  
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA - - - - -  
**DE FECHA:** JULIO VEINTISEIS (26) - - - - -  
DE DOS MIL DIEZ (2010) - - - - -  
**OTORGADA EN LA NOTARIA SEXTA (6ª.) DEL**  
**CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTÁ, D.C.** - - - - -

**ACTO: PODER** - - - - -

**PODERDANTE: CAVELIER ABOGADOS** Nit. 860.041.367-3

**APODERADOS:** - - - - -

**LUZ CLEMENCIA DE PAEZ** C.C. 35.456.344

**NIDIA OSORIO LOPEZ** C.C. 39.787.682

**OSCAR FERNANDO CORREA BARBOSA** C.C. 79.524.634

**EDNA DARMELY SARMIENTO CHARRY** C.C. 52.006.265

**JORGE CHAVARRO ARISTIZABAL** C.C. 16.209.380

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, ante mí **AMPARO**  
**QUINTERO ARTURO** - Notaria(o) Sexta(o) (6) - - - - - de este Círculo  
Notarial, se otorgó la escritura pública que se consigna en los siguientes  
términos: - - - - -

Compareció: con minuta escrita la señora **ADRIANA ZAPATA GIRALDO**, mayor  
de edad, vecina de esta ciudad, casada, identificada con la cédula de ciudadanía  
No. 51.680.061 de Bogotá, y dijo: - - - - -

- - - - - **ESTIPULACIONES** - - - - -

**PRIMERA:** Que obra en su calidad de Representante Legal de la sociedad  
denominada **CAVELIER ABOGADOS** domiciliada en la Carrera 4 No. 72-35,  
Bogotá, Colombia. - - - - -

**SEGUNDA:** Que **SANOFI-AVENTIS**, sociedad constituida y existente bajo las  
leyes de Francia, domiciliada en 174 Avenue de France, 75013 Paris, Francia,  
designó a **CAVELIER ABOGADOS** como su representante para la Propiedad  
Industrial en Colombia con facultades de nombrar apoderados tal como consta en  
la copia auténtica del documento de representación que se protocoliza. - - - - -

**TERCERA:** Que en su carácter de representante legal de **CAVELIER**  
**ABOGADOS**, y en desarrollo de la facultad otorgada por **SANOFI-AVENTIS**,  
confiere poder a los abogados **LUZ CLEMENCIA DE PAEZ**, T.P.A. No. 23.555,  
identificada con cédula de ciudadanía número **35.456.344** de Usaquen, **NIDIA**



**OSORIO LOPEZ**, T.P.A. No.73.366, identificada con cédula de ciudadanía número **39.787.682** de Bogotá, **OSCAR FERNANDO CORREA BARBOSA**, T.P.A. No. 71.027 identificado con cédula de ciudadanía número **79.524.634** de Bogotá, **EDNA DARMELY SARMIENTO CHARRY**, T.P.A. 65.794 identificada con cédula de ciudadanía número **52.006.265** de Bogotá y **JORGE CHAVARRO ARISTIZABAL**, T.P.A. No. 40.119, identificado con cédula de ciudadanía número **16.209.380** de Cartago (Valle), mayores de edad, vecinos de Bogotá, para que representen a la sociedad a cuyo nombre actúa, ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, incluyendo las del orden administrativo, contencioso administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos: -----

a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, trazado de circuitos integrados, secretos industriales; el registro de marcas de fábrica, colectivas, defensivas, de servicio, lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas, variedades vegetales, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria; y el registro de licencias de uso de esos derechos -----

b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor, oposiciones, cancelación administrativa o judicial, nulidad, medidas cautelares, acción por infracción, concesión de licencias, la protección de secretos industriales y de nombres de dominio junto con su administración y pago; acciones populares, de tutela y de cumplimiento; y en general los procesos civiles, penales, administrativos o contencioso administrativos, de conciliación, arbitramento, tutela relacionados con estos derechos; acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan. -----

**CUARTO:** Que los apoderados designados están facultados en todos los asuntos arriba determinados para sustituir este mandato, transigir, conciliar, arbitrar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar y ratificar los actos de agentes oficiosos. -----

**QUINTO:** Que protocoliza con la presente escritura, un certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que acredita la constitución y personería de la sociedad **CAVELIER ABOGADOS**, igualmente protocoliza copia autenticada del documento de representación otorgado el día **28 de Mayo de 2010** por **SANOFI-**



\*01\*



\* 9 4 7 1 9 8 3 7 \*

6

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

12 DE JULIO DE 2010 HORA 16:09:43

R028844095

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

CERTIFICA:

NOMBRE : CAVELIER ABOGADOS  
N.I.T. : 860041367-3  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

NO: 00820237

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0006233 DE NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1974 , INSCRITA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1974 BAJO EL NUMERO 00021234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA: CAVELIER PERDOMO Y CAVELIER.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001000 DE NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE MARZO DE 1983 , INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 1983 BAJO EL NUMERO 00130769 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : CAVELIER PERDOMO Y CAVELIER. POR EL DE : CAVELIER ABOGADOS

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1.000 OTORGADA EN LA NOTARIA 6A. DE BOGOTA EL 10 DE MARZO DE 1.983, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 1.983 BAJO EL NUMERO 130769 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CAVELIER PERDOMO Y CAVELIER, POR EL DE: CAVELIER ABOGADOS, E INTRODUJO OTRAS REFORMAS.

CERTIFICA:

CERTIFICA

QUE POR E.P.NO. 2.034 DE LA NOTARIA 6 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE 1.995, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 1.995 BAJO EL NO. 5.937 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. AL MUNICIPIO DE TABIO ( CUNDINAMARCA )..

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 7710 DE LA NOTARIA SEXTA DE BOGOTA DEL 10 DE OCTUBRE DE 1984, INSCRITA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1984 BAJO EL NO. 1559 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NATURALEZA JURIDICA DE SOCIEDAD COMERCIAL A SOCIEDAD CIVIL.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.

FECHA

NOTARIA

INSCRIPCION

842

10-V-1.977

18. BTA.

27-V-1.977-NO. 46.204

3.430

1-VII-1.980

6A. BTA.

3-IX-1.980-NO. 89.582

4.844

10-IX-1.980

6A. BTA.

8-X-1.980-NO. 91.261

432

10-II-1.983

6A. BTA.

1-III-1.983-NO. 129.337  
COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA

26 JUL. 2010

ARTURO QUINTERO  
NOTARIA



|             |               |                 |                   |         |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------|
| 7.710       | 10-X-1.984    | 6A. BTA.        | 15-XI-1.984-NO.   | 1.559   |
| 7.305       | 21-X-1.985    | 6A. BTA.        | 18-XI-1.985-NO.   | 1.906   |
| 2.567       | 29-IV-1.987   | 6A. BTA.        | 7-V- 1.987-NO.    | 2.386   |
| 4.278       | 3-VII-1.987   | 6A. BTA.        | 23-VII-1987 NO.   | 215.652 |
| 2.657       | 25- IV-1.988  | 6A. BTA.        | 19- V -1988-NO.   | 2,740   |
| 9.033       | 21-XII-1.990  | 6A. BTA.        | 10- I - 1991-NO.  | 3.786   |
| 25          | 3- I -1.991   | 6A. BTA.        | 10- I - 1991-NO.  | 3.787   |
| 1.608       | 8-III-1.991   | 6A. BTA.        | 14-III- 1991-NO.  | 3.841   |
| 2.155       | 2-IV- 1.991   | 6A. BTA.        | 8-IV - 1991-NO.   | 3.862   |
| 797         | 7-II -1.991   | 6A. BTA.        | 7- V -1991-NO.    | 3.882   |
| 1.739       | 14-III-1.991  | 6A. BTA.        | 7- V -1991-NO.    | 3.881   |
| 5.886       | 21-VIII-1.991 | 6A. BTA.        | 27-VIII-1991 NO.  | 4.019   |
| 8.596       | 4-XII -1.991  | 6A. BTA.        | 16-III -1992 NO.  | 4.430   |
| 1.494       | 10-III -1.992 | 6A. BTA.        | 19-III -1992 NO.  | 4.436   |
| 4.205       | 8 -VII -1.992 | 6A. BTA.        | 15-VII -1992 NO.  | 4.554   |
| 8.829       | 16-XII -1.992 | 6A. BTA.        | 24-XII -1992 NO.  | 4.819   |
| 12          | 5-I -1.993    | 6 STAFE BTA     | 13-I -1993 NO.    | 4.850   |
| 4.877       | 29-VI -1.993  | 6 STAFE BTA     | 7-VII -1993 NO.   | 5.065   |
| 5.216       | 12-VII -1.993 | 6 STAFE BTA     | 16-VII -1993 NO.  | 5.077   |
| ACTA NO. 71 | 2-IX- 1.993   | JUNTA DE SOCIOS | 29-IX- 1993 NO.   | 5.174   |
| 2.034       | 18-IV- 1.995  | 6 STAFE BTA     | 27- IV -1995 NO.  | 5.937   |
| 2.227       | 25-IV-1.995   | 6 STAFE BTA     | 18-VIII-1.995 NO. | 6.092   |
| 7.594       | 12-XII-1.995  | 6 STAFE BTA     | 19- XII-1.995 NO. | 6.294   |
| 676         | 11- II-1.997  | 6 STAFE BTA     | 14- II -1.997 NO. | 6.873   |

CERTIFICA:

REFORMAS:

| E.P. NO. | FECHA      | NOTARIA | CIUDAD      | FECHA      | NO. INSC. |
|----------|------------|---------|-------------|------------|-----------|
| 0004506  | 1997/07/28 | 0006    | BOGOTA D.C. | 1997/09/02 | 00007115  |
| 0002103  | 1998/04/08 | 0006    | BOGOTA D.C. | 1998/04/21 | 00007426  |
| 0005326  | 1998/08/06 | 0006    | BOGOTA D.C. | 1998/08/13 | 00007544  |
| 0005538  | 1998/08/14 | 0006    | BOGOTA D.C. | 1998/08/27 | 00007564  |
| 0007760  | 1998/11/10 | 0006    | BOGOTA D.C. | 1998/11/12 | 00007644  |
| 0006709  | 1997/11/04 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2000/12/04 | 00008481  |
| 0003034  | 2003/05/30 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2003/06/04 | 00882729  |
| 0003786  | 2004/07/16 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2004/07/28 | 00009703  |
| 0001432  | 2005/03/18 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2005/04/07 | 00009917  |
| 0004818  | 2005/08/22 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2005/08/26 | 00010008  |
| 0005506  | 2007/07/17 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2007/07/24 | 00010841  |
| 5453     | 2009/10/19 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2009/10/21 | 00012243  |
| 1336     | 2010/03/16 | 0006    | BOGOTA D.C. | 2010/03/24 | 00012506  |

CERTIFICA:


VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 .


CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO : EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE ABOGADOS. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, CONTRAER OBLIGACIONES Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS Y SUBORDINADOS AL MISMO, INCLUSIVE LOS DE ARRENDAMIENTO, HIPOTECA, MUTUO CON O SIN INTERES, MANDATO CIVIL Y COMERCIAL, Y SOCIEDAD, ASI COMO PARTICIPAR EN ASOCIACIONES CIENTIFICAS, GREMIALES O PROFESIONALES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$10,000.00 DIVIDIDO EN 10,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :  
- SOCIO CAPITALISTA (S)





\*01\*



\* 9 4 7 1 9 8 3 8 \*

7

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

12 DE JULIO DE 2010

HORA 16:09:43

R028844095

PAGINA: 2 de 3

\*\*\*\*\*

ASOCIACION CAVELIER DEL DERECHO

NO. CUOTAS: 8,800.00

N.I.T. 000008001722568

VALOR: \$8,800.00

GAUDEBERT DE CAVELIER AGNES JEANNE

NO. CUOTAS: 1,200.00

C.E. 000000000131100

VALOR: \$1,200.00

- SOCIO INDUSTRIAL (S)

SUAREZ DE PAEZ LUZ CLEMENCIA

NO. CUOTAS: 0.00

C.C. 000000035456344

VALOR: \$0.00

CHAVARRO JORGE

NO. CUOTAS: 0.00

C.C. 000000016209380

VALOR: \$0.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 10,000.00

VALOR: \$10,000.00

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURAS PUBLICAS NO. 001431 Y 001432 DEL 18 DE MARZO DE 2005 DE LA NOTARIA 06 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 07 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NO. 0009918 Y 0009917, RESPECTIVAMENTE DEL LIBRO XIII, DE LAS MIL DOSCIENTAS ( 1200 ) PARTES DE INTERES SOCIAL RADICADAS EN CABEZA DE AGNES GAUDEBERT DE CAVELIER, SEISCIENTAS (600) PARTES ESTAN GRAVADAS O AFECTADAS EN PROPIEDAD FIDUCIARIA A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS : GERMAN CAVELIER FRANCO, ERNESTO CAVELIER FRANCO, JORGE CAVELIER FRANCO, INES CAVELIER FRANCO, GUILLERMO CAVELIER FRANCO, ELENA CAVELIER FRANCO, ALEJANDRO CAVELIER FRANCO, BEATRIZ CAVELIER FRANCO, Y LUCIA CAVELIER FRANCO,

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL DIRECTOR. EL SOCIO FUNDADOR GERMAN CAVELIER GAVIRIA TENDRA EL CARACTER DE PRESIDENTE DIRECTOR VITALICIO, PARTICIPARA POR DERECHO PROPIO EN EL CONSEJO SUPERIOR Y EN EL CONSEJO DIRECTIVO Y LLEVARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD CUANDO LO ESTIME PERTINENTE SIN LIMITACION ALGUNA. IGUAL PARTICIPACION Y ATRIBUCIONES TENDRA SU SUPLENTE AGNES GAUDEBERT DE CAVELIER CUANDO OCUPE EL CARGO, EN CASO DE FALTA ABSOLUTA DE GERMAN CAVELIER GAVIRIA. LOS SOCIOS COLECTIVOS ESTÁN AUTORIZADOS PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER TIEMPO, SIN PERJUICIO DE LAS DELEGACIONES CONFERIDAS A LOS ORGANOS CREADOS POR LOS PRESENTES ESTATUTOS

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004818 DE NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE AGOSTO DE 2005, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00010008 DEL LIBRO XIII, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE


IDENTIFICACION

PRESIDENTE DIRECTOR VITALICIO

CAVELIER GAVIRIA GERMAN

C.C. 000000002877924

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 13 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 24 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00012618 DEL LIBRO XIII,



FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                             | IDENTIFICACION         |
|------------------------------------|------------------------|
| DIRECTORA                          |                        |
| ZAPATA GIRALDO ADRIANA             | C.C. 000000051680061   |
| REPRESENTANTE LEGAL                |                        |
| ASOCIACION CAVELIER DEL DERECHO    | N.I.T. 000008001722568 |
| REPRESENTANTE LEGAL                |                        |
| GALLON GIRALDO CARLOS              | C.C. 000000019066425   |
| REPRESENTANTE LEGAL                |                        |
| GAUDEBERT DE CAVELIER AGNES JEANNE | C.E. 000000000131100   |
| SOCIO COLECTIVO                    |                        |
| GAUDEBERT DE CAVELIER AGNES JEANNE | C.E. 000000000131100   |
| SOCIO COLECTIVO                    |                        |
| ASOCIACION CAVELIER DEL DERECHO    | N.I.T. 000008001722568 |

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004818 DE NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE AGOSTO DE 2005, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00010008 DEL LIBRO XIII, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                                     | IDENTIFICACION       |
|--------------------------------------------|----------------------|
| SUPLENTE DEL PRESIDENTE DIRECTOR VITALICIO |                      |
| GAUDEBERT DE CAVELIER AGNES JEANNE         | C.E. 000000000131100 |

CERTIFICA:

QUE EL NOMBRAMIENTO DE GALLÓN GIRALDO CARLOS INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00012618 DEL LIBRO XIII, SE DA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO.

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: APARTE DE LAS FACULTADES Y DEBERES QUE DE TIEMPO EN TIEMPO SE LE ASIGNEN POR EL CONSEJO SUPERIOR, EL DIRECTOR TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A) LA DE REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE CUALQUIER ORDEN O NATURALEZA Y ANTE OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, CON FACULTADES PARA NOVAR, TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR Y PARA COMPARECER EN JUICIOS INCLUSIVE EN AQUELLOS EN DONDE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES; B) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD; Y C ) CREAR O SUPRIMIR TODOS LOS EMPLEOS QUE SEAN NECESARIOS DE ACUERDO CON EL CONSEJO SUPERIOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, ASIGNARLES FUNCIONES, FIJAR SUS SALARIOS Y NOMBRAR LAS PERSONAS QUE DEBAN DESEMPEÑARLOS, ASI COMO RETIRARLOS Y REEMPLAZARLOS CUANDO HAYA LUGAR. CUANDO CUALQUIERA DE LOS ACTOS INDICADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR SE REFIERA A OPERACIONES CUYO MONTO EXCEDA DE LA SUMA EQUIVALENTE A CIENTO OCHENTA ( 180 ) SALARIOS MINIMOS MENSUALES, SU CELEBRACION REQUERIRA LA APROBACION PREVIA DEL CONSEJO SUPERIOR.

CERTIFICA:


\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000071 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1993, INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993 BAJO EL NUMERO 00005175 DEL LIBRO XIII, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                        | IDENTIFICACION       |
|-------------------------------|----------------------|
| REVISOR FISCAL                |                      |
| RINCON FANDIÑO MIGUEL ALFONSO | C.C. 000000002877024 |

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.





\*01\*



\* 9 4 7 1 9 8 3 9 \*

8

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

12 DE JULIO DE 2010

HORA 16:09:43

R028844095

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*


SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,600

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

*Esteban Q*




\* \* \*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

\* \* \*



4



Sanchez  
nylo  
co  
oco  
9

REPRESENTACION

REPRÉSENTATION

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/Je (nous) soussigné(s)  
SANOFI-AVENTIS

domiciliado (s)  
domicilié(s) à 174 Avenue de France, 75013 PARIS, FRANCE

Por el presente nombramos a CAVELIER ABOGADOS, sociedad colectiva constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, mediante Escritura Pública No. 6233 del 10 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, domiciliada en Bogotá D.C., con matrícula mercantil No. 00820237 y NIT 860041367-3, domiciliada en la Carrera 4a N° 72-35, Bogotá, Colombia, como nuestra representante en todos los asuntos de Propiedad Industrial, con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales.


CAVELIER ABOGADOS también podrá representarnos, con las mismas facultades arriba indicadas, ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, autoridades administrativas o jurisdiccionales, tribunales de arbitramento, en asuntos de naturaleza civil, comercial, penal, constitucional, competencia, competencia desleal, administrativa, contencioso administrativa, protección del consumidor, variedades vegetales, nombres de dominio, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, acciones de tutela, la protección de secretos industriales, derecho regulatorio y en general para que nos represente en cualesquiera acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan.

La representante podrá, en nuestro nombre, designar apoderados para actuar ante autoridades administrativas y judiciales, por vía extrajudicial y

Par le présent instrument, procède (procédons) à la désignation de CAVELIER ABOGADOS, une société collective constituée conformément aux lois de la République de Colombie selon l'acte No. 6233 déposé le 10 septembre 1974 au rang des minutes à l'étude de notaire six de l'arrondissement notarial de Bogota, sise à Bogota D.C., titulaire de l'immatriculation commerciale No. 00820237 et du matricule fiscal 860041367-3, sise Carrera 4 No. 72 - 35, Bogota, Colombie, comme notre représentant pour toutes les affaires de Propriété Industrielle, ayant la faculté de recevoir des notifications et de nommer les fonds des pouvoirs judiciaires ou extrajudiciaires.

CAVELIER ABOGADOS pourra également nous représenter, avec les mêmes facultés ci-dessus indiquées, devant toute entité ou toute personne, ayant ou non juridiction, toute administration ou toute autorité juridictionnelle, tout tribunal d'arbitrage, dans des affaires de nature civile, commerciale, pénale, constitutionnelle, de concurrence, de concurrence déloyale, administrative, contentieuse-administrative, de protection du consommateur, de variétés végétales, de noms de domaine, d'oppositions ou d'observations, de radiations administratives et judiciaires, de nullité, de mesures conservatoires, de concession de licences, d'actions de protection juridique des droits constitutionnels, de protection de secrets industriels, de droit réglementaire et en général pour qu'il me(nous) représente dans toutes les actions ou dans tous les procès que nous pourrions être engagés contre nous.

Le représentant pourra désigner des fondés de pouvoir pour agir devant les autorités administratives et judiciales, par voie extrajudiciaire et





COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA  
D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE  
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA  
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA

26 JUL. 2010

ARTURO QUINTERO ARTURO  
NOTARIA

Handwritten notes in the bottom left corner, including the number '22' and some illegible scribbles.

demandantes, como demandados, como litisconsortes, como agentes oficiosos, como terceros, por llamamiento en garantía o como intervinientes ad excludendum. Dentro de esta autorización, la representante podrá facultar a los apoderados que ella designe para transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar y sustituir el poder que se le otorgue. Así mismo, la representante tendrá la facultad para revocar el poder así otorgado en el momento que considere pertinente. La representante en todo caso podrá ratificar los actos de agentes oficiosos.


90  
demandeurs, défendeurs, cointéressés, agents officieux, tiers, pour appel en garantie ou comme intervenants ad excludendum. Dans le cadre de cette autorisation, le représentant pourra autoriser les fondés de pouvoir qu'il désignera à transiger, concilier, admettre les faits du procès, désister, radier, recevoir, renoncer et substituer le pouvoir qui lui sera octroyé. De même, le représentant aura la faculté de révoquer le pouvoir ainsi octroyé au moment où il jugera opportun. Le représentant pourra en tout cas ratifier les actes d'agents officieux.

Dado y firmado hoy/Fait et signé  
aujourd'hui le  
en/à Paris

28 Mai 2010

por/par



Firma/Signature

  
Josiane MERLIER  
Directeur, Administration Brevets

Je soussigné Me **Hervé POMMERY**  
Notaire à Paris, certifie matériellement  
la signature de **Mme Josiane MERLIER**.

apposée sur le présent document.  
Cette certification ne comporte aucune  
vérification de l'exactitude des faits et  
actes mentionnés dans le présent document





(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Le présent acte, public

3. agissant en qualité de... **Notaire**

| Age Group | 18-29 | 30-49 | 50-69 | 70+ |
|-----------|-------|-------|-------|-----|
| 18-29     | 85    | 75    | 65    | 55  |
| 30-49     | 80    | 70    | 60    | 50  |
| 50-69     | 75    | 65    | 55    | 45  |
| 70+       | 70    | 60    | 50    | 40  |


## 5. à Paris

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

9. Sceau : ~~JEAN MARTIN~~

**Jeon MARTIN**  
...Avocat.général

*"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"*



1

TRADUCCION OFICIAL NO. 517/2010

EL TEXTO QUE SIGUE ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN FRANCES; LLEVA SELLO Y FIRMA DE HELENA URIBE DE LEMOINE, TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL, SEGÚN RESOLUCION No. 3618 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA EL 6 DE SEPT. DE 1972.

TRADUCCIÓN DE LOS SELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN OTORGADO POR **SANOFI-AVENTIS**, DOMICILIADA EN 174 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS, FRANCE, A **CAVELIER ABOGADOS**



DADO Y FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2010 /

POR: **JOSIANE MERLIER**, DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE PATENTES

EL SUSCRITO ABOGADO **HERVE POMMERY**, NOTARIO DE PARIS, CERTIFICA MATERIALMENTE LA FIRMA DE LA SEÑORA **JOSIANE MERLIER**, PUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. ESTA CERTIFICACIÓN NO CONLLEVA NINGUNA VERIFICACIÓN ACERCA DE LA EXACTITUD DE LOS HECHOS Y ACTOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

FIRMADO: **HERVE POMMERY**, NOTARIO ASOCIADO DE PARIS.

HAY SELLO DEL NOTARIO.



ESPACIO

EN

BLANCO

**APOSTILLA**

CONVENIO DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961 /

1. PAÍS: REPÚBLICA FRANCESA

**EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO**

- 2. HA SIDO FIRMADO POR: **EL ABOGADO HERVE POMMERY**
- 3. ACTUANDO EN SU CAPACIDAD DE: NOTARIO
- 4. LLEVA EL SELLO DE: SU DESPACHO

**CERTIFICADO**


- 5. EN: PARÍS
- 6. EL: 8 DE JUNIO DE 2010
- 7. POR: EL PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE DE APELACIONES DE PARIS
- 8. BAJO EL NO: **40356**
- 9. SELLO: CORTE DE APELACIONES DE PARIS
- 10. FIRMADO: JEAN MARTIN, ABOGADO GENERAL

La Apostilla confirma únicamente la autenticidad de la firma, del sello o de la estampilla del documento. No implica que el contenido del documento sea verdadero ni que la República Francesa apruebe su contenido.

LA TRADUCTORA OFICIAL

*Helena Uribe de Lemoine*

HELENA URIBE DE LEMOINE




REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

025547  
Helena Uribe  
CUYA FIRMADA COINCIDE EN EL  
DOCUMENTO DESEMPENA  
AS FUNCIONES INDICADAS

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

2010 JUL 27 P 1:00

JEFE DE LEGACIONES  
BOGOTA D.C.



000 13



**ATTESTATION NOTARIEE**  
Je soussigné, Maître Hervé POMMERY,  
notaire :  
**CERTIFIE :**

Que la signature qui précède de  
**Mme Josiane MERLIER** est  
authentique

Que la signataire exerce actuellement la  
fonction de

**Directeur, Administration Brevets**  
de la société

**SANOFI AVENTIS**

Société légalement constituée et existant  
selon les lois de France

Domiciliée à

**174 Avenue de France**  
**75013 PARIS, (France)**

Et que la signataire est dûment autorisée à  
concéder le présent document.

Fait et signé à **PARIS**

Le **7 juin 2010**

Signature : **Hervé POMMERY**  
NOTAIRE

**CERTIFICACIÓN NOTARIAL**

El infrascrito, Maître Hervé POMMERY,  
Notario :

**CERTIFICA :**

Que la Firma que antecede de  
**Sra. Josiane MERLIER** es auténtica

Que el signatario desempeña actualmente  
el cargo de

**Directeur, Administration Brevets**  
de la compañía

**SANOFI AVENTIS**

Sociedad que actualmente existe y está  
organizada de acuerdo a las leyes de  
**FRANCIA**

Que la dirección de dicha compañía es


**174 Avenue de France**  
**75013 PARIS, (Francia)**


Y que el signatario tiene facultad para  
otorgar este documento.

Dado y firmado en **PARIS**

El **7 junio de 2010**

Firma : **Hervé POMMERY**  
NOTAIRE





## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Le présent acte public

2. a été signé par. M<sup>r</sup> POMMERY

3. agissant en qualité de. Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de. Son étude

Attesté

5. à Paris

08 JUIN 2010

6. le.....


7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° 40355 Hanpe

9. Sceau : Jean MARTIN

AVOCAT GÉNÉRAL

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"



**AUTENTICACION NOTARIAL (SOCIEDAD)**

EL INFRASCRITO ABOGADO HERVE POMMERY, NOTARIO:, CERTIFICA QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE LA SEÑORA JOSIANE MERLIER ES AUTENTICA; QUE EL SIGNATARIO DESEMPEÑA ACTULAMETNE EL CARGO DE **DIRECTOR, ADMINISTRACIÓN DE PATENTES**, DE LA SOCIEDAD **SANOFI AVENTIS**, SOCIEDAD QUE ACTUALMENTE EXISTE Y ESTA ORGANIZADA DE ACUERDO A LAS LEYES DE FRANCIA, QUE LA DIRECCION DE DICHA COMPAÑIA ES 174 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS, (FRANCIA) Y QUE EL SIGNATARIO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR ESTE DOCUMENTO.



DADO Y FIRMADO: EN PARIS EL 7 DE JUNIO DE 2010

FIRMADO: HERVE POMMERY, NOTARIO DE PARIS

HAY SELLO DEL NOTARIO

-----

*Handwritten signature*



ESPACIO

EN

BLANCO

## APOSTILLA

CONVENIO DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961

2. PAÍS: REPÚBLICA FRANCESA

### EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO

2. HA SIDO FIRMADO POR: **EL ABOGADO HERVE POMMERY**

3. ACTUANDO EN SU CAPACIDAD DE: NOTARIO

4. LLEVA EL SELLO DE: SU DESPACHO

### CERTIFICADO

5. EN: PARÍS

6. EL: 8 DE JUNIO DE 2010

7. POR: EL PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE DE APELACIONES  
DE PARIS

8. BAJO EL NO: **40355**

9. SELLO: CORTE DE APELACIONES DE PARIS


10. FIRMADO: JEAN MARTIN, ABOGADO GENERAL

La Apostilla confirma únicamente la autenticidad de la firma, del sello o de la estampilla del documento. No implica que el contenido del documento sea verdadero ni que la República Francesa apruebe su contenido.

LA TRADUCTORA OFICIAL

*Helena Uribe de Lemoine*

HELENA URIBE DE LEMOINE



MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

2010 JUL 26 P 1:00

JEFE DE LEGALIZACIONES  
BOGOTA D.C.

COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA  
D.C., HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE  
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA  
BOGOTA D.C., REPUBLICA DE COLOMBIA

26 JUL. 2010

ARTURO QUINTERO ARTURO  
NOTARIA

025549  
Helena Uribe  
CUYA FIRMA APARECE EN EL  
DOCUMENTO DESEMPENA  
AS FUNCIONES INDICADAS

7 700044 125990

3



AVENTIS, documento que está debidamente legalizado. --  
Presente la señora **ADRIANA ZAPATA GIRALDO**  
domiciliada en Bogotá, identificada como aparece al pie de  
su firma y manifestó que está conforme con el contenido  
de esta escritura pública. -----

----- **HASTA AQUI LAS DECLARACIONES DEL INTERESADO** -----

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.** Leído, el presente instrumento público por  
el otorgante, dio su asentimiento y en prueba de ello lo firma junto con la suscrita  
Notaria quien en esta forma lo autoriza. -----

**DERECHOS NOTARIALES:** \$ 42.860.00 -----

**IVA:** \$ 14.732.00 -----

**RECAUDO SUPERINTENDENCIA:** \$3.570.00 -----

**RECAUDO FONDO NACIONAL DE NOTARIADO:** \$3.570.00 -----

**RESOLUCIÓN 10301 DE DICIEMBRE 17 DE 2009** -----

**PAPEL NOTARIAL:** El presente instrumento público se extendió y firmó en las  
hojas de papel notarial números: 7-700044-126454 7-700044-125990

**EN BLANCO... EN BLANCO**

  
**ADRIANA ZAPATA GIRALDO**

C.C. 51680061

TEL. 2112348

Representante Legal de **CAVELIER ABOGADOS**



**AMPARO QUINTERO**  
**NOTARIA(O) SEXTA(O) (6) DE BOGOTÁ, D.C.**

T. CAVELIER.Angelica.PE



ES FIEL Y NOVENA COPIA (FOTOCOPIA) TOMADA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3870 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2006.

COPIA QUE EXPIDO EN 12 HOJAS RUBRICADAS EN SUS MARGENES, LA CUAL CARECE DE NOTAS DE REVOCATORIA, MODIFICACION O SUSTITUCION, POR TANTO SE PRESUME VIGENTE EL PODER EN ELLA CONTENIDO.

BOGOTA, D.C. SEPTIEMBRE 08 DE 2010


RESOLUCION 01 DE 2008

LA NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C.





SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-116608-00000-0000

Fecha: 2010-09-21 12:45:47  
Tra. 11 PATENTEIYII  
Act. 411 PRESENTACION

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Eve: 378 FASENACIONALI  
Folios: 210

5

PATENTE DE INVENCION ☐

MODELO DE UTILIDAD ☐

Art 33 Decisión 486/00

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita una patente.                                             |
| <input type="checkbox"/>          | Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud   |
| <input type="checkbox"/>          | Descripción de la invención                                                         |
| <input type="checkbox"/>          | Dibujos de ser estos pertinentes                                                    |
| <input type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento) |
| Completa <input type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                                 |

PATENTE DE INVENCION PCT ☒

MODELO DE UTILIDAD PCT ☐

Art.33 Decisión 486/00, Circular Única

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita una PCT                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>          | Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada inicialmente (capítulo descriptivo, reivindicatorio, resumen) |
| <input checked="" type="checkbox"/>          | Dibujos de ser estos pertinentes                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)                                     |
| Completa <input checked="" type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                                                                     |

DISEÑO INDUSTRIAL ☐

(Art. 119 Decisión 486/00)

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita Diseño industrial                                                              |
| <input type="checkbox"/>          | Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud                         |
| <input type="checkbox"/>          | Representación gráfica y fotográfica del Diseño industrial o muestra del material que incorpora el diseño |
| <input type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas                                                             |
| Completa <input type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                                                       |

ESQUEMA DE TRAZADO ☐

(Art. 92 Decisión 486/00)

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>          | Indicación que se solicita un esquema de trazado                                  |
| <input type="checkbox"/>          | Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud |
| <input type="checkbox"/>          | Representación gráfica de un esquema de trazado                                   |
| <input type="checkbox"/>          | Comprobante de pago de las tasas establecidas                                     |
| Completa <input type="checkbox"/> | Incompleta <input type="checkbox"/>                                               |

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
3 décembre 2009 (03.12.2009)

PCT

(10) Numéro de publication internationale

WO 2009/144395 A1

(51) Classification internationale des brevets :  
C07D 471/04 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01)  
C07D 213/28 (2006.01) A61P 19/00 (2006.01)  
C07D 233/56 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)  
A61K 31/437 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2009/000303

(22) Date de dépôt international :  
20 mars 2009 (20.03.2009)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
0801584 21 mars 2008 (21.03.2008) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :  
SANOFI-AVENTIS [FR/FR]; 174 avenue de France,  
F-75013 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :  
ALMARIO GARCIA, Antonio [FR/FR]; c/o Sanofi-  
aventis, Département Brevets, 174 avenue de France,  
F-75013 Paris (FR). DE PERETTI, Danielle [FR/FR]; c/  
o Sanofi-aventis, Département Brevets, 174 avenue de  
France, F-75013 Paris (FR). EVANNO, Yannick  
[FR/FR]; c/o Sanofi-aventis, Département Brevets, 174  
avenue de France, F-75013 Paris (FR). LARDENOIS,

Patrick [FR/FR]; c/o Sanofi-aventis, Département  
Brevets, 174 avenue de France, F-75013 Paris (FR).  
MACHNIK, David [FR/FR]; c/o Sanofi-aventis,  
Département Brevets, 174 avenue de France, F-75013  
Paris (FR). RAKOTOARISOA, Nathalie [FR/FR]; c/o  
Sanofi-aventis, Département Brevets, 174 avenue de  
France, F-75013 Paris (FR).

(74) Mandataire : MOREL-PECHEUX, Muriel; Sanofi-  
aventis, Département Brevets, 174 avenue de France,  
F-75013 Paris (FR).


(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre  
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,  
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,  
CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ,  
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR,  
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,  
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,  
NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,  
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre  
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,  
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,  
TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,  
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : POLYSUBSTITUTED DERIVATIVES OF 2-HETEROARYL-6-PHENYL-IMIDAZO[L,2- A] PYRIDINES, AND PREPARATION AND THERAPEUTIC USE THEREOF

(54) Titre : DÉRIVÉS POLYSUBSTITUÉS DE 2-HETEROARYL-6-PHENYL-IMIDAZO[1,2- α]PYRIDINES, LEUR PRÉPARATION ET LEUR APPLICATION EN THÉRAPEUTIQUE



(57) Abstract : Compounds of Formula (I): (I) wherein R<sub>1</sub> is a heteroaryl or heterocyclic group, optionally substituted for one or a plurality of atoms or groups; X is 1 to 4 substituents, identical to or different from each other and selected from hydrogen, halogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkoxy, NRaRb, nitro, or cyano, the (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl group capable of being optionally substituted for one or a plurality of groups selected from halogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)halogenoalkoxy, NRaRb, or hydroxyl; R, in positions 3, 5, 7, or 8 of Imidazo[1,2-α]pyridine, is 1 to 4 substituents, identical to or different from each other and selected from hydrogen, halogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl, or (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkoxy; R<sub>2</sub> and R<sub>3</sub>, independently of each other, represent a hydrogen atom or a (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl group optionally substituted for an Rf group, or an optionally substituted aryl group; R<sub>4</sub> is a hydrogen atom, a (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl group optionally substituted for an Rf group, or an aryl group optionally substituted as a base or salt having an acid added. The invention is used in therapy and in synthesis methods.

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]

WO 2009/144395 A1

WO 2009/144395 A1



MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des  
revendications, sera republiée si des modifications sont  
reçues (règle 48.2.h)).

Publiée :


— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

Composés de formule (I) dans laquelle : R<sub>1</sub> représente un groupe hétéroaryle ou hétérocyclique éventuellement être substitué par un ou plusieurs atomes ou groupes; X représente de 1 à 4 substituants identiques ou différents l'un de l'autre choisi parmi hydrogène, un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, nitro, cyano, le groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs groupes choisis parmi un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)halogénoalcoxy, NRaRb ou hydroxyle; R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine de 1 à 4 substituants identiques ou différents l'un de l'autre choisis parmi un hydrogène, un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy; R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe Rf, ou un groupe aryle, éventuellement substitué; R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe Rf; un groupe aryle, éventuellement substitué, à l'état de base ou de sel d'addition à un acide. Utilisation en thérapeutique et procédé de synthèse.

DÉRIVÉS POLYSUBSTITUÉS DE 2-HÉTÉROARYL-6-PHENYL-IMIDAZO[1,2-*a*]PYRIDINES, LEUR PRÉPARATION ET LEUR APPLICATION EN THÉRAPEUTIQUE

5 La présente invention se rapporte à des dérivés polysubstitués de 2-hétéroaryl-6-phényl-imidazo[1,2-*a*]pyridine, à leur préparation et à leur application en thérapeutique dans le traitement ou la prévention de maladies impliquant les récepteurs nucléaires Nurr-1, aussi appelés NR4A2, NOT, TINUR, RNR-1, et HZF3.

La présente invention a pour objet les composés de formule (I) :



dans laquelle :

R<sub>1</sub> représente :

un groupe hétéroaryle ou hétérocyclique, ce groupe pouvant éventuellement être substitué par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi les atomes ou groupes suivants :

15 halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, oxo, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)thioalkyle, -S(O)(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, -S(O)<sub>2</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, hydroxyle, cyano, nitro, hydroxy(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, NRaRb(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène-oxy, NRaRb, CONRaRb, SO<sub>2</sub>NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, NRcC(O)ORe, NRcSO<sub>2</sub>Re, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle ou hétéroaryle monocyclique, l'aryle ou l'hétéroaryle monocyclique étant éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, oxo, nitro, cyano ou OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle et R<sub>1</sub> est lié à l'imidazo[1,2-*a*]pyridine par un carbone aromatique;

20

X représente de 1 à 4 substituants identiques ou différents l'un de l'autre choisi parmi hydrogène, un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, nitro, cyano, le groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs groupes choisis parmi un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)haloalcoxy, NRaRb ou hydroxyle ;

30

R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine de 1 à 4 substituants

identiques ou différents l'un de l'autre choisis parmi un hydrogène, un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre,

- un atome d'hydrogène,
- 5 un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe R<sub>f</sub> ;
- un groupe aryle, éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro ou cyano ;

R<sub>2</sub> et X peuvent former ensemble avec les atomes de carbone qui les porte un cycle carboné de 5 à 7 atomes de carbone;

R<sub>4</sub> représente :

- un atome d'hydrogène,
- un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe R<sub>f</sub> ;
- un groupe aryle, éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis
- 15 parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro, cyano, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl(CO)-, CONRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, NRcC(O)ORe ou aryle, l'aryle étant éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi
- un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy,
- 20 halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro ou cyano ;

Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène ou aryle ;

ou Ra et Rb forment ensemble, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe azétidine, pyrrolidine, pipéridine, azépine, morpholine, thiomorpholine, pipérazine, homopipérazine, ce groupe étant éventuellement substitué par un groupe

25 (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryle ou aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène ;

Rc et Rd représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle,

ou Rc et Rd forment ensemble un groupe (C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>)alkylène ;

30 Re représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle,

ou Rc et Re forment ensemble un groupe (C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>)alkylène ;

R<sub>f</sub> représente un atome d'halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, hydroxyle, cyano, NRaRb, C(O)NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, NRcCOORe, SO<sub>2</sub>NRaRb, NRcSO<sub>2</sub>Re, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle, l'aryle étant

éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisi parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro, cyano ou OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle; à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

5

Les composés de formule (I) peuvent comporter un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques. Ils peuvent donc exister sous forme d'énantiomères ou de diastéréoisomères. Ces énantiomères, diastéréoisomères, ainsi que leurs mélanges, y compris les mélanges racémiques, font partie de l'invention.

10

Les composés de formule (I) peuvent exister à l'état de bases ou de sels d'addition à des acides. De tels sels d'addition font partie de l'invention.

Ces sels peuvent être préparés avec des acides pharmaceutiquement acceptables, mais les sels d'autres acides utiles, par exemple, pour la purification ou l'isolement des composés de formule (I) font également partie de l'invention.

15

Les composés de formule (I) peuvent également exister sous forme d'hydrates ou de solvats, à savoir sous forme d'associations ou de combinaisons avec une ou plusieurs molécules d'eau ou avec un solvant. De tels hydrates et solvats font également partie de l'invention.

Dans le cadre de la présente invention, on entend par :

20

- un groupe (C<sub>x</sub>-C<sub>t</sub>) : un groupe comprenant entre x et t atomes de carbone ;
- un atome d'halogène : un fluor, un chlore, un brome ou un iode ;
- un groupe alkyle : un groupe aliphatique saturé linéaire, ramifié ou cyclique, éventuellement substitué par un groupe alkyle saturé linéaire, ramifié ou cyclique. A titre d'exemples, on peut citer les groupes méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle, isobutyle, tertbutyle, cyclopropyle, cyclobutyl, cyclopentyle, cyclohexyle, méthylcyclopropyl, cyclopropylméthyl etc ;

25

- un groupe alkylène : un groupe alkyle divalent
- un groupe alcoxy : un radical -O-alkyle où le groupe alkyle est tel que précédemment défini ;

30

- un groupe haloalkyle : un groupe alkyle substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène identiques ou différents. A titre d'exemples, on peut citer les groupes CF<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>, CHF<sub>2</sub>, CCl<sub>3</sub>.
- un groupe haloalcoxy : un radical -O-alkyle où le groupe alkyle est tel que précédemment défini et substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène identiques ou

22

différents. A titre d'exemples, on peut citer les groupes  $\text{OCF}_3$ ,  $\text{OCHF}_2$ ,  $\text{OCCl}_3$ .

- un groupe thioalkyle : un radical S-alkyle où le groupe alkyle est tel que précédemment défini ;
- un groupe aryle : un groupe aromatique mono ou bicyclique comportant de 6 à 10 atomes. A titre d'exemples de groupes aryle, on peut citer les groupes phényle et naphthyle ;
- un groupe hétéroaryle : un groupe aromatique mono ou bicyclique comportant de 5 à 10 atomes dont de 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi N, O et S. A titre d'exemples de groupes hétéroaryles, on peut citer : pyrrole, furane, thiophène, pyrazole, imidazole, triazole, tétrazole, oxazole, isoxazole, oxadiazole, thiazole, isothiazole, thiadiazole, pyridine, pyrimidine, pyrazine, pyridazine, triazine, thiéno-thiophène, furo-furane, thiéno-furane, furo-pyrrole, thiéno-pyrrole, pyrrolo-pyrrole, pyrrolo-isoxazole, furo-isoxazole, thiéno-isoxazole, isoxazolo-isoxazole, pyrrolo-oxazole, furo-oxazole, thiéno-oxazole, oxazolo-isoxazole, oxazolo-oxazole, pyrrolo-isothiazole, furo-isothiazole, thiéno-isothiazole, isothiazolo-isoxazole, isothiazolo-oxazole, isothiazolo-isothiazole, pyrrolo-thiazole, furo-thiazole, thiéno-thiazole, thiazolo-oxazole, thiazolo-isoxazole, thiazolo-isothiazole, thiazolo-thiazole, pyrrolo-pyrazole, furo-pyrazole, thiéno-pyrazole, pyrazolo-isoxazole, pyrazolo-oxazole, pyrazolo-isothiazole, pyrazolo-thiazole, pyrazolo-pyrazole, pyrrolo-imidazole, furo-imidazole, thiéno-imidazole, imidazo-isoxazole, imidazo-oxazole, imidazo-isothiazole, imidazo-thiazole, imidazo-pyrazole, imidazo-imidazole, pyrrolo-oxadiazole, furo-oxadiazole, thiéno-oxadiazole, pyrazolo-oxadiazole, imidazo-oxadiazole, furo-thiadiazole, thiéno-thiadiazole, pyrrolo-thiadiazole, imidazo-thiadiazole, pyrazolo-thiadiazole, thiéno-triazole, pyrrolo-triazole, furo-triazole, oxazolo-triazole, isoxazolo-triazole, thiazolo-triazole, isothiazolo-triazole, pyrazolo-triazole, imidazo-triazole, indole, isoindole, benzimidazole, indazole, indolizine, benzofurane, isobenzofurane, benzothiophène, benzo[c]thiophène, pyrrolopyridine, imidazopyridine, pyrazolopyridine, triazolopyridine, tétrazolopyridine, pyrrolopyrimidine, imidazopyrimidine, pyrazolopyrimidine, triazolopyrimidine, pyrrolopyrazine, imidazopyrazine, pyrazolopyrazine, triazolopyrazine, pyrrolopyridazine, imidazopyridazine, pyrazolopyridazine, triazolopyridazine, pyrrolotriazine, imidazotriazine, pyrazolotriazine, furopyridine, fuopyrimidine, fuopyrazine, fuopyridazine, furotriazine, oxazolopyridine, oxazolopyrimidine, oxazolopyrazine, oxazolopyridazine, isoxazolopyridine, isoxazolopyrimidine, isoxazolopyrazine, isoxazolopyridazine, oxadiazolopyridine, benzoxazole,

- benzisoxazole, benzoxadiazole, thiénopyridine, thiénopyrimidine, thiénopyrazine, thiénopyridazine, thiénotriazine, thiazolopyridine, thiazolopyrimidine, thiazolopyrazine, thiazolopyridazine, isothiazolopyridine, isothiazolopyrimidine, isothiazolopyrazine, isothiazolopyridazine, thiadiazolopyridine, benzothiazole, benzoisothiazole, 5 benzothiadiaazole, benzotriazole, quinoléine, isoquinoléine, cinnoline, phthalazine, quinoxaline, quinazoline, naphthyridine, benzotriazine, pyridopyrimidine, pyridopyrazine, pyridopyridazine, pyridotriazine, pyrimidopyrimidine, pyrimidopyrazine, pyrimidopyridazine, pyrazinopyrazine, pyrazinopyridazine, pyridazinopyridazine.
- 10 - un groupe hétérocyclique : un groupe bicyclique de 9 à 10 atomes comportant de 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi N, O et S, dont un cycle est aromatique et l'autre cycle est saturé ou partiellement saturé, chacun des cycles ne comportant au maximum que 2 hétéroatomes. A titre d'exemples de groupes bicycliques, on peut citer : benzodioxole, benzoxathiole, benzopyrane, benzothiopyrane, benzoxazine, benzothiazine, 15 benzodioxine, benzothioxine, dioxolo-pyridine, oxathiolo-pyridine, pyrano-pyridine, thiopyrano-pyridine, oxazino-pyridine, thiazino-pyridine, dioxino-pyridine, thioxino-pyridine, dioxolo-pyrimidine, oxathiolo-pyrimidine, pyrano-pyrimidine, thiopyrano-pyrimidine, oxazino-pyrimidine, thiazino-pyrimidine, dioxino-pyrimidine, thioxino-pyrimidine, dioxolo-pyrazine, oxathiolo-pyrazine, pyrano-pyrazine, thiopyrano-pyrazine, 20 oxazino-pyrazine, thiazino-pyrazine, dioxino-pyrazine, thioxino-pyrazine, dioxolo-pyridazine, oxathiolo-pyridazine, pyrano-pyridazine, thiopyrano-pyridazine, oxazino-pyridazine, thiazino-pyridazine, dioxino-pyridazine, thioxino-pyridazine, indole, isoindole, benzimidazole, indazole, indolizine, benzofuran, isobenzofuran, benzothiophene, benzo[c]thiophene pyrrolopyridine, imidazopyridine, pyrazolopyridine, 25 pyrrolopyrimidine, imidazopyrimidine, pyrazolopyrimidine, pyrrolopyrazine, imidazopyrazine, pyrazolopyrazine, pyrrolopyridazine, imidazopyridazine, pyrazolopyridazine, furopyridine, fuopyrimidine, fuopyrazine, fuopyridazine, oxazolopyridine, oxazolopyrimidine, oxazolopyrazine, oxazolopyridazine, isoxazolopyridine, isoxazolopyrimidine, isoxazolopyrazine, isoxazolopyridazine, 30 benzoxazole, benzisoxazole, benzoxadiazole, thienopyridine, thienopyrimidine, thienopyrazine, thienopyridazine, thiazolopyridine, thiazolopyrimidine, thiazolopyrazine, thiazolopyridazine, isothiazolopyridine, isothiazolopyrimidine, isothiazolopyrazine, isothiazolopyridazine, benzothiazole, benzoisothiazole, quinoléine, isoquinoléine, cinnoline, phthalazine, quinoxaline, quinazoline, naphthyridine,

24

pyridopyrimidine, pyridopyrazine, pyridopyridazine, pyrimidopyrimidine, pyrimidopyrazine, pyrimidopyridazine, pyrazinopyrazine, pyrazinopyridazine, pyridazinopyridazine, l'un des cycles de ces groupes bicycliques étant sous forme saturée ou partiellement saturée, par exemple dihydrobenzofurane, tétrahydroquinoléine, dihydrobenzoxazole, benzodioxole.

- un carbone aromatique : un carbone qui est inclus dans un cycle aromatique
- les atomes de soufre et d'azote peuvent être à l'état oxydé (N-oxide, sulfoxide, sulfone)

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un premier groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle, dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, oxo, NRaRb ; (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, aryle, CONRaRb ;

Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

les autres substituants étant définis tels que précédemment.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un deuxième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuryle, dihydrobenzofuryle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, méthyle, oxo, NRaRb; méthoxy, éthoxy, phényle, isopentyle, CONHC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> ;

Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;

25

les autres substituants étant définis tels que précédemment.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un troisième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

- 5 X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou d'halogène ;  
les autres substituants étant définis tels que précédemment.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un quatrième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

- 10 X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou de fluor ;  
les autres substituants étant définis tels que précédemment.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un cinquième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

- 15 R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;  
les autres substituants étant définis tels que précédemment.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un sixième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

- 20 R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou un groupe méthyle ;  
les autres substituants étant définis tels que précédemment.

- 25 Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un septième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;  
les autres substituants étant définis tels que précédemment.

30

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un huitième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;

26

les autres substituants étant définis tels que précédemment.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un neuvième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

- 5  $R_4$  représente un atome d'hydrogène, ou un groupe  $(C_1-C_{10})$ alkyle, éventuellement substitué par un groupe  $R_f$  ;

$R_f$  représente un groupe  $(C_1-C_{10})$ alcoxy ;

les autres substituants étant définis tels que précédemment.

- 10 Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un dixième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

$R_4$  représente un atome d'hydrogène, ou un groupe choisi parmi les groupes méthyle, butyle, méthoxy-éthyle ;

les autres substituants étant définis tels que précédemment.

15

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un onzième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

le groupe  $R^4-O$   est en position 2, 3 ou 4 du phényle qui le porte ;

les substituants étant tels que définis précédemment.

20

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un douzième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

- 25  $R_1$  représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle, dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényl, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène,  $(C_1-C_{10})$ alkyle, oxo,  $NRaRb$  ;

- 30  $(C_1-C_{10})$ alcoxy, aryle,  $CONRaRb$  ;

$Ra$  et  $Rb$  représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe  $(C_1-C_{10})$ alkyle ;

$X$  représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou d'halogène ;

R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

5 R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe R<sub>f</sub> ;

R<sub>f</sub> représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;

à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

10 Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un treizième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuryle, dihydrobenzofuryle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, 15 pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, méthyle, oxo, NRaRb; éthoxy, phényle, isopentyle, CONHC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, méthoxy ;

20 Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;

X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou de fluor ;

R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou un groupe méthyle ;

25 R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;

R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, ou un groupe choisi parmi les groupes méthyle, butyle, méthoxy-éthyle ;

à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

30

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un quatorzième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle,

dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

- ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, oxo, NRaRb ;
- 5 (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, aryle, CONRaRb ;

Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou d'halogène ;

- 10 R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

- R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué
- 15 par un groupe R<sub>f</sub> ;

R<sub>f</sub> représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;

le groupe  $\begin{array}{c} \text{R}_3 \quad \text{R}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{R}_4-\text{O} \end{array}$  étant en position 2, 3 ou 4 du phényle qui le porte ;

à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

- 20 Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un quinzième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuryle, dihydrobenzofuryle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle,

25 pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, méthyle, oxo, NRaRb, éthoxy, phényle, isopentyle, CONHC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, méthoxy ;

- 30 Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;

X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou de fluor ;

R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou

un groupe méthyle ;

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;

R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, ou un groupe choisi parmi les groupes méthyle, butyle, méthoxy-éthyle ;

le groupe  étant en position 2, 3 ou 4 du phényle qui le porte ;  
à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, un seizième groupe de composés est constitué des composés pour lesquels :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle, dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, oxo, NRaRb, aryle ;

X représente un hydrogène,

R représente un hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ;

R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, ce groupe étant éventuellement substitué par un groupe Rf ;

Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

Rf représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;

à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, on peut notamment citer les composés suivants :

- {3-[2-(5-Méthylisoxazol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényle}méthanol ;
- [3-[2-(pyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényle]méthanol et son chlorhydrate ;

- Chlorhydrate (2:1) de 6-(3-*tert*butoxyméthylphényl)-2-(pyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- [3-[2-(Thiazol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol
- [3-[2-(quinoléin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-]2-(pyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-[(1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- 6-[6-(3-hydroxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl]-3,4-dihydro-1*H*-quinoléin-2-one et son chlorhydrate ;
- 2-(5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)-6-(3-*tert*-butoxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- 6-[6-(3-Hydroxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl]-3*H*-benzoxazol-2-one et son chlorhydrate ;
- Chlorhydrate (1:1) de [2-(2-furan-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- {3-[2-(5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {3-[2-(5-chlorothién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl] phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(6-diméthylaminopyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1*H*-indol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(6-aminopyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;

- {3-[2-(1*H*-indol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(2-aminopyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(3Phénylisoxazol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [4-[2-(Benzofuran-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [3-[2-(Pyridin-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [4-[2-(Pyridin-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [3-[2-(Thiën-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- 2-(Benzofuran-2-yl)-6-[3-(2-méthoxyéthoxyméthyl)phényl]imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- 6-[3-(2-Méthoxyéthoxyméthyl)phényl]-2-(thiën-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine et son oxalate ;
- [3-(2-Thiën-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- Chlorhydrate (1:1) de [3-(3-méthyl-2-thiën-2-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(1*H*-indol-3-yl)-3-méthylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(2-Ethoxypyrimidin-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- [2-(2-Quinoléin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol et son chlorhydrate ;

32

- {3-[2-(2-Chloro-pyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzothiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzo[b]thiophèn-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzo[b]thiophèn-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- 3-(2-Benzo[b]thiophèn-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzofuran-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(3-Chlorothièn-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(5-méthylisoxazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(3-Méthyl-2-thièn-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Thièn-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Pyridin-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(5-Chlorothièn-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Thièn-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;

- 2-[3-(2-Benzofuran-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzothiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]thiényl-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-Méthyl-1H-benzimidazol-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Furan-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]thiényl-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Thiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol et son chlorhydrate ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- [2-Fluoro-6-(2-thién-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-pyridin-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-(2-Benzothiazol-2-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- [2-(2-Benzo[*b*]thiophén-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- {2-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-6-fluorophényl}méthanol ;
- [2-(2-Benzofuran-5-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- [2-(2-Benzo[*b*]thiényl-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;

- [2-Fluoro-6-(2-thiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(3-méthyl-2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-thién-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-pyridin-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(5-Chlorothién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-2,6-difluorophényl}méthanol ;
- [3-(2-Benzofuran-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzofuran-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzothiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-thiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- 6-(3-Méthoxyméthylphényl)-2-(1-méthyl-1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine et son chlorhydrate ;
- 2-(1*H*-Indol-6-yl)-6-(3-méthoxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridine et son chlorhydrate ;
- 2-{3-[2-(5-Méthylisoxazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- [2-Fluoro-6-(3-méthyl-2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {2-[2-(5-Chlorothiophén-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-6-fluorophényl}méthanol ;
- [2-(2-Benzofuran-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- [2-(2-Benzofuran-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1-méthyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-furan-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;

35

- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-méthyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {3-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-2,6-difluorophényl}méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-furan-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzofuran-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]thiényl-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- 2-(1*H*-Indol-6-yl)-6-[3-[2-(méthoxyéthyl)oxyméthyl]phényl]imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- 2-[3-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- [2-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2-Méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(4-Méthylthiën-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-Méthyl-1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Isoquinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,6-Difluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}-propan-2-ol ;
- 2-(3-{2-[1-(3-Méthylbutyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl}phényl)propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolin-3-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(6-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol

36

- {2-Fluoro-6-[2-(3-fluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-méthylthiën-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-pyrimidin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(2-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-méthylthiën-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1-méthyl-1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-quinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-isoquinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {2-[2-(2,6-Difluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-6-fluorophényl}méthanol ;
- (2-Fluoro-6-{2-[1-(3-méthylbutyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl}phényl)méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(6-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-méthylthiën-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(2-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-méthylthiën-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;

37

- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-méthyl-1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-quinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-isoquinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(2,6-Difluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-2,6-difluorophényl}méthanol ;
- (2,6-Difluoro-3-{2-[1-(3-méthylbutyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl}phényl)méthanol ;
- *N*-*tert*-Butyl-5-[6-(2,4-difluoro-3-hydroxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl]nicotinamide ;

Conformément à l'invention, on peut préparer les composés de formule générale (I) selon le procédé décrit dans le schéma 1.




Schéma 1

On peut préparer les composés de l'invention suivant le schéma 1 (voie A) par une réaction de couplage, catalysée par un métal tel que le palladium, entre une imidazopyridine de formule générale (IV), dans laquelle R et R1 sont définis comme précédemment et Y représente un atome d'halogène ou un dérivé de bore, et un dérivé de formule générale (VII), dans laquelle R2, R3, R4 et X sont définis comme précédemment et Z représente un dérivé de bore ou d'étain si Y représente un atome d'halogène ou un halogène si Y représente un dérivé de bore, pour obtenir les composés de formule générale (I), par exemple selon la méthode décrite par A. Gueiffier dans *Helv. Chim. Acta* 2001, 84, 3610-3615.

Alternativement, on peut préparer les composés de l'invention suivant le schéma 1 (voie B) par une réaction de couplage, catalysée par un métal tel que le palladium, entre une 2-chloroimidazopyridine de formule générale (IX), dans laquelle R, R2, R3, R4 et X sont définis comme précédemment, et un dérivé de formule générale (X), dans laquelle R1 est défini comme précédemment et W représente un dérivé de bore ou d'étain, pour obtenir les composés de formule générale (I), par exemple selon la méthode décrite par S. Buchwald dans *J.A.C.S.* 2005, 127, 4685.

Selon le schéma 1 (voie C), les dérivés de formule générale (XI), dans laquelle R, R2; R3 et X sont définis comme précédemment et PG représente un groupement protecteur de fonction hydroxyle, tel que décrit par exemple par T. Greene dans « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience) peuvent être soumis à une réaction de couplage, catalysée par un métal tel que le palladium, avec un dérivé de formule générale (X), dans laquelle R1 est défini comme précédemment et W représente un dérivé de bore ou d'étain, pour obtenir les composés de formule générale (XII), par exemple selon la méthode décrite par S. Buchwald dans *J.A.C.S.* 2005, 127, 4685. Finalement, les composés de formule générale (XII) peuvent être soumis à une réaction de déprotection, telle que décrite par exemple par T. Greene dans « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience), ou par toute autre méthode connue de l'Homme du métier pour obtenir les composés de formule générale (I).

Alternativement, on peut préparer les composés de l'invention suivant le schéma 1 (voie D) par condensation entre une aminopyridine de formule générale (XIII), dans laquelle R2, R3, R4 et X sont définis comme précédemment, R4 n'étant pas un atome d'hydrogène, et une halogénocétone de formule générale (VI), dans laquelle R et R1 sont définis comme précédemment pour obtenir les composés de formule générale (I), pour lesquels R est en

position 3 du noyau imidazopyridine.

Lorsque R4 représente un atome d'hydrogène, on peut transformer les composés de formule générale (XIII) selon le schéma 1 (voie E) en dérivés de formule générale (XIV), dans laquelle R2, R3 et X sont définis comme précédemment et PG représente un groupement protecteur de fonction hydroxyle, tel que décrit par exemple par T. Greene dans « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience), ou par toute méthode connue de l'Homme du métier. Les composés de formule générale (XIV) peuvent être condensés avec une halogénocétone de formule générale (VI), dans laquelle R et R1 sont définis comme précédemment, pour obtenir les composés de formule générale (XII), pour lesquels R est en position 3 du noyau imidazopyridine. Finalement, les composés de formule générale (XII) peuvent être soumis à une réaction de déprotection, telle que décrite par exemple par T. Greene dans « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience), ou par toute autre méthode connue de l'Homme du métier pour obtenir les composés de formule générale (I).

Conformément à l'invention, on peut préparer les intermédiaires des composés de formule générale (I) selon les procédés décrits dans le schéma 2.




Schéma 2

Selon le schéma 2 (voie a), les composés de formule générale (IV) peuvent être obtenus par condensation entre une aminopyridine de formule générale (II), dans laquelle R

est défini comme précédemment et Y représente un atome d'halogène ou un dérivé de bore, et une halogénocétone de formule générale (III), dans laquelle R1 est défini comme précédemment par exemple selon les méthodes décrites par L. Cai dans *J. Med. Chem.* 2007, 50, 4746, pour obtenir les composés de formule générale (IV), pour lesquels R est en position 5, 7 ou 8 du noyau imidazopyridine.

Alternativement, selon le schéma 2 (voie b), les composés de formule générale (IV) peuvent être obtenus par condensation entre une aminopyridine de formule générale (V), dans laquelle Y représente un atome d'halogène ou un dérivé de bore, et une halogénocétone de formule générale (VI), dans laquelle R et R1 sont définis comme précédemment pour obtenir les composés de formule générale (IV), pour lesquels R est en position 3 du noyau imidazopyridine.

Selon le schéma 2 (voie c), les composés de formule générale (XIIIa), (XIIIb) ou (XIV) peuvent être obtenus par une réaction de couplage, catalysée par un métal tel que le palladium, entre une aminopyridine de formule générale (Va) ou (Vb) protégée par un groupe protecteur R' dans laquelle Y représente un atome d'halogène ou un dérivé de bore, et un dérivé de formule générale (VII), dans laquelle R2, R3 et X sont définis comme précédemment, R6 représente R4 (composés XIIIa et XIIIb) ou un groupe protecteur de fonction hydroxyle PG (composés XIV) et Z représente un dérivé de bore ou d'étain si Y représente un halogène ou un halogène si Y représente un dérivé de bore.

Selon le schéma 2 (voie d), les composés de formule générale (VIII) peuvent être obtenus à partir des composés de formule générale (II), par exemple selon la méthode décrite par C. Townsend dans *Syn. Commun.* 1997, 27, 1763-1765. Les composés de formule générale (IX) ou (XI) dans laquelle R, R2, R3 et X sont définis comme précédemment et R6 représente un groupe R4 (composés IX) ou un groupe protecteur PG (composés XI), peuvent être obtenus par une réaction de couplage, catalysée par un métal tel que le palladium, entre une imidazopyridine de formule générale (VIII), dans laquelle R est défini comme précédemment et Y représente un atome d'halogène ou un dérivé de bore, et un dérivé de formule générale (VII), dans laquelle R2, R3 et X sont définis comme précédemment, R6 représente un groupe R4 ou un groupe protecteur PG et Z représente un dérivé de bore ou d'étain si Y représente un atome d'halogène ou un halogène si Y représente un dérivé de bore, par exemple selon la méthode décrite par A. Gueiffier dans *Helv. Chim. Acta* 2001, 84, 3610-3615.

D'une façon générale, les intermédiaires ci-dessus peuvent être soumis, si désiré et


si nécessaire, à toutes réactions de protection / déprotection connues de l'homme de l'art avant et / ou après toutes réactions décrites dans les schémas ci-dessus.

Les produits de formule (I), peuvent être soumis, si désiré et si nécessaire, à toutes réactions connues de l'homme de l'art, dans un ordre quelconque, pour être transformés en d'autres produits de formule (I),

A titre d'exemples de réactions, on peut citer : les réactions d'estérification ou d'amidification de fonction acide, les réactions de carbamoylation, les réactions d'hydrolyse de fonction ester, les réactions de transformation de fonction hydroxyle en fonction alcoxy, les réactions de couplage catalysées par un métal de transition, les réactions de protection des fonctions réactives, les réaction d'élimination des groupements protecteurs que peuvent porter les fonctions réactives protégées, les réactions de salification par un acide minéral ou organique ou par une base pour obtenir le sel correspondant, les réactions de dédoublement des formes racémiques en énantiomères, lesdits produits de formule (I) ainsi obtenus étant le cas échéant sous toutes les formes isomères possibles racémiques, énantiomères et diastéréoisomères.

Dans les schémas 1 et 2, les composés de départ et les réactifs, quand leur mode de préparation n'est pas décrit, sont disponibles dans le commerce ou décrits dans la littérature, ou bien peuvent être préparés selon des méthodes qui y sont décrites ou qui sont connues de l'Homme du métier.

L'invention, selon un autre de ses aspects, a également pour objet les composés de formules (VIII-1), (IX-1), (IX-2), (XI-1), (XI-2), (XI-3), (XI-4), (XIII-1), (XIII-2), (XIV-1), (XIV-2) et (XIV-3). Ces composés sont utiles comme intermédiaires de synthèse des composés de formule (I).



25 Le composé de formule (VIII-1) peut être préparé, par exemple, selon le procédé décrit dans l'exemple N° 3. Dans une première étape, on peut effectuer une condensation entre une aminopyridine substituée par un dérivé de bore telle que, par exemple, la 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine et le 2-bromoacétate d'éthyle. Dans une deuxième étape, le composé est soumis à une réaction de cyclisation et de chloration en présence d'un agent chlorant tel que l'oxychlorure de phosphore qui conduit au composé (VIII-1).

30 Le composé de formule (IX-1) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre la 6-bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine et l'acide 3-(hydroxyméthyl)phénylboronique, tel que décrit dans l'exemple N° 2.

35 Le composé de formule (IX-2) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre le composé de formule (VIII-1) et le 2-(3-bromophényl)propan-2-ol, tel que décrit dans l'exemple N° 7

Le composé de formule (XI-1) peut être préparé par action du *tert*-butylchlorodiméthylsilane sur le composé de formule (IX-1), en présence d'une base telle

que l'imidazole et dans un solvant tel que le tétrahydrofurane, tel que décrit dans l'exemple N° 4.

Le composé de formule (XI-2) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre le (2-bromobenzyloxy)*tert*-butyldiméthylsilane et le composé de formule (VIII-1), tel que décrit dans l'exemple N° 3.

Le composé de formule (XI-3) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre le (2-bromo-6-fluorobenzyloxy)*tert*-butyldiméthylsilane et le composé de formule (VIII-1), tel que décrit dans l'exemple N° 13.

Le composé de formule (XI-4) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre le (3-bromo-2,6-difluorobenzyloxy)*tert*-butyldiméthylsilane et le composé de formule (VIII-1), tel que décrit dans l'exemple N° 14.

Le composé de formule (XIII-1) peut être préparé par une réaction de couplage catalysée par un métal, tel que le palladium, entre la 5-bromo-2-aminopyridine et un dérivé d'acide boronique, par exemple l'acide 3-(hydroxyméthyl)phénylboronique, tel que décrit dans l'exemple N°6.

Le composé de formule (XIII-2) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre la 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine et le 2-(3-bromophényl)propan-2-ol, tel que décrit dans l'exemple N°8

Le composé de formule (XIV-1) peut être préparé par action du (*tert*-butylchlorodiméthyl)silane sur le composé de formule (XIII-1) dans un solvant, par exemple le tétrahydrofurane, en présence d'une base telle que l'imidazole, tel que décrit dans l'exemple N°6.

Le composé de formule (XIV-2) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre la 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine et le 3-(*tert*butyldiméthylsilyloxyméthyl)-2,4-difluorobromobenzène, tel que décrit dans l'exemple N°10

Le composé de formule (XIV-3) peut être préparé par une réaction de couplage, catalysée par un métal, tel que le palladium, entre la 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine et le 2-(*tert*butyldiméthylsilyloxyméthyl)-3-fluorobromobenzène, tel que décrit dans l'exemple N°9

Les composés de formules (VIII-1), (IX-1), (XI-1), (XI-2), (XIII-1) et (XIV-1) ont été préparés à l'état de poudre ou d'huile, à l'état de base ou de sel. Le tableau 1 rassemble quelques données physicochimiques de ces intermédiaires.

Tableau 1

| N°       | R.M.N. <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ ppm) ; M+H ; PF                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (VIII-1) | 1,35 (m, 12H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; M+H = 279 ; PF = 115 - 120°C.                                                                                           |
| (IX-1)   | 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,35 à 7,75 (m, 6H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; M+H = 259.                                                                                                     |
| (IX-2)   | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; de 7,6 à 7,7 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                                      |
| (XI-1)   | 0,10 (s, 6H) ; 0,92 (s, 9H) ; 4,79 (s, 2H) ; 7,37 (d, 1H) ; de 7,55 à 7,67 (m, 5H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,84 (t, 1H) ; M+H = 373 ; PF = 120 - 123°C.                                                 |
| (XI-2)   | (CDCl <sub>3</sub> ) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,15 à 7,55 (m, 7H) ; 8,15 (s, 1H) ; M+H = 373.                                                                               |
| (XI-3)   | (CDCl <sub>3</sub> ) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,05 à 7,1 (m, 2H) ; de 7,25 à 7,3 (m, 2H) ; 7,4 (s, 1H) ; 7,45 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H). M+H = 391.                             |
| (XI-4)   | 0,0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; 7,15 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 2H) ; 8,0 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H). M+H = 409.                                                             |
| (XIII-1) | 4,55 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,55 (d, 1H) ; 7,2 (d, 1H) ; de 7,3 à 7,55 (m, 3H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; M+H = 201                                                          |
| (XIII-2) | 1,45 (s, 6H) ; 5,0 (s, 1H) ; 6,0 (s, 2H) ; 6,55 (d, 1H) ; de 7,3 à 7,4 (m, 3H) ; 7,65 (s, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H). M+H = 229                                                            |
| (XIV-1)  | 0,09 (s, 6H) ; 0,91 (s, 9H) ; 4,75 (s, 2H) ; 6,02 (m, 2H) ; 6,52 (dd, 1H) ; 7,21 (d, 1H) ; 7,36 (t, 1H) ; 7,43 (d, 1H) ; 7,47 (s, 1H) ; 7,66 (dd, 1H) ; 8,21 (d, 1H). M+H = 315 ; PF = 82 - 84°C |
| (XIV-2)  | 0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; 7,05 (t, 1H) ; de 7,35 à 7,45 (m, 2H) ; 8,0 (s, 1H). M+H = 351                                                             |
| (XIV-3)  | 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; de 7,05 à 7,15 (m, 2H) ; de 7,3 à 7,4 (m, 1H) ; de 7,45 à 7,5 (m, 1H) ; 8,0 (d, 1H). M+H = 333                            |

Les exemples suivants décrivent la préparation de certains composés conformes à l'invention. Ces exemples ne sont pas limitatifs et ne font qu'illustrer la présente invention. Les numéros des composés exemplifiés renvoient à ceux donnés dans le tableau ci-après, qui illustre les structures chimiques et les propriétés physiques de quelques composés selon l'invention.

La nomenclature des composés a été établie à partir du logiciel Autonom.

45

**Exemple 1 : Chlorhydrate (2:1) de 6-(3-*tert*-butoxyméthylphényl)-2-(pyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*] pyridine (composé 3 du tableau)**

**1.1 *N*-[5-(3-*tert*-Butoxyméthylphényl)pyridin-2-yl]acétamide**

Sous un courant d'argon, 1,0 g de *N*-(5-bromopyridin-2-yl)acétamide, 967 mg  
 5 d'acide 3-(*tert*-butoxyméthyl)phénylboronique et 269 mg de  
 tétrakis(triphénylphosphine)palladium sont placés dans un ballon contenant 30 ml de  
 diméthoxyéthane et 15 ml d'une solution 2M de carbonate de sodium préalablement  
 dégazés. On chauffe à 90°C pendant 15 heures. Après refroidissement, le mélange  
 réactionnel est concentré sous pression réduite. Le résidu est repris entre le dichlorométhane  
 10 et l'eau, la phase organique est séparée, séchée sur sulfate de sodium et le filtrat est  
 concentré sous pression réduite. Le résidu est ensuite purifié par chromatographie sur gel de  
 silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol. Le solide obtenu est trituré à  
 l'éther diéthylique, recueilli par filtration puis séché. On obtient 1,0 g de composé.

Spectre RMN 1H (DMSO-*d*<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 1,4 (s, 9H) ; 2,3 (s, 3H) ; 4,55 (s, 2H) ; de 7,4 à  
 15 7,55 (m, 3H) ; 7,6 (s, 1H) ; 8,05 (m, 1H) ; de 8,2 à 8,4 (m, 2H) ; 8,55 (m, 1H). M+H = 299.

**1.2 5-(3-*tert*-Butoxyméthylphényl)pyridin-2-ylamine**

559 mg d'hydroxyde de sodium dans 2 ml d'éthanol et 2 ml d'eau sont placés dans  
 un ballon contenant 695 mg de *N*-[5-(3-*tert*-butoxyméthylphényl)pyridin-2-yl]acétamide. On  
 y ajoute 1 ml d'eau et 1 ml d'éthanol et on chauffe le mélange au reflux du solvant pendant  
 20 1 heure. Après refroidissement, le mélange réactionnel est concentré sous pression réduite.  
 Le résidu est repris entre le dichlorométhane et l'eau puis la phase organique est séparée,  
 séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. Le résidu est purifié  
 par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol.  
 On obtient 487 mg de composé.

25 Spectre RMN 1H (DMSO-*d*<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 1,25 (s, 9H) ; 4,45 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,55 (d,  
 1H) ; 7,25 (d, 1H) ; 7,35 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,5 (s, 1H) ; 7,7 (m, 1H) ; 8,25 (s, 1H). M+H  
 = 257.

**1.3 6-(3-*tert*-Butoxyméthylphényl)-2-pyridin-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridine**

30 On place dans un ballon 487 mg de 5-(3-*tert*-butoxyméthylphényl)pyridin-2-ylamine  
 (obtenu selon le protocole décrit dans l'exemple 1.2), 380 mg de 2-bromo-1-pyridin-3-  
 ylétanone dans 15 ml de *n*-propanol. On ajoute 223 mg d'hydrogénocarbonate de sodium.

46

On chauffe à 80°C durant 24 heures, laisse refroidir à température ambiante et concentre le mélange réactionnel sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et l'acétate d'éthyle. La phase organique est séparée, séchée et le filtrat est concentré sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un  
5 mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 128 mg de composé.

M+H = 358.

**1.4 Chlorhydrate (2:1) de 6-(3-*tert*-butoxyméthylphényl)-2-(pyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*] pyridine**

121 mg de 6-(3-*tert*-butoxyméthylphényl)-2-pyridin-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridine sont  
10 mis en suspension dans 5 ml de dichlorométhane ; on y ajoute, goutte à goutte et sous agitation, 7,48 ml d'une solution 0,1N d'acide chlorhydrique dans le 2-propanol et agite à température ambiante pendant 7 heures. Le mélange est concentré sous pression réduite. Le solide obtenu est trituré à l'éther diéthylique, recueilli par filtration et séché à l'étuve sous pression réduite à 40°C. Le solide est ensuite dissous à température ambiante dans un  
15 minimum d'isopropanol puis reprecipité à l'aide d'éther isopropylique. Le précipité formé (après 3h au frigo) est recueilli par filtration, lavé au pentane puis séché à l'étuve sous pression réduite à 50°C. On obtient 60 mg de composé.

PF = 220 - 222°C. Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,3 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 2H) ; de 7,85 à 8,0 (m, 2H) ; 8,05 (d, 1H) ; de 8,75  
20 à 8,90 (m, 3H) ; 9,15 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H). M+H = 358.

**Exemple 2 : Chlorhydrate (2:1) de [3-(2-Quinolén-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol (composé 5 du tableau)**

**2.1 6-Bromo-3*H*-imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-one**

25 3,0 g de 5-bromopyridin-2-ylamine dans 5,8 ml de 2-bromoacétate d'éthyle sont placés dans un ballon et agités à température ambiante pendant 48 h. Il se forme un précipité que l'on recueille par filtration, lave à l'éther diéthylique et sèche à l'étuve sous pression réduite. Le solide est ensuite repris dans 50 ml d'éthanol et on y ajoute 2,18 g d'hydrogénocarbonate de sodium. Le mélange réactionnel est chauffé au reflux du solvant  
30 pendant 5 h, refroidi à température ambiante puis concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu est repris entre l'eau et le dichlorométhane et la phase organique est séparée, séchée et concentrée sous pression réduite. On obtient 1,46 g de composé utilisé tel quel dans les étapes suivantes.

47

M+H = 214.

## 2.2 6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine

Un mélange de 1,4 g de 6-bromo-3*H*-imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-one dans 5 ml de POCl<sub>3</sub> est chauffé à 105°C pendant 2 heures puis refroidi à température ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et le dichlorométhane et on ajoute une solution aqueuse à 30% de NH<sub>4</sub>OH jusqu'à pH basique. La phase organique est ensuite séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. Puis le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 760 mg de composé.

10 Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 7,35 (d, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 8,3 (s, 1H). M+H = 232.

## 2.3 [3-(2-Chloroimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol

Dans un ballon, on place 760 mg de 6-bromo-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine dans 25 ml de toluène et 8 ml d'éthanol et on dégaze à l'argon pendant 10 mn. Après addition de 15 230 mg de tétrakis(triphénylphosphine)palladium, on agite 5 mn à température ambiante puis on ajoute 650 mg d'acide 3-(hydroxyméthyl)phénylboronique et 8 ml d'une solution 2M de carbonate de sodium. Le mélange réactionnel est chauffé à 80°C pendant 16 h puis refroidi à température ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et l'acétate d'éthyle et la phase organique est séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. L'huile obtenue est purifiée par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 550 mg de composé. 20 Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,35 à 7,75 (m, 6H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H). M+H = 259.

## 2.4 [3-[2-(Quinoléin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol

25 Dans un réacteur à vis, on place 550 mg de [3-(2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol, 550 mg d'acide 3-quinoléineboronique, 20 mg d'acétate de palladium, 70 mg de 2-dicyclohexylphosphino-2',6'-diméthoxy-1,1'-biphényl et 900 mg de K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> dans 8 ml de toluène anhydre. Le réacteur est fermé et on chauffe à 115°C pendant 16 h. Après refroidissement, le mélange réactionnel est filtré sur célite et rincé avec du dichlorométhane. 30 La phase organique est lavée par une solution saturée de NaCl, puis séparée, séchée et concentrée sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 90 mg de composé.

M+H = 351.

**2.5 Chlorhydrate (2:1) de [3-[2-(quinoléin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol**

Une solution de 90 mg de [3-[(2-quinoléin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol dans du dichlorométhane et du méthanol est passée sur verre fritté puis on ajoute au filtrat 5,2 ml d'une solution 0,1N d'acide chlorhydrique dans l'isopropanol. Il se forme un précipité que l'on recueille par filtration et lave à l'éther diéthylique. Le solide est ensuite dissous à température ambiante par le minimum de méthanol et repris ensuite par de l'éther diéthylique. Le précipité est recueilli par filtration et séché à l'étuve sous pression réduite. On obtient 66 mg de composé.

10 PF = 279 - 281°C. Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (m, 2H) ; 7,95 (m, 1H) ; 8,0 (m, 1H) ; 8,1 (m, 1H) ; 8,2 (m, 2H) ; 8,95 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 9,6 (s, 1H). M+H = 445.

**Exemple 3 : Chlorhydrate (1:1) de [2-[2-(furan-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol (composé 12 du tableau)**

**3.1 Bromhydrate de [2-imino-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyridin-1-yl]acétate d'éthyle**

5,0 g de 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine dans 7,6 ml de 2-bromoacétate d'éthyle sont placés dans un ballon et le mélange est agité à température ambiante pendant 20 h. Il se forme un précipité que l'on recueille par filtration, lave par de l'éther diéthylique puis par de l'éthanol et sèche à l'étuve sous pression réduite. On obtient 8,78 g de composé.

Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,3 (m, 15H) ; de 4,1 à 4,25 (m, 2H) ; 5,2 (s, 2H) ; 7,1 (d, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H). M+H = 388.

**25 3.2 2-Chloro-6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine**

Dans un ballon on place 8,78 g de composé obtenu selon le protocole décrit en 3.1 dans 20 ml de POCl<sub>3</sub>. Le mélange réactionnel est chauffé à 105°C pendant 16h, refroidi à température ambiante et concentré sous pression réduite. Le résidu est repris entre le dichlorométhane et l'eau à 0°C et on ajoute une solution aqueuse à 30% de NH<sub>4</sub>OH jusqu'à pH basique. La phase organique est séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. On obtient 4,3 g de composé.

30 PF = 115 - 120°C. Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,35 (m, 12H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H). M+H = 279.

**3.3 (2-Bromobenzyloxy)tert-butyldiméthylsilane**

2,0 g de (2-bromophényl)méthanol sont placés dans un ballon et dissous dans 100 ml de tétrahydrofurane. On y ajoute 1,1 g d'1*H*-imidazole puis 2,1 g de chlorure de *tert*-butyldiméthylsilane et on laisse agiter à température ambiante pendant 48 heures. Le mélange réactionnel est ensuite hydrolysé avec de l'eau et la phase organique, extraite à l'acétate d'éthyle, est séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 2,66 g de composé.

Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,6 (s, 2H) ; 6,95 (m, 1H) ; 7,2 (m, 1H) ; de 7,35 à 7,45 (m, 2H). M+H = 302.

10 3.4 6-[2-[(*tert*-Butyldiméthylsilanyl)oxyméthyl]phényl]-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine

450 mg de (2-bromobenzoyloxy)*tert*-butyldiméthylsilane, 500 mg de 2-chloro-6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine et 1,46 g de carbonate de césium sont dissous dans 8 ml de tétrahydrofurane et 1 ml d'eau. On dégaze à l'argon pendant 10 min, on ajoute 110 mg de [1,1'-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium et on chauffe au reflux du solvant pendant 16 heures. Après refroidissement, le mélange réactionnel est hydrolysé avec de l'eau et la phase organique extraite au dichlorométhane est séparée, séchée et concentrée sous pression réduite. L'huile obtenue est purifiée par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 260 mg de composé.

Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,15 à 7,55 (m, 7H) ; 8,15 (s, 1H). M+H = 373.

3.5 6-[2-[(*tert*-Butyldiméthylsilanyl)oxyméthyl]phényl]-2-(furan-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine

25 3 mg d'acétate de palladium, 11 mg de 2-(dicyclohexyl)phosphino-2',6'-diméthoxy-1,1'-biphényl, 270 mg de K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, 110 mg d'acide 3-furaneboronique et quelques gouttes d'éthanol sont placés dans un réacteur contenant un mélange de 240 mg de 6-[2-[(*tert*-butyldiméthylsilanyl)oxyméthyl]phényl]-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine dans 2 ml de toluène préalablement dégazé sous courant d'argon. Le réacteur est fermé et chauffé à 115°C pendant 16 h. Après refroidissement, le mélange réactionnel est filtré sur célite, lavé au dichlorométhane puis concentré sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 258 mg de composé.

Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,55 (s, 2H) ; 6,75 (m, 1H) ; de 7,1 à 7,6 (m, 8H) ; 7,95 (s, 1H) ; 8,15 (s, 1H). M+H = 405.

### 3.6 [2-[2-(Furan-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl]phényl]méthanol

On place dans un ballon 250 mg de 6-[2-[(*tert*-butyldiméthylsilanyloxy)méthyl]phényl]-2-(furan-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine dans 6 ml de tétrahydrofurane et on y ajoute 320 mg de fluorure de tétrabutylammonium. Le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 48 h et concentré sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 156 mg de composé.

10 M+H = 291.

### 3.7 Chlorhydrate (1:1) de [2-(2-(furan-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)phényl]méthanol

156 mg de [2-(2-furan-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl]phényl]méthanol sont mis en suspension dans du dichlorométhane ; on y ajoute, goutte à goutte, 5,4 ml d'une solution 0,1N d'acide chlorhydrique dans l'isopropanol et agite à température ambiante. Le mélange réactionnel est ensuite concentré sous pression réduite. Le solide résiduel est repris dans l'éther diéthylique, le précipité est recueilli par filtration, lavé à l'éther diéthylique et séché à l'étuve sous pression réduite.

20 PF = 205 - 208°C. Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 4,45 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; de 7,9 à 8,0 (m, 3H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H). M+H = 327.

### Exemple 4 : Chlorhydrate (1:1) de {3-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl]phényl}méthanol (composé N°33 du tableau)

#### 25 4.1 Bromhydrate de (5-bromo-2-imino-1*H*-pyridin-1-yl)acétate d'éthyle

En procédant comme dans l'exemple 3.1 et à partir de 5,0 g de 5-bromopyridin-2-ylamine et de 9,6 ml de 2-bromoacétate d'éthyle, on obtient 9,56 g de composé.

Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 1,3 (t, 3H) ; 4,25 (q, 2H) ; 5,15 (s, 2H) ; 7,15 (d, 1H) ; 8,1 (d, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; M+H = 341.

#### 30 4.2 6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine

En procédant comme dans l'exemple 3.2, en partant de 9,5 g de bromhydrate de (5-bromo-2-imino-1*H*-pyridin-1-yl)acétate d'éthyle et de 30 ml de POCl<sub>3</sub>, on obtient 6,7 g de 6-bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine. Le composé est purifié par chromatographie sur gel

de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 5,97 g de composé. PF = 155 -159°C. Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 7,35 (d, 1H) ; de 7,45 à 7,6 (m, 2H) ; 8,3 (s, 1H) ; M+H = 232.

#### 4.3 6-[3-[(*tert*-butyldiméthylsilanyloxy)méthyl]phényl]-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine

On place dans un ballon 5,7 g de [3-(2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol obtenu selon le protocole décrit dans l'exemple 2.3 dans 220 ml de tétrahydrofurane, puis on ajoute 1,95 g de d'*1H*-imidazole et 3,65 g de chlorure de *tert*-butyldiméthylsilane et on laisse agiter à température ambiante pendant 48 heures. Le mélange réactionnel est ensuite hydrolysé par 150 ml d'eau et la phase organique extraite à l'acétate d'éthyle est séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. Le solide résiduel est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 6,1 g de composé.

Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0,10 (s, 6H) ; 0,92 (s, 9H) ; 4,79 (s, 2H) ; 7,37 (d, 1H) ; de 7,55 à 7,67 (m, 5H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,84 (t, 1H). PF = 120-123°C. M+H = 373.

#### 4.4 6-[3-[(*tert*-butyldiméthylsilanyloxy)méthyl]phényl]-2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine

On place dans un réacteur 200 mg de 6-[3-[(*tert*-butyldiméthylsilanyloxy)méthyl]phényl]-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine dans 2 ml de toluène et on dégaze sous courant d'argon pendant 10 mn puis on ajoute 3 mg d'acétate de palladium, 11 mg de 2-(dicyclohexyl)phosphino-2',6'-diméthoxy-1,1'-biphényle, 110 mg d'acide 6-indoleboronique, 230 mg de K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> et quelques gouttes d'éthanol. Le réacteur est fermé et chauffé à 115°C pendant 16 h. Après refroidissement, le mélange réactionnel est concentré sous pression réduite et le résidu obtenu est ensuite purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 180 mg de composé.

Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; 6,4 (m, 1H) ; 7,1 (m, 1H) ; de 7,2 à 7,35 (m, 4H) ; 7,4 (s, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,15 (s, 1H) 8,35 (m, 1H) 11,5 (s, 1H) ; M+H = 454.

#### 4.5 {3-[2-(1*H*-Indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol

210 mg de fluorure de tétrabutylammonium sont introduits dans un ballon contenant 180 mg de 6-[3-[(*tert*-butyldiméthylsilanyloxy)méthyl]phényl]-2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine dans 4 ml de tétrahydrofurane. Le mélange réactionnel est agité à

52

température ambiante pendant 48 h et est concentré sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 117 mg de composé.

Spectre RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 4,65 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 6,5 (m, 1H) ; 7,4 (m, 2H) ; 7,5 (t, 1H) ; de 7,6 à 7,75 (m, 6H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H). M+H = 340.

#### 4.6 Chlorhydrate (1:1) de {3-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol

110 mg de {3-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol sont mis en suspension dans du dichlorométhane et du méthanol; on y ajoute, goutte à goutte, 3,2 ml d'une solution 0,1N d'acide chlorhydrique dans l'isopropanol. Le mélange réactionnel est ensuite concentré sous pression réduite. Le solide résiduel est repris dans l'éther diéthylique, le précipité est recueilli par filtration et séché à l'étuve sous pression réduite.

PF = 251 - 254°C. . Spectre RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 4,65 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,75 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H) ; 11,6 (s, 1H). M+H = 376.

#### Exemple 5 : [3-[2-(Benzofuran-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol (composé 23 du tableau)

##### 5.1 2-(Benzofuran-3-yl)-6-bromoimidazo[1,2-*a*]pyridine

Dans un tube en verre, on dissout 250 mg de 1-(benzofuran-3-yl)-2-bromoéthanone, 181 mg de 5-bromopyridin-2-ylamine et 105 mg d'hydrogénocarbonate de sodium dans 15 ml de n-propanol. Le tube est fermé et chauffé à 80°C pendant 20h. Après refroidissement, on ajoute 20 ml d'eau et le mélange réactionnel est agité 1 heure à température ambiante. Il se forme un précipité que l'on recueille par filtration, lave à l'eau puis à l'éther diisopropylique et sèche au dessiccateur sous pression réduite. On obtient 250 mg de composé.

PF = 151-153°C. RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : de 7,31 à 7,43 (m, 3H) ; de 7,53 à 7,68 (m, 2H) ; 8,15 (m, 1H) ; 8,42 (s, 1H) ; 8,50 (s, 1H) ; 8,87 (m, 1H). M+H = 314.

##### 5.2 [3-(2-(Benzofuran-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol

100 mg de 2-(benzofuran-3-yl)-6-bromoimidazo[1,2-*a*]pyridine, 73 mg d'acide 3-(hydroxyméthyl)phénylboronique et 11 mg de tétrakis(triphénylphosphine)palladium sont placés dans un tube à micro-ondes. On y ajoute 2 ml d'acétonitrile, 2 ml de toluène et 1,5 ml

5 d'une solution 2 M de carbonate de sodium. Le tube est placé dans un appareil à micro-ondes et irradié à 150°C pendant 15 min. La phase organique est séparée, séchée puis concentrée sous pression réduite. Le résidu huileux est repris par 3 ml de dichlorométhane et trituré pendant 1 heure. Le précipité est recueilli par filtration, lavé à l'éther diisopropylique et séché au dessiccateur sous pression réduite. On obtient 44 mg de composé.

PF = 150-152°C. RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,75 (m, 9H) ; 8,2 (m, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,9 (t, 1H). M+H = 341.

10 **Exemple 6 : Chlorhydrate (1:1) de [3-(3-méthyl-2-thién-2-yl-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)phényl]méthanol (composé 31 du tableau)**

**6.1 [3-(6-Aminopyridin-3-yl)phényl]méthanol**

15 2,0 g de tétrakis(triphénylphosphine)palladium et 75 ml d'une solution 2M de carbonate de sodium sont ajoutés dans un ballon contenant une solution de 5,0 g de 5-bromopyridin-2-ylamine et 5,7 g d'acide 3-(hydroxyméthyl)phénylboronique dans 140 ml de toluène, et 70 ml d'éthanol préalablement dégazée. On chauffe à 80°C pendant 16h. Après refroidissement, le mélange réactionnel est concentré sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et l'acétate d'éthyle. La phase organique est séparée, séchée et concentrée sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice par un mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 4,99 g de composé.

20 RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 4,55 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,55 (d, 1H) ; 7,2 (d, 1H) ; de 7,3 à 7,55 (m, 3H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; M+H = 201.

**6.2 5-[3-(tert-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)phényl]pyridin-2-ylamine**

25 4,99 g de [3-(6-aminopyridin-3-yl)phényl]méthanol sont placés dans un ballon et dissous dans 240 ml de tétrahydrofurane. On y ajoute 2,2 g d'1H-imidazole puis 4,51 g de chlorure de tert-butyldiméthylsilane et on laisse agiter à température ambiante pendant 48 heures. Le mélange réactionnel est ensuite hydrolysé avec de l'eau et la phase organique, extraite à l'acétate d'éthyle, est séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 7,0 g de composé.

RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 0,09 (s, 6H) ; 0,91 (s, 9H) ; 4,75 (s, 2H) ; 6,02 (m, 2H) ; 6,52 (dd, 1H) ; 7,21 (d, 1H) ; 7,36 (t, 1H) ; 7,43 (d, 1H) ; 7,47 (s, 1H) ; 7,66 (dd, 1H) ; 8,21 (d, 1H). M+H = 315 ; PF = 82 - 84°C.

### 6.3 6-[3-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)phényl]-3-méthyl-2-thién-2-

#### 5 ylimidazo[1,2-*a*]pyridine

Dans un tube en verre, on dissout 280 mg de 5-[3-(*tert*-butyldiméthylsilanyloxyméthyl)phényl]pyridin-2-ylamine, 390 mg de 2-bromo-1-thiophèn-2-ylpropan-1-one et 190 mg d'hydrogénocarbonate de sodium dans 5 ml d'éthanol. Le tube est fermé et chauffé à 100°C pendant 20h. Après refroidissement, le mélange réactionnel est concentré sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 260 mg de composé.

10 Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 2,6 (s, 3H) ; 4,7 (s, 2H) ; 7 (m, 1H) ; de 7,2 à 7,6 (m, 8H) ; 7,45 (s, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; M+H = 435.

Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 2,6 (s, 3H) ; 4,7 (s, 2H) ; 7 (m, 1H) ; de 7,2 à 7,6 (m, 8H) ; 7,45 (s, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; M+H = 435.

### 6.4 [3-(3-Méthyl-2-thién-2-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol

15 310 mg de fluorure de tétrabutylammonium sont introduits dans un ballon contenant 260 mg de 6-[3-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)phényl]-3-méthyl-2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridine dans 6 ml de tétrahydrofurane. Le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 48 h et est concentré sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol. On obtient 140 mg de composé. M+H = 321

### 6.5 Chlorhydrate (1:1) de [3-(3-Méthyl-2-thién-2-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol

140 mg de [3-(3-méthyl-2-thién-2-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol sont mis en suspension dans du dichlorométhane et du méthanol; on y ajoute, goutte à goutte, 3,2 ml d'une solution 0,1N d'acide chlorhydrique dans l'isopropanol. Le mélange réactionnel est ensuite concentré sous pression réduite. Le solide résiduel est repris dans l'éther diéthylique, le précipité est recueilli par filtration et séché à l'étuve sous pression réduite. On obtient 150 mg de composé.

25 Spectre RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 2,85 (s, 3H) ; 4,75 (s, 2H) ; 7,35 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,85 (m, 2H) ; 7,9 (d, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; M+H = 321 ; PF = 279 - 283°C.

### Exemple 7: 2-{3-[2-(1H-Indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol (composé 47 du tableau)

#### 7.1 2-(3-bromophényl)propan-2-ol

Sous courant d'argon, 6,5 g de 3-bromoacétophénone sont placés dans un ballon et dissous dans 544 ml d'éther diéthylique et 272 ml de tétrahydrofurane. On refroidit à 0°C par un bain de glace et on y ajoute goutte à goutte 100 ml d'une solution 1M de bromure de méthylmagnésium dans l'éther dibutylique. On agite le mélange à 0°C pendant 1h et on  
5 ajoute 400 ml d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. La phase organique est séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. On obtient 10.0 g de composé. RMN 1H (DMSO-d6,  $\delta$  en ppm) : 1,45 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,65 (s, 1H).

#### 7.2 2-[3-(2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-phenyl]propan-2-ol

10 On place dans un ballon 85,5 ml de tétrahydrofurane et 9,5 ml d'eau, on dégaze à l'argon pendant 10 min et on ajoute successivement 5,8 g du composé obtenu en 7.1, 4,48 g de 2-chloro-6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,2,3-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridine obtenu en 3.2, 20,35 g de carbonate de césium et 0,85 g de [1,1'-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium. On agite le mélange 2 heures au reflux  
15 du tétrahydrofurane. Après refroidissement à température ambiante, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et l'acétate d'éthyle. La phase organique lavée par 2 fois avec une solution saturée de chlorure de sodium est ensuite séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange  
20 dichlorométhane/acétate d'éthyle. Le solide obtenu est trituré à l'éther diisopropylique, recueilli par filtration, puis séché à l'étuve sous pression réduite. On obtient 2,31 g de composé. RMN 1H (DMSO-d6,  $\delta$  en ppm) : 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; de 7,6 à 7,7 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).

#### 7.3 2-{3-[2-(1H-Indol-6-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol

25 4 mg d'acétate de palladium, 14 mg de 2-(dicyclohexyl)phosphino-2',6'-diméthoxy-1,1'-biphényle, 175 mg d'acide indole-6-boronique, 355 mg de K3PO4 et quelques gouttes d'éthanol sont placés dans un réacteur contenant un mélange de 250 mg de composé obtenu à l'étape 7.2 dans 3,1 ml de toluène anhydre préalablement dégazé sous courant d'argon. Le réacteur est fermé et chauffé à 115°C pendant 16 heures. Après refroidissement, le mélange  
30 réactionnel est filtré sur célite puis concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 210 mg de composé. PF = 203-204°C.

RMN 1H (DMSO-d6,  $\delta$  en ppm) : 1,55 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 6,45 (s, 1H) ; de 7,4 à 7,75 (m,

8H); 7,85 (s, 1H); 8,05 (s, 1H); 8,4 (s, 1H); 8,85 (s, 1H); 11,2 (s, 1H).

**Exemple 8 2-[3-(2-Thién-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol (composé 49 du tableau)**

5 **8.1 2-[3-(6-Aminopyridin-3-yl)phényl]propan-2-ol**

Sous courant d'argon, on place dans un ballon, 9,0 g de composé obtenu à l'étape 7.1, 11,05 g de 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine, 83,7 ml d'une solution 2M de carbonate de sodium et 1,70 g de tétrakis(triphénylphosphine)palladium que l'on dissout dans 523 ml de *N,N*-diméthylformamide. Le mélange est chauffé 1h30 à 80°C.

- 10 Après refroidissement à température ambiante, 1 l d'acétate d'éthyle est ajouté au milieu réactionnel que l'on filtre sur célite. La phase organique est ensuite séparée, lavée 3 fois par une solution de chlorure de sodium saturée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange dichlorométhane/méthanol. Le solide obtenu est trituré dans l'éther diisopropylique, recueilli par filtration puis séché à l'étuve sous pression réduite. On obtient
- 15 2,35 g de composé.

RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,45 (s, 6H); 5,0 (s, 1H); 6,0 (s, 2H); 6,55 (d, 1H); de 7,3 à 7,4 (m, 3H); 7,65 (s, 1H); 7,7 (d, 1H); 8,25 (s, 1H).

20 **8.2 2-[3-(2-Thién-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol (composé 49 du tableau)**

58 mg (0,7 mmole) de bicarbonate de sodium sont pesés dans un tube à microondes. On y ajoute 57 mg (0,25 mmole) du composé obtenu en 8.1 en solution dans 2 ml de propan-1-ol, puis 92 mg (0,375 mmole) de 2-bromo-1-(thién-3-yl)éthanone en solution dans 1 ml de

25 propan-1-ol Le tube est scellé puis agité à 80°C pendant 16 heures. Le mélange réactionnel est refroidi à température ambiante, on y ajoute 200 mg de propanethiol sur silice (Biotage Si-Thiol) et le mélange est agité 6h à température ambiante, puis filtré. Le résidu est lavé par 2 fois 2 ml de propan-1-ol, puis le filtrat est évaporé et purifié par chromatographie. On obtient 34,2 mg de composé.

- 30 RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,5 (s, 6H); 5,1 (s, 1H); 7,45 (t, 1H); de 7,5 à 7,55 (m, 2H); de 7,6 à 7,7 (m, 4H); 7,8 (s, 1H); 7,95 (d, 1H); 8,3 (s, 1H); 8,9 (s, 1H). M+H = 335.

**Exemple 9 : [2-(2-Benzothiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol (composé 69 du tableau)**

57

### 9.1 (2-Bromo-6-fluorophényl)méthanol

20,0 g (0,098 mole) de 2-bromo-6-fluorobenzaldéhyde sont mis en solution dans 500 ml de méthanol et refroidis au bain de glace; puis on y ajoute par portions 3,72 g (0,098 mole) de borohydrure de sodium. Le mélange est agité à froid pendant 1 heure puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et le dichlorométhane, la phase organique est séparée, séchée et concentrée sous pression réduite. Le résidu est cristallisé dans le pentane. On obtient 18,1 g de composé.

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 2,15 (t, 1H) ; 4,95 (d, 2H) ; de 7,05 à 7,3 (m, 2H) ; 7,45 (d, 1H).

### 9.2 (2-Bromo-6-fluorobenzoyloxy)*tert*-butyldiméthylsilane

Dans un ballon de 500 ml, on dissout 15,7g (0,076 mole) du composé obtenu précédemment dans 230 ml de THF et ajoute 7,8 g (0,115 mole) d'imidazole puis 13,8g (0,092 mole) de chlorure de *tert*-butyldiméthylsilane et agite le mélange réactionnel pendant 16 heures. Puis on évapore le solvant sous pression réduite, reprend le résidu entre l'eau et l'éther diéthylique, décante, lave la phase organique à l'eau et la sèche sur sulfate de sodium. Après évaporation du solvant, on recueille 25 g d'huile.

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0,0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; de 6,8 à 7,05 (m, 2H) ; 7,25 (d, 1H).

### 9.3 5-[2-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-3-fluorophényl]pyridin-2-ylamine

6,4 g du composé obtenu en 9.2, 4,40 g de 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine, 30 ml d'une solution 2M de carbonate de sodium et 816 mg de [1,1'-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium sont dissous dans 80 ml de *N,N*-diméthylformamide et placés dans un ballon sous courant d'argon. Le mélange est chauffé 2h à 80°C. Après refroidissement à température ambiante, on évapore les solvants sous pression réduite et reprend le résidu entre l'eau et l'acétate d'éthyle et élimine un insoluble par filtration sur célite. La phase organique est décantée, lavée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et séchée sur sulfate de sodium. Le composé est purifié par chromatographie en éluant avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol. On obtient 4,58 g d'huile.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; de 7,05 à 7,15 (m, 2H) ; de 7,3 à 7,4 (m, 1H) ; de 7,45 à 7,5 (m, 1H) ; 8,0 (d, 1H).

M+H = 333

58

**9.4 2-{6-[2-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-3-fluorophényl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl}benzothiazole**

58 mg (0,7 mmole) de bicarbonate de sodium sont pesés dans un tube à microondes. On y ajoute 83 mg (0,25 mmole) du composé obtenu en 9.3 en solution dans 2 ml de propan-1-ol, puis 0,375 mmole de 1-(benzothiazol-2-yl)-2-bromoéthanone en solution dans 1 ml de propan-1-ol. Le tube est scellé puis agité à 80°C pendant 16 heures. Le mélange réactionnel est refroidi à température ambiante, on y ajoute 200 mg de propanethiol sur silice (Biotage Si-Thiol) et le mélange est agité 6h à température ambiante, puis filtré et le filtrat est évaporé sous pression réduite. Le composé est utilisé tel quel pour l'étape suivante.

**9.5 [2-(2-Benzothiazol-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol**

Le composé brut obtenu en 9.4 est dissous dans 5 ml de THF contenant 0,5 mmole de fluorure de tétrabutylammonium hydraté. Le mélange est agité 16h à température ambiante, puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le composé est purifié par chromatographie. On obtient 37,5 mg de composé.

RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,35 (m, 2H) ; de 7,45 à 7,5 (m, 2H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H). M+H = 376.

**Exemple 10 : [2,6-Difluoro-3-(3-méthyl-2-thién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol (composé 75 du tableau)**

**10.1 (3-bromo-2,6-difluorophényl)méthanol**

20 g de 3-bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde sont mis en solution dans 450 ml de méthanol et refroidi au bain de glace; puis on y ajoute par portions 3,42 g de borohydrure de sodium. Le mélange est agité à température ambiante pendant 1 heure puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et le dichlorométhane, la phase organique est séparée, séchée et concentrée sous pression réduite. Le résidu est cristallisé dans le n-pentane. On obtient 14,6 g de composé.

Spectre RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 2,0 (s, 1H) ; 4,9 (s, 2H) ; de 6,85 à 7,0 (m, 1H) ; de 7,5 à 7,65 (m, 1H).

**10.2 (3-Bromo-2,6-difluorobenzyloxy)*tert*-butyldiméthylsilane**

11,15 g du composé obtenu en 10.1 sont dissous dans 150 ml de THF, on ajoute 5,1 g d'imidazole puis 9,04 g de chlorure de *tert*-butyldiméthylsilane et agite le mélange à

température ambiante pendant 24 heures. Puis on évapore le solvant, reprend le résidu et l'eau et l'éther diéthylique, décante, lave la phase organique à l'eau et la sèche sur sulfate de sodium. On évapore le solvant sous pression réduite. On obtient 17,5 g d'huile.

Spectre RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0,0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,65 (s, 2H) ; de 6,65 à 6,7 (m, 1H) ; de 7,3 à 7,4 (m, 1H).

### 10.3 5-[3-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-2,4-difluorophényl]pyridin-2-ylamine

6,7 g du composé obtenu en 10.2, 4,40 g de 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine, 30 ml d'une solution 2M de carbonate de sodium et 816 mg de [1,1'-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium sont dissous dans 80 ml de *N,N*-diméthylformamide et placés dans un ballon sous courant d'argon. Le mélange est chauffé 2h à 80°C. Après refroidissement à température ambiante, on évapore les solvants sous pression réduite et reprend le résidu entre l'eau et l'acétate d'éthyle et élimine un insoluble par filtration sur célite. La phase organique est décantée, lavée avec une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium et séchée sur sulfate de sodium. Le composé est purifié par chromatographie en éluant avec un mélange de dichlorométhane et de méthanol. On obtient 4,25 g de solide blanc.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,4 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; 7,05 (t, 1H) ; de 7,35 à 7,45 (m, 2H) ; 8,0 (s, 1H). M+H = 351.

### 10.4 6-[3-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-2,4-difluorophényl]-3-méthyl-2-thiën-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridine

58,8 mg (0,7 mmole) de bicarbonate de sodium sont pesés dans un tube à microondes. On y ajoute 83 mg (0,25 mmole) du composé obtenu en 10.3 en solution dans 2 ml de propan-1-ol, puis 0,375 mmole de 2-bromo-1-(thiën-2-yl)propan-1-one en solution dans 1 ml de propan-1-ol. Le tube est scellé puis irradié pendant 10 mn à 180°C. Le mélange réactionnel est refroidi à température ambiante, on y ajoute 200 mg de propanethiol sur silice (Biotage Si-Thiol) et le mélange est agité 6h à température ambiante, puis filtré. Le résidu est lavé par 2 fois 2 ml de propan-1-ol, puis le filtrat est évaporé. Le composé est utilisé tel quel pour l'étape suivante.

### 10.5 [2,6-Difluoro-3-[3-méthyl-2-(thiën-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol

60

Le composé brut obtenu en 10.4 est dissous dans 5 ml de THF contenant 0,5 mmole de fluorure de tétrabutylammonium hydraté. Le mélange est agité 16h à température ambiante, puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le composé est purifié par chromatographie. On obtient 21,2 mg de composé.

- 5 RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 2,75 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,2 (d, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (s, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 2H) ; 8,45 (s, 1H). M+H = 357.

**Exemple 11 : 2-[3-(2-Benzo[d]isoxazol-3-ylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol (composé 100 du tableau)**

**11.1 [1-(3-Bromophényl)-1-(méthyl)éthyl]oxytriméthylsilane**

- On place dans un ballon 3,4 g du composé préparé selon 7.1 dans 80 ml de dichlorométhane à 0°C. On ajoute 5,6 ml de triéthylamine et 4,5 ml de chlorure de triméthylsilane. Le mélange est agité une heure à 0°C et 20h à température ambiante. On ajoute 50 ml d'eau et
- 15 le mélange est extrait avec 30 ml de dichlorométhane. La phase organique est lavée avec 20 ml d'une solution saturée en chlorure de sodium, séchée sur sulfate de magnésium puis concentrée sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 2,5 g de composé.

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 9H) ; 1,45 (s, 6H) ; 7,15 à 7,25 (m, 3H) ; 7,45 (m, 1H).

20

**11.2 5-[3-[1-Méthyl-1-(triméthylsilanyloxy)éthyl]phényl]pyridin-2-ylamine**

- 0,74 g de composé obtenu en 11.1 sont placés dans 10 ml de tétrahydrofurane et 2 ml d'eau et dégazés sous courant d'argon pendant 10 mn. On y ajoute 0,6 g de 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ylamine, 180 mg de [1,1'-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium et 1,8 g de carbonate de césium et on
- 25 chauffe à 80°C pendant 4 heures. Après refroidissement, le mélange réactionnel est concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 560 mg de composé.

- RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 9H) ; 1,5 (s, 6H) ; 4,35 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; 7,25 (m, 3H) ; 7,5 (m, 1H) ; 7,55 (m, 1H) ; 8,2 (s, 1H). M+H = 302.
- 30

**11.3 N-Méthoxy-N-méthylbenzo[d]isoxazole-3-carboxamide**

On place dans un ballon 1,0 g d'acide benzo[d]isoxazole-3-carboxylique, 0,7 g de chlorhydrate de N,O-diméthylhydroxylamine, 2,3 g de chlorhydrate de 1-(3-

61

diméthylaminopropyl-3-éthylcarbodiimide) et 1 ml de pyridine dans 40 ml de tétrahydrofurane. Le mélange est agité à température ambiante pendant 20h. On concentre, le résidu est repris dans 40 ml d'acétate d'éthyle et 20 ml d'eau. La phase organique est lavée avec 20 ml d'une solution 1N d'hydroxyde de sodium, 20 ml d'une solution saturée en chlorure de sodium, séchée sur sulfate de magnésium puis concentrée sous pression réduite. On obtient 1,1 g de composé.

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 3,4 (s, 3H) ; 3,8 (s, 3H) ; de 7,25 à 7,55 (m, 3H) ; 7,95 (d, 1H). M+H = 207.

#### 10 11.4 1-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)éthanone

On place dans un ballon 1,1 g du composé obtenu en 11.3 dans 50 ml de tétrahydrofurane à 0°C et sous argon. On ajoute goutte à goutte 5 ml de bromure de méthylmagnésium (3M dans l'éther éthylique) . Le mélange est agité deux heures à 0°C et 20h à température ambiante. On refroidit à 0°C et on ajoute 25 ml d'eau et 10 ml d'une solution saturée en chlorure d'ammonium. Le mélange est extrait avec 30 ml d'acétate d'éthyle. La phase organique est lavée avec 40 ml d'une solution saturée en chlorure de sodium, séchée sur sulfate de magnésium puis concentrée sous pression réduite. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant par un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 0,6 g de composé.

20 RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 2,8 (s, 3H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H). M+H = 162.

#### 11.5 1-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)-2-bromoéthanone

On place dans un ballon 1,7 g de bromure de cuivre dans 75 ml d'acétate d'éthyle et on chauffe à reflux. On ajoute 0,6 g de composé obtenu en 11.4. Le mélange est agité 4 heures à reflux. On filtre sur papier puis on verse sur 100 ml d'une solution à 20% de thiosulfate de sodium. Le mélange est extrait avec 50 ml d'acétate d'éthyle. La phase organique est lavée avec 40 ml d'une solution saturée en chlorure de sodium, séchée sur sulfate de magnésium puis concentrée sous pression réduite. On obtient 0,7 g de composé.

30 RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 4,75 (s, 2H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H).

#### 11.6 2-[3-(2-Benzo[d]isoxazol-3-ylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol

On place dans un ballon 0,22 g de composé obtenu en 11.2 et 0,17 g de composé obtenu en 11.5 dans 7 ml d'éthanol. On ajoute 61 mg d'hydrogénocarbonate de sodium et on chauffe à

62

reflux pendant 20h. Après refroidissement, le mélange réactionnel est concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange heptane/acétate d'éthyle. On obtient 210 mg de composé.

RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 1,55 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,55 (m, 3H) ;  
5 7,75 (m, 2H) ; 7,85 (m, 3H) ; 8,55 (d, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).

### Exemple 12 : procédé de préparation des composés 102 à 111

#### 12.1

0,495 mmole d'acétate de palladium, et 0,99 mmole de S-Phos sont pesés dans un  
10 ballon de 100 ml purgé à l'argon. On y ajoute 55 ml de toluène dégazé et on agite le mélange dans un bain à ultrasons jusqu'à dissolution complète.

#### 12.2.

0,3 mmole d'acide hétéroarylboronique est pesée dans un tube à réaction, on y ajoute successivement 0,36 mmole de phosphate de potassium finement pulvérisé et séché,  
15 0,5 ml d'éthanol anhydre dégazé, 0,18 mmole du composé obtenu en 7.2 en solution dans 2 ml de toluène puis le tube est purgé à l'argon. On ajoute ensuite 1 ml de la solution préparée en 12.1. Le tube est fermé et agité 16h à 75°C. On rajoute 0,5 ml de solution préparée en 12.2.1 et prolonge le chauffage pendant 10h. La solution refroidie est diluée par 5 ml d'acétate d'éthyle, on y ajoute 100 mg de silice-propanethiol (Biotage Si-Thiol) et le  
20 mélange est agité 4h à température ambiante. Le solide est séparé par filtration et lavé par 2x2 ml de THF. Le filtrat est évaporé à sec et le composé est soumis à purification par chromatographie.

### Exemple 13 : préparation des composés 112 à 125

#### 25 13.1 6-[2-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-3-fluorophényl]-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine

On dégaze sous courant d'argon 100 ml d'un mélange 85/15 de THF et d'eau puis ajoute 5,3 g du composé préparé en 9.2, 6,07 g de 2-chloro-6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,2,3-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine obtenu tel qu'en 4.2, 18,6 g de carbonate de  
30 césium et 466 mg de [1,1'-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium. On agite le mélange 2 heures dans un bain thermostaté à 80°C. Après refroidissement à température ambiante, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et l'éther diéthylique. On élimine un solide par filtration. La phase organique lavée par 2 fois avec une solution saturée de chlorure de sodium est ensuite séchée sur sulfate de sodium et

63

concentrée sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol. Le solide obtenu est trituré au pentane, recueilli par filtration, puis séché à l'étuve sous pression réduite. On obtient 4,74 g de composé. RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,05 à 7,1 (m, 2H) ; de 7,25 à 7,3 (m, 2H) ; 7,4 (s, 1H) ; 7,45 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H). M+H = 391.

### 13.2 Procédé de préparation des composés 112 à 125

#### 13.2.1

0,3 mmole d'acide hétéroarylboronique est pesée dans un tube à réaction, on y ajoute successivement 0,36 mmole de phosphate de potassium finement pulvérisé et séché, 0,5 ml d'éthanol anhydre dégazé, 0,18 mmole du composé obtenu en 13.1 en solution dans 2 ml de toluène puis le tube est purgé à l'argon. On ajoute ensuite 1 ml de la solution préparée en 12.1. Le tube est fermé et agité 16h à 75°C. On rajoute 0,5 ml de solution préparée en 12.2.1 et prolonge le chauffage pendant 10h. La solution refroidie est diluée par 5 ml d'acétate d'éthyle, on y ajoute 100 mg de silice-propanethiol (Biotage Si-Thiol) et le mélange est agité 4h à température ambiante. Le solide est séparé par filtration et lavé par 2x2 ml de THF. Le filtrat est évaporé à sec et le résidu est utilisé tel quel pour l'étape suivante.

#### 13.2.2

Dans un tube à réaction, on mélange le composé obtenu en 13.2.1, 0,36 mmole de fluorure de césium en solution dans 3 ml de méthanol et 21 µl d'acide acétique. La solution est agitée 16 heures à température ambiante, les solvants sont ensuite évaporés. Le résidu est purifié par HPLC en éluant avec un mélange acétonitrile/eau.

### 25 Exemple 14 : préparation des composés 126 à 137

#### 14.1 6-[3-(*tert*-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-2,4-difluorophényle]-2-chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine

On dégaze sous courant d'argon 100 ml d'un mélange 85/15 de THF et d'eau puis ajoute 5,3 g du composé préparé en 10.2, 6,07 g de 2-chloro-6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,2,3-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine obtenu tel qu'en 4.2, 18,6 g de carbonate de césium et 466 mg de [1,1'-bis(diphénylphosphino)ferrocène]dichloropalladium. On agite le mélange 2 heures dans un bain thermostaté à 80°C. Après refroidissement à température ambiante, les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu est repris entre l'eau et l'éther diéthylique. On élimine un solide par filtration. La phase organique lavée par 2 fois

avec une solution saturée de chlorure de sodium est ensuite séchée sur sulfate de sodium et concentrée sous pression réduite. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange dichlorométhane/méthanol. Le solide obtenu est trituré au pentane, recueilli par filtration, puis séché à l'étuve sous pression réduite. On obtient 4,74 g de composé. RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 0,0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; 7,15 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 2H) ; 8,0 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H). M+H = 409.

## 14.2 Préparation des composés 126 à 137

### 14.2.1

En procédant comme décrit en 13.2.1, et en partant de 0,3 mmole d'acide hétéroarylboronique et de 0,18 mmole du composé préparé en 14.1 on obtient le composé brut utilisé ten quel pour l'étape suivante.

### 14.2.2

En procédant comme décrit en 13.2.2, et en partant du composé obtenu en 14.2.1, on obtient le composé attendu qui est purifié par HPLC en éluant avec un mélange acétonitrile/eau.


Le tableau 2 ci-après illustre les structures chimiques de formule générale (I) ; le tableau 3 ci-après illustre les caractéristiques physicochimiques de quelques exemples de composés selon l'invention. Dans ces tableaux :

- la colonne « Pos. » renseigne sur la position de substitution du groupe  sur le noyau phényle ;
- dans la colonne « Sel/base », « - » représente un composé sous forme de base libre, alors que « HCl » ou « oxalate » représente respectivement un composé sous forme de chlorhydrate ou d'oxalate et le rapport entre parenthèses est le rapport (acide:base) ;
  - Dans le tableau 3 ,la colonne « PF » renseigne les points de fusion des produits en degrés Celsius (°C) ou, lorsque les produits ont été isolés sous la forme de solide amorphe ou d'huile, ils sont caractérisés par leur masse [M+H] ;
  - « Ph » signifie phényle ; « Cl » signifie chlore ; « F » signifie fluor ; « Me » signifie méthyle ; « MeO » signifie méthoxy ; « (F<sub>2</sub>CH)O » signifie difluorométhoxy ; « *t*-Bu » signifie *tert*-butyle ;

65










- dans la colonne R, le chiffre devant le substituant renseigne la position de substitution du groupe R sur le noyau phényle ;
  - dans la colonne X, le chiffre devant le substituant renseigne la position de substitution du groupe X sur le noyau imidazo[1,2-a]pyridine ;
- 5 - N.D. signifie non déterminé ;

Tableau 2













| Ex | R <sub>1</sub> | Pos. | R <sub>2</sub> | R <sub>3</sub> | R <sub>4</sub> | X | R | sel       |
|----|----------------|------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------|
| 1  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | -         |
| 2  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | HCl (2:1) |
| 3  |                | 3    | H              | H              | t-Bu           | H | H | HCl (1:1) |
| 4  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | -         |
| 5  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | HCl (2:1) |
| 6  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | HCl (1:1) |
| 7  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | HCl (2:1) |












66

|    |                                                                                     |   |   |   |              |   |   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|---|---|-----------|
| 8  |    | 3 | H | H | H            | H | H | HCl (1:1) |
| 9  |    | 3 | H | H | H            | H | H | HCl (1:1) |
| 10 |    | 3 | H | H | <i>t</i> -Bu | H | H | -         |
| 11 |  | 3 | H | H | H            | H | H | HCl (1:1) |
| 12 |  | 2 | H | H | H            | H | H | HCl (1:1) |
| 13 |  | 3 | H | H | H            | H | H | -         |
| 14 |  | 3 | H | H | H            | H | H | HCl (1:1) |
| 15 |  | 3 | H | H | H            | H | H | HCl (2:1) |
| 16 |  | 3 | H | H | H            | H | H | HCl (1:1) |
| 17 |  | 3 | H | H | H            | H | H | HCl (2:1) |












67

|    |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 18 |    | 3 | H | H | H | H | H | HCl (1:1) |
| 19 |    | 3 | H | H | H | H | H | HCl (2:1) |
| 20 |    | 3 | H | H | H | H | H | HCl (2:1) |
| 21 |   | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 22 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 23 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 24 |  | 4 | H | H | H | H | H | -         |
| 25 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 26 |  | 4 | H | H | H | H | H | -         |
| 27 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |












68












|    |                                                                                     |   |   |   |                                                  |   |      |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|---|------|---------------|
| 28 |    | 3 | H | H | (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> | H | H    | -             |
| 29 |    | 3 | H | H | (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> | H | H    | Oxalate (1:1) |
| 30 |    | 3 | H | H | H                                                | H | H    | -             |
| 31 |    | 3 | H | H | H                                                | H | 3-Me | HCl (1:1)     |
| 32 |   | 3 | H | H | H                                                | H | 3-Me | HCl (1:1)     |
| 33 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 34 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 35 |  | 2 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 36 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 37 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 38 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |













69

|    |                                                                                     |   |    |    |   |     |      |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|-----|------|------------|
| 39 |    | 3 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1 :1) |
| 40 |    | 3 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1 :1) |
| 41 |    | 2 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1 :1) |
| 42 |   | 3 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1 :1) |
| 43 |  | 2 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1 :1) |
| 44 |  | 3 | H  | H  | H | H   | H    | -          |
| 45 |  | 3 | H  | H  | H | H   | H    | -          |
| 46 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F | H    | -          |
| 47 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H    | -          |
| 48 |  | 3 | Me | Me | H | H   | 3-Me | -          |
| 49 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H    | -          |











70

|    |                                                                                     |   |    |    |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|
| 50 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 51 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 52 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 53 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 54 |   | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 55 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 56 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 57 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 58 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 59 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 60 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |











|    |                                                                                     |   |    |    |   |         |   |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|---------|---|------------|
| 61 |    | 3 | Me | Me | H | H       | H | -          |
| 62 |    | 3 | Me | Me | H | H       | H | -          |
| 63 |    | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | HCl (1 :1) |
| 64 |   | 3 | Me | Me | H | H       | H | HCl (1 :1) |
| 65 |  | 2 | H  | H  | H | 2,4-diF | H | HCl (1 :1) |
| 66 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -          |
| 67 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -          |
| 68 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -          |
| 69 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -          |
| 70 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -          |
| 71 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -          |

|    |                                                                                     |   |   |   |   |         |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|------|---|
| 72 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H    | - |
| 73 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H    | - |
| 74 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H    | - |
| 75 |    | 3 | H | H | H | 2,4-diF | 3-Me | - |
| 76 |   | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 77 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 78 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 79 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 80 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 81 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 82 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 83 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |










73

|    |                                                                                     |   |    |    |    |         |      |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|---------|------|------------|
| 84 |    | 3 | H  | H  | Me | H       | H    | HCl (1 :1) |
| 85 |    | 3 | H  | H  | Me | H       | H    | HCl (1 :1) |
| 86 |    | 3 | Me | Me | H  | H       | H    | -          |
| 87 |   | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | 3-Me | -          |
| 88 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -          |
| 89 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -          |
| 90 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -          |
| 91 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -          |
| 92 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -          |
| 93 |  | 3 | H  | H  | H  | 2,4-diF | H    | -          |











74

|     |                                                                                     |   |    |    |                                                  |         |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|--------------------------------------------------|---------|---|---|
| 94  |    | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 95  |    | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 96  |    | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 97  |   | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 98  |  | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 99  |  | 3 | H  | H  | (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> | H       | H | - |
| 100 |  | 3 | Me | Me | H                                                | H       | H | - |
| 101 |  | 2 | H  | H  | H                                                | 3-F     | H | - |
| 102 |  | 3 | Me | Me | H                                                | H       | H | - |
| 103 |  | 3 | Me | Me | H                                                | H       | H | - |










75

|     |                                                                                     |   |    |    |   |     |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|-----|---|---|
| 104 |    | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 105 |    | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 106 |    | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 107 |   | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 108 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 109 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 110 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 111 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 112 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F | H | - |

76

|     |                                                                                     |   |   |   |   |     |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|
| 113 |    | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 114 |    | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 115 |    | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 116 |    | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 117 |   | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 118 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 119 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 120 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 121 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 122 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |

77

|     |                                                                                     |   |   |   |   |         |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 123 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H | - |
| 124 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H | - |
| 125 |   | 2 | H | H | H | 3-F     | H | - |
| 126 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 127 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 128 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 129 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 130 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 131 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |

78







|     |                                                                                     |   |   |   |   |         |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 132 |    | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 133 |    | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 134 |    | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 135 |   | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 136 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 137 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |

Tableau 3

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 176-178       | 2,8 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; de 7,6 à 7,75 (m, 4H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H). |

79

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 325-330       | 4,6 (s, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (m, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,85 (m, 2H) ; 8,55 (d, 2H) ; 8,85 (d, 2H) ; 9,05 (m, 2H).                                                                             |
| 3  | 220-222       | 1,3 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 2H) ; de 7,85 à 8,0 (m, 2H) ; 8,05 (d, 1H) ; de 8,75 à 8,90 (m, 3H) ; 9,15 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H).                                 |
| 4  | 201-203       | 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; de 7,55 à 7,75 (m, 4H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H).                                                                    |
| 5  | 279-281       | 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (m, 2H) ; 7,95 (m, 1H) ; 8,0 (m, 1H) ; 8,1 (m, 1H) ; 8,2 (m, 2H) ; 8,95 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 9,6 (s, 1H).                     |
| 6  | 264-266       | 4,65 (s, 2H) ; 6,15 (s, 2H) ; 7,15 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; 7,7 (m, 2H) ; 7,75 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H).                                  |
| 7  | 260-265       | 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; de 7,85 à 8,0 (m, 2H) ; 8,05 (m, 1H) ; de 8,75 à 8,9 (m, 3H) ; 9,2 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H).                                           |
| 8  | 270-272       | 4,65 (s, 2H) ; 6,6 (s, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; de 7,75 à 7,85 (m, 2H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 11,5 (s, 1H). |
| 9  | 340-345       | 2,55 (m, 2H) ; 3,0 (t, 2H) ; 4,65 (s, 2H) ; 7,05 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75(s, 1H) ; de 7,8 à 7,9 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H).           |
| 10 | 277-279       | 1,3 (s, 9H) ; de 3,25 à 3,35 (m, 2H) ; 4,5 (s, 2H) ; 4,9 (t, 2H) ; de 7,3 à 7,4 (m, 2H) ; 7,5 (t, 1H) ; de 7,55 à 7,70 (m, 4H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H).                                     |
| 11 | 340-345       | 4,65 (s, 2H) ; 7,35 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; de 7,9 à 8,0 (m, 2H) ; 8,15(d, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 12,0 (s, 1H).                      |

80

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 205-208       | 4,45 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; de 7,9 à 8,0 (m, 3H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                   |
| 13 | 239-240       | 3,3 (m, 2H) ; 4,6 (d, 2H) ; 4,8 (t, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; de 7,35 à 7,45 (m, 2H) ; 7,5 (t, 1H) ; de 7,55 à 7,7 (m, 4H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H).                                           |
| 14 | 232-236       | 4,65 (s, 2H) ; 7,25 (d, 1H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                           |
| 15 | 280-285       | 3,2 (s, 6H) ; 4,6 (s, 2H) ; 7,15 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,15 (m, 1H) ; 8,35 (m, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H) ; 9,20 (s, 1H).                |
| 16 | 285-290       | 4,65 (s, 2H) ; 6,9 (m, 1H) ; 7,35 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 4H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,9 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H) ; 11,65 (s, 1H).                  |
| 17 | 375-380       | 4,65 (s, 2H) ; 7,15 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,9 (d, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,35 (m, 2H) ; 8,5 (m, 1H) ; 8,6 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H).                |
| 18 | 250-254       | 4,65 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; 7,25 (m, 2H) ; de 7,4 à 7,6 (m, 3H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,6 (s, 1H) ; 9,35 (s, 1H) ; 12,15 (s, 1H).                                   |
| 19 | 340-345       | 4,6 (s, 2H) ; 7,05 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (s, 1H) ; 7,8 (m, 2H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,55 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                               |
| 20 | 380-385       | 4,65 (s, 2H) ; 6,65 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (s, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,3 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; 9,3 (s, 1H) ; 12,05 (s, 1H). |
| 21 | 285-287       | 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; de 7,3 à 7,75 (m, 10H) ; 7,95 (m, 2H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (t, 1H).                                                                                                            |
| 22 | 144-146       | 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; de 7,15 à 7,75 (m, 11H) ; 8,40 (s, 1H) ; 8,9 (t, 1H).                                                                                                                          |

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 150-152       | 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,75 (m, 9H) ; 8,2 (m, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,9 (t, 1H).                                                                                                       |
| 24 | 178-180       | 4,55 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; de 7,3 à 7,5 (m, 4H) ; de 7,55 à 7,75 (m, 5H) ; 8,2 (m, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,9 (m, 1H).                                                                                |
| 25 | 208-210       | 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,4 (m, 2H) ; 7,45 (t, 1H) ; de 7,5 à 7,7 (m, 4H) ; 7,85 (t, 1H) ; 8,1 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,6 (m, 1H) ; 8,9 (m, 1H).                                                    |
| 26 | 226-228       | 4,55 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; 7,3 (m, 1H) ; 7,4 (m, 2H) ; 7,7 (m, 4H) ; 7,85 (t, 1H) ; 8,1 (d, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,6 (m, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                                      |
| 27 | 162-164       | 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; 7,1 (m, 1H) ; de 7,25 à 7,65 (m, 8H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,85 (t, 1H).                                                                                                                    |
| 28 | 81-83         | 3,25 (s, 3H) ; 3,55 (m, 4H) ; 4,55 (s, 2H) ; de 7,2 à 7,4 (m, 4H) ; 7,5 (t, 1H) ; de 7,68 à 7,75 (m, 6H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,95 (t, 1H).                                                                              |
| 29 | 126-128       | 3,25 (s, 3H) ; 3,55 (m, 4H) ; 4,55 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; de 7,3 à 7,7 (m, 8H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,85 (t, 1H).                                                                                                       |
| 30 | 173-175       | 4,6 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; 7,3 (d, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; de 7,5 à 7,65 (m, 6H) ; 7,9 (m, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,85 (t, 1H).                                                                                         |
| 31 | 279-283       | 2,85 (s, 3H) ; 4,65 (s, 2H) ; 7,35 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,8 (m, 2H) ; 8,9 (m, 1H) ; 8,95 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                   |
| 32 | 255-258       | 3,75 (s, 3H) ; 4,65 (s, 2H) ; 7,2 (t, 1H) ; 7,3 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; de 7,55 à 7,65 (m, 2H) ; de 7,75 à 7,9 (m, 3H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 9,0 (s, 1H) ; 11,95 (s, 1H) ; 14,55 (m, 1H). |
| 33 | 251-254       | 4,65 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,75 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H) ; 11,6 (s, 1H).                       |

82

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 204-208       | 1,4 (t, 3H) ; 4,45 (q, 2H) , 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55(t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ;8,05 (d, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 9,25 (s, 2H).                    |
| 35 | 290-294       | 4,5 (s, 2H) ; 7,4 à 7,55 (m, 3H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,8 (t, 1H) ; 7,95 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,2 (m, 2H) ; 9,0 (m, 2H) ; 9,2 (s, 1H) ; 9,65 (s, 1H).                                              |
| 36 | 244-248       | 4,6 (s, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,9 (d, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,05 (m, 1H) ; 8,15 (s, 1H) ; 8,55 (d, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                    |
| 37 | 220-224       | 4,6 (s, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,45 à 7,65 (m, 4H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,8 (m, 2H) ; 8,1 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                           |
| 38 | 261-263       | 4,65 (s, 2H) ; 7,4 à 7,5 (m, 3H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,9 (d, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,05 à 8,15 (m, 3H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,1 (s, 1H).                                    |
| 39 | 277-279       | 4,6 (s, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ;7,65 (d, 1H) ; 7,7 (s, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; 7,95 (m, 2H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H).        |
| 40 | 285-288       | 4,55 (s, 2H) ; 7,35 (d, 1H) ; 7,45 (m, 2H) ; 7,55 (m, 1H) ;7,6 (d, 1H) ; 7,7 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,15 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H).                    |
| 41 | 310-315       | 4,5 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; 7,4 à 7,55 (m, 4H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,95 (m, 2H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                          |
| 42 | 270-271       | 3,35 (t, 2H) ; de4,6 à 4,7 (m, 4H) ; 7,0 (d, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; 7,95 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,6 (s, 1H) ; 8,2 (s, 1H). |
| 43 | 310-315       | 4,5 (s, 2H) ; 6,6 (s, 1H) ; 7,4 à 7,55 (m, 4H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,0 (m, 2H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                            |

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                                                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 181-183       | 4,65 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,1 (s, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,65 (m, 1H) ; 7,75 (m, 4H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                       |
| 45 | 178-180       | 4,65 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,2 (s, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (m, 4H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                                                  |
| 46 | 277-279       | 2,5 (s, 3H) ; 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 6,75 (s, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                                                                   |
| 47 | 203-204       | 1,55 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 6,45 (s, 1H) ; de 7,4 à 7,75 (m, 8H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                                                       |
| 48 | [349]         | 1,5 (s, 6H) ; 2,8 (s, 3H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,2 (d, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,55 (d, 2H) ; de 7,6 à 7,7 (m, 4H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,55 (s, 1H).                                                                          |
| 49 | [335]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; de 7,5 à 7,55 (m, 2H) ; de 7,6 à 7,7 (m, 4H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                                                                  |
| 50 | [330]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; de 7,3 à 7,35 (m, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,9 (t, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,65 (d, 1H) ; 9,0 (s, 1H). |
| 51 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,15 (d, 1H) ; de 7,4 à 7,45 (m, 2H) ; de 7,5 à 7,55 (m, 2H) ; de 7,6 à 7,65 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                                                       |
| 52 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,25 à 7,4 (m, 3H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 4H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                              |
| 53 | [335]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,15 (d, 1H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 4H) ; de 7,6 à 7,65 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                                               |
| 54 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; de 7,4 à 7,45 (m, 3H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 3H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,2 (m, 1H) ; 8,55 (s, 2H) ; 8,98 (s, 1H).                                                |

84

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                                                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | [386]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 2H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 3H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H).                                           |
| 56 | [385]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,35 à 7,45 (m, 3H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; de 7,85 à 7,9 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                   |
| 57 | [383]         | 1,5 (s, 6H) ; 4,35 (s, 3H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,25 à 7,35 (m, 2H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 3H) ; 7,8 (d, 1H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H), 9,05 (s, 1H).                  |
| 58 | [371]         | 1,5 (s, 6H) ; de 3,2 à 3,3 (m, 2H) ; de 4,55 à 4,6 (m, 2H) ; 5,1 (s, 1H) ; 6,85 (d, 1H) ; de 7,4 à 7,55 (m, 4H) ; 7,6 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).            |
| 59 | [319]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 6,6 (d, 1H) ; 6,85 (d, 1H) ; 7,4 (t, 1H) ; de 7,45 à 7,55 (m, 2H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                                           |
| 60 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,05 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,6 à 7,7 (d, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,0 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H). |
| 61 | [385]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,45 à 7,5 (m, 2H) ; de 7,55 à 7,6 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; de 7,8 à 7,85 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).          |
| 62 | [336]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; de 7,45 à 7,55 (m, 2H) ; de 7,65 à 7,7 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,9 (sd, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                              |
| 63 | 330-335       | 4,5 (s, 2H) ; 7,4 (m, 3H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,05 (m, 2H) ; 8,3 (d, 1H) ; 9,0 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 14,0 (s, 1H).                                                                                 |
| 64 | 190-195       | 1,55 (s, 6H) ; 7,4 (t, 1H) ; 7,6 (m, 4H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,25 (m, 2H) ; 9,05 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 14,0 (s, 1H)                                                                    |

85

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 350-355       | 4,65 (s, 2H) ; 7,35 (m, 2H) ; 7,55 (t, 1H) ; 7,75 (m, 2H) ; 8,05 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H) ; 9,05 (s, 1H) ; 9,1 (s, 1H) ; 13,9 (s, 1H).                                                          |
| 66 | [325]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,3 (m, 2H) ; de 7,4 à 7,5 (m, 2H) ; de 7,5 à 7,55 (m, 3H) ; 7,95 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                                |
| 67 | [320]         | 4,45 (s, 2H) ; 5,25 (s, 1H) ; de 7,25 à 7,35 (m, 3H) ; 7,45 (m, 2H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,9 (t, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                   |
| 68 | [325]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,15 (m, 1H) ; de 7,2 à 7,3 (m, 2H) ; de 7,4 à 7,5 (m, 2H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                   |
| 69 | [376]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,35 (m, 2H) ; de 7,45 à 7,5 (m, 2H) ; de 7,5 à 7,6 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                 |
| 70 | [375]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,4 (m, 4H) ; de 7,45 à 7,5 (m, 2H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).                              |
| 71 | [361]         | 3,25 (t, 2H) ; 4,45 (d, 2H) ; 4,55 (t, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 6,85 (d, 1H) ; 7,25 (m, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H). |
| 72 | [359]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,05 (s, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; de 7,4 à 7,5 (m, 2H) ; 7,65 (d, 2H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                      |
| 73 | [375]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; de 7,4 à 7,5 (m, 2H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,8 (d, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).         |
| 74 | [326]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 à 7,35 (m, 2H) ; de 7,45 à 7,55 (m, 2H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,95 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                        |
| 75 | [357]         | 2,75 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,2 (d, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (s, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,65 à 7,75 (m, 2H) ; 8,45 (s, 1H).                                     |

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | [343]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; de 7,55 à 7,65 (m, 4H) ; 7,95 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                                            |
| 77 | [338]         | 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,35 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,6 (m, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,9 (t, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,65 (d, 1H) ; 8,85 (s, 1H).           |
| 78 | [377]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,15 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; de 7,4 à 7,45 (m, 2H) ; de 7,55 à 7,65 (m, 2H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                                  |
| 79 | [377]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; de 7,2 à 7,3 (m, 2H) ; 7,35 (m, 2H) ; 7,5 (d, 1H) ; de 7,6 à 7,75 (m, 4H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                      |
| 80 | [343]         | 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 7,15 (d, 1H) ; 7,35 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; de 7,6 à 7,7 (m, 2H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                              |
| 81 | [377]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; de 7,4 à 7,5 (m, 3H) ; de 7,6 à 7,75 (m, 3H) ; 8,25 (m, 1H) ; 8,55 (d, 2H) ; 8,8 (s, 1H).                                                     |
| 82 | [394]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,65 (m, 1H) ; 7,8 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                          |
| 83 | [344]         | 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; de 7,25 à 7,3 (m, 2H) ; de 7,4 à 7,5 (m, 2H) ; de 7,5 à 7,55 (m, 3H) ; 7,95 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                            |
| 84 | 247-252       | 3,4 (s, 3H) ; 3,9 (s, 3H) ; 4,55 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; de 7,45 à 7,8 (m, 7H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,25 (m, 2H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H).                                                |
| 85 | 88-92         | 3,35 (s, 3H) ; 4,55 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; de 7,55 à 7,65 (m, 3H) ; 7,75 (m, 3H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H) ; 11,6 (s, 1H). |
| 86 | 205-208       | 1,5 (s, 6H) ; 2,5 (s, 3H) ; 5,1 (s, 1H) ; 6,7 (s, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,7 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                            |
| 87 | [339]         | 2,70 (s, 3H) ; 4,45 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,20 (m, 1H) ; 7,32 (m, 2H) ; 7,47 (m, 3H) ; 7,58 (m, 1H) ; 7,64 (d, 1H) ; 8,50 (s, 1H).                                                     |

87

| Ex | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | [359]         | 4,43 (d, 2H) ; 5,30 (t, 1H) ; 7,18 (s, 1H) ; 7,30 (m, 2H) ; 7,46 (m, 3H) ; 7,65 (d, 1H) ; 8,39 (s, 1H) ; 8,68 (s, 1H).                                                             |
| 89 | [359]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,30 (t, 1H) ; 7,32 (m, 5H) ; 7,48 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,70 (m, 2H) ; 8,47 (s, 1H) ; 8,72 (s, 1H).                                                             |
| 90 | [359]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,32 (t, 1H) ; 7,30 (m, 2H) ; 7,41 (m, 2H) ; 7,48 (m, 2H) ; 7,70 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,54 (m, 2H) ; 8,72 (s, 1H).                                              |
| 91 | [373]         | 4,35 (s, 3H) ; 4,47 (d, 2H) ; 5,31 (t, 1H) ; 7,28 (m, 4H) ; 7,49 (m, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,65 (dd 2H) ; 7,78 (d, 1H) ; 8,66 (s, 1H) ; 8,78 (s, 1H).                               |
| 92 | [309]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,30 (t, 1H) ; 6,63 (s, 1H) ; 6,88 (s, 1H) ; 7,29 (m, 2H) ; 7,47 (m, 2H) ; 7,62 (d, 1H) ; 7,78 (s, 1H) ; 8,23 (s, 1H) ; 8,69 (s, 1H).                               |
| 93 | [393]         | 4,61 (d, 2H) ; 5,34 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,40 (m, 2H) ; 7,48 (d, 1H) ; 7,65 (m, 1H) ; 7,72 (d, 1H) ; 7,88 (d, 1H) ; 7,91 (s, 1H) ; 8,00 (d, 1H) ; 8,52 (s, 1H) ; 8,81 (s, 1H). |
| 94 | [391]         | 4,35 (s, 3H) ; 4,62 (d, 2H) ; 5,32 (t, 1H) ; 7,29 (m, 3H) ; 7,53 (d, 1H) ; 7,67 (m, 3H) ; 7,82 (d, 1H) ; 8,70 (s, 1H) ; 8,94 (s, 1H).                                              |
| 95 | [379]         | 3,25 (t, 2H) ; 4,58 (m, 4H) ; 5,34 (t, 1H) ; 6,83 (d, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,40 (d, 1H) ; 7,62 (m, 2H) ; 7,74 (d, 1H) ; 7,86 (s, 1H) ; 8,30 (s, 1H) ; 8,74 (s, 1H).                |
| 96 | [327]         | 4,60 (d, 2H) ; 5,33 (t, 1H) ; 6,62 (s, 1H) ; 6,88 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,42 (d, 1H) ; 7,63 (m, 2H) ; 7,79 (s, 1H) ; 8,24 (s, 1H) ; 8,80 (s, 1H).                               |
| 97 | [377]         | 4,62 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,05 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,41 (d, 1H) ; 7,68 (m, 3H) ; 7,97 (d, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,30 (s, 1H) ; 8,47 (s, 1H) ; 8,78 (s, 1H).                |
| 98 | [393]         | 4,61 (d, 2H) ; 5,34 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,43 (d, 1H) ; 7,57 (d, 1H) ; 7,64 (m, 1H) ; 7,72 (d, 1H) ; 7,81 (d, 1H) ; 7,99 (d, 1H) ; 8,08 (d, 1H) ; 8,52 (d, 2H) ; 8,79 (s, 1H). |

88

| Ex  | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 67-70         | 3,3 (s, 3H) ; 3,55 (m, 2H) ; 3,65 (m, 2H) ; 4,6 (s, 2H) ; 6,45 (m, 1H) ; 7,4 (m, 2H) ; 7,5 (t, 1H) ; de 7,55 à 7,7 (m, 6H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H) ; 11,15 (s, 1H).     |
| 100 | 206-210       | 1,55 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,55 (m, 3H) ; 7,75 (m, 2H) ; 7,85 (m, 3H) ; 8,55 (d, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                       |
| 101 | 275-277       | 4,45 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,35 (m, 2H) ; 7,45 à 7,6 (m, 3H) ; 7,75 à 7,9 (m, 3H) ; 8,55 (d, 1H) ; 8,8 (m, 2H).                                                                          |
| 102 | [368]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 6,5 (m, 1H) ; 7,5 (m, 7H) ; 7,72 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,19 (s, 1H) ; 8,32 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                            |
| 103 | [368]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 6,4 (m, 1H) ; 7,0 (m, 1H) ; 7,05 (m, 2H) ; 7,2 (m, 1H) ; 7,35 (m, 1H) ; 7,5 (m, 3H) ; 7,75 (m, 1H) ; 7,85 (s, 1H) ; 8,6 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; 11,0 (s, 1H). |
| 104 | [360]         | 1,5 (s, 6H) , 4,1 (s, 3H) , 5,1 (s, 1H) , 7,15 (m, 1H) , 7,45 (m, 1H) , 7,55 (m, 2H) , 7,7 (s, 2H) , 7,8 (s, 1H) , 8,2 (d, 1H), 8,55 (s, 1H) , 8,6 (d, 1H) , 9,0 (s, 1H)                    |
| 105 | [346]         | 1,5 (s, 6H) , 2,5 (s, 3H) ; 5,15 (s, 1H) , 7,3 (m, 1H) , 7,45 (m, 1H) , 7,5 (m, 2H) , 7,65 (m, 2H) , 7,8 (s, 1H) , 7,9 (d, 1H) , 8,25 (s, 1H) , 8,9 (s, 1H)                                 |
| 106 | [382]         | 1,5 (s, 6H) , 3,85 (s, 3H) , 5,1 (s, 1H) , 6,5 (d, 1H) , 7,35 (d, 1H) , 7,45 (m, 1H) , 7,55 (m, 3H) , 7,65 (m, 2H) , 7,8 (m, 2H) , 8,2 (s, 1H) , 8,4 (s, 1H) , 8,9 (s, 1H)                  |
| 107 | [380]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (m, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,6 (m, 2H) ; 7,8 (m, 4H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (m, 1H) ; 9,0 (m, 1H) ; 9,05 (s, 1H) ; 9,35 (d, 1H).                 |
| 108 | [380]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,6 (m, 3H) ; 7,85 (m, 4H) ; 8,2 (m, 2H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,8 (d, 1H) ; 9,0 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H).                                                |

| Ex  | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | [357]         | 1.5 (s, 6H), 5.1 (s, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.55 (d, 1H), 7.6 (d, 1H), 7.7 (s, 2H), 7.75 (m, 1H), 7.8 (m, 2H), 8.75 (s, 1H), 8.95 (s, 1H)                                         |
| 110 | [366]         | 0.95 (d, 6H), 1.5 (m, 7H), 1.7 (m, 2H), 4.2 (t, 2H), 5.1 (s, 1H), 7.45 (m, 1H), 7.55 (m, 2H), 7.65 (m, 2H), 7.8 (s, 1H), 7.9 (s, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.25 (s, 1H), 8.9 (s, 1H) |
| 111 | [380]         | 1.5 (s, 6H), 5.15 (s, 1H), 7.65 (m, 8H), 8.05 (m, 1H), 8.1 (m, 1H), 8.7 (s, 1H), 8.9 (m, 1H), 8.95 (s, 1H), 9.95 (s, 1H)                                                      |
| 112 | [358]         | 4,45 (d, 2H); 5,30 (t, 1H); 6,5 (s, 1H); 7,3 (m, 2H); 7,4 (m, 1H); 7,45 (m, 3H); 7,65 (d, 1H); 7,75 (d, 1H); 8,2 (s, 1H); 8,4 (s, 1H); 8,7 (s, 1H); 11,2 (s, 1H); ;           |
| 113 | [350]         | 3,9 (s, 3H); 4,4 (s, 2H); 5,35 (s, 1H); 6,9 (d, 1H, ); 7,4 (m, 3H) 7,65 (d, 2H); 8,25 (d, 1H); 8,45 (s, 1H); 8,70 (s, 1H); 8,75 (s, 1H);                                      |
| 114 | [338]         | 4,45 (m, 2H); 5,3 (m, 1H); 7,3 (m, 2H); 7,5 (m, 2H); 7,75 (d, 1H); 8,25 (m, 1H); 8,55 (d, 1H); 8,6 (d, 1H); 8,7 (m, 1H); 8,75 (m, 1H).                                        |
| 115 | [339]         | 2,25 (s, 3H); 4,44 (s, 2H); 5,3 (s, 1H); 7,1 (s, 1H); 7,3 (m, 2H); 7,45 (m, 3H); 7,6 (d, 1H); 8,3 (s, 1H); 8,65 (s, 1H).                                                      |
| 116 | [321]         | 4,45 (d, 2H); 5,35 (t, 1H); 7,3 (m, 2H); 7,5 (m, 2H); 7,75 (d, 1H); 8,7 (s, 1H); 8,78 (s, 1H); 9,18 (s, 1H); 9,4 (s, 2H).                                                     |
| 117 | [358]         | 4,45 (m, 2H); 5,25 (m, 1H); 7,05 (s, 1H); 7,2 (m, 1H); 7,25 (m, 2H); 7,45 (m, 4H); 7,75 (m, 2H); 8,6 (s, 1H); 8,75 (s, 1H); 11,0 (s, 1H).                                     |
| 118 | [358]         | 4,45 (m, 2H); 5,3 (m, 1H); 6,45 (s, 1H); 7,3 (m, 2H); 7,45 (m, 4H); 7,6 (m, 2H); 8,05 (s, 1H); 8,4 (s, 1H); 8,7 (s, 1H); 11,2 (s, 1H).                                        |
| 119 | [350]         | 4,1 (s, 3H); 4,45 (s, 2H); 5,3 (m, 1H); 7,2 (m, 1H); 7,3 (d, 2H); 7,5 (m, 2H); 7,7 (d, 1H); 8,2 (m, 1H); 8,5 (s, 1H); 8,6 (d, 1H); 8,75 (s, 1H).                              |

90

| Ex  | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | [339]         | 3,15 (s, 3H) ; 4,45 (m, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 7,3 (m, 3H) ; 7,45 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,9 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).                                                           |
| 121 | [372]         | 3,8 (s, 3H) ; 4,45 (m, 2H) ; 5,35 (m, 1H) ; 6,55 (d, 1H) ; 7,3 (d, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (m, 1H) ; 7,6 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,8 (d, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).   |
| 122 | [370]         | 4,45 (m, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,65 (m, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,85 (m, 1H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,1 (m, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H) ; 8,95 (m, 1H) ; 9,35 (m, 1H). |
| 123 | [370]         | 4,45 (s, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,9 (m, 3H) ; 8,25 (m, 2H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,85 (d, 1H) ; 9,45 (s, 1H).                                            |
| 124 | [356]         | 4,45 (m, 2H) ; 5,35 (m, 1H) ; 7,3 (d, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,7 (m, 3H) ; 8,75 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                                                        |
| 125 | [379]         | 0,9 (d, 6H) ; 1,5 (m, 1H) ; 1,7 (m, 2H) ; 4,2 (t, 2H) ; 4,4 (s, 2H) ; 5,25 (s, 1H) ; 7,25 (m, 3H) ; 7,5 (m, 3H) ; 7,6 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                 |
| 126 | [376]         | 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 6,5 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,4 (s, 1H) ; 7,45 (m, 2H) ; 7,65 (m, 3H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                              |
| 127 | [368]         | 3,9 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 6,9 (d, 1H) ; 7,2 (t, 1H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,6 (m, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,75 (d, 2H).                                  |
| 128 | [389]         | 2,25 (s, 3H) ; 4,6 (s, 2H) ; 5,3 (s, 1H) ; 7,1 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,4 (m, 2H) ; 7,6 (m, 2H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).                                                              |
| 129 | [376]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 6,45 (s, 1H) ; 7,25 (m, 1H) ; 7,45 (m, 2H) ; 7,65 (m, 4H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                         |

| Ex  | PF<br>ou[M+H] | RMN Spectre RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | [368]         | 4,1 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,15 (m, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 8,15 (m, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                              |
| 131 | [357]         | 2,45 (s, 3H) ; 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (m, 2H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,9 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H).                                                            |
| 132 | [390]         | 3,85 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 6,5 (d, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,8 (d, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H).                 |
| 133 | [388]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,85 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H) ; 8,1 (m, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 9,0 (m, 1H) ; 9,35 (d, 1H).                 |
| 134 | [388]         | 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (m, 1H) ; 7,7 (m, 4H) ; 8,2 (m, 2H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,8 (d, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 9,45 (s, 1H)                                               |
| 135 | [374]         | 4,55 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,50 (d, 1H) ; 7,65 (m, 1H) ; 7,7 (s, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,80 (d, 1H) ; 8,85 (s, 1H)                                                          |
| 136 | [397]         | 0,9 (d, 6H) ; 1,5 (m, 1H) ; 1,7 (m, 2H) ; 4,15 (t, 2H) ; 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,9 (s, 1H) ; 8,15 (s, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H) ; |
| 137 | [437]         | 1,4 (s, 9H) ; 4,6 (m, 2H) ; 5,35 (m, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,15 (s, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,55 (m, 1H) ; 8,65 (m, 1H) ; 8,8 (m, 1H) ; 8,9 (m, 1H) ; 9,0 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 9,3 (s, 1H).   |

92

Les composés selon l'invention ont fait l'objet d'essais pharmacologiques permettant de déterminer leur effet modulateur sur NOT.

5 **Evaluation de l'activité *in vitro* sur cellules N2A**

L'activité des composés selon l'invention a été évaluée sur une lignée cellulaire (N2A) exprimant de manière endogène le récepteur de souris Nurr1 et transfectée de manière stable avec l'élément de réponse liant NOT (NBRE) couplé au gène rapporteur luciférase. Les EC<sub>50</sub> sont comprises entre 0,01 et 10  $\mu$ M. Les essais ont été réalisés selon le mode

10 opératoire décrit ci dessous.

La lignée cellulaire Neuro-2A provient de source commerciale standard (ATCC). Le clone Neuro-2A a été obtenu à partir d'une tumeur spontanée provenant d'une souche de souris A albino par R.J Klebe et col. Cette lignée Neuro-2A est ensuite stablement transfectée avec 8NBRE-luciférase. Les cellules N2A-8NBRE sont cultivées jusqu'à confluence dans des

15 flacons de culture de 75 cm<sup>2</sup> contenant du DMEM supplémenté par 10% de sérum fœtal de veau, 4,5 g/L de glucose et 0,4 mg/ml de Généticine. Après une semaine de culture les cellules sont récupérées par de la trypsine 0,25% pendant 30 secondes puis remises en suspension dans du DMEM sans rouge de phénol contenant 4,5g/L de glucose, 10% de sérum délipidé Hyclone et déposées dans des plaques blanches 96 puits à fond transparent.

20 Les cellules sont déposées à raison de 60.000 par puits dans 75  $\mu$ L pendant 24 heures avant l'addition des produits. Les produits sont appliqués dans 25 $\mu$ L et incubés 24 heures supplémentaires. Le jour de la mesure, on ajoute à chaque puits un volume équivalent (100 $\mu$ L) de Steadylite, puis on attend 30 minutes pour obtenir une lyse complète des cellules et la production maximale du signal. Les plaques sont ensuite mesurées dans un compteur de

25 luminescence pour microplaques après avoir été scellées par un film adhésif. Les produits sont préparés sous forme de solution stock à 10<sup>-2</sup> M, puis dilués dans 100% de DMSO. Chaque concentration de produit est préalablement diluée dans du milieu de culture avant incubation avec les cellules contenant ainsi 0,625% final de DMSO.

Par exemple, les composés n° 6, 7, 24, 50, 68, 79 et 86 ont montré une CE<sub>50</sub> de

30 respectivement 0,9 ; 1,6 ; 52 ; 202 ; 20 ; 5 et 71 nM. Il apparaît donc que les composés selon l'invention ont un effet modulateur de NOT.

Les composés selon l'invention peuvent donc être utilisés pour la préparation de

93

médicaments pour leur application en thérapeutique dans le traitement ou la prévention de maladies impliquant les récepteurs NOT.

Ainsi, selon un autre de ses aspects, l'invention a pour objet des médicaments qui comprennent un composé de formule (I), ou un sel d'addition de ce dernier à un acide pharmaceutiquement acceptable.

Ces médicaments trouvent leur emploi en thérapeutique, notamment dans le traitement et la prévention des maladies neurodégénératives telles que par exemple la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, les tauopathies (ex. la paralysie progressive supranucléaire, la démence fronto-temporale, la dégénérescence corticobasale, la maladie de Pick); les traumatismes cérébraux comme l'ischémie et les traumatismes crâniens et l'épilepsie; les maladies psychiatriques comme la schizophrénie, la dépression, la dépendance à une substance, les troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité; les maladies inflammatoires du système nerveux central comme la sclérose en plaque, encéphalite, myélite et encéphalomyélite et autres maladies inflammatoires comme les pathologies vasculaires, l'athérosclérose, les inflammations des articulations, l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde; l'ostéoarthrite, la maladie de Crohn, colite ulcéreuse; les maladies inflammatoires allergiques telle que l'asthme, les maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, lupus, sclérodermies, Syndrome de Guillain-Barré, maladie d'Addison et autres maladies immuno-médiées; l'ostéoporose; les cancers.

Ces composés pourraient être aussi utilisés comme traitement associé à des greffes et/ou transplantations de cellules souches.

Selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne des compositions pharmaceutiques comprenant, en tant que principe actif, un composé selon l'invention. Ces compositions pharmaceutiques contiennent une dose efficace d'au moins un composé selon l'invention, ou un sel pharmaceutiquement acceptable, dudit composé, ainsi qu'au moins un excipient pharmaceutiquement acceptable.

Lesdits excipients sont choisis selon la forme pharmaceutique et le mode d'administration souhaité, parmi les excipients habituels qui sont connus de l'Homme du métier.

Dans les compositions pharmaceutiques de la présente invention pour l'administration orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intra-veineuse, topique, locale, intratrachéale, intranasale, transdermique ou rectale, le principe actif de formule (I) ci-dessus, ou son sel, peut être administré sous forme unitaire d'administration, en mélange avec des excipients pharmaceutiques classiques, aux animaux et aux êtres humains pour la

prophylaxie ou le traitement des troubles ou des maladies ci-dessus.

Les formes unitaires d'administration appropriées comprennent les formes par voie orale telles que les comprimés, les gélules molles ou dures, les poudres, les granules et les solutions ou suspensions orales, les formes d'administration sublinguale, buccale, 5 intratrachéale, intraoculaire, intranasale, par inhalation, les formes d'administration topique, transdermique, sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse, les formes d'administration rectale et les implants. Pour l'application topique, on peut utiliser les composés selon l'invention dans des crèmes, gels, pommades ou lotions.

A titre d'exemple, une forme unitaire d'administration d'un composé selon 10 l'invention sous forme de comprimé peut comprendre les composants suivants :

|    |                               |           |
|----|-------------------------------|-----------|
|    | Composé selon l'invention     | 50,0 mg   |
|    | Mannitol                      | 223,75 mg |
|    | Croscarmellose sodique        | 6,0 mg    |
|    | Amidon de maïs                | 15,0 mg   |
| 15 | Hydroxypropyl-méthylcellulose | 2,25 mg   |
|    | Stéarate de magnésium         | 3,0 mg    |


Il peut y avoir des cas particuliers où des dosages plus élevés ou plus faibles sont appropriés ; de tels dosages ne sortent pas du cadre de l'invention. Selon la pratique 20 habituelle, le dosage approprié à chaque patient est déterminé par le médecin selon le mode d'administration, le poids et la réponse dudit patient.

La présente invention, selon un autre de ses aspects, concerne également une méthode de traitement des pathologies ci-dessus indiquées qui comprend l'administration, à un patient, d'une dose efficace d'un composé selon l'invention, ou un de ses sels 25 pharmaceutiquement acceptables.

95

**REVENDICATIONS**

1. Composés de formule (I) :



dans laquelle :

R<sub>1</sub> représente :

un groupe hétéroaryle ou hétérocyclique ce groupe pouvant éventuellement être substitué par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi les atomes ou groupes suivants : halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, oxo, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)thioalkyle, -S(O)(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, -S(O)<sub>2</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-alkyle), hydroxyle, cyano, nitro, hydroxy(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, NRaRb(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène-oxy, NRaRb, CONRaRb, SO<sub>2</sub>NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, NRcC(O)ORe, NRcSO<sub>2</sub>Re, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle ou hétéroaryle monocyclique, l'aryle ou l'hétéroaryle monocyclique étant éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, oxo, nitro, cyano ou OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle et R<sub>1</sub> est lié à l'imidazo[1,2-*a*]pyridine par un carbone aromatique;

X représente de 1 à 4 substituants identiques ou différents l'un de l'autre choisi parmi hydrogène, un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, nitro, cyano, le groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle pouvant être éventuellement substitué par un ou plusieurs groupes choisis parmi un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)haloalcoxy, NRaRb ou hydroxyle ;

R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine de 1 à 4 substituants identiques ou différents l'un de l'autre choisis parmi un hydrogène, un halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre,

un atome d'hydrogène,

un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe R<sub>f</sub> ;

un groupe aryle, éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro ou cyano ;

R<sub>2</sub> et X peuvent former ensemble avec les atomes de carbone qui les porte un cycle carboné de 5 à 7 atomes de carbone;

R<sub>4</sub> représente :

un atome d'hydrogène,  
un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe Rf ;  
un groupe aryle, éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis  
10 parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro, cyano, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyl(CO)-, CONRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, NRcC(O)ORe ou aryle, l'aryle étant éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy,  
15 halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro ou cyano ;

Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène ou aryle ;

ou Ra et Rb forment ensemble, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe azétidine, pyrrolidine, pipéridine, azépine, morpholine, thiomorpholine, pipérazine,  
20 homopipérazine, ce groupe étant éventuellement substitué par un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryle ou aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène ;

Rc et Rd représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle,

ou Rc et Rd forment ensemble un groupe (C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>)alkylène ;  
25 Re représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle,  
ou Rc et Re forment ensemble un groupe (C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>)alkylène ;

Rf représente un atome d'halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, hydroxyle, cyano, NRaRb, C(O)NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, NRcCOORe, SO<sub>2</sub>NRaRb, NRcSO<sub>2</sub>Re, aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkylène, aryle, l'aryle étant  
30 éventuellement substitué par un ou plusieurs substituants choisis parmi un halogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, halo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, NRaRb, hydroxyle, nitro, cyano ou OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle,  
à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

97

2. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisé en ce que

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle, dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, oxo, NRaRb ; (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, aryle, CONRaRb ;

- 10 Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle.

3. Composés de formule (I) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que :

X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou d'halogène.

15

4. Composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :

R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle.

20

5. Composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :

R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle.

25

6. Composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :

R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe Rf ;

- 30 Rf représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy.

7. Composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :

le groupe  $\begin{array}{c} \text{R3} \text{ R2} \\ \diagdown \diagup \\ \text{R4-O} \end{array}$  est en position 2, 3 ou 4 du phényle qui le porte.

5 8. Composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle, dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, 10 pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle, benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;

ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, oxo, NRaRb ; (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, aryle, CONRaRb ;

15 Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou d'halogène ;

R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

20 R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;

R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué par un groupe Rf ;

Rf représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;

25 à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

9. Composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :

R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle, 30 benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle, dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, pyrimidinyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, benzimidazolyle, indazolyle,

- benzisoxazolyle, isoquinoléinyle, pyrazolyle ;  
ces groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes  
choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, oxo, NRaRb ;  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy, aryle, CONRaRb ;
- 5 Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;  
X représente 1 ou 2 atomes d'hydrogène ou d'halogène ;  
R représente en position 3, 5, 7 ou 8 de l'imidazo[1,2-*a*]pyridine un atome d'hydrogène, ou  
un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;
- 10 R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;  
R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, éventuellement substitué  
par un groupe Rf ;  
Rf représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;
- 15 le groupe  étant en position 2, 3 ou 4 du phényle qui le porte ;  
à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

10. Composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisé en ce que

- R<sub>1</sub> représente un groupe isoxazolyle, pyridinyle, thiazolyle, quinoléinyle,  
20 benzo[1,3]dioxolyle, indolyle, 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, benzofuranyle,  
dihydrobenzofuranyle, dihydrobenzoxazolyle, furyle, thiényle, pyrrolo[2,3-*b*]pyridinyle, ces  
groupes pouvant éventuellement être substitués par un ou plusieurs atomes ou groupes  
choisis indépendamment les uns des autres parmi halogène, (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, oxo, NRaRb,  
aryle ;
- 25 X représente un hydrogène,  
R représente un hydrogène, ou un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;  
R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ;  
R<sub>4</sub> représente un atome d'hydrogène, un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle, ce groupe étant  
éventuellement substitué par un groupe Rf ;
- 30 Ra et Rb représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alkyle ;  
Rf représente un groupe (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)alcoxy ;  
à l'état de base ou de sel d'addition à un acide.

## 11. Composés :

- {3-[2-(5-Méthylisoxazol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [3-[2-(pyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- Chlorhydrate (2:1) de 6-(3-*tert*butoxyméthylphényl)-2-(pyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- [3-[2-(Thiazol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol
- [3-[2-(quinoléin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-[2-(pyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-[(1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- 6-[6-(3-hydroxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl]-3,4-dihydro-1*H*-quinoléin-2-one et son chlorhydrate ;
- 2-(5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)-6-(3-*tert*-butoxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- 6-[6-(3-Hydroxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl]-3*H*-benzoxazol-2-one et son chlorhydrate ;
- Chlorhydrate (1:1) de [2-(2-furan-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(5-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {3-[2-(5-Chlorothién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl] phényl}méthanol et son chlorhydrate ;

- {3-[2-(6-Diméthylaminopyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1*H*-indol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(6-Aminopyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1*H*-indol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(2-Aminopyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(3Phénylisoxazol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [4-[2-(Benzofuran-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [3-[2-(Pyridin-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [4-[2-(Pyridin-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [3-[2-(Thién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- 2-(Benzofuran-2-yl)-6-[3-(2-méthoxyéthoxyméthyl)phényl]imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- 6-[3-(2-Méthoxyéthoxyméthyl)phényl]-2-(thién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine et son oxalate ;
- [3-(2-Thién-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl]méthanol ;
- [3-(3-méthyl-2-thién-2-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ; ;
- {3-[2-(1*H*-indol-3-yl)-3-méthylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl} méthanol et son chlorhydrate ;

- {3-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(2-Ethoxypyrimidin-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- [2-(2-Quinoléin-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(2-Chloro-pyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzothiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzo[b]thiophèn-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzo[b]thiophèn-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- 3-(2-Benzo[b]thiophèn-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol et son chlorhydrate ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- {3-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- [3-(2-Benzofuran-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(3-Chlorothièn-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(5-méthylisoxazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(3-Méthyl-2-thièn-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;

- 2-[3-(2-Thién-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Pyridin-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(5-Chlorothién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzothiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]thiényl-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-Méthyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Furan-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]thiényl-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Thiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol et son chlorhydrate ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol et son chlorhydrate ;
- [2-Fluoro-6-(2-thién-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-pyridin-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-(2-Benzothiazol-2-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;

10f

- [2-(2-Benzo[*b*]thiophén-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- {2-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-6-fluorophényl}méthanol ;
- [2-(2-Benzofuran-5-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- [2-(2-Benzo[*b*]thiényl-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-thiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(3-méthyl-2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-thién-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-pyridin-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(5-Chlorothién-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-2,6-difluorophényl}méthanol ;
- [3-(2-Benzofuran-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-thién-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzofuran-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzothiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-thiazol-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- 6-(3-Méthoxyméthylphényl)-2-(1-méthyl-1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridine et son chlorhydrate ;
- 2-(1*H*-Indol-6-yl)-6-(3-méthoxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridine et son chlorhydrate ;
- 2-{3-[2-(5-Méthylisoxazol-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- [2-Fluoro-6-(3-méthyl-2-thiényl-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {2-[2-(5-Chlorothiophén-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-6-fluorophényl}méthanol ;
- [2-(2-Benzofuran-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;

- [2-(2-Benzofuran-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1-méthyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-furan-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]thiényl-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-méthyl-1*H*-benzimidazol-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {3-[2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-2,6-difluorophényl}méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-furan-2-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzofuran-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]thiényl-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-2,6-difluorophényl]méthanol ;
- 2-(1*H*-Indol-6-yl)-6-[3-[2-(méthoxyéthyl)oxyméthyl]phényl]imidazo[1,2-*a*]pyridine ;
- 2-[3-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- [2-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)-6-fluorophényl]méthanol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2-Méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(4-Méthylthién-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-Méthyl-1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolín-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Isoquinolín-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,6-Difluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}-propan-2-ol ;

- 2-(3-{2-[1-(3-Méthylbutyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl}phényl)propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolin-3-yl-imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]propan-2-ol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(6-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol
- {2-Fluoro-6-[2-(3-fluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-méthylthiën-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-pyrimidin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(2-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-méthylthiën-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1-méthyl-1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-quinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-isoquinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {2-[2-(2,6-Difluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-6-fluorophényl}méthanol ;
- (2-Fluoro-6-{2-[1-(3-méthylbutyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl}phényl)méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(6-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-méthylthiën-2-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-

yl]phényl}méthanol ;

- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-6-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(2-méthoxypyridin-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-méthylthién-3-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-méthyl-1*H*-indol-5-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]phényl}méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-quinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-isoquinolin-5-ylimidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl)phényl]méthanol ;
- {3-[2-(2,6-Difluoropyridin-4-yl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl]-2,6-difluorophényl}méthanol ;
- (2,6-Difluoro-3-{2-[1-(3-méthylbutyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-yl}phényl)méthanol ;
- *N*-*tert*-Butyl-5-[6-(2,4-difluoro-3-hydroxyméthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridin-2-yl]nicotinamide.

12. Médicament, caractérisé en ce qu'il comprend un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, ou un sel d'addition de ce composé à un acide pharmaceutiquement acceptable.

5

13. Composition pharmaceutique, caractérisée en ce qu'elle comprend un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, ou un sel pharmaceutiquement acceptable, de ce composé, ainsi qu'au moins un excipient pharmaceutiquement acceptable.

10

14. Utilisation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour la préparation d'un médicament destiné au traitement et à la prévention des maladies neurodégénératives.

15. Utilisation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour la préparation d'un médicament destiné au traitement et à la prévention des traumatismes cérébraux et de l'épilepsie.

5

16. Utilisation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour la préparation d'un médicament destiné au traitement et à la prévention des maladies psychiatriques.

10

17. Utilisation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour la préparation d'un médicament destiné au traitement et à la prévention des maladies inflammatoires.

15

18. Utilisation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour la préparation d'un médicament destiné au traitement et à la prévention de l'ostéoporose et les cancers.


20

19. Utilisation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour la préparation d'un médicament destiné au traitement et à la prévention de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, des tauopathies, de la sclérose en plaque.

25


20. Utilisation d'un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 pour la préparation d'un médicament destiné au traitement et à la prévention de la schizophrénie, la dépression, la dépendance à une substance, les troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité.

21. Procédé de synthèse des composés de formule (I) selon la revendication 1, par réaction de composés de formule (XI)





dans laquelle R, X, R3 et R2 sont tels que définis dans la revendication 1 et GP est un groupement protection de la fonction hydroxyle, avec R1-W avec R1 est tel que défini dans la revendication 1 et W est un dérivé de bore ou d'étain puis le produit obtenu est déprotégé.

22. Procédé de synthèse des composés de formule (I) selon la revendication 1, par réaction de composés de formule (IX)



dans laquelle R, X, R3, R4 et R2 sont tels que définis dans la revendication 1 avec R1-W avec R1 est tel que défini dans la revendication 1 et W est un dérivé de bore ou d'étain.


23. Procédé de synthèse des composés de formule (I) selon la revendication 1, par réaction de composés de formule (VIII)



dans laquelle R est tel que défini dans la revendication 1 et Y représente un dérivé de bore avec un composé de formule (VII) dans laquelle R6 représente R4 et R2, R3, R4 et X sont tel que défini dans la revendication 1 et Z est un halogène


170

24. Procédé de synthèse des composés de formule (I) selon la revendication 1, par réaction de composés de formule (XIII)




5 dans laquelle R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> et X sont tel que défini dans la revendication 1 avec un composé de formule (VI) R<sub>1</sub>, R sont tel que défini dans la revendication 1 et Hal est un halogène.

10 25. Procédé de synthèse des composés de formule (I) selon la revendication 1, par réaction de composés de formule (XIV)



15 dans laquelle R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> et X sont tel que défini dans la revendication 1 et GP est un groupement protection de l'a fonction hydroxyle avec un composé de formule (VI) R<sub>1</sub>, R sont tel que défini dans la revendication 1 et Hal est un halogène puis le produit obtenu est déprotégé.

26. Composés intermédiaires




27. Procédé de synthèse selon l'une quelconque des revendications 21 à 25 où les  
20 composés de formules générales (VIII), (IX), (XI), (XIII) et (XIV) sont les composés de  
formules générales (VIII-1), (IX-1), (IX-2), (XI-1), (XI-2), (XI-3), (XI-4), (XIII-1), (XIII-2),  
(XIV-1), (XIV-2) et (XIV-3).

DERIVADOS POLISUSTITUIDOS DE 2-HETEROARIL-6-FENIL-IMIDAZO  
[1,2-*a*]PIRIDINAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA

La presente invención se refiere a derivados polisustituídos de 2-heteroaril-6-fenil-  
5 imidazo[1,2-*a*]piridina, a su preparación y a su aplicación en terapéutica en el tratamiento o  
la prevención de enfermedades que implican los receptores nucleares Nurr-1 también  
denominados NR4A2, NOT, TINUR, RNR-1, y HZF3.

La presente invención tiene por objeto los compuestos de fórmula (I) :



10 en la que:

R<sub>1</sub> representa :

un grupo heteroarilo o heterocíclico, pudiendo estar opcionalmente  
sustituido con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente  
los unos de los otros entre los átomos o grupos siguientes : halógeno, alquilo  
15 (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>),  
tioalquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), -S(O)-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), -S(O)<sub>2</sub>-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>),  
hidroxilo, oxo, ciano, nitro, hidroxil-alquilenos (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb-alquilenos  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)-alquilenos (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)-oxi, NRaRb, CONRaRb,  
SO<sub>2</sub>NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>),  
20 NRcC(O)ORe, NRcSO<sub>2</sub>Re, aril-alquilenos (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), arilo o heteroarilo  
monocíclico, estando el arilo o el heteroarilo monocíclico opcionalmente  
sustituido con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un  
grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alcoxi  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb, hidroxilo, oxo, nitro, ciano o OCO-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) y R<sub>1</sub>  
25 está unido a la imidazo[1,2-*a*]piridina por un carbono aromático ;

X representa 1 a 4 sustituyentes idénticos o diferentes uno de otro, elegidos entre un  
hidrógeno, un halógeno, alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb, nitro, ciano, pudiendo  
estar el grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) opcionalmente sustituido con uno o varios grupos elegidos  
entre un halógeno, alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb o hidroxilo;

30 R representa en la posición 3, 5, 7 u 8 de la imidazo[1,2-*a*]piridina de 1 a 4 sustituyentes  
idénticos o diferentes uno de otro, elegidos entre un hidrógeno, un halógeno,

alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), halo-alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi ( $C_1-C_{10}$ );

$R_2$  y  $R_3$  representan, independientemente uno de otro,

un átomo de hidrógeno,

un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), sustituido opcionalmente con un grupo  $R_f$ ;

- 5 un grupo arilo, sustituido opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), haloalquilo( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi( $C_1-C_{10}$ ), haloalcoxi( $C_1-C_{10}$ ),  $NRaRb$ , hidroxilo, nitro o ciano ;

$R_2$  y  $X$  pueden formar junto con los átomos de carbono a los que están unidos un ciclo carbonado de 5 a 7 átomos de carbono;

- 10  $R_4$  representa :

un átomo de hidrógeno,

un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), sustituido opcionalmente con un grupo  $R_f$ ;

un grupo arilo, sustituido opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), haloalquilo( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi( $C_1-C_{10}$ ),

- 15 haloalcoxi( $C_1-C_{10}$ ),  $NRaRb$ , hidroxilo, nitro, ciano, alquil ( $C_1-C_{10}$ )(CO)-,  $CONRaRb$ ,  $NRcCORD$ ,  $OC(O)NRaRb$ ,  $OCOalquilo(C_1-C_{10})$ ,  $NRcC(O)ORe$  o arilo, estando el arilo sustituido opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), haloalquilo( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi( $C_1-C_{10}$ ), haloalcoxi( $C_1-C_{10}$ ),  $NRaRb$ , hidroxilo, nitro o ciano ;

- 20  $Ra$  y  $Rb$  representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), aril-alquilenos ( $C_1-C_{10}$ ) o arilo ;

o  $Ra$  y  $Rb$  forman juntos, con el átomo de nitrógeno al que están unidos, un grupo azetidina, pirrolidina, piperidina, azepina, morfolina, tiomorfolina, piperacina, homopiperacina, estando este grupo sustituido opcionalmente con un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), arilo o

- 25 arilalquilenos( $C_1-C_{10}$ ) ;

$Rc$  y  $Rd$  representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), aril-alquilenos ( $C_1-C_{10}$ ), arilo;

o  $Rc$  y  $Rd$  forman juntos un grupo alquilenos( $C_2-C_5$ );

$Re$  representa un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), aril-alquilenos ( $C_1-C_{10}$ ), arilo ;

- 30 o  $Rc$  y  $Re$  forman juntos un grupo alquilenos( $C_2-C_5$ );

$Rf$  representa un átomo de halógeno, un grupo alcoxi( $C_1-C_{10}$ ), haloalcoxi( $C_1-C_{10}$ ), hidroxilo, ciano,  $NRaRb$ ,  $C(O)NRaRb$ ,  $NRcCORD$ ,  $OC(O)NRaRb$ ,  $OCOalquilo(C_1-C_{10})$ ,  $NRcCOORe$ ,  $SO_2NRaRb$ ,  $NRcSO_2Re$ , arilalquilenos( $C_1-C_{10}$ ), arilo, estando el arilo sustituido opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un grupo

alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), haloalquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), haloalcoxi(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb, hidroxilo, nitro, ciano o OCOalquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>);  
en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

5 Los compuestos de la fórmula (I) pueden contener uno o varios átomos de carbono asimétricos. Pueden existir, por tanto, en forma de enantiómeros o diastereoisómeros. Estos enantiómeros, diastereoisómeros, así como sus mezclas, incluidas las mezclas racémicas, forman parte de la invención.

10 Los compuestos de fórmula (I) pueden existir en forma de bases o de sales de adición a ácidos. Dichas sales de adición forman parte de la invención.

Estas sales se pueden preparar con ácidos farmacéuticamente aceptables, pero las sales de otros ácidos útiles, por ejemplo para la purificación o el aislamiento de los compuestos de fórmula (I), forman parte igualmente de la invención.

15 Los compuestos de fórmula (I) pueden existir igualmente en forma de hidratos o de solvatos, es decir, en forma de asociaciones o de combinaciones con una o varias moléculas de agua o con un disolvente. Dichos hidratos y solvatos forman parte igualmente de la invención.

En el marco de la presente invención, se entiende por:

- un grupo C<sub>x</sub>-C<sub>t</sub>: un grupo que comprende entre x y t átomos de carbono;
- 20 - un átomo de halógeno: un flúor, un cloro, un bromo o un yodo;
- un grupo alquilo: un grupo alifático saturado lineal, ramificado o cíclico, eventualmente sustituido con un grupo alquilo saturado lineal, ramificado o cíclico. Como ejemplos, se pueden citar los grupos metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutilo, tercbutilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, metilciclopropilo, ciclopropilmetilo
- 25 etc. ;
- un grupo alquilenos: un grupo alquilo divalente
- un grupo alcoxi: un radical -O-alquilo en el que el grupo alquilo es tal como se ha definido anteriormente ;
- un grupo haloalquilo: un grupo alquilo sustituido con uno o varios átomos de halógeno
- 30 idénticos o diferentes. A título de ejemplos, se pueden citar los grupos CF<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>, CHF<sub>2</sub>, CCl<sub>3</sub>.
- un grupo haloalcoxi: un radical -O-alquilo en el que el grupo alquilo es tal como se ha definido anteriormente y está sustituido con uno o varios átomos de halógeno idénticos o diferentes. A título de ejemplos, se pueden citar los grupos OCF<sub>3</sub>, OCHF<sub>2</sub>, OCCl<sub>3</sub>.

- un grupo tioalquilo: un radical S-alquilo en el que el grupo alquilo es tal como se ha definido anteriormente ;
- un grupo arilo: un grupo aromático mono o bicíclico que contiene de 6 a 10 átomos. Como ejemplos de grupos arilo, se pueden citar los grupos fenilo y naftilo;
- 5 - un grupo heteroarilo : un grupo aromático mono o bicíclico que contiene de 5 a 10 átomos entre ellos 1 a 4 heteroátomos elegidos entre N, O y S. Como ejemplos de grupos heteroarilos, se pueden citar : pirrol, furano, tiofeno, pirazol, imidazol, triazol, tetrazol, oxazol, isoxazol, oxadiazol, tiazol, isotiazol, tiadiazol, piridina, pirimidina, piracina, piridacina, triacina, tieno-tiofeno, furo-furano, tieno-furano, furo-pirrol, tieno-  
10 pirrol, pirrolo-pirrol, pirrolo-isoxazol, furo-isoxazol, tieno-isoxazol, isoxazolo-isoxazol, pirrolo-oxazol, furo-oxazol, tieno-oxazol, oxazolo-isoxazol, oxazolo-oxazol, pirrolo-isotiazol, furo-isotiazol, tieno-isotiazol, isotiazolo-isoxazol, isotiazolo-oxazol, isotiazolo-isotiazol, pirrolo-tiazol, furo-tiazol, tieno-tiazol, tiazolo-oxazol, tiazolo-isoxazol, tiazolo-isotiazol, tiazolo-tiazol, pirrolo-pirazol, furo-pirazol, tieno-pirazol, pirazolo-isoxazol, pirazolo-oxazol, pirazolo-isotiazol, pirazolo-tiazol, pirazolo-pirazol,  
15 pirrolo-imidazol, furo-imidazol, tieno-imidazol, imidazo-isoxazol, imidazo-oxazol, imidazo-isotiazol, imidazo-tiazol, imidazo-pirazol, imidazo-imidazol, pirrolo-oxadiazol, furo-oxadiazol, tieno-oxadiazol, pirazolo-oxadiazol, imidazo-oxadiazol, furo-tiadiazol, tieno-tiadiazol, pirrolo-tiadiazol, imidazo-tiadiazol, pirazolo-tiadiazol, tieno-triazol, pirrolo-triazol, furo-triazol, oxazolo-triazol, isoxazolo-triazol, tiazolo-triazol, isotiazolo-triazol, pirazolo-triazol, imidazo-triazol, indol, isoindol, bencimidazol, indazol, indolicina, benzofurano, isobenzofurano, benzotiofeno, benzo[c]tiofeno, pirrolopiridina, imidazopiridina, pirazolopiridina, triazolopiridina, tetrazolopiridina, pirrolopirimidina, imidazopirimidina, pirazolopirimidina, triazolopirimidina, pirrolopiracina, imidazopiracina, pirazolopiracina, triazolopiracina, pirrolopiridacina, imidazopiridacina, pirazolopiridacina, triazolopiridacina, pirrolotriacina, imidazotriacina, pirazolotriacina, furopiridina, fuopirimidina, fuopiracina, fuopiridacina, furotriacina, oxazolopiridina, oxazolopirimidina, oxazolopiracina, oxazolopiridacina, isoxazolopiridina, isoxazolopirimidina, isoxazolopiracina, isoxazolopiridacina, oxadiazolopiridina, benzoxazol, benzoisoxazol, benzoxadiazol, tienopiridina, tienopirimidina, tienopiracina, tienopiridacina, tienotriacina, tiazolopiridina, tiazolopirimidina, tiazolopiracina, tiazolopiridacina, isotiazolopiridina, isotiazolopirimidina, isotiazolopiracina, isotiazolopiridacina, tiadiazolopiridina, benzotiazol, benzoisotiazol, benzotiadiazol, benzotriazol, quinoleína, isoquinoleína, cinolina, ftalacina, quinoxalina, quinazolina,

naftiridina, benzotriacina, piridopirimidina, piridopiracina, piridopiridacina, piridotriacina, pirimidopirimidina, pirimidopiracina, pirimidopiridacina, piracinopiracina, piracinopiridacina, piridacinopiridacina.

- un grupo heterocíclico : un grupo bicíclico de 9 a 10 átomos que contiene de 1 a 4 heteroátomos elegidos entre N, O y S, en el que un ciclo es aromático y el otro ciclo está saturado o parcialmente saturado, conteniendo cada uno de los ciclos 2 heteroátomos como máximo. Como ejemplos de grupos bicíclicos, se pueden citar : benzodioxol, benzoxatiol, benzopirano, benzotiopirano, benzoxacina, benzotiacina, benzodioxina, benzotioxina, dioxolo-piridina, oxatiolo-piridina, pirano-piridina, tiopirano-piridina, oxacino-piridina, tiacino-piridina, dioxino-piridina, tioxino-piridina, dioxolo-pirimidina, oxatiolo-pirimidina, pirano-pirimidina, tiopirano-pirimidina, oxacino-pirimidina, tiacino-pirimidina, dioxino-pirimidina, tioxino-pirimidina, dioxolo-piracina, oxatiolo-piracina, pirano-piracina, tiopirano-piracina, oxacino-piracina, tiacino-piracina, dioxino-piracina, tioxino-piracina, dioxolo-piridacina, oxatiolo-piridacina, pirano-piridacina, tiopirano-piridacina, oxacino-piridacina, tiacino-piridacina, dioxino-piridacina, tioxino-piridacina, indol, isoindol, bencimidazol, indazol, indolicina, benzofurano, isobenzofurano, benzotiofeno, benzo[c]tiofeno, pirrolopiridina, imidazopiridina, pirazolopiridina, pirrolopirimidina, imidazopirimidina, pirazolopirimidina, pirrolopiracina, imidazopiracina, pirazolopiracina, pirrolopiridacina, imidazopiridacina, pirazolopiridacina, fuopiridina, fuopirimidina, fuopiracina, fuopiridacina, oxazolopiridina, oxazolopirimidina, oxazolopiracina, oxazolopiridacina, isoxazolopiridina, isoxazolopirimidina, isoxazolopiracina, isoxazolopiridacina, benzoxazol, benzoisoxazol, benzoxadiazol, tienopiridina, tienopirimidina, tienopiracina, tienopiridacina, tiazolopiridina, tiazolopirimidina, tiazolopiracina, tiazolopiridacina, isotiazolopiridina, isotiazolopirimidina, isotiazolopiracina, isotiazolopiridacina, benzotiazol, benzoisotiazol, quinoleína, isoquinoleína, cinolina, ftalacina, quinoxalina, quinazolina, naftiridina, piridopirimidina, piridopiracina, piridopiridacina, pirimidopirimidina, pirimidopiracina, pirimidopiridacina, piracinopiracina, piracinopiridacina, piridacinopiridacina, estando uno de los ciclos de estos grupos bicíclicos bajo forma saturada o parcialmente saturada, por ejemplo dihidrobenzofurano, tetrahydroquinoleína, dihidrobenzoxazol, benzodioxol.
- un carbono aromático : un carbono que está incluído en un ciclo aromático
- pudiendo estar los átomos de azufre y de nitrógeno en estado oxidado (N-óxido, sulfóxido, sulfona)

117

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un primer grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que:

- R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo, benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), oxo, NRaRb; alcoxi(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), arilo, CONRaRb ;  
Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;  
siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

- Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un segundo grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

- R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofurilo, dihidrobenzofurilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo, benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, metilo, oxo, NRaRb ; metoxi, etoxi, fenilo, isopentilo, CONHC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> ;  
Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;  
siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

- Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un tercer grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

- X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de halógeno ;  
siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un cuarto grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de flúor ;

siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un quinto grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

- 5 R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;

siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un sexto grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

- 10 R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo metilo;

siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

- 15 Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un séptimo grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independientemente uno del otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>);

siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

20

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un octavo grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independiente uno del otro un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;

siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

25

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un noveno grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

R<sub>4</sub> representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), opcionalmente sustituido con un grupo R<sub>f</sub> ;

- 30 R<sub>f</sub> representa un grupo alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;


siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un décimo grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

$R_4$  representa un átomo de hidrógeno, o un grupo elegido entre los grupos metilo, butilo, metoxi-etilo ;

siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

- 5 Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un decimoprimer grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

el grupo  está en posición 2, 3 o 4 del fenilo al que está unido ;  
siendo los demás sustituyentes tal como se han definido anteriormente.

- 10 Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un décimosegundo grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

$R_1$  representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo,

- 15 benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo( $C_1$ - $C_{10}$ ), oxo,  $NRaRb$  ;  
alcoxi( $C_1$ - $C_{10}$ ), arilo,  $CONRaRb$  ;

$Ra$  y  $Rb$  representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1$ - $C_{10}$ ) ;

- 20  $X$  representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de halógeno ;

$R$  representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo( $C_1$ - $C_{10}$ ) ;

$R_2$  y  $R_3$  representan, independientemente uno del otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo( $C_1$ - $C_{10}$ ) ;

- 25  $R_4$  representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo( $C_1$ - $C_{10}$ ), opcionalmente sustituido con un grupo  $R_f$  ;

$R_f$  representa un grupo alcoxi ( $C_1$ - $C_{10}$ ) ;

en forma de base o de sal de adición a un ácido.

30

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un decimotercer grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que :

$R_1$  representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo,

- indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofurilo, dihidrobenzofurilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo, benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos  
5 elegidos independientemente entre sí entre halógeno, metilo, oxo, NRaRb ; etoxi, fenilo, isopentilo, CONHC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, metoxi ;  
Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;  
X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de flúor ;  
10 R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo metilo;  
R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independiente uno del otro un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;  
R<sub>4</sub> representa un átomo de hidrógeno, o un grupo elegido entre los grupos metilo, butilo, metoxi-etilo ;  
15 en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un décimocuarto grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que:

- R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo,  
20 indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo, benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), oxo, NRaRb;  
25 alcoxi(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), arilo, CONRaRb ;  
Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;  
X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de halógeno ;  
R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un  
30 grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;  
R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independientemente uno del otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>);  
R<sub>4</sub> representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), opcionalmente sustituido con un grupo Rf ;

Rf representa un grupo alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;

estando el grupo  en posicion 2, 3 o 4 del fenilo al que está unido ;  
en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

5 Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un décimoquinto grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que:

R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinoleinilo, benzofurilo, dihidrobenzofurilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo,

10 benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, metilo, oxo, NRaRb ; etoxi, fenilo, isopentilo, CONHC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, metoxi ;

Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo  
15 metilo;

X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de flúor ;

R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo metilo;

R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independiente uno del otro un átomo de hidrógeno o un grupo metilo;

20 R<sub>4</sub> representa un átomo de hidrógeno, o un grupo elegido entre los grupos metilo, butilo, metoxi-etilo ;

estando el grupo  en posicion 2, 3 o 4 del fenilo al que está unido ;  
en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

25 Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, un décimosexto grupo de compuestos está constituido por los compuestos para los que:

R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahydroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pudiendo estar estos grupos

30 opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), oxo, NRaRb, arilo ;

X representa un hidrógeno,

R representa un hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ) ;

$R_2$  y  $R_3$  representan, independientemente el uno del otro, un átomo de hidrógeno ;

$R_4$  representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), estando este grupo opcionalmente sustituido con un grupo  $R_f$  ;

- 5  $R_a$  y  $R_b$  representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ) ;

$R_f$  representa un grupo alcoxi ( $C_1-C_{10}$ ) ;

en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

- 10 Entre los compuestos de fórmula (I) objeto de la invención, se pueden citar principalmente los compuestos siguientes:

- {3-[2-(5-metilisoxazol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- [3-[2-(piridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol y su hidrocloreuro ;
- Hidrocloreuro (2:1) de 6-(3-*terc*-butoximetilfenil)-2-(piridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridina ;
- [3-[2-(tiazol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol
- [3-[2-(quinolein-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol y su hidrocloreuro ;
- {3-[2-(1,3-benzodioxol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- [3]-2-(piridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol y su hidrocloreuro ;
- {3-[2-[(1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- 6-[6-(3-hidroximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridin-2-il]-3,4-dihidro-1*H*-quinolein-2-ona y su hidrocloreuro ;
- 2-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-6-(3-*terc*-butoximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridina ;
- 6-[6-(3-hidroximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridin-2-il]-3*H*-benzoxazol-2-ona y su hidrocloreuro ;
- Hidrocloreuro (1:1) de [2-(2-furan-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {3-[2-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-

il]fenil}metanol ;

- {3-[2-(5-clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il] fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(6-dimetilaminopiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(1*H*-indol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(6-aminopiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(1*H*-indol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(2-aminopiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(3-fenilisoxazol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol;
- [4-[2-(Benzofuran-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [3-[2-(piridin-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [4-[2-(piridin-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [3-[2-(tien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- 2-(Benzofuran-2-il)-6-[3-(2-metoxietoximetil)fenil]imidazo[1,2-*a*]piridina ;
- 6-[3-(2-metoxietoximetil)fenil]-2-(tien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridina y su oxalato ;
- [3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- Hidrocloruro (1:1) de [3-(3-metil-2-tien-2-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {3-[2-(1*H*-indol-3-il)-3-metilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;

- {3-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- {3-[2-(2-Etoxipirimidin-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- [2-(2-quinolein-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol y su hidrocloreuro ;
- {3-[2-(2-Cloro-piridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- [3-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol y su hidrocloreuro ;
- [3-(2-Benzo[b]tiofen-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol y su hidrocloreuro ;
- [3-(2-Benzo[b]tiofen-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol y su hidrocloreuro ;
- 3-(2-Benzo[b]tiofen-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol y su hidrocloreuro ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- {3-[2-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreuro ;
- [3-(2-Benzofuran-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol ;
- {3-[2-(3-Clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(5-metilisoxazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} propan-2-ol ;
- 2-[3-(3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-piridin-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(5-Clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] propan-2-ol ;

R5


- 2-[3-(2-Benzofuran-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]tienil-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-metil-1H-bencimidazol-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Furan-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]tienil-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-tiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1H-indazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloreto ;
- 2-{3-[2-(1H-Indazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol y su hidrocloreto ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1H-indazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloreto ;
- [2-Fluoro-6-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-piridin-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2-(2-Benzotiazol-2-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- [2-(2-Benzo[*b*]tiofen-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- {2-[2-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-6-fluorofenil}metanol ;
- [2-(2-Benzofuran-5-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- [2-(2-Benzo[*b*]tienil-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-tiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;

- [2,6-Difluoro-3-(3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-piridin-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {3-[2-(5-Clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-2,6-difluorofenil} metanol ;
- [3-(2-Benzofuran-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [3-(2-Benzofuran-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [3-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-tiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- 6-(3-metoximetilfenil)-2-(1-metil-1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridina y su hidrocloreto ;
- 2-(1*H*-Indol-6-il)-6-(3-metoximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridina y su hidrocloreto ;
- 2-{3-[2-(5-metilisoxazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- [2-Fluoro-6-(3-metil-2-tienil-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {2-[2-(5-Clorotiofén-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-6-fluorofenil} metanol ;
- [2-(2-Benzofuran-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- [2-(2-Benzofuran-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1-metil-1*H*-bencimidazol-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-furan-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]tienil-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-metil-1*H*-bencimidazol-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {3-[2-(2,3-Dihidrobencofuran-5-il)-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-2,6-difluorofenil} metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-furan-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;

- [3-(2-Benzofuran-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]tienyl-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- 2-(1*H*-Indol-6-il)-6-[3-[2-(metoxietil)oximetil]fenil]imidazo[1,2-*a*]piridina ;
- 2-[3-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- [2-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(4-metiltien-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-metil-1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Isoquinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,6-Difluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}-propan-2-ol ;
- 2-(3-{2-[1-(3-metilbutil)-1*H*-pirazol-4-il]imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il}fenil)propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolin-3-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(6-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol
- {2-Fluoro-6-[2-(3-fluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-metiltien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-pirimidin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(2-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-metiltien-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;

- {2-Fluoro-6-[2-(1-metil-1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-quinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-isoquinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {2-[2-(2,6-Difluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-6-fluorofenil}metanol ;
- (2-Fluoro-6-{2-[1-(3-metilbutil)-1*H*-pirazol-4-il]imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il}phenyl)metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(6-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-metiltien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(2-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-metiltien-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-metil-1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-(2-quinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil}metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-(2-isoquinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil}metanol ;
- {3-[2-(2,6-Difluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-2,6-difluorofenil}metanol ;
- (2,6-Difluoro-3-{2-[1-(3-metilbutil)-1*H*-pirazol-4-il]imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il}fenil)metanol ;
- *N-terc*-butil-5-[6-(2,4-difluoro-3-hidroxi metilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridin-2-il]nicotinamida ;

Según la invención, se pueden preparar los compuestos de la fórmula general (I) según el procedimiento descrito en el esquema 1.



Esquema 1

Se pueden preparar los compuestos de la invención según el esquema 1 (vía A) por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal tal como el paladio, entre una imidazopiridina de la fórmula general (IV), en la que R y R1 se definen como anteriormente e Y representa un átomo de halógeno o un derivado de boro, y un derivado de la fórmula general (VII) en la que R2, R3, R4 y X se definen como anteriormente, Z representa un derivado de boro o de estaño si Y representa un átomo de halógeno o un halógeno si Y representa un derivado de boro, para obtener los compuestos de la fórmula general (I), por ejemplo, según el método descrito por A. Gueiffier en *Helv. Chim. Acta* 2001, 84, 3610-3615.

Alternativamente, se pueden preparar los compuestos de la invención según el esquema 1 (ruta B) mediante una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal tal como el paladio, entre una 2-cloroimidazopiridina de la fórmula general (IX), en la que R, R2, R3, R4 y X se definen como anteriormente y un derivado de la fórmula general (X), en la que R1 se define como anteriormente y W representa un derivado de boro o de estaño, para obtener los compuestos de la fórmula general (I), por ejemplo, según el método descrito por S. Buchwald en *J.A.C.S.* 2005, 127, 4685.


Según el esquema 1 (ruta C), los derivados de fórmula general (XI), en la que R, R2, R3 y X

se definen como anteriormente y PG representa un grupo protector de función hidroxilo, tal como se describe por ejemplo en T. Greene en « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience) pueden someterse a una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal tal como paladio, con un derivado de fórmula general (X), en la que R1 se define como anteriormente y W representa un derivado de boro o de estaño, para obtener los compuestos de fórmula general (XII), por ejemplo según el método descrito por S. Buchwald en J.A.C.S. 2005, 127, 4685. Finalmente, los compuestos de fórmula general (XII) pueden someterse a una reacción de desprotección, tal como describe por ejemplo T. Greene en « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience), o mediante cualquier otro método conocido por el experto en la materia para obtener los compuestos de fórmula general (I).

Alternativamente, se pueden preparar los compuestos de la invención siguiendo el esquema 1 (ruta D) por una reacción de condensación entre una aminopiridina de fórmula general (XIII), en la que R2, R3, R4 y X se definen como anteriormente, no siendo R4 un átomo de hidrógeno y una halógenocetona de fórmula general (VI), en la que R y R1 se definen como anteriormente para obtener los compuestos de fórmula general (I) para los que R está en posición 3 del núcleo imidazopiridina.

Cuando R4 representa un átomo de hidrógeno, los compuestos de fórmula general (XII) pueden transformarse según el esquema 1 (ruta E) en derivados de fórmula general (XIV), en la que R2, R3 y X se definen tal como anteriormente y PG representa un grupo protector de función hidroxilo, tal como describe por ejemplo T. Greene en « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience), por ejemplo un grupo tertbutildimetilsilil, o por cualquier método conocido por el experto en la materia. Los compuestos de fórmula general (XIV) pueden condensarse con una halógenocetona de fórmula general (VI), en la que R y R1 se definen como anteriormente, para obtener los compuestos de fórmula general (XII), para los que R está en posición 3 del núcleo imidazopiridina. Finalmente, los compuestos de fórmula general (XII) pueden someterse a una reacción de desprotección, tal como describe por ejemplo T. Greene en « *Protective Groups in Organic Synthesis* » (Wiley Interscience), o mediante cualquier otro método conocido por el experto en la materia para obtener los compuestos de fórmula general (I).

Según la invención, se pueden preparar los intermedios de los compuestos de la fórmula general (I) según los procedimientos descritos en el esquema 2.



### Esquema 2

Según el esquema 2, los compuestos de fórmula general (IV) pueden obtenerse por condensación entre una aminopiridina de fórmula general (II), en la que R se define como anteriormente e Y representa un átomo de halógeno o un derivado de boro, y una halógenocetona de fórmula general (III), en la que R1 se define como anteriormente, por ejemplo según los métodos descritos por L. Cai en J. Med. Chem. 2007, 50, 4746, para obtener los compuestos de fórmula general (IV), para los que R está en posición 5, 7 u 8 del núcleo imidazopiridina.

Alternativamente, según el esquema 2 (ruta b), se pueden preparar los compuestos de fórmula general (IV) por condensación entre una aminopiridina de fórmula general (V), en la que Y representa un átomo de halógeno o un derivado de boro, y una halógenocetona de fórmula general (VI), en la que R y R1 se definen como anteriormente para obtener los compuestos de fórmula general (IV) para los que R está en posición 3 del núcleo imidazopiridina.

Según el esquema 2 (ruta c), los compuestos de fórmula general (XIIIa), (XIIIb) o (XIV) pueden obtenerse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal tal como paladio, entre una aminopiridina de fórmula general (Va) o (Vb) protegida por un grupo protector R' en la que Y representa un átomo de halógeno o un derivados de boro y un derivado de fórmula general (VII), en la que R2, R3 y X se definen como anteriormente, R6 representa R4 (compuestos XIIIa y XIIIb) o un grupo protector de la función hidroxilo PG (compuestos XIV) y Z representa un derivado de boro o de estaño si Y representa un halógeno o un halógeno si Y representa un derivado de boro.

Según el esquema 2 (ruta d), los compuestos de fórmula general (VIII) pueden obtenerse a partir de los compuestos de fórmula general (II), por ejemplo según el método descrito por C. Townsend en *Syn. Commun.* 1997, 27, 1763-1765. Los compuestos de fórmula general (IX) o (XI) en la que R, R2, R3 y X se definen como anteriormente y R6 representa un grupo R4 (compuestos IX) o un grupo protector PG (compuestos XI), pueden obtenerse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal tal como paladio, entre una imidazopiridina de fórmula general (VIII), en la que R se define como anteriormente e Y representa un átomo de halógeno o un derivado de boro, y un derivado de fórmula general (VII), en la que R2, R3 y X se definen como anteriormente, R6 representa un grupo R4 o un grupo protector PG y Z representa un derivado de boro o de estaño si Y representa un átomo de halógeno o un halogène si Y representa un derivado de boro, por ejemplo según el método descrito por A. Gueiffier en *Helv. Chim. Acta* 2001, 84, 3610-3615.

De una forma general, los intermediarios citados pueden ser sometidos, si se desea y si es necesario, a todas las reacciones de protección / desprotección conocidas por los expertos en la técnica antes y / o después de todas las reacciones descritas en los esquemas anteriores.


Los productos de fórmula (I), pueden someterse, si se desea y si es necesario, a cualquiera de las reacciones conocidas por el experto en la técnica, en cualquier orden, para ser transformados en otros productos de fórmula (I),

Como ejemplos de reacciones, se pueden citar : las reacciones de esterificación o de amidificación de la función ácido, reacciones de carbamoylación, reacciones de hidrólisis de la función éster, reacciones de transformación de la función hidroxilo en función alcoxi, reacciones de acoplamiento catalizadas por un metal de transición, reacciones de protección de las funciones reactivas, reacción de eliminación de los grupos protectores que pueden contener las funciones reactivas protegidas, reacciones de salificación por un ácido mineral u orgánico o por una base para obtener la sal correspondiente, reacciones de desdoblamiento de las formas racémicas en enantiómeros, estando dichos productos de fórmula (I) así obtenidos, llegado el caso, en todas las formas isómeras posibles, racémicas, enantiómeras y diastereoisómeras.


En los esquemas 1 y 2, los compuestos de partida y los reactivos, cuando no se describe su modo de preparación, se encuentran disponibles en el mercado o descritos en la bibliografía, o bien se pueden preparar según los métodos que se describen en la misma, o que son conocidos por el experto en la técnica.

La invención, según otro de sus aspectos, tiene igualmente por objeto los compuestos de fórmulas (VIII-1), (IX-1), (IX-2), (XI-1), (XI-2), (XI-3), (XI-4), (XIII-1), (XIII-2), (XIV-1), (XIV-2) y (XIV-3). Estos compuestos son útiles como intermediarios de síntesis de los compuestos de la fórmula (I).


5



(VIII-1)




(IX-1)




(IX-2)


10



(XI-1)




(XI-2)




(XI-3)


15



(XI-4)




(XIII-1)




(XIII-2)


20



(XIV-1)



(XIV-2)



(XIV-3)

25

El compuesto de la fórmula (VIII-1) se puede preparar, por ejemplo, según el procedimiento descrito en el ejemplo N° 3. En una primera etapa, se puede efectuar una condensación entre una aminopiridina sustituida con un derivado de boro tal como, por ejemplo, la 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina y el 2-bromoacetato de etilo. En una segunda etapa, se somete el compuesto a una reacción de ciclación y de cloración en presencia de un agente clorante tal como el oxiclورو de fósforo, que lleva al compuesto (VIII-1).

30

El compuesto de fórmula (IX-1) puede prepararse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal, tal como paladio, entre la 6-bromo-2cloroimida[1,2-a]piridina y el ácido acido 3-(hidroximetil)fenilborónico, tal como se describe en el ejemplo N°2.

35

El compuesto de fórmula (IX-2) puede prepararse por una reacción de acoplamiento,

catalizada por un metal, tal como paladio, entre el compuesto de fórmula (VIII-1) y 2-(3-bromofenil)propan-2-ol, tal como se describe en el ejemplo N°7

El compuesto de fórmula (XI-1) puede prepararse por acción del *terc*-butilclorodimetilsilano sobre el compuesto de fórmula (IX-1) en presencia de una base tal como imidazol y en un disolvente tal como tetrahidrofurano, tal como se describe en el ejemplo N°4.

El compuesto de fórmula (XI-2) puede prepararse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal, tal como paladio, entre (2-bromobenciloxi)*terc*-butildimetilsilano y el compuesto de fórmula (VIII-1), tal como se describe en el ejemplo N° 3.

El compuesto de fórmula (XI-3) puede prepararse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal, tal como paladio, entre (2-bromo-6-fluorobenciloxi)*terc*-butildimetilsilano y el compuesto de fórmula (VIII-1), tal como se describe en el ejemplo N° 13.

El compuesto de fórmula (XI-4) puede prepararse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal, tal como paladio, entre (3-bromo-2,6-fluorobenciloxi)*terc*-butildimetilsilano y el compuesto de fórmula (VIII-1), tal como se describe en el ejemplo N° 14.

El compuesto de fórmula (XIII-1) puede prepararse por una reacción de acoplamiento catalizada por un metal, tal como paladio, entre la 5-bromo-2-aminopiridina y un derivado de ácido borónico, por ejemplo el ácido 3-(hidroximetil)fenilborónico, tal como se describe en el ejemplo N°6.

El compuesto de fórmula (XIII-2) puede prepararse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal, tal como paladio, entre la 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina y 2-(3-bromofenil)propan-2-ol, tal como se describe en el ejemplo N°8.

El compuesto de fórmula (XIV-1) puede prepararse por acción de (*terc*-1-butilclorodimetil)silano sobre el compuesto de fórmula (XIII-1) en un disolvente, por ejemplo tetrahidrofurano, en presencia de una base tal como imidazol, tal como se describe en el ejemplo N°6.

El compuesto de fórmula (XIII-2) puede prepararse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal, tal como paladio, entre la 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina y 3-(*terc*-butiksimetilsililoximetil)-2,4-difluorobromobenceno, tal como se describe en el ejemplo N°10.

El compuesto de fórmula (XIII-3) puede prepararse por una reacción de acoplamiento, catalizada por un metal, tal como paladio, entre la 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina y 2-(*terc*-butilsimetilsililoximetil)-3-fluorobromobenceno, tal como se describe en el ejemplo N°9.

Los compuestos de fórmulas (VIII-1), (IX-1), (XI-1), (XI-2), (XIII-1) y (XIV-1) se han preparado en forma de polvo o de aceite, en forma de base o de sal. La tabla 1 reúne algunos datos fisicoquímicos de estos intermedios.

Tabla 1

5

| Nº       | R.M.N. $^1\text{H}$ (DMSO-d <sub>6</sub> , $\delta$ ppm) ; M+H ; PF                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (VIII-1) | 1,35 (m, 12H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; M+H = 279; PF = 115 - 120°C.                                                                                     |
| (IX-1)   | 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,35 a 7,75 (m, 6H); 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; M+H = 259.                                                                                               |
| (IX-2)   | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H); de 7,6 a 7,7 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                                |
| (XI-1)   | 0,10 (s, 6H) ; 0,92 (s, 9H) ; 4,79 (s, 2H) ; 7,37 (d, 1H); de 7,55 a 7,67 (m, 5H); 8,05 (s, 1H) ; 8,84 (t, 1H); M+H = 373; PF = 120 - 123 °C.                                             |
| (XI-2)   | (CDCl <sub>3</sub> ) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,15 a 7,55 (m, 7H); 8,15 (s, 1H); M+H = 373.                                                                          |
| (XI-3)   | (CDCl <sub>3</sub> ) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,05 a 7,1 (m, 2H) ; de 7,25 a 7,3 (m, 2H); 7,4 (s, 1H); 7,45 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H). M+H = 391.                        |
| (XI-4)   | 0,0 (s, 6H); 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; 7,15 (t, 1H); 7,4 (d, 1H); de 7,5 a 7,6 (m, 2H); 8,0 (s, 1H); 8,65 (s, 1H). M+H = 409.                                                           |
| (XIII-1) | 4,55 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,55 (d, 1H); 7,2 (d, 1H); de 7,3 a 7,55 (m, 3H); 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H); M+H = 201                                                       |
| (XIII-2) | 1,45 (s, 6H) ; 5,0 (s, 1H) ; 6,0 (s, 2H); 6,55 (d, 1H) ; de 7,3 a 7,4 (m, 3H); 7,65 (s, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H). M+H = 229                                                       |
| (XIV-1)  | 0,09 (s, 6H) ; 0,91 (s, 9H) ; 4,75 (s, 2H) ; 6,02 (m, 2H); 6,52 (dd, 1H); 7,21 (d, 1H); 7,36 (t, 1H); 7,43 (d, 1H); 7,47 (s, 1H); 7,66 (dd, 1H); 8,21 (d, 1H). M+H = 315; PF = 82 - 84 °C |
| (XIV-2)  | 0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; 7,05 (t, 1H) ; de 7,35 a 7,45 (m, 2H) ; 8,0 (s, 1H). M+H = 351                                                      |
| (XIV-3)  | 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; de 7,05 a 7,15 (m, 2H) ; de 7,3 a 7,4 (m, 1H) ; de 7,45 a 7,5 (m, 1H); 8,0 (d, 1H). M+H= 333                       |

Los ejemplos siguientes describen la preparación de ciertos compuestos según la invención. Estos ejemplos no son limitantes y sólo son para ilustrar la presente invención. Los números de los compuestos de los ejemplos se refieren a los que se dan en la tabla que sigue, que ilustra las estructuras químicas y las propiedades físicas de algunos compuestos

según la invención.

La nomenclatura de los compuestos ha sido establecida a partir del programa informático Autonom.

**Ejemplo 1: Hidrocloruro (2:1) de 6-(3-*terc*-butoximetilfenil)-2-(piridin-3-il)imidazo[1,2-*a*] piridina (compuesto 3 de la tabla)**

#### **1.1 *N*-[5-(3-*terc*-butoximetilfenil)piridin-2-il]acetamida**

Bajo una corriente de argón, 1,0 g de *N*-(5-bromopiridin-2-il)acetamida, 967 mg de ácido 3-(*terc*-butoximetil)fenilborónico y 269 mg de tetraquis(trifenilfosfina)paladio se colocan en un matraz que contiene 30 ml de dimetoxieano y 15 ml de una disolución 2M de carbonato de sodio previamente desgasificado. Se calienta a 90°C durante 15 horas. Después de enfriar, la mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El resto se recoge entre agua y diclorometano, la fase orgánica se separa, se seca sobre sulfato de sodio y el filtrado se concentra a presión reducida. El resto se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla diclorometano/metanol. El sólido obtenido se tritura con éter dietílico, se recoge por filtración, después se seca. Se obtienen 1,0 g de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 1,4 (s, 9H) ; 2,3 (s, 3H) ; 4,55 (s, 2H) ; de 7,4 a 7,55 (m, 3H); 7,6 (s, 1H) ; 8,05 (m, 1H) ; de 8,2 a 8,4 (m, 2H); 8,55 (m, 1H). M+H = 299.

#### **1.2 5-(3-*terc*-butoximetilfenil)piridin-2-ilamina**

559 mg de hidróxido de sodio en 2 ml de etanol y 2 ml de agua se colocan en un matraz que contiene 695 mg de *N*-[5-(3-*terc*-butoximetilfenil)piridin-2-il]acetamida. Se le añade 1 ml de agua y 1 ml de etanol y se calienta la mezcla a reflujo del disolvente durante 1 hora. Después de enfriar, la mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El resto se recoge entre agua y diclorometano, después la fase orgánica se separa, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. Se purifica el resto por cromatografía sobre gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 487 mg de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 1,25 (s, 9H); 4,45 (s, 2H); 6,05 (s, 2H) ; 6,55 (d, 1H) ; 7,25 (d, 1H); 7,35 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,5 (s, 1H) ; 7,7 (m, 1H) ; 8,25 (s, 1H). M+H = 257.

#### **1.3 6-(3-*terc*-butoximetilfenil)-2-piridin-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridina**

Se colocan en un matraz 487 mg de 5-(3-*terc*-butoximetilfenil)piridin-2-ilamina (obtenido según el protocolo descrito en el ejemplo 1.2), 380 mg de 2-bromo-1-piridin-3-iletanona en 15 ml de *n*-propanol. Se añaden 223 g de hidrogenocarbonato de sodio. Se calienta a 80°C durante 24 horas, se deja enfriar a temperatura ambiente y se concentra la mezcla de reacción a presión reducida. El resto se recoge entre agua y acetato de etilo. La fase orgánica se separa, se seca y el filtrado se concentra bajo presión reducida. Se purifica el resto por cromatografía sobre gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 128 mg de compuesto.

M+H = 358.

#### 10 1.4 Hidrocloruro (2:1) de 6-(3-*terc*-butoximetilfenil)-2-(piridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridina

121 mg de 6-(3-*terc*-butoximetilfenil)-2-piridin-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridina se ponen en suspensión en 5 ml de diclorometano ; se añaden gota a gota y con agitación, 7,48 ml de una disolución 0,1N de ácido clorhídrico en 2-propanol y se agita a temperatura ambiente durante 7 horas. La mezcla se concentra a presión reducida. Se tritura el sólido obtenido con éter dietílico y se recoge por filtración y se seca en estufa a presión reducida a 40 °C. El sólido se disuelve a continuación a temperatura ambiente en un mínimo de isopropanol, después se vuelve a precipitar con ayuda de éter isopropílico. El precipitado formado (después de 3h en el frigorífico) se recoge por filtración, se lava con pentano, a continuación se seca en estufa a presión reducida a 50°C. Se obtienen 60 mg de compuesto.

PF = 220 - 222 °C. Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 1,3 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); de 7,65 a 7,75 (m, 2H) ; de 7,85 a 8,0 (m, 2H); 8,05 (d, 1H) ; de 8,75 a 8,90 (m, 3H); 9,15 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H). M+H = 358.

#### 25 Ejemplo 2: Hidrocloruro (2:1) de [3-(2-quinolein-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol (compuesto 5 de la tabla)

##### 2.1 6-Bromo-3*H*-imidazo[1,2-*a*]piridin-2-ona

3,0 g de 5-bromopiridin-2-ilamina en 5,8 ml de 2-bromoacetato de etilo se colocan en un matraz y se agitan a temperatura ambiente durante 48 h. Se forma un precipitado que se recoge mediante filtración, se lava con éter dietílico y se seca en estufa a presión reducida. El sólido se recoge a continuación con 50 ml de etanol y se le añaden 2,18 g de hidrogénocarbonato de sodio. Se calienta la mezcla de reacción a reflujo del disolvente durante 5 h, se enfría a temperatura ambiente y después se concentra a presión reducida. El resto obtenido se recoge entre diclorometano y agua y la fase orgánica se separa, se seca y se

concentra a presión reducida. Se obtienen 1,46 g de compuesto, que se utiliza tal cual en las etapas siguientes.

M+H = 214.

## 2.2 6-Bromo-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina

- 5 Una mezcla de 1,4 g de 6-bromo-3*H*-imidazo[1,2-*a*]piridin-2-ona en 5 ml de POCl<sub>3</sub> se calienta a 105°C durante 2 horas, a continuación se enfría a temperatura ambiente y se concentra a presión reducida. Se recoge el residuo entre diclorometano y agua y se le añade una disolución acuosa al 30 % de NH<sub>4</sub>OH hasta pH básico. A continuación se separa la fase orgánica, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. A
- 10 continuación se purifica el residuo por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 760 mg de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-*d*<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 7,35 (d, 1H); 7,55 (m, 2H); 8,3 (s, 1H). M+H = 232.

## 2.3 [3-(2-Cloroimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol

- 15 En un matraz, se colocan 760 mg de 6-bromo-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina en 25 ml de tolueno y 8 ml de etanol y se desgasifica con argón durante 10 min. Después de añadir 230 mg de tetraquis(trifenilfosfina)paladio, se agita 5 min a temperatura ambiente, a continuación se añaden 650 mg de ácido 3-(hidroximetil)fenilborónico y 8 ml de una disolución 2M de carbonato de sodio. Se calienta la mezcla de reacción a 80 °C durante 16
- 20 h, después se enfría a temperatura ambiente y se concentra a presión reducida. El resto se recoge entre agua y acetato de etilo y la fase orgánica se separa, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. El aceite obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de heptano/acetato de etilo. Se obtienen 550 mg de compuesto.

- 25 Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-*d*<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,35 a 7,75 (m, 6H); 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H). M+H = 259.

## 2.4 [3-[2-(quinolein-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol

- En un reactor helicoidal, se colocan 550 mg de [3-(2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol, 550 mg de ácido 3-quinoleineborónico, 20 mg de acetato de paladio, 70 mg
- 30 de 2-diciclohexilfosfino-2',6'-dimetoxi-1,1'-bifenil y 900 mg de K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> en 8 ml de tolueno anhidro. El reactor se cierra y se calienta a 115°C durante 16 h. Después de enfriarla, la mezcla de reacción se filtra por celita y se lava con diclorometano. La fase orgánica se lava con agua, se lava con una disolución saturada de NaCl, después se separa, se seca y se

concentra a presión reducida. Se purifica el resto por cromatografía sobre gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 90 mg de compuesto.

M+H = 351.

**2.5 Hidrocloruro (2:1) de [3-[2-(quinolein-3-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil]metanol**

Una disolución de 90 mg de [3-[(2-quinolein-3-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil]metanol en diclorometano y metanol se pasa sobre vidrio fritado, a continuación se añaden al filtrado 5,2 ml de una disolución 0,1N de ácido clorhídrico en isopropanol. Se forma un precipitado que se recoge por filtración y se lava con éter dietílico. El sólido se disuelve a continuación a temperatura ambiente en el mínimo de metanol y después se recoge con éter dietílico. El precipitado se recoge por filtración y se seca en estufa bajo presión reducida. Se obtienen 66 mg de compuesto.

PF = 279 - 281 °C. Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (m, 2H) ; 7,95 (m, 1H); 8,0 (m, 1H) ; 8,1 (m, 1H) ; 8,2 (m, 2H); 8,95 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 9,6 (s, 1H). M+H = 445.

**Ejemplo 3: Hidrocloruro (1:1) de [2-[2-(furan-3-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil]metanol (compuesto 12 de la tabla)**

**3.1 Hidrobromuro de [2-imino-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2H-piridin-1-il]acetato de etilo**

Se ponen en un matraz 5,0 g de 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina en 7,6 ml de 2-bromoacetato de etilo y la mezcla se agita a temperatura ambiente durante 20 h. Se forma un precipitado que se recoge por filtración, se lava con éter dietílico y con etanol y se seca en estufa bajo presión reducida. Se obtienen 8,78 g de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 1,3 (m, 15H) ; de 4,1 a 4,25 (m, 2H) ; 5,2 (s, 2H) ; 7,1 (d, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,3 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H). M+H = 388.

**3.2 2-Cloro-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)imidazo[1,2-a]piridina**

En un matraz se colocan 8,78 g del compuesto obtenido según el protocolo descrito en 3.1 en 20 ml de POCl<sub>3</sub>. La mezcla de reacción se calienta a 105°C durante 16h, se enfría a temperatura ambiente y se concentra bajo presión reducida. El resto se recoge entre diclorometano y agua a 0°C y se añade una disolución acuosa al 30% de NH<sub>4</sub>OH hasta pH básico. Se separa la fase orgánica, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. Se obtienen 4,3 g de compuesto.

PF = 115 - 120°C. Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 1,35 (m, 12H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H). M+H = 279.

### 3.3 (2-Bromobenciloxi)*terc*-butildimetilsilano

Se ponen en un matraz 2,0 mg de (2-bromofenil)metanol y se disuelven en 100 ml de tetrahydrofurano. Se añaden 1,1 g de 1*H*-imidazol y después 2,1 g de cloruro de *terc*-butildimetilsilano y se deja en agitación a temperatura ambiente durante 48 horas. La mezcla de reacción se hidroliza con agua y la fase orgánica, extraída con acetato de etilo, se separa, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra bajo presión reducida. El resto obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla heptano/acetato de etilo. Se obtienen 2,66 g de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm): 0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,6 (s, 2H); 6,95 (m, 1H) ; 7,2 (m, 1H) ; de 7,35 a 7,45 (m, 2H). M+H = 302.

### 3.4 6-[2-[(*terc*-butildimetilsilanil)oximetil]fenil-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina

450 mg de (2-bromobenciloxi)*terc*-butildimetilsilano, 500 mg de 2-cloro-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridina y 1,46 g de carbonato de cesio se disuelven en 8 ml de tetrahydrofurano y 1 ml de agua. Se desgasifica con argón durante 10 min, se añaden 110 mg de [1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio y se calienta a reflujo del disolvente durante 16 horas. Después de enfriarse, se hidroliza la mezcla de reacción con agua y la fase orgánica, extraída con diclorometano, se separa, se seca y se concentra a presión reducida. El aceite obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de heptano/acetato de etilo. Se obtienen 260 mg de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm): 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,15 a 7,55 (m, 7H); 8,15 (s, 1H). M+H = 373.

### 3.5 6-[2-[(*terc*-butildimetilsilanil)oximetil]fenil]-2-(furan-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridina

3 mg de acetato de paladio, 11 mg de 2-(díciclohexil)fosfino-2',6'-dimetoxi-1,1'-bifenil, 270 mg de K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, 110 mg de ácido 3-furaneborónico y algunas gotas de etanol se colocan en un reactor que contiene una mezcla de 240 mg de 6-[2-[(*terc*-butildimetilsilanil)oximetil]fenil]-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina en 2 ml de tolueno previamente esgasificado con corriente de argón. El reactor se cierra y se calienta a 115°C durante 16 h. Después de enfriarse, se filtra la mezcla sobre celita, se lava con diclorometano y después se concentra a presión reducida. Se purifica el residuo por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 258 mg de compuesto.

Espectro RMN  $^1\text{H}$  ( $\text{CDCl}_3$ ,  $\delta$  en ppm): 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,55 (s, 2H) ; 6,75 (m, 1H); de 7,1 a 7,6 (m, 8H); 7,95 (s, 1H); 8,15 (s, 1H).  $\text{M}+\text{H} = 405$ .

### 3.6 [2-[2-(Furan-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol

Se colocan en un matraz 250 mg de 6-[2-[(*tert*-butildimetilsilaniloxi)metil]fenil]-2-(furan-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridina en 6 ml de tetrahidrofurano y se le añaden 320 mg de fluoruro de tetrabutilamonio. La mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 48 h y se concentra a presión reducida. Se purifica el resto por cromatografía sobre gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 156 mg de compuesto.

10  $\text{M}+\text{H} = 291$ .

### 3.7 Hidrocloruro (1:1) de [2-(2-(furan-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol

156 mg de [2-(2-furan-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol se ponen en suspensión en diclorometano ; se le añaden, gota a gota, 5,4 ml de una disolución de ácido clorhídrico 0,1 N en isopropanol y se agita a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El sólido residual se recoge con éter dietílico, el precipitado se recoge por filtración, se lava con éter dietílico y se seca en estufa a presión reducida.

PF = 205 - 208 °C. Espectro RMN  $^1\text{H}$  ( $\text{DMSO}-d_6$ ,  $\delta$  en ppm):  $\delta$  4,45 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,45 (t, 1H); 7,5 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ; de 7,9 a 8,0 (m, 3H); 8,45 (s, 1H); 8,55 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).  $\text{M}+\text{H} = 327$ .

**Ejemplo 4 : Hidrocloruro (1:1) de {3-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol (compuesto N°33 de la tabla)**

#### 4.1 Hidrobromuro de (5-bromo-2-imino-1*H*-piridin-1-il)acetato de etilo

Procediendo como en el ejemplo 3.1 y a partir de 5,0 g de 5-bromopiridin-2-ilamina y de 9,6 ml de 2-bromoacetato de etilo, se obtienen 9,56 g de compuesto.

Espectro RMN  $^1\text{H}$  ( $\text{DMSO}-d_6$ ,  $\delta$  en ppm):  $\delta$  1,3 (t, 3H); 4,25 (q, 2H); 5,15 (s, 2H) ; 7,15 (d, 1H); 8,1 (d, 1H); 8,45 (s, 1H); 8,95 (s, 1H) ;  $\text{M}+\text{H} = 341$ .

#### 4.2 6-Bromo-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina

Procediendo como en el ejemplo 3.2, partiendo de 9,5 g de hidrobromuro de (5-bromo-2-imino-1*H*-piridin-1-il)acetato de etilo y de 30 ml de  $\text{POCl}_3$ , se obtienen 6,7 g de 6-bromo-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina. El compuesto se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de heptano/acetato de etilo. Se obtienen 5,97 g de

compuesto. PF = 155 - -159 °C. Espectro RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm): 7,35 (d, 1H); de 7,45 a 7,6 (m, 2H); 8,3 (s, 1H) ; M+H = 232.

#### 4.3 6-[3-[(*tert*-butildimetilsilaniloxy)metil]fenil]-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina

Se colocan en un matraz 5,7 g de [3-(2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol  
5 obtenido según el protocolo descrito en el ejemplo 2.3 en 220 ml de tetrahydrofurano, a continuación se añaden 1,95 g de 1*H*-imidazol y 3,65 g de cloruro de *tert*-butildimetilsilano y se deja agitando a temperatura ambiente durante 48 horas. A continuación se hidroliza la mezcla de reacción con 150 ml de agua y la fase orgánica, extraída con acetato de etilo, se separa, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. El sólido  
10 residual se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de heptano/acetato de etilo. Se obtienen 6,1 g de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm): 0,10 (s, 6H) ; 0,92 (s, 9H) ; 4,79 (s, 2H) ; 7,37 (d, 1H); de 7,55 a 7,67 (m, 5H); 8,05 (s, 1H) ; 8,84 (t, 1H). PF=120-123°C. M+H = 373.

#### 4.4 6-[3-[(*tert*-butildimetilsilaniloxy)metil]fenil]-2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridina

Se colocan en un reactor 200 mg de 6-[3-[(*tert*-butildimetilsilaniloxy)metil]fenil]-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina en 2 ml de tolueno y se desgasifica con corriente de argón durante 10 min, a continuación se añaden 3 mg de acetato de paladio, 11 mg de 2-(díciclohexil)fosfino-2',6'-dimetoxi-1,1'-bifenilo, 110 mg de ácido 6-indolborónico, 230 mg  
20 de K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> y algunas gotas de etanol. El reactor se cierra y se calienta a 115°C durante 16 h. Después de enfriarse, la mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida y el resto obtenido se purifica a continuación mediante cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de heptano/acetato de etilo. Se obtienen 180 mg de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm): 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; 6,4 (m, 1H);  
25 7,1 (m, 1H) ; de 7,2 a 7,35 (m, 4H); 7,4 (s, 1H); 7,55 (m, 2H); 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,15 (s, 1H) 8,35 (m, 1H) 11,5 (s, 1H) ; M+H = 454.

#### 4.5 {3-[2-(1*H*-Indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol

210 mg de fluoruro de tetrabutilamonio se introducen en un matraz que contiene 180 mg de 6-[3-[(*tert*-butildimetilsilaniloxy)metil]fenil]-2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridina  
30 en 4 ml de tetrahydrofurano. La mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 48 h y se concentra a presión reducida. Se purifica el resto por cromatografía sobre gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 117 mg de compuesto.

Espectro RMN  $^1\text{H}$  (DMSO- $d_6$ ,  $\delta$  en ppm):  $\delta$  4,65 (d, 2H); 5,3 (t, 1H); 6,5 (m, 1H); 7,4 (m, 2H); 7,5 (t, 1H); de 7,6 a 7,75 (m, 6H); 8,1 (s, 1H); 8,4 (s, 1H); 8,9 (s, 1H); 11,2 (s, 1H).  $M+H = 340$ .

**4.6 CHidrocioruro (1:1) de {3-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol**

110 mg de {3-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol se ponen en suspensión en diclorometano y metanol; se le añaden, gota a gota, 3,2 ml de una solución de ácido clorhídrico 0,1 N en isopropanol. La mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El sólido residual se recoge con éter dietílico, el precipitado se recoge por filtración y se seca en estufa a presión reducida.

PF = 251 - 254 °C. . Espectro RMN  $^1\text{H}$  (DMSO- $d_6$ ,  $\delta$  en ppm) : 4,65 (s, 2H); 6,55 (s, 1H); 7,45 (d, 1H); 7,55 (m, 2H); 7,65 (d, 1H); 7,7 (d, 1H); 7,75 (m, 2H); 8,0 (d, 1H); 8,1 (s, 1H); 8,25 (d, 1H); 8,7 (s, 1H); 9,25 (s, 1H); 11,6 (s, 1H).  $M+H = 376$ .

**Ejemplo 5 : [3-[2-(Benzofuran-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol (compuesto 23 de la tabla)**

**5.1 2-(Benzofuran-3-il)-6-bromoimidazo[1,2-*a*]piridina**

En un tubo de vidrio se disuelven 250 mg de 1-(benzofuran-3-il)-2-bromoetanona, 181 mg de 5-bromopiridin-2-ilamina y 105 mg de hidrógenocarbonato de sodio en 15 ml de *n*-propanol. El tubo se cierra y se calienta a 80°C durante 20 h. Después de enfriarse, se añaden 20 ml de agua y la mezcla de reacción se agita 1 hora a temperatura ambiente. Se forma un precipitado que se recoge mediante filtración, se lava con agua y después con éter diisopropílico y se seca en desecador a presión reducida. Se obtienen 250 mg de compuesto.

PF=151-153°C. RMN  $^1\text{H}$  (DMSO- $d_6$ ,  $\delta$  en ppm): de 7,31 a 7,43 (m, 3H); de 7,53 a 7,68 (m, 2H); 8,15 (m, 1H); 8,42 (s, 1H); 8,50 (s, 1H); 8,87 (m, 1H).  $M+H = 314$ .

**5.2 [3- (2-(Benzofuran-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol**

100 mg de 2-(benzofuran-3-il)-6-bromoimidazo[1,2-*a*]piridina, 73 mg de ácido 3-(hidroximetil)fenilborónico y 11 mg de tetraquis(trifenilfosfina)paladio se colocan en un tubo de microondas. Se le añaden 2 mL de acetonitrilo, 2 ml de tolueno y 1,5 mL de una disolución 2N de carbonato de sodio. Se pone el tubo en un aparato de microondas y se irradia a 150 °C durante 15 min. La fase orgánica se separa, se seca y después se concentra bajo presión reducida. El resto aceitado se recoge con 3 ml de diclorometano y se tritura

144

durante 1 hora. El precipitado se recoge por filtración, se lava con éter diisopropílico y se seca en desecador bajo presión reducida. Se obtienen 44 mg de compuesto.

PF=150-152°C. RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm): 4,6 (d, 2H); 5,25 (t, 1H); de 7,25 a 7,75 (m, 9H); 8,2 (m, 1H); 8,45 (s, 1H); 8,5 (s, 1H); 8,9 (t, 1H). M+H = 341.

5 **Ejemplo 6 : Hidrocloruro (1:1) de [3-(3-metil-2-tien-2-il-imidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]metanol (compuesto 31 de la tabla)**

6.1 **[3-(6-Aminopiridin-3-il)fenil]metanol**

2,0 g de tetraquis(trifenilforfina)paladio y 75 ml de una disolución 2M de carbonato desodio se añaden a unmatraz que contiene una disolución de 5,0 g de 5-bromopiridin-2-ilamina y 5,7 g de ácido 3-(hidroximetil)fenilborónico en 140 ml de tolueno, y 70 ml de etanol previamene desgasificado. Se calienta a 80°C, durante 16h. Después de enfriar, la mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El resto se recoge entre agua y acetato de etilo. Se separa la fase orgánica, se seca y se concentra a presión reducida. Se purifica el residuo por cromatografía sobre gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 4,99 g de compuesto.

RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm): 4,55 (d, 2H); 5,2 (t, 1H); 6,05 (s, 2H); 6,55 (d, 1H); 7,2 (d, 1H); de 7,3 a 7,55 (m, 3H); 7,7 (d, 1H); 8,25 (s, 1H); M+H = 201.

6.2 **5-[3-(*terc*-butildimetilsilaniloximetil)fenil]piridin-2-ilamina**

Se ponen en un matraz 4,99 mg de 3(6-amonipiridin-3-il)fenil]metanol y se disuelven en 240 ml de tetrahidrofurano. Se añaden 2,2 g de 1*H*-imidazol y después 4,51 g de cloruro de *terc*-butildimetilsilano y se deja en agitación a temperatura ambiente durante 48 horas. La mezcla de reacción se hidroliza con agua y la fase orgánica, extraída con acetato de etilo, se separa, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra bajo presión reducida. El resto obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla heptano/acetato de etilo. Se obtienen 7,0 g de compuesto.

RMN 1H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm): 0,09 (s, 6H); 0,91 (s, 9H); 4,75 (s, 2H); 6,02 (m, 2H); 6,52 (dd, 1H); 7,21 (d, 1H); 7,36 (t, 1H); 7,43 (d, 1H); 7,47 (s, 1H); 7,66 (dd, 1H); 8,21 (d, 1H). M+H = 315; PF = 82 - 84 °C.

30 **6.3 6-[3-(*terc*-butildimetilsilaniloximetil)fenil]-3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-a]piridina**

En un tubo de vidrio se disuelven 280 mg de 5-[3-(*terc*-butildimetilsilaniloximetil)fenil]piridin-2-ilamina, 390 mg de 2-bromo-1-tiofen-2-ilpropan-

1-ona y 190 mg de hidrógenocarbonato de sodio en 5 ml de etanol. El tubo se cierra y se calienta a 100°C durante 20 h. Después de enfriar, la mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El residuo se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de heptano/acetato de etilo. Se obtienen 260 mg de compuesto.

- 5 Espectro RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm): 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 2,6 (s, 3H); 4,7 (s, 2H) ; 7 (m, 1H); de 7,2 a 7,6 (m, 8H); 7,45 (s, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; M+H = 435.

#### 6.4 [3-(3-metil-2-tien-2-il-imidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]metanol

- 10 310 mg de fluoruro de tetrabutilamonio se introducen en un matraz que contiene 260 mg de 6-[3-(*tert*-butildimetilsilaniloximetil)fenil]-3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-a]piridina en 6 ml de tetrahidrofurano. La mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 48 h y se concentra a presión reducida. Se purifica el resto por cromatografía sobre gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se obtienen 140 mg de compuesto. M+H = 321

- 15 6.5 Hidrocloruro (1:1) de [3-(3-metil-2-tien-2-il-imidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]metanol

- 140 mg de [3-(3-metil-2-tien-2-il-imidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]metanol se ponen en suspensión en diclorometano y metanol; se le añaden, gota a gota, 3,2 ml de una solución de ácido clorhídrico 0,1 N en isopropanol. La mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El sólido residual se recoge con éter dietílico, el precipitado se recoge por 20 filtración y se seca en estufa a presión reducida. Se obtienen 150 mg de compuesto.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm): δ 2,85 (s, 3H) ; 4,75 (s, 2H) ; 7,35 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,75 (d, 1H) ; 7,85 (m, 2H) ; 7,9 (d, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; M+H = 321; PF = 279 - 283 °C.

- 25 Ejemplo 7 : 2-{3-[2-(1H-Indol-6-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol (compuesto 47 de la tabla)

#### 7.1 2-(3-bromofenil)propan-2-ol

- 30 Bajo corriente de argón, se colocan en un matraz 6,5 g de 3-bromoacetofenona y se disuelven en 544 ml de éter dietílico y 272 ml de tetrahidrofurano. Se enfría a 0°C en un baño de hielo y se le añaden gota a gota 100 ml de una disolución 1M de bromuro de metilmagnesio en éter dibutílico. Se agita la mezcla a 0°C durante 1h y se añaden 400 ml de una disolución acuosa saturada de cloruro de amonio. Se separa la fase orgánica, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. Se obtienen 10.0 g de compuesto. RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,45 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,4 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,65 (s, 1H).

146

## 7.2 2-[3-(2-Cloro-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-fenil]propan-2-ol

Se colocan en un matraz 85,5 ml de tetrahidrofurano y 9,5 ml de agua, se desgasifica con argón durante 10 min y se añaden sucesivamente 5,8 g del compuesto obtenido en 7.1, 4,48 g de 2-cloro-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,2,3-dioxaborolan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridina obtenido en 3.2, 20,35 g de carbonato de cesio y 0,85 g de [1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dihloropaladio. Se agita la mezcla 2 horas a reflujo de tetrahidrofurano. Después de enfriarse a temperatura ambiente, los disolventes se evaporan a presión reducida. El resto se recoge entre agua y acetato de etilo. La fase orgánica se lava 2 veces con una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. El residuo obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/acetato de etilo. Se tritura el sólido obtenido con éter diisopropílico, se recoge por filtración, después se seca en estufa a presión reducida. Se obtienen 2,31 g de compuesto. RMN <sup>1</sup>H (DMSO-*d*<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H); de 7,6 a 7,7 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).

## 7.3 2-{3-[2-(1H-Indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol

4 mg de acetato de paladio, 14 mg de 2-(díciclohexil)fosfino-2',6'-dimetoxi-1,1'-bifenilo, 175 mg de ácido indol-6-borónico, 355 mg de K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> y algunas gotas de etanol se colocan en un reactor que contiene una mezcla de 250 mg del compuesto obtenido en la etapa 7.2 en 3,1 ml de tolueno anhidro previamente desgasificado en corriente de argón. El reactor se cierra y se calienta a 115°C durante 16 horas. Después de enfriarse, se filtra la mezcla de reacción sobre celita y después se concentra a presión reducida. El residuo obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de heptano/acetato de etilo. Se obtienen 210 mg de compuesto. PF=203-204°C.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-*d*<sub>6</sub>, δ en ppm): 1,55 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 6,45 (s, 1H) ; de 7,4 a 7,75 (m, 8H); 7,85 (s, 1H); 8,05 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).

**Ejemplo 8 2-[3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol (compuesto 49 de la tabla)**

### 8.1 2-[3-(6-Aminopiridin-3-il)fenil]propan-2-ol

Bajo corriente de argón, se colocan en un matraz 9,0 g del compuesto obtenido en la etapa 7.1, 11,05 g de 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina, 83,7 ml de una disolución 2M de carbonato de sodio y 1,70 g de tetrakis(trifenilfosfina)paladio que se disuelven en 523 ml de N,N-dimetilformamida. La mezcla se calienta 1h30 a 80°C. Después

de enfriamiento a temperatura ambiente, se añade al medio de reacción 1 l de acetato de etilo, que se filtra sobre celita. La fase orgánica se separa, se lava 3 veces con una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra bajo presión reducida. Se purifica el residuo por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. El sólido obtenido se tritura en éter diisopropílico, se recoge por filtración y se seca en estufa bajo presión reducida. Se obtienen 2,35 g de compuesto.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,45 (s, 6H) ; 5,0 (s, 1H) ; 6,0 (s, 2H); 6,55 (d, 1H) ; de 7,3 a 7,4 (m, 3H); 7,65 (s, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H).

## 8.2 2-[3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol (compuesto 49 de la tabla)

58 mg (0,7 mmol) de bicarbonato de sodio se pesan en un tubo de microondas. Se le añaden 57 mg (0,25 mmol) del compuesto obtenido en 8.1 en disolución en 2 ml de propan-1-ol, a continuación 92 mg (0,375 mmol) de 2-bromo-1-(tienil-3-il)etanona en disolución en 1 ml de propan-1-ol. El tubo se sella, después se agita a 80°C durante 16 horas. La mezcla de reacción se enfría a temperatura ambiente, se le añaden 200 mg de propanotiol sobre sílice (Biotage Si-Tiol) y la mezcla se agita 6h a temperatura ambiente, después se filtra. El residuo se lava 2 veces con 2 ml de propan-1-ol, a continuación el filtrado se evapora y se purifica por cromatografía. Se obtienen 34,2 mg de compuesto.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H); de 7,5 a 7,55 (m, 2H); de 7,6 a 7,7 (m, 4H); 7,8 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).M+H = 335.

## Ejemplo 9: [2-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-a]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol (compuesto 69 de la tabla)

### 9.1 (2-Bromo-6-fluorofenil)metanol

20,0 g (0,098 mol) de 2-bromo-6-fluorobenzaldehído se disuelven en 500 ml de metanol y se enfrían en un baño de hielo; a continuación se le añade en porciones 3,72 g (0,098 mmol) de borohidruro de sodio. La mezcla se agita en frío 1 hora y luego se evapora el disolvente a presión reducida. El resto se recoge entre diclorometano y agua, la fase orgánica se separa, se seca y se concentra a presión reducida. El resto se cristaliza en n-pentano. Se obtienen 18,1 g de compuesto.

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 2,15 (t, 1H); 4,95 (d, 2H); de 7,05 a 7,3 (m, 2H); 7,45 (d, 1H).

### 9.2 (2-Bromo-6-fluorobenciloxi)terc-butildimetilsilane

En un matraz de 500 ml, se disuelven 15,7g (0,076 mol) del compuesto obtenido anteriormente en 230 ml de THF y se añaden 7,8 g (0.115 mol) de imidazol, a continuación

13,8g (0,092 mol) de cloruro de *terc*-butildimetilsilano y se agita la mezcla de reacción durante 16 horas. A continuación se evapora el disolvente a presión reducida, se recoge el residuo entre agua y éter dietílico, se decanta, se lava la fase orgánica con agua y se seca sobre sulfato de sodio. Después de evaporación del disolvente, se recogen 25 g de aceite.

- 5 RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0,0 (s, 6H); 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H) ; de 6,8 a 7,05 (m, 2H); 7,25 (d, 1H).

### 9.3 5-[2-(*terc*-butildimetilsilaniloximetil)-3-fluorofenil]piridin-2-ilamina

- 6,4 g del compuesto obtenido en 9.2, 4,40 g de 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina, 30 ml de una disolución 2M de carbonato de sodio y 816 mg de [1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio se disuelven en 80 ml de *N,N*-dimetilformamida y se colocan en una matraz bajo corriente de argón. La mezcla se calienta 2h a 80°C. Después de enfriamiento a temperatura ambiente, se evaporan los disolventes a presión reducida y se recoge en resto entre agua y acetato de etilo y se elimina un insoluble por filtración sobre celita. La fase orgánica se decanta, se lava con una disolución acuosa saturada de cloruro de sodio y se seca sobre sulfato de sodio. El compuesto se purifica por cromatografía eluyendo con una mezcla de diclorometano y metanol. Se obtienen 4,58 g de aceite.
- 10
- 15

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; de 7,05 a 7,15 (m, 2H) ; de 7,3 a 7,4 (m, 1H) ; de 7,45 a 7,5 (m, 1H); 8,0 (d, 1H).

- 20 M+H= 333

### 9.4 2-{6-[2-(*terc*-butildimetilsilaniloximetil)-3-fluorofenil]imidazo[1,2-*a*]piridin-2-il}benzotiazol

- 58 mg (0,7 mmol) de bicarbonato de sodio se pesan en un tubo de microondas. Se le añaden 83 mg (0,25 mmol) del compuesto obtenido en 9.3 en disolución en 2 ml de propan-1-ol, a continuación 0,375 mmol de 1-(benzotiazol-2-il)-2-bromoetanona en disolución en 1 ml de propan-1-ol. El tubo se sella, después se agita a 80°C durante 16 horas. La mezcla de reacción se enfría a temperatura ambiente, se le añaden 200 mg de propanotiol sobre sílice (Biotage Si-Tiol) y la mezcla se agita 6h a temperatura ambiente, después se filtra y el filtrado se evapora a presión reducida.. El compuesto se utiliza tal cual para la etapa siguiente.
- 25
- 30

### 9.5 [2-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol

El compuesto bruto obtenido en 9.4 se disuelve en 5 ml de THF que contiene 0,5 mmol de fluoruro de tetrabutilamonio hidratado. La mezcla se agita 16h a temperatura ambiente y el disolvente se evapora bajo presión reducida. El compuesto se purifica por cromatografía. Se

obtienen 37,5 mg de compuesto.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 a 7,35 (m, 2H); de 7,45 a 7,5 (m, 2H); de 7,5 a 7,6 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H). M+H = 376.

5 **Ejemplo 10: [2,6-Difluoro-3-(3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol (compuesto 75 de la tabla)**

**10.1 (3-bromo-2,6-difluorofenil)metanol**

20 g de 3-bromo-2,6-difluorobenzaldehído se disuelven en 450 ml de metanol y se enfrían en un baño de hielo; a continuación se le añade en porciones 3,42 g de borohidruro de sodio.

10 La mezcla se agita a temperatura ambiente durante 1 hora y luego se evapora el disolvente a presión reducida. El resto se recoge entre diclorometano y agua, la fase orgánica se separa, se seca y se concentra a presión reducida. El resto se cristaliza en n-pentano. Se obtienen 14,6 g de compuesto.

15 Espectro Rmin <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 2,0 (s, 1H) ; 4,9 (s, 2H) ; de 6,85 a 7,0 (m, 1H) ; de 7,5 a 7,65 (m, 1H).

**10.2 (3-Bromo-2,6-difluorobenciloxi)*tert*-butildimetilsilane**

11,15 g del compuesto obtenido en 10.1 se disuelven en 150 ml de THF, se añaden 5,1 g de imidazol, a continuación 9,04 g de cloruro de *tert*-butildimetilsilano y se agita la mezcla a temperatura ambiente durante 24 horas. A continuación se evapora el disolvente, se recoge el residuo con agua y éter dietílico, se decanta, se lava la fase orgánica con agua y se seca sobre sulfato de sodio. Se evapora el disolvente a presión reducida. Se obtienen 17,5 g de aceite.

Espectro RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0,0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,65 (s, 2H) ; de 6,65 a 6,7 (m, 1H) ; de 7,3 a 7,4 (m, 1H).

25 **10.3 5-[3-(*tert*-butildimetilsilaniloximetil)-2,4-difluorofenil]piridin-2-ilamina**

6,7 g del compuesto obtenido en 10.2, 4,40 g de 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-ilamina, 30 ml de una disolución 2M de carbonato de sodio y 816 mg de [1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio se disuelven en 80 ml de *N,N*-dimetilformamida y se colocan en una matraz bajo corriente de argón. La mezcla se calienta 2h a 80°C.

30 Después de enfriamiento a temperatura ambiente, se evaporan los disolventes a presión reducida y se recoge en resto entre agua y acetato de etilo y se elimina un insoluble por filtración sobre celita. La fase orgánica se decanta, se lava con una disolución acuosa saturada de cloruro de sodio y se seca sobre sulfato de sodio. El compuesto se purifica por cromatografía eluyendo con una mezcla de diclorometano y metanol. Se obtienen 4,25 g de

sólido blanco.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,8 (s, 9H) ; 4,4 (s, 2H) ; 6,05 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; 7,05 (t, 1H) ; de 7,35 a 7,45 (m, 2H) ; 8,0 (s, 1H). M+H = 351.

**10.4 6-[3-(*terc*-butildimetilsilaniloximetil)-2,4-difluorofenil]-3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridina**

Se pesan 58,8 mg (0,7 mmoles) de bicarbonato de sodio en un tubo de microondas. Se le añaden 83 mg (0,25 mmol) del compuesto obtenido en 10.3 en disolución en 2 ml de propan-1-ol, a continuación 0,375 mmol de 2-bromo-1-(tien-2-il)propan-1-ona en disolución en 1 ml de propan-1-ol. El tubo se sella, después se irradia durante 10 min a 180°C. La mezcla de reacción se enfría a temperatura ambiente, se le añaden 200 mg de propanotiol sobre sílice (Biotage Si-Tiol) y la mezcla se agita 6h a temperatura ambiente, después se filtra. El residuo se lava 2 veces con 2 ml de propan-1-ol, a continuación el filtrado se evapora. El compuesto se utiliza tal cual para la etapa siguiente.

**10.5 [2,6-Difluoro-3-[3-metil-2-(tien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol**

El compuesto bruto obtenido en 10.4 se disuelve en 5 ml de THF que contiene 0,5 mmol de fluoruro de tetrabutilamonio hidratado. La mezcla se agita 16h a temperatura ambiente y el disolvente se evapora bajo presión reducida. El compuesto se purifica por cromatografía. Se obtienen 21,2 mg de compuesto.

Rmin <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>, δ en ppm): 2,75 (s, 3H); 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,2 (d, 1H); 7,25 (t, 1H); 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (s, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,65 a 7,75 (m, 2H) ; 8,45 (s, 1H). M+H = 357.

**Ejemplo 11 : 2-[3-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol (compuesto 100 de la tabla)**

**11.1 [1-(3-Bromofenil)-1-(metil)etil]oxitrimetilsilano**

Se colocan en un matraz 3,4 g del compuesto preparado según 7.1 en 80 ml de diclorometano a 0°C. Se añaden 5,6 mL de trietilamina y 4,5 mL de cloruro de trimetilsilanilo. La mezcla se agita 1 hora a 0°C y 20 h a temperatura ambiente. Se añaden 50 ml de agua y la mezcla se extrae con 30 ml de diclorometano. La fase orgánica se lava con 20 ml de una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra bajo presión reducida. El resto se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla heptano/acetato de etilo. Se obtienen 2,5 g de compuesto.

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 9H) ; 1,45 (s, 6H) ; 7,15 a 7,25 (m, 3H); 7,45 (m, 1H).

**11.2 5-[3-[1-metil-1-(trimetilsilaniloxi)etil]fenil]piridin-2-ilamina**

0,74 g de compuesto obtenido en 11.1 se colocan en 10 ml de tetrahidrofurano y 2 ml de

agua se desgasifican en corriente de argón durante 10 min. Se añaden 0,6 g de 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridim-2-ilamina, 180 mg de [1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio y 1,8 g de carbonato de cesio y se calienta a 80 °C durante 4 horas. Después de enfriar, la mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El resto obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla heptano/acetato de etilo. Se obtienen 560 mg de compuesto.

RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 0 (s, 9H) ; 1,5 (s, 6H) ; 4,35 (s, 2H) ; 6,45 (d, 1H) ; 7,25 (m, 3H); 7,5 (m, 1H) ; 7,55 (m, 1H) ; 8,2 (s, 1H). M+H = 302.

### 11.3 *N*-metoxi-*N*-metilbenzo[d]isoxazol-3-carboxamida

Se colocan en un matraz 1,0 g de ácido benzo[d]isoxazol-3-carboxílico, 0,7 g de hidrocloreuro de *N,O*-dimetilhidroxilamina, 2,3 g de hidrocloreuro de 1-(3-dimetilaminopropil-3-etilcarbodiimida) y 1 ml de piridina en 40 ml de tetrahidrofurano. Se agita la mezcla a temperatura ambiente durante 20 horas. El resto se concentra y se recoge en 40 mL de acetato de etilo y 20 mL de agua. La fase orgánica se lava con 20 ml de una solución de hidróxido de sodio, 20 ml de una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra a presión reducida. Se obtienen 1,1 g de compuesto.

RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 3,4 (s, 3H) ; 3,8 (s, 3H) ; de 7,25 a 7,55 (m, 3H); 7,95 (d, 1H). M+H = 207.

### 11.4 1-(Benzo[d]isoxazol-3-il)etanona

Se colocan en un matraz 1,1 g del compuesto obtenido en 11.3 en 50 ml de tetrahidrofurano a 0°C y bajo argón. Se añaden gota a gota 5 ml de bromuro de metilmagnesio (3M en éter etílico). La mezcla se agita dos horas a 0°C y 20 h a temperatura ambiente. Se enfría a 0°C y se añaden 25 ml de agua y 10 ml de una disolución saturada de cloruro de amonio. La mezcla se extrae con 30 ml de acetato de etilo. La fase orgánica se lava con 40 ml de una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra bajo presión reducida. El resto se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla heptano/acetato de etilo. Se obtienen 0,6 g de compuesto.

RMN 1H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 2,8 (s, 3H); 7,45 (m, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H). M+H = 162.

### 11.5 1-(Benzo[d]isoxazol-3-il)-2-bromoetanona

Se colocan en un matraz 1,7 g de bromuro de cobre en 75 ml de acetato de etilo y se calienta a reflujo. Se añaden 0,6 g del compuesto obtenido en 11.4. Se agita la mezcla 4 horas a reflujo. Se filtra sobre papel, a continuación se vierte sobre 100 ml de una disolución al 20%

de tiosulfato de sodio. La mezcla se extrae con 50 ml de acetato de etilo. La fase orgánica se lava con 40 ml de una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de magnesio y se concentra bajo presión reducida. Se obtienen 0,7 g de compuesto.

RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  en ppm) : 4,75 (s, 2H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H).

#### 5 11.6 2-[3-(2-Benzo[d]isoxazol-3-ilimidazo[1,2-a]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol

Se colocan en un matraz 0,22 g del compuesto obtenido en 11.2 y 0,17 g del compuesto obtenido en 11.5 en 7 ml de etanol. Se añaden 61 mg de hidrógenocarbonato de sodio y se calienta a reflujo durante 20h. Después de enfriar, la mezcla de reacción se concentra bajo presión reducida. El resto obtenido se purifica por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla heptano/acetato de etilo. Se obtienen 210 mg de compuesto.

RMN <sup>1</sup>H (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  en ppm) : 1,55 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H); 7,55 (m, 3H); 7,75 (m, 2H) ; 7,85 (m, 3H) ; 8,55 (d, 1H); 8,75 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).

#### Ejemplo 12 : Procedimiento de preparación de los compuestos 102 a 111

12,1

15 0,495 mmol de acetato de paladio y 0,99 mmol de S-Fos se pesan en un matraz de 100 ml purgado con argón. Se le añaden 55 ml de tolueno desgasificado y se agita la mezcla en un baño de ultrasonidos hasta la completa disolución.

12.2.

20 0,3 mmol de ácido heteroarilborónico se pesan en un tubo de reacción, se le añaden sucesivamente 0,36 mmol de fosfato de potasio finamente pulverizado y secado, 0,5 ml de etanolanhidro desgasificado, 0,18 mmol del compuesto obtenido en 7.2 en disolución en 2 ml de tolueno, a continuación el tubo se purga con argón. Se añaden a continuación 1 ml de la disolución preparada en 12.1. El tubo se cierra y se agita 16h a 75°C. Se añaden 0,5 ml de disolución preparada en 12.2.1 y se prolonga en calentamiento durante 10h. La disolución  
25 enfriada se diluye con 5 ml de acetato de etilo y se le añaden 100 mg de sílice-propanotiol (Biotage Si-tiol) y la mezcla se agita 4h a temperatura ambiente. El sólido se separa por filtración y se lava con 2x2 ml de THF. El filtrado se evapora a sequedad y el compuesto se somete a purificación por cromatografía.

#### Ejemplo 13 : Preparación de los compuestos 112 a 125

#### 30 13.1 6-[2-(*tert*-butildimetilsilaniloximetil)-3-fluorofenil]-2-cloroimidazo[1,2-a]piridina

Se desgasifican en corriente de argón 100 ml de una mezcla 85/15 de THF y de agua, a continuación se añaden 5,3 g del compuesto preparado en 9.2, 6,07 g de 2-cloro-6-(4,4,5,5,-tetrametil-1,2,3-dioxaborolan-2-il)imidazo[1,2-a]piridina obtenido tal como en 4.2,

18,6 g de carbonato de cesio y 466 mg de [1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio. Se agita la mezcla 2 horas en un baño termostatzado a 80°C. Después de enfriarse a temperatura ambiente, los disolventes se evaporan a presión reducida. Se recoge el residuo entre agua y éter dietílico. Se elimina un sólido por filtración. La fase orgánica se lava 2 veces con una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de sodio y se concentra a presión reducida. Se purifica el residuo obtenido por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se tritura el sólido obtenido con pentano, se recoge por filtración, después se seca en estufa a presión reducida. Se obtienen 4,74 g de compuesto. RMN <sup>1</sup>H (CDCl<sub>3</sub>, δ en ppm) : 0 (s, 6H) ; 0,85 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; de 7,05 a 7,1 (m, 2H) ; de 7,25 a 7,3 (m, 2H); 7,4 (s, 1H); 7,45 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H). M+H = 391.

### 13.2 Procedimiento de preparación de los compuestos 112 a 125

#### 13.2.1

0,3 mmol de ácido heteroarilborónico se pesan en un tubo de reacción, se le añaden sucesivamente 0,36 mmol de fosfato de potasio finamente pulverizado y secado, 0,5 ml de etanolanhidro desgasificado, 0,18 mmol del compuesto obtenido en 13.1 en disolución en 2 ml de tolueno, a continuación el tubo se purga con argón. Se añaden a continuación 1 ml de la disolución preparada en 12.1. El tubo se cierra y se agita 16h a 75°C. Se añaden 0,5 ml de disolución preparada en 12.2.1 y se prolonga en calentamiento durante 10h. La disolución enfriada se diluye con 5 ml de acetato de etilo y se le añaden 100 mg de sílice-propanotiol (Biotage Si-tiol) y la mezcla se agita 4h a temperatura ambiente. El sólido se separa por filtración y se lava con 2x2 ml de THF. El filtrado se evapora a sequedad y el residuo se utiliza tal cual en la etapa siguiente.

#### 13.2.2

En un tubo de reacción, se mezcla el compuesto obtenido en 13.2.1, 0,36 mmol de fluoruro de cesio en disolución en 3 ml de metanol y 21 µl de ácido acético. La disolución se agita 16 horas a temperatura ambiente, los disolvente se evaporan a continuación. El residuo se purifica por HPLC eluyendo con una mezcla de acetonitrilo/agua.

### Ejemplo 14 : Preparación de los compuestos 126 a 137

#### 14.1 6-[3-(*terc*-butildimetilsilaniloximetil)-2,4-difluorofenil]-2-cloroimidazo[1,2-*a*]piridina

Se desgasifican en corriente de argón 100 ml de una mezcla 85/15 de THF y de agua, a continuación se añaden 5,3 g del compuesto preparado en 10.2, 6,07 g de 2-cloro-6-(4,4,5,5,-tetrametil-1,2,3-dioxaborolan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridina obtenido tal como en 4.2,

18,6 g de carbonato de cesio y 466 mg de [1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio. Se agita la mezcla 2 horas en un baño termostatzado a 80°C. Después de enfirarse a temperatura ambiente, los disolventes se evaporan a presión reducida. Se recoge el residuo entre agua y éter dietílico. Se elimina un sólido por filtración. La fase orgánica se lava 2 veces con una disolución saturada de cloruro de sodio, se seca sobre sulfato de sodio y se concentra a presión reducida. Se purifica el residuo obtenido por cromatografía en gel de sílice eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol. Se tritura el sólido obtenido con pentano, se recoge por filtración, después se seca en estufa a presión reducida. Se obtienen 4,74 g de compuesto. RMN 1H (DMSO-d6,  $\delta$  en ppm) : 0,0 (s, 6H); 0,8 (s, 9H) ; 4,7 (s, 2H); 7,15 (t, 1H); 7,4 (d, 1H); de 7,5 a 7,6 (m, 2H); 8,0 (s, 1H); 8,65 (s, 1H). M+H = 409.

## 14.2 Preparación de los compuestos 126 a 137

### 14.2.1

Procediendo como se describe en 13.2.1, y partiendo de partant de 0,3 mmol de ácido heteroarilborónico y de 0,18 mmol del compuesto preparado en 14.1 se obtiene el compuesto bruto utilizado tal cual en la etapa siguiente.

### 14.2.2

Procediendo como se describe en 13.2.2, y partiendo del compuesto obtenido en 14.2.1, se obtiene el compuesto esperado que se purifica por HPLC eluyendo con una mezcla de acetonitrilo/agua.


La tabla 2 a continuación ilustra las estructuras químicas de fórmula general (I) ; la tabla 3 a continuación ilustra las características fisicoquímicas de algunos ejemplos de compuestos según la invención. En estas tablas:

- la columna « Pos. » informa sobre la posición de sustitución del grupo  $\text{R}^4\text{-O}-\text{C}(\text{R}^2)(\text{R}^3)$  sobre el núcleo fenilo ;
- en la columna « Sal/base », « - » representa un compuesto en forma de base libre, mientras que « HCl » u « oxalato » representa respectivamente un compuesto en forma de hidrocloreuro o de oxalato y la relación entre paréntesis es la relación (ácido:base).
- En la tabla 3, la columna « PF » informa sobre los puntos de fusión de los productos en grados Celsius (°C) o, cuando los productos se han aislado en forma de sólido amorfo o aceite, están caracterizados por su masa [M+H];
- « Ph » significa fenilo ; « Cl » significa cloro ; « F » significa flúor ; « Me » significa










155











- metilo ; « MeO » significa metoxi ; « (F<sub>2</sub>CH)O » significa difluorometoxi ; « *t*-Bu » signifique *terc*-butilo ;
- en la columna R, la cifra delante del sustituyente muestra la posición de sustitución del grupo R sobre el núcleo fenilo ;
  - 5 - en la columna X, la cifra delante del sustituyente muestra la posición de sustitución del grupo X sobre el núcleo imidazo[1,2-*a*]piridina ;
  - n.d. significa no determinado .













Tabla 2

























| Ej | R <sub>1</sub> | Pos. | R <sub>2</sub> | R <sub>3</sub> | R <sub>4</sub> | X | R | sal       |
|----|----------------|------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------|
| 1  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | -         |
| 2  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | HCl (2:1) |
| 3  |                | 3    | H              | H              | <i>t</i> -Bu   | H | H | HCl (1:1) |
| 4  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | -         |
| 5  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | HCl (2:1) |
| 6  |                | 3    | H              | H              | H              | H | H | HCl (1:1) |












|    |                                                                                     |   |   |   |      |   |   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|-----------|
| 7  |    | 3 | H | H | H    | H | H | HCl (2:1) |
| 8  |    | 3 | H | H | H    | H | H | HCl (1:1) |
| 9  |    | 3 | H | H | H    | H | H | HCl (1:1) |
| 10 |   | 3 | H | H | t-Bu | H | H | -         |
| 11 |  | 3 | H | H | H    | H | H | HCl (1:1) |
| 12 |  | 2 | H | H | H    | H | H | HCl (1:1) |
| 13 |  | 3 | H | H | H    | H | H | -         |
| 14 |  | 3 | H | H | H    | H | H | HCl (1:1) |
| 15 |  | 3 | H | H | H    | H | H | HCl (2:1) |
| 16 |  | 3 | H | H | H    | H | H | HCl (1:1) |













|    |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 17 |    | 3 | H | H | H | H | H | HCl (2:1) |
| 18 |    | 3 | H | H | H | H | H | HCl (1:1) |
| 19 |    | 3 | H | H | H | H | H | HCl (2:1) |
| 20 |   | 3 | H | H | H | H | H | HCl (2:1) |
| 21 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 22 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 23 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 24 |  | 4 | H | H | H | H | H | -         |
| 25 |  | 3 | H | H | H | H | H | -         |
| 26 |  | 4 | H | H | H | H | H | -         |











|    |                                                                                     |   |   |   |                                                  |   |      |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|---|------|---------------|
| 27 |    | 3 | H | H | H                                                | H | H    | -             |
| 28 |    | 3 | H | H | (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> | H | H    | -             |
| 29 |    | 3 | H | H | (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> | H | H    | Oxalate (1:1) |
| 30 |    | 3 | H | H | H                                                | H | H    | -             |
| 31 |    | 3 | H | H | H                                                | H | 3-Me | HCl (1:1)     |
| 32 |  | 3 | H | H | H                                                | H | 3-Me | HCl (1:1)     |
| 33 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 34 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 35 |  | 2 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 36 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 37 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |
| 38 |  | 3 | H | H | H                                                | H | H    | HCl (1:1)     |











|    |                                                                                     |   |    |    |   |     |      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|-----|------|-----------|
| 39 |    | 3 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1:1) |
| 40 |    | 3 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1:1) |
| 41 |    | 2 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1:1) |
| 42 |   | 3 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1:1) |
| 43 |  | 2 | H  | H  | H | H   | H    | HCl (1:1) |
| 44 |  | 3 | H  | H  | H | H   | H    | -         |
| 45 |  | 3 | H  | H  | H | H   | H    | -         |
| 46 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F | H    | -         |
| 47 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H    | -         |
| 48 |  | 3 | Me | Me | H | H   | 3-Me | -         |
| 49 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H    | -         |










|    |                                                                                     |   |    |    |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|
| 50 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 51 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 52 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 53 |    | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 54 |   | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 55 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 56 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 57 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 58 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 59 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |
| 60 |  | 3 | Me | Me | H | H | H | - |

|    |                                                                                     |   |    |    |   |         |   |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|---------|---|-----------|
| 61 |    | 3 | Me | Me | H | H       | H | -         |
| 62 |    | 3 | Me | Me | H | H       | H | -         |
| 63 |    | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | HCl (1:1) |
| 64 |   | 3 | Me | Me | H | H       | H | HCl (1:1) |
| 65 |  | 2 | H  | H  | H | 2,4-diF | H | HCl (1:1) |
| 66 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -         |
| 67 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -         |
| 68 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -         |
| 69 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -         |
| 70 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -         |
| 71 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F     | H | -         |










|    |                                                                                     |   |   |   |   |         |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|------|---|
| 72 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H    | - |
| 73 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H    | - |
| 74 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H    | - |
| 75 |    | 3 | H | H | H | 2,4-diF | 3-Me | - |
| 76 |   | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 77 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 78 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 79 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 80 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 81 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 82 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |
| 83 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H    | - |

|    |                                                                                     |   |    |    |    |         |      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|---------|------|-----------|
| 84 |    | 3 | H  | H  | Me | H       | H    | HCl (1:1) |
| 85 |    | 3 | H  | H  | Me | H       | H    | HCl (1:1) |
| 86 |    | 3 | Me | Me | H  | H       | H    | -         |
| 87 |   | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | 3-Me | -         |
| 88 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -         |
| 89 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -         |
| 90 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -         |
| 91 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -         |
| 92 |  | 2 | H  | H  | H  | 3-F     | H    | -         |
| 93 |  | 3 | H  | H  | H  | 2,4-diF | H    | -         |

|     |                                                                                     |   |    |    |                                                  |         |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|--------------------------------------------------|---------|---|---|
| 94  |    | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 95  |    | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 96  |    | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 97  |    | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 98  |  | 3 | H  | H  | H                                                | 2,4-diF | H | - |
| 99  |  | 3 | H  | H  | (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> | H       | H | - |
| 100 |  | 3 | Me | Me | H                                                | H       | H | - |
| 101 |  | 2 | H  | H  | H                                                | 3-F     | H | - |
| 102 |  | 3 | Me | Me | H                                                | H       | H | - |
| 103 |  | 3 | Me | Me | H                                                | H       | H | - |

|     |                                                                                     |   |    |    |   |     |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|-----|---|---|
| 104 |    | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 105 |    | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 106 |    | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 107 |   | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 108 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 109 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 110 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 111 |  | 3 | Me | Me | H | H   | H | - |
| 112 |  | 2 | H  | H  | H | 3-F | H | - |

|     |  |   |   |   |   |     |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|-----|---|---|
| 113 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 114 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 115 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 116 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 117 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 118 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 119 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 120 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 121 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |
| 122 |  | 2 | H | H | H | 3-F | H | - |

|     |                                                                                     |   |   |   |   |         |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 123 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H | - |
| 124 |    | 2 | H | H | H | 3-F     | H | - |
| 125 |   | 2 | H | H | H | 3-F     | H | - |
| 126 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 127 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 128 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 129 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 130 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 131 |  | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |







|     |                                                                                                                         |   |   |   |   |         |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 132 |  <chem>CN1C=CC=Cc2ccccc12</chem>       | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 133 |  <chem>c1ccc2nc3ccccc3cc2c1</chem>     | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 134 |  <chem>c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23</chem>   | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 135 |  <chem>Fc1cc(F)nc(C)cc1</chem>        | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 136 |  <chem>CC(C)CCn1cc(C)nn1</chem>      | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |
| 137 |  <chem>CC(C)(C)NC(=O)c1ccncc1</chem> | 3 | H | H | H | 2,4-diF | H | - |

Tabla 3

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 176-178       | 2,8 (s, 3H); 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H); de 7,6 a 7,75 (m, 4H); 8,3 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H).                                                                          |
| 2  | 325-330       | 4,6 (s, 2H); 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (m, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,85 (m, 2H) ; 8,55 (d, 2H); 8,85 (d, 2H); 9,05 (m, 2H).                                                                              |
| 3  | 220-222       | 1,3 (s, 9H) ; 4,5 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); de 7,65 a 7,75 (m, 2H) ; de 7,85 a 8,0 (m, 2H); 8,05 (d, 1H) ; de 8,75 a 8,90 (m, 3H); 9,15 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H).                                  |
| 4  | 201-203       | 4,6 (d, 2H) ; 5,25 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H); de 7,55 a 7,75 (m, 4H); 8,1 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H).                                                                    |
| 5  | 279-281       | 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (m, 2H) ; 7,95 (m, 1H); 8,0 (m, 1H) ; 8,1 (m, 1H) ; 8,2 (m, 2H); 8,95 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 9,6 (s, 1H).                      |
| 6  | 264-266       | 4,65 (s, 2H) ; 6,15 (s, 2H); 7,15 (d, 1H); 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,6 (d, 1H) ; 7,7 (m, 2H) ; 7,75 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,2 (d, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H).                                    |
| 7  | 260-265       | 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; de 7,85 a 8,0 (m, 2H); 8,05 (m, 1H) ; de 8,75 a 8,9 (m, 3H); 9,2 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H).                                            |
| 8  | 270-272       | 4,65 (s, 2H) ; 6,6 (s, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; de 7,5 a 7,6 (m, 2H); 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; de 7,75 a 7,85 (m, 2H); 8,05 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 11,5 (s, 1H). |
| 9  | 340-345       | 2,55 (m, 2H); 3,0 (t, 2H); 4,65 (s, 2H) ; 7,05 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H); de 7,8 a 7,9 (m, 2H); 8,0 (d, 1H); 8,2 (d, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H).              |
| 10 | 277-279       | 1,3 (s, 9H) ; de 3,25 a 3,35 (m, 2H); 4,5 (s, 2H) ; 4,9 (t, 2H); de 7,3 a 7,4 (m, 2H) ; 7,5 (t, 1H); de 7,55 a 7,70 (m, 4H); 8,1 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H); 9,0 (s, 1H).                                        |

131

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 340-345       | 4,65 (s, 2H) ; 7,35 (d, 1H); 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ;<br>7,75 (s, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; de 7,9 a 8,0 (m, 2H); 8,15 (d, 1H); 8,65 (s,<br>1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 12,0 (s, 1H).                    |
| 12 | 205-208       | 4,45 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,45 (t, 1H); 7,5 (t, 1H); 7,65<br>(d, 1H) ; de 7,9 a 8,0 (m, 3H); 8,45 (s, 1H); 8,55 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                        |
| 13 | 239-240       | 3,3 (m, 2H); 4,6 (d, 2H) ; 4,8 (t, 2H); 5,25 (t, 1H) ; de 7,35 a 7,45 (m,<br>2H) ; 7,5 (t, 1H); de 7,55 a 7,7 (m, 4H); 8,1 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H); 9,0 (s,<br>1H).                                              |
| 14 | 232-236       | 4,65 (s, 2H) ; 7,25 (d, 1H); 7,4 (m, 1H) ; 7,5 (t, 1H); 7,65 (m, 2H) ; 7,75<br>(s, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                              |
| 15 | 280-285       | 3,2 (s, 6H) ; 4,6 (s, 2H); 7,15 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65<br>(d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,15 (m, 1H); 8,35 (m, 1H); 8,7 (s,<br>1H) ; 8,8 (s, 1H) ; 9,20 (s, 1H).                   |
| 16 | 285-290       | 4,65 (s, 2H) ; 6,9 (m, 1H) ; 7,35 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); de<br>7,65 a 7,75 (m, 4H); 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,9 (s, 1H)<br>; 9,25 (s, 1H) ; 11,65 (s, 1H).                  |
| 17 | 375-380       | 4,65 (s, 2H) ; 7,15 (d, 1H); 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ;<br>7,75 (s, 1H) ; 7,9 (d, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,35 (m, 2H); 8,5 (m, 1H) ; 8,6<br>(s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H).                  |
| 18 | 250-254       | 4,65 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; 7,25 (m, 2H) ; de 7,4 a 7,6 (m, 3H); 7,65 (m,<br>2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,6 (s, 1H) ; 9,35 (s, 1H) ;<br>12,15 (s, 1H).                                  |
| 19 | 340-345       | 4,6 (s, 2H); 7,05 (t, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (s,<br>1H); 7,8 (m, 2H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,55 (d, 1H); 8,7 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                    |
| 20 | 380-385       | 4,65 (s, 2H) ; 6,65 (d, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65 (s, 1H) ; 7,7<br>(d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,3 (d, 1H); 8,7 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H) ;<br>8,95 (s, 1H) ; 9,3 (s, 1H) ; 12,05 (s, 1H). |

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                                                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 285-287       | 4,6 (d, 2H); 5,25 (t, 1H); de 7,3 a 7,75 (m, 10H); 7,95 (m, 2H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (t, 1H).                                                                                                                     |
| 22 | 144-146       | 4,6 (d, 2H); 5,25 (t, 1H); de 7,15 a 7,75 (m, 11H); 8,40 (s, 1H) ; 8,9 (t, 1H).                                                                                                                                   |
| 23 | 150-152       | 4,6 (d, 2H); 5,25 (t, 1H); de 7,25 a 7,75 (m, 9H); 8,2 (m, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,9 (t, 1H).                                                                                                        |
| 24 | 178-180       | 4,55 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; de 7,3 a 7,5 (m, 4H); de 7,55 a 7,75 (m, 5H); 8,2 (m, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) , 8,9 (m, 1H).                                                                                |
| 25 | 208-210       | 4,6 (d, 2H); 5,25 (t, 1H); de 7,25 a 7,4 (m, 2H); 7,45 (t, 1H); de 7,5 a 7,7 (m, 4H); 7,85 (t, 1H); 8,1 (d, 1H); 8,5 (s, 1H) ; 8,6 (m, 1H); 8,9 (m, 1H).                                                          |
| 26 | 226-228       | 4,55 (d, 2H) ; 5,2 (t, 1H) ; 7,3 (m, 1H); 7,4 (m, 2H); 7,7 (m, 4H); 7,85 (t, 1H); 8,1 (d, 1H); 8,45 (s, 1H); 8,6 (m, 1H); 8,95 (s, 1H).                                                                           |
| 27 | 162-164       | 4,6 (d, 2H); 5,25 (t, 1H); 7,1 (m, 1H) ; de 7,25 a 7,65 (m, 8H); 8,25 (s, 1H); 8,85 (t, 1H).                                                                                                                      |
| 28 | 81-83         | 3,25 (s, 3H); 3,55 (m, 4H); 4,55 (s, 2H) ; de 7,2 a 7,4 (m, 4H); 7,5 (t, 1H); de 7,68 a 7,75 (m, 6H); 8,4 (s, 1H) ; 8,95 (t, 1H).                                                                                 |
| 29 | 126-128       | 3,25 (s, 3H); 3,55 (m, 4H); 4,55 (s, 2H) ; 7,1 (m, 1H) ; de 7,3 a 7,7 (m, 8H); 8,3 (s, 1H) ; 8,85 (t, 1H).                                                                                                        |
| 30 | 173-175       | 4,6 (d, 2H); 5,2 (t, 1H) ; 7,3 (d, 1H); 7,45 (t, 1H); de 7,5 a 7,65 (m, 6H); 7,9 (m, 1H); 8,25 (s, 1H); 8,85 (t, 1H).                                                                                             |
| 31 | 279-283       | 2,85 (s, 3H) ; 4,65 (s, 2H) ; 7,35 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,75 (d, 1H) ; 8,8 (m, 2H); 8,9 (m, 1H); 8,95 (d, 1H); 8,15 (d, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                     |
| 32 | 255-258       | 3,75 (s, 3H) ; 4,65 (s, 2H) ; 7,2 (t, 1H) ; 7,3 (t, 1H); 7,45 (d, 1H) ; de 7,55 a 7,65 (m, 2H) ; de 7,75 a 7,9 (m, 3H); 7,95 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 9,0 (s, 1H) ; 11,95 (s, 1H) ; 14,55 (m, 1H). |

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 251-254       | 4,65 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (m, 2H); 7,65 (d, 1H) ;<br>7,7 (d, 1H) ; 7,75 (m, 2H) ; 8,0 (d, 1H); 8,1 (s, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,7<br>(s, 1H) ; 9,25 (s, 1H) ; 11,6 (s, 1H).   |
| 34 | 204-208       | 1,4 (t, 3H); 4,45 (q, 2H) , 4,65 (s, 2H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65<br>(d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H); 8,05 (d, 1H); 8,65 (s, 1H) ; 9,2 (s,<br>1H) ; 9,25 (s, 2H).                  |
| 35 | 290-294       | 4,5 (s, 2H) ; 7,4 a 7,55 (m, 3H); 7,65 (d, 1H) ; 7,8 (t, 1H); 7,95 (m, 2H) ;<br>8,0 (d, 1H); 8,2 (m, 2H); 9,0 (m, 2H); 9,2 (s, 1H) ; 9,65 (s, 1H).                                                  |
| 36 | 244-248       | 4,6 (s, 2H); 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,9 (d,<br>1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,05 (m, 1H) ; 8,15 (s, 1H); 8,55 (d, 1H); 8,85 (s,<br>1H) ; 9,05 (s, 1H).                    |
| 37 | 220-224       | 4,6 (s, 2H); 7,4 (d, 1H) ; 7,45 a 7,65 (m, 4H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,8 (m, 2H)<br>; 8,1 (d, 1H); 8,2 (d, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                            |
| 38 | 261-263       | 4,65 (s, 2H) ; 7,4 a 7,5 (m, 3H); 7,55 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ;<br>7,9 (d, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,05 a 8,15 (m, 3H); 8,65 (s, 1H) ; 9,1 (s,<br>1H).                                   |
| 39 | 277-279       | 4,6 (s, 2H); 7,4 (d, 1H) ; 7,45 (t, 1H); 7,55 (d, 1H); 7,65 (d, 1H); 7,7 (s,<br>1H); 7,85 (d, 1H) ; 7,95 (m, 2H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,2 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H)<br>; 8,7 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H).        |
| 40 | 285-288       | 4,55 (s, 2H) ; 7,35 (d, 1H); 7,45 (m, 2H); 7,55 (m, 1H) ; 7,6 (d, 1H); 7,7<br>(s, 1H); 7,95 (d, 1H) ; 8,15 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,45 (s, 1H); 8,8 (s,<br>1H) ; 9,15 (s, 1H).                    |
| 41 | 310-315       | 4,5 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; 7,4 a 7,55 (m, 4H); 7,65 (m, 2H) ; 7,75 (d,<br>1H) ; 7,95 (m, 2H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                          |
| 42 | 270-271       | 3,35 (t, 2H); de 4,6 a 4,7 (m, 4H) ; 7,0 (d, 1H); 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H);<br>7,7 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; 7,95 (s, 1H); 8,0 (d, 1H); 8,2 (d,<br>1H) ; 8,6 (s, 1H) ; 8,2 (s, 1H). |

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                                             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 310-315       | 4,5 (s, 2H) ; 6,6 (s, 1H) ; 7,4 a 7,55 (m, 4H); 7,65 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,0 (m, 2H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                                           |
| 44 | 181-183       | 4,65 (d, 2H); 5,3 (t, 1H) ; 7,1 (s, 1H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,55 (t, 1H); 7,65 (m, 1H); 7,75 (m, 4H); 8,0 (d, 1H); 8,1 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                         |
| 45 | 178-180       | 4,65 (d, 2H); 5,3 (t, 1H) ; 7,2 (s, 1H); 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (t, 1H); 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (m, 4H); 8,65 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                                                   |
| 46 | 277-279       | 2,5 (s, 3H) ; 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 6,75 (s, 1H); 7,3 (m, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                                                                 |
| 47 | 203-204       | 1,55 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 6,45 (s, 1H) ; de 7,4 a 7,75 (m, 8H).; 7,85 (s, 1H); 8,05 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                                                     |
| 48 | [349]         | 1,5 (s, 6H) ; 2,8 (s, 3H); 5,1 (s, 1H) ; 7,2 (d, 1H); 7,45 (t, 1H); 7,55 (d, 2H); de 7,6 a 7,7 (m, 4H); 7,85 (s, 1H); 8,55 (s, 1H).                                                                             |
| 49 | [335]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H); de 7,5 a 7,55 (m, 2H); de 7,6 a 7,7 (m, 4H); 7,8 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                                                                  |
| 50 | [330]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; de 7,3 a 7,35 (m, 1H); 7,45 (t, 1H); 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,9 (t, 1H); 8,15 (d, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,65 (d, 1H) ; 9,0 (s, 1H). |
| 51 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,15 (d, 1H); de 7,4 a 7,45 (m, 2H) ; de 7,5 a 7,55 (m, 2H); de 7,6 a 7,65 (m, 2H); 7,8 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                                                       |
| 52 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,25 a 7,4 (m, 3H); 7,45 (t, 1H); 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; de 7,65 a 7,75 (m, 4H); 7,85 (s, 1H); 8,45 (s, 1H) 8,95 (s, 1H).                                                 |
| 53 | [335]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,15 (d, 1H); de 7,5 a 7,6 (m, 4H); de 7,6 a 7,65 (m, 2H); 7,8 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                                               |

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,1 (s, 1H) ; de 7,4 a 7,45 (m, 3H); 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; de 7,65 a 7,75 (m, 3H); 7,85 (s, 1H); 8,2 (m, 1H); 8,55 (s, 2H) ; 8,98 (s, 1H).                                                  |
| 55 | [386]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 2H); de 7,5 a 7,6 (m, 3H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,85 (s, 1H); 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,0 (s, 1H).                                            |
| 56 | [385]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,35 a 7,45 (m, 3H); 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; de 7,85 a 7,9 (m, 2H); 8,0 (d, 1H); 8,55 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                     |
| 57 | [383]         | 1,5 (s, 6H) ; 4,35 (s, 3H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,25 a 7,35 (m, 2H); 7,45 (t, 1H); 7,5 (d, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,65 a 7,75 (m, 3H); 7,8 (d, 1H) ; 7,85 (s, 1H); 8,7 (s, 1H), 9,05 (s, 1H).                     |
| 58 | [371]         | 1,5 (s, 6H) ; de 3,2 a 3,3 (m, 2H); de 4,55 a 4,6 (m, 2H); 5,1 (s, 1H) ; 6,85 (d, 1H); de 7,4 a 7,55 (m, 4H); 7,6 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,85 (s, 1H); 8,3 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                |
| 59 | [319]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 6,6 (d, 1H); 6,85 (d, 1H); 7,4 (t, 1H) ; de 7,45 a 7,55 (m, 2H); 7,65 (m, 2H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                                             |
| 60 | [369]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,05 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H) ; 7,5 (d, 1H) ; 7,55 (d, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,6 a 7,7 (d, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,95 (d, 1H) ; 8,0 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H); 8,9 (s, 1H). |
| 61 | [385]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; de 7,45 a 7,5 (m, 2H); de 7,55 a 7,6 (m, 2H); 7,65 (d, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; de 7,8 a 7,85 (m, 2H); 8,0 (d, 1H); 8,05 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).             |
| 62 | [336]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H); de 7,45 a 7,55 (m, 2H); de 7,65 a 7,7 (m, 2H); 7,75 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,9 (sd, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                                |
| 63 | 330-335       | 4,5 (s, 2H) ; 7,4 (m, 3H) ; 7,55 (m, 2H); 7,75 (d, 1H) ; 8,05 (m, 2H); 8,3 (d, 1H); 9,0 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H) ; 14,0 (s, 1H).                                                                                   |

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                           |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | 190-195       | 1,55 (s, 6H) ; 7,4 (t, 1H) ; 7,6 (m, 4H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,25 (m, 2H) ; 9,05 (s, 1H) ; 9,2 (s, 1H) ; 14,0 (s, 1H)                                              |
| 65 | 350-355       | 4,65 (s, 2H) ; 7,35 (m, 2H) ; 7,55 (t, 1H); 7,75 (m, 2H) ; 8,05 (m, 2H); 8,25 (d, 1H) ; 9,05 (s, 1H) ; 9,1 (s, 1H) ; 13,9 (s, 1H).                                                         |
| 66 | [325]         | 4,45 (d, 2H); 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 a 7,3 (m, 2H); de 7,4 a 7,5 (m, 2H); de 7,5 a 7,55 (m, 3H); 7,95 (s, 1H); 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                                  |
| 67 | [320]         | 4,45 (s, 2H) ; 5,25 (s, 1H); de 7,25 a 7,35 (m, 3H); 7,45 (m, 2H) ; 7,7 (d, 1H); 7,9 (t, 1H); 8,25 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                    |
| 68 | [325]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,15 (m, 1H) ; de 7,2 a 7,3 (m, 2H); de 7,4 a 7,5 (m, 2H); de 7,5 a 7,6 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                  |
| 69 | [376]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 a 7,35 (m, 2H); de 7,45 a 7,5 (m, 2H); de 7,5 a 7,6 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                |
| 70 | [375]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 a 7,4 (m, 4H); de 7,45 a 7,5 (m, 2H); 7,7 (d, 1H) ; 7,85 (d, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,5 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).                              |
| 71 | [361]         | 3,25 (t, 2H) ; 4,45 (d, 2H) ; 4,55 (t, 2H); 5,3 (t, 1H) ; 6,85 (d, 1H); 7,25 (m, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,85 (s, 1H); 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H). |
| 72 | [359]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,05 (s, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; de 7,4 a 7,5 (m, 2H); 7,65 (d, 2H); 7,95 (d, 1H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H); 8,65 (s, 1H).                      |
| 73 | [375]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; de 7,4 a 7,5 (m, 2H); 7,55 (d, 1H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,8 (d, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,05 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).        |
| 74 | [326]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; de 7,25 a 7,35 (m, 2H); de 7,45 a 7,55 (m, 2H); 7,7 (d, 1H) ; 7,75 (s, 1H) ; 7,95 (s, 1H); 8,5 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                        |

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | [357]         | 2,75 (s, 3H); 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,2 (d, 1H); 7,25 (t, 1H); 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (s, 1H) ; 7,6 (d, 1H) ; de 7,65 a 7,75 (m, 2H) ; 8,45 (s, 1H).                                 |
| 76 | [343]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,4 (d, 1H) ; de 7,55 a 7,65 (m, 4H); 7,95 (s, 1H); 8,35 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                                            |
| 77 | [338]         | 4,6 (s, 2H); 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,35 (m, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,6 (m, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,9 (t, 1H); 8,15 (d, 1H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,65 (d, 1H) ; 8,85 (s, 1H).           |
| 78 | [377]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,15 (s, 1H); 7,25 (t, 1H); de 7,4 a 7,45 (m, 2H) ; de 7,55 a 7,65 (m, 2H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                                 |
| 79 | [377]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; de 7,2 a 7,3 (m, 2H); 7,35 (m, 2H) ; 7,5 (d, 1H) ; de 7,6 a 7,75 (m, 4H); 8,5 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                     |
| 80 | [343]         | 4,6 (s, 2H); 5,35 (s, 1H) ; 7,15 (d, 1H); 7,35 (t, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; 7,55 (m, 2H); de 7,6 a 7,7 (m, 2H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                              |
| 81 | [377]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H); de 7,4 a 7,5 (m, 3H); de 7,6 a 7,75 (m, 3H); 8,25 (m, 1H); 8,55 (d, 2H); 8,8 (s, 1H).                                                       |
| 82 | [394]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,45 (t, 1H); 7,55 (m, 2H); 7,65 (m, 1H); 7,8 (d, 1H) ; 8,05 (d, 1H) ; 8,15 (d, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H).                           |
| 83 | [344]         | 4,6 (s, 2H); 5,35 (s, 1H) ; de 7,25 a 7,3 (m, 2H); de 7,4 a 7,5 (m, 2H); de 7,5 a 7,55 (m, 3H); 7,95 (s, 1H); 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                              |
| 84 | 247-252       | 3,4 (s, 3H) ; 3,9 (s, 3H) ; 4,55 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; de 7,45 a 7,8 (m, 7H); 8,0 (d, 1H); 8,25 (m, 2H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H).                                               |
| 85 | 88-92         | 3,35 (s, 3H); 4,55 (s, 2H) ; 6,55 (s, 1H) ; 7,45 (d, 1H) ; de 7,55 a 7,65 (m, 3H); 7,75 (m, 3H) ; 8,0 (d, 1H); 8,1 (s, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 9,25 (s, 1H) ; 11,6 (s, 1H). |
| 86 | 205-208       | 1,5 (s, 6H) ; 2,5 (s, 3H) ; 5,1 (s, 1H) ; 6,7 (s, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H); 7,7 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H).                                          |

| Ej | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 | [339]         | 2,70 (s, 3H); 4,45 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,20 (m, 1H) ; 7,32 (m, 2H);<br>7,47 (m, 3H); 7,58 (m, 1H); 7,64 (d, 1H); 8,50 (s, 1H).                                                |
| 88 | [359]         | 4,43 (d, 2H); 5,30 (t, 1H); 7,18 (s, 1H); 7,30 (m, 2H) ; 7,46 (m, 3H);<br>7,65 (d, 1H) ; 8,39 (s, 1H) ; 8,68 (s, 1H).                                                              |
| 89 | [359]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,30 (t, 1H); 7,32 (m, 5H); 7,48 (m, 2H) ; 7,65 (d, 1H) ;<br>7,70 (m, 2H) ; 8,47 (s, 1H) ; 8,72 (s, 1H).                                                            |
| 90 | [359]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,32 (t, 1H) ; 7,30 (m, 2H) ; 7,41 (m, 2H) ; 7,48 (m, 2H) ;<br>7,70 (m, 2H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,54 (m, 2H); 8,72 (s, 1H).                                            |
| 91 | [373]         | 4,35 (s, 3H) ; 4,47 (d, 2H); 5,31 (t, 1H) ; 7,28 (m, 4H); 7,49 (m, 1H);<br>7,55 (d, 1H) ; 7,65 (dd 2H) ; 7,78 (d, 1H) ; 8,66 (s, 1H) ; 8,78 (s, 1H).                               |
| 92 | [309]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,30 (t, 1H); 6,63 (s, 1H) ; 6,88 (s, 1H) ; 7,29 (m, 2H);<br>7,47 (m, 2H); 7,62 (d, 1H) ; 7,78 (s, 1H); 8,23 (s, 1H) ; 8,69 (s, 1H).                                |
| 93 | [393]         | 4,61 (d, 2H); 5,34 (t, 1H); 7,25 (t, 1H); 7,40 (m, 2H) ; 7,48 (d, 1H) ; 7,65<br>(m, 1H); 7,72 (d, 1H) ; 7,88 (d, 1H); 7,91 (s, 1H) ; 8,00 (d, 1H); 8,52 (s,<br>1H) ; 8,81 (s, 1H). |
| 94 | [391]         | 4,35 (s, 3H) ; 4,62 (d, 2H); 5,32 (t, 1H) ; 7,29 (m, 3H); 7,53 (d, 1H) ;<br>7,67 (m, 3H) ; 7,82 (d, 1H) ; 8,70 (s, 1H) ; 8,94 (s, 1H).                                             |
| 95 | [379]         | 3,25 (t, 2H) ; 4,58 (m, 4H); 5,34 (t, 1H); 6,83 (d, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,40<br>(d, 1H); 7,62 (m, 2H); 7,74 (d, 1H); 7,86 (s, 1H); 8,30 (s, 1H); 8,74 (s,<br>1H).                  |
| 96 | [327]         | 4,60 (d, 2H); 5,33 (t, 1H); 6,62 (s, 1H); 6,88 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,42<br>(d, 1H) ; 7,63 (m, 2H) ; 7,79 (s, 1H); 8,24 (s, 1H) ; 8,80 (s, 1H).                                 |
| 97 | [377]         | 4,62 (d, 2H); 5,35 (t, 1H) ; 7,05 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,41 (d, 1H); 7,68<br>(m, 3H); 7,97 (d, 1H); 8,05 (s, 1H) ; 8,30 (s, 1H); 8,47 (s, 1H) ; 8,78 (s,<br>1H).                |
| 98 | [393]         | 4,61 (d, 2H); 5,34 (t, 1H); 7,25 (t, 1H); 7,43 (d, 1H); 7,57 (d, 1H) ; 7,64<br>(m, 1H); 7,72 (d, 1H) ; 7,81 (d, 1H) ; 7,99 (d, 1H); 8,08 (d, 1H); 8,52 (d,<br>2H); 8,79 (s, 1H).   |

| Ej  | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d <sub>6</sub> , δ en ppm)                                                                                                                        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 67-70         | 3,3 (s, 3H) ; 3,55 (m, 2H) ; 3,65 (m, 2H); 4,6 (s, 2H); 6,45 (m, 1H) ; 7,4 (m, 2H) ; 7,5 (t, 1H); de 7,55 a 7,7 (m, 6H); 8,05 (s, 1H) ; 8,35 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H) ; 11,15 (s, 1H).     |
| 100 | 206-210       | 1,55 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,45 (t, 1H); 7,55 (m, 3H); 7,75 (m, 2H) ; 7,85 (m, 3H) ; 8,55 (d, 1H); 8,75 (s, 1H) ; 9,05 (s, 1H).                                                      |
| 101 | 275-277       | 4,45 (d, 2H); 5,35 (t, 1H) ; 7,35 (m, 2H) ; 7,45 a 7,6 (m, 3H); 7,75 a 7,9 (m, 3H); 8,55 (d, 1H); 8,8 (m, 2H).                                                                          |
| 102 | [368]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 6,5 (m, 1H) ; 7,5 (m, 7H); 7,72 (d, 1H) ; 7,8 (s, 1H) ; 8,19 (s, 1H); 8,32 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                          |
| 103 | [368]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 6,4 (m, 1H); 7,0 (m, 1H); 7,05 (m, 2H) ; 7,2 (m, 1H) ; 7,35 (m, 1H) ; 7,5 (m, 3H) ; 7,75 (m, 1H); 7,85 (s, 1H); 8,6 (s, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; 11,0 (s, 1H). |
| 104 | [360]         | 1,5 (s, 6H) , 4,1 (s, 3H) , 5,1 (s, 1H) , 7,15 (m, 1 H) , 7,45 (m, 1H) , 7,55 (m, 2H) , 7,7 (s, 2H) , 7,8 (s, 1H) , 8,2 (d, 1H), 8,55 (s, 1H) , 8,6 (d, 1H) , 9,0 (s, 1H)               |
| 105 | [346]         | 1,5 (s, 6H), 2,5 (s, 3H) ; 5,15 (s, 1H) , 7,3 (m, 1H) , 7,45 (m, 1H) , 7,5 (m, 2H) , 7,65 (m, 2H) , 7,8 (s, 1H) , 7,9 (d, 1H) , 8,25 (s, 1H) , 8,9 (s, 1H)                              |
| 106 | [382]         | 1,5 (s, 6H) , 3,85 (s, 3H) , 5,1 (s, 1H) , 6,5 (d, 1H) , 7,35 (d, 1H) , 7,45 (m, 1H) , 7,55 (m, 3H) , 7,65 (m, 2H) , 7,8 (m, 2H) , 8,2 (s, 1H) , 8,4 (s, 1H) , 8,9 (s, 1H)              |
| 107 | [380]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (m, 1H); 7,45 (m, 1H) ; 7,6 (m, 2H) ; 7,8 (m, 4H); 8,0 (d, 1H); 8,2 (d, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,95 (m, 1H) ; 9,0 (m, 1H); 9,05 (s, 1H) ; 9,35 (d, 1H).                 |
| 108 | [380]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,6 (m, 3H); 7,85 (m, 4H); 8,2 (m, 2H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,8 (d, 1H); 9,0 (s, 1H) ; 9,4 (s, 1H).                                               |
| 109 | [357]         | 1,5 (s, 6H) , 5,1 (s, 1H) , 7,45 (t, 1H) , 7,55 (d, 1H) , 7,6 (d, 1H) , 7,7 (s, 2H) , 7,75 (m, 1H) , 7,8 (m, 2H) , 8,75 (s, 1H) , 8,95 (s, 1H)                                          |

| Ej  | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | [366]         | 0,95 (d, 6H) ; 1,5 (m, 7H) ; 1,7 (m, 2H) ; 4,2 (t, 2H) ; 5,1 (s, 1H) ; 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,8 (s, 1H) ; 7,9 (s, 1H) ; 8,15 (s, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,9 (s, 1H) |
| 111 | [380]         | 1,5 (s, 6H) ; 5,15 (s, 1H) ; 7,65 (m, 8H) ; 8,05 (m, 1H) ; 8,1 (m, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,9 (m, 1H) ; 8,95 (s, 1H) ; 9,95 (s, 1H)                                                          |
| 112 | [358]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,30 (t, 1H); 6,5 (s, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,45 (m, 3H) ; 7,65 (d, 1H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H); ;             |
| 113 | [350]         | 3,9 (s, 3H) ; 4,4 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 6,9 (d, 1H, ) ; 7,4 (m, 3H) 7,65 (d, 2H ) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,45 (s 1H) ; 8,70 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ;                                         |
| 114 | [338]         | 4,45 (m, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,25 (m, 1H); 8,55 (d, 1H); 8,6 (d, 1H) ; 8,7 (m, 1H) ; 8,75 (m, 1H).                                             |
| 115 | [339]         | 2,25 (s, 3H) ; 4,44 (s, 2H) ; 5,3 (s, 1H) ; 7,1 (s, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,45 (m, 3H) ; 7,6 (d, 1H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                                          |
| 116 | [321]         | 4,45 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 8,78 (s, 1H) ; 9,18 (s, 1H) ; 9,4 (s, 2H).                                                         |
| 117 | [358]         | 4,45 (m, 2H) ; 5,25 (m, 1H) ; 7,05 (s, 1H) ; 7,2 (m, 1H) ; 7,25 (m, 2H) ; 7,45 (m, 4H); 7,75 (m, 2H) ; 8,6 (s, 1H); 8,75 (s, 1H) ; 11,0 (s, 1H).                                          |
| 118 | [358]         | 4,45 (m, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 6,45 (s, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,45 (m, 4H); 7,6 (m, 2H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                            |
| 119 | [350]         | 4,1 (s, 3H) ; 4,45 (s, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 7,2 (m, 1H) ; 7,3 (d, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,2 (m, 1H); 8,5 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,75 (s, 1H).                                 |
| 120 | [339]         | 3,15 (s, 3H); 4,45 (m, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 7,3 (m, 3H) ; 7,45 (m, 2H); 7,65 (d, 1H) ; 7,9 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).                                                           |
| 121 | [372]         | 3,8 (s, 3H) ; 4,45 (m, 2H) ; 5,35 (m, 1H); 6,55 (d, 1H) ; 7,3 (d, 2H) ; 7,4 (d, 1H) ; 7,5 (m, 1H) ; 7,6 (m, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 7,8 (d, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H).  |

| Ej  | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | [370]         | 4,45 (m, 2H) ; 5,3 (m, 1H) ; 7,3 (m, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,65 (m, 1H);<br>7,75 (d, 1H) ; 7,85 (m, 1H) ; 8,0 (d, 1H); 8,1 (m, 1H) ; 8,45 (s, 1H); 8,8<br>(s, 1H) ; 8,95 (m, 1H) ; 9,35 (m, 1H). |
| 123 | [370]         | 4,45 (s, 2H) ; 5,3 (m, 1H); 7,3 (m, 2H) ; 7,55 (m, 2H); 7,9 (m, 3H) ; 8,25<br>(m, 2H) ; 8,55 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,85 (d, 1H); 9,45 (s, 1H).                                               |
| 124 | [356]         | 4,45 (m, 2H) ; 5,35 (m, 1H); 7,3 (d, 2H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,7 (m, 3H); 8,75<br>(s, 1H) ; 8,85 (s, 1H).                                                                                          |
| 125 | [379]         | 0,9 (d, 6H); 1,5 (m, 1H); 1,7 (m, 2H); 4,2 (t, 2H); 4,4 (s, 2H) ; 5,25 (s,<br>1H); 7,25 (m, 3H); 7,5 (m, 3H) ; 7,6 (d, 1H) ; 8,1 (s, 1H) ; 8,65 (s, 1H).                                       |
| 126 | [376]         | 4,6 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 6,5 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,4 (s, 1H); 7,45 (m,<br>2H); 7,65 (m, 3H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,75 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                 |
| 127 | [368]         | 3,9 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H); 5,3 (t, 1H) ; 6,9 (d, 1H) ; 7,2 (t, 1H) ; 7,4 (m,<br>1H) ; 7,6 (m, 1H) ; 7,7 (d, 1H) ; 8,25 (d, 1H) ; 8,4 (s, 1H) ; 8,75 (d, 2H).                                   |
| 128 | [389]         | 2,25 (s, 3H) ; 4,6 (s, 2H); 5,3 (s, 1H) ; 7,1 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,4 (m,<br>2H) ; 7,6 (m, 2H) ; 8,3 (s, 1H) ; 8,7 (s, 1H).                                                                |
| 129 | [376]         | 4,6 (d, 2H); 5,35 (t, 1H) ; 6,45 (s, 1H) ; 7,25 (m, 1H) ; 7,45 (m, 2H);<br>7,65 (m, 4H) ; 8,05 (s, 1H) ; 8,45 (s, 1H); 8,75 (s, 1H) ; 11,2 (s, 1H).                                            |
| 130 | [368]         | 4,1 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,3 (t, 1H) ; 7,15 (m, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,45<br>(m, 1H); 7,65 (m, 2H) ; 8,15 (m, 1H); 8,55 (s, 1H) ; 8,6 (d, 1H) ; 8,85 (s,<br>1H).                             |
| 131 | [357]         | 2,45 (s, 3H) ; 4,6 (s, 2H); 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (m, 2H) ; 7,4 (m, 1H) ; 7,65<br>(m, 2H) ; 7,9 (d, 1H) ; 8,25 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H).                                                            |
| 132 | [390]         | 3,85 (s, 3H) ; 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 6,5 (d, 1H) ; 7,25 (t, 1H) ; 7,45<br>(d, 1H) ; 7,5 (m, 2H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,8 (d, 1H) ; 8,2 (s, 1H) ; 8,45 (s,<br>1H); 8,8 (s, 1H).              |
| 133 | [388]         | 4,6 (d, 2H) ; 5,35 (t, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,5 (d, 1H) ; 7,65 (m, 2H) ; 7,85<br>(m, 2H) ; 8,0 (d, 1H); 8,1 (m, 1H) ; 8,5 (s, 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 9,0 (m,<br>1H); 9,35 (d, 1H).                |

182

| Ej  | PF o<br>[M+H] | RMN Espectro RMN <sup>1</sup> H (DMSO-d6, δ en ppm)                                                                                                                                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | [388]         | 4,6 (s, 2H); 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (m, 1H) ; 7,7 (m, 4H) ; 8,2 (m, 2H); 8,55 (s, 1H) ;8,6 (d, 1H) ;8,8 (d 1H) ; 8,85 (s, 1H) ; 9,45 (s, 1H)                                            |
| 135 | [374]         | 4,55 (s, 2H) ; 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,50 (d, 1H); 7,65 (m, 1H); 7,7 (s, 2H) ; 7,75 (d, 1H) ; 8,80 (d, 1H); 8,85 (s, 1H)                                                      |
| 136 | [397]         | 0,9 (d, 6H); 1,5 (m, 1H); 1,7 (m, 2H); 4,15 (t, 2H); 4,6 (s, 2H); 5,35 (s, 1H) ; 7,25 (t, 1H); 7,45 (m, 1H) ; 7,55 (m, 2H); 7,9 (s, 1H) ; 8,15 (s, 1H); 8,25 (s, 1H) ; 8,8 (s, 1H) ; |
| 137 | [437]         | 1,4 (s, 9H) ; 4,6 (m, 2H) ; 5,35 (m, 1H); 7,75 (d, 1H); 8,15 (s, 1H); 8,2 (s, 1H) ; 8,55 (m, 1H); 8,65 (m, 1H) ; 8,8 (m, 1H); 8,9 (m, 1H); 9,0 (s, 1H) ; 9,15 (s, 1H); 9,3 (s, 1H).  |

Los compuestos según la invención han sido objeto de ensayos farmacológicos que permiten determinar su efecto modulador sobre NOT.

**Evaluación de la actividad *in vitro* sobre células N2A**

La actividad de los compuestos según la invención ha sido evaluada sobre una línea celular (N2A) que expresa de manera endógena el receptor de ratón Nurrl y que ha sido transfectada de manera estable con el elemento de respuesta que une al NOT (NBRE) acoplado con el gen informador luciferasa. Las EC<sub>50</sub> están comprendidas entre 0,01 y 10 μM. Los ensayos se han realizado según el modo de operación descrito más adelante.

La estirpe celular Neuro-2A proviene de un proveedor comercial estándar (ATCC). El clon Neuro-2A se ha obtenido a partir de un tumor espontáneo proveniente de una cepa de ratón A albino por R.J Klebe *et al.* Esta estirpe Neuro-2A se transfecta a continuación de manera estable con 8NBRE-luciferasa. Se cultivan las células N2A-8NBRE hasta la confluencia en frascos de cultivo de 75 cm<sup>2</sup> que contienen DMEM enriquecido con 10% de suero fetal de ternero, 4,5 g/l de glucosa y 0,4 mg/ml de geneticina. Después de una semana de cultivo, las células se recuperan mediante tripsina al 0,25% durante 30 segundos, se vuelven a poner en suspensión en DMEM sin rojo de fenol, que contiene 4,5 g/L de glucosa, 10% de suero deslipidado Hyclone y se depositan en placas blancas de 96 pocillos con fondo transparente. Se depositan las células a razón de 60.000 por pocillo en 75 μl durante 24 horas antes de la adición de los productos. Se aplican los productos en 25 μl y se incuban 24 horas adicionales. El día de la medida, se añade a cada pocillo un volumen equivalente (100 μl) de Steadylite, y después se esperan 30 minutos para obtener una lisis completa de las células y la producción máxima de señal. Las placas se miden en un contador de luminiscencia para microplacas después de haber sido selladas con una película adhesiva. Los productos se preparan en forma de disolución madre a 10<sup>-2</sup> M y se diluyen en 100% de DMSO. Cada concentración de producto se diluye previamente en medio de cultivo antes de la incubación con las células, conteniendo así 0,625% final de DMSO.

Por ejemplo, los compuestos n° 6, 7, 24, 50, 68, 79 y 86 han mostrado una EC<sub>50</sub> de respectivamente 0,9 ; 1,6; 52 ; 202 20 5 y 71 nM.

Parece pues que los compuestos según la invención tienen un efecto modulador de NOT.

Los compuestos según la invención se pueden utilizar por tanto para la preparación de medicamentos para su aplicación en terapéutica en el tratamiento o en la prevención de enfermedades que implican a los receptores NOT.

Así, según otro de sus aspectos, la invención tiene por objeto medicamentos que comprenden un compuesto de la fórmula (I), o una sal de adición de este último a un ácido farmacéuticamente aceptable.

Estos medicamentos encuentran su empleo en terapéutica, principalmente en el tratamiento y la prevención de enfermedades neurodegenerativas tales como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, tauopatías (por ejemplo, parálisis progresiva supranuclear, demencia frontotemporal, degeneración corticobasal, enfermedad de Pick); traumatismos cerebrales como isquemia y traumatismos craneales y epilepsia; enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia, depresión, dependencia de una sustancia, trastornos de déficit de atención con hiperactividad; enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, como esclerosis en placa, encefalitis, mielitis y encefalomielitis y otras enfermedades inflamatorias, como patologías vasculares, aterosclerosis, inflamaciones de las articulaciones, artrosis, artritis reumatoide ; osteoartritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa; enfermedades inflamatorias alérgicas, tales como asma, enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, lupus, esclerodermias, Síndrome de Guillain-Barré, enfermedad de Addison y otras enfermedades inmunomediadas; osteoporosis; los cánceres.

Estos compuestos también se podrían utilizar como tratamiento asociado en los injertos y/o trasplantes de células madres.

Según otro de sus aspectos, la presente invención se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden, como principio activo, un compuesto según la invención. Estas composiciones farmacéuticas contienen una dosis eficaz de al menos un compuesto según la invención, o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto, así como al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.

Dichos excipientes se eligen según la forma farmacéutica y el modo de administración deseado, entre los excipientes habituales que son conocidos por el experto en la técnica.

En las composiciones farmacéuticas de la presente invención para administración oral, sublingual, subcutánea, intramuscular, intravenosa, tópica, local, intratraqueal, intranasal, transdérmica o rectal, el principio activo de fórmula (I) anterior, o su sal, puede administrarse en forma unitaria de administración, mezclado con excipientes farmacéuticos clásicos, a los animales y a los seres humanos para la profilaxis o el tratamiento de los trastornos o las enfermedades anteriores.

Las formas unitarias de administración apropiadas comprenden las formas por vía oral tales como comprimidos, cápsulas blandas o duras, polvos, gránulos y soluciones o

suspensiones orales, las formas de administración sublingual, bucal, intratraqueal, intraocular, intranasal, por inhalación, las formas de administración tópica, transdérmica, subcutánea, intramuscular o intravenosa, las formas de administración rectal y los implantes. Para la aplicación tópica, se pueden utilizar los compuestos según la invención en cremas, geles, pomadas o lociones.

A título de ejemplo, una forma unitaria de administración de un compuesto según la invención en forma de comprimido puede comprender los componentes siguientes :


|    |                              |           |
|----|------------------------------|-----------|
|    | Compuesto según la invención | 50,0 mg   |
|    | Manitol                      | 223,75 mg |
| 10 | Croscarmelosa sódica         | 6,0 mg    |
|    | Almidón de maíz              | 15,0 mg   |
|    | Hidroxipropil-metilcelulosa  | 2,25 mg   |
|    | Estearato de magnesio        | 3,0 mg    |

Puede haber casos particulares en los que sean apropiadas dosificaciones más altas o más bajas ; no estando dichas dosificaciones fuera del alcance de la invención. Según la práctica habitual, la dosificación apropiada para cada paciente la determina el médico según el modo de administración, el peso y la respuesta de dicho paciente.

La presente invención, según otro de sus aspectos, se refiere igualmente a un método de tratamiento de las patologías indicadas anteriormente que comprende la administración a un paciente de una dosis eficaz de un compuesto según la invención, o de una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

REIVINDICACIONES

## 1. Compuestos de fórmula (I):



5 en la que:

R<sub>1</sub> representa :

un grupo heteroarilo o heterocíclico, pudiendo estar opcionalmente  
sustituido con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente  
los unos de los otros entre los átomos o grupos siguientes : halógeno, alquilo  
10 (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>),  
tioalquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), -S(O)-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), -S(O)<sub>2</sub>-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>),  
hidroxilo, oxo, ciano, nitro, hidroxil-alquilenos (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb-alquilenos  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)-alquilenos (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)-oxi, NRaRb, CONRaRb,  
SO<sub>2</sub>NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>),  
15 NRcC(O)ORe, NRcSO<sub>2</sub>Re, aril-alquilenos (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), arilo o heteroarilo  
monocíclico, estando el arilo o el heteroarilo monocíclico opcionalmente  
sustituido con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un  
grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alcoxi  
(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb, hidroxilo, oxo, nitro, ciano o OCO-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) y R<sub>1</sub>  
20 está unido a la imidazo[1,2-a]piridina por un carbono aromático ;

X representa 1 a 4 sustituyentes idénticos o diferentes uno de otro, elegidos entre un  
hidrógeno, un halógeno, alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb, nitro, ciano, pudiendo  
estar el grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) opcionalmente sustituido con uno o varios grupos elegidos  
entre un halógeno, alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb o hidroxilo;

25 R representa en la posición 3, 5, 7 u 8 de la imidazo[1,2-a]piridina de 1 a 4 sustituyentes  
idénticos o diferentes uno de otro, elegidos entre un hidrógeno, un halógeno, alquilo (C<sub>1</sub>-  
C<sub>10</sub>), halo-alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>);

R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independientemente uno de otro,

un átomo de hidrógeno,

30 un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), sustituido opcionalmente con un grupo R<sub>f</sub> ;

un grupo arilo, sustituido opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos

entre un halógeno, un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), haloalquilo( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi( $C_1-C_{10}$ ), haloalcoxi( $C_1-C_{10}$ ), NRaRb, hidroxilo, nitro o ciano ;

$R_2$  y X pueden formar junto con los átomos de carbono a los que están unidos un ciclo carbonado de 5 a 7 átomos de carbono;

5  $R_4$  representa :

un átomo de hidrógeno,

un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), sustituido opcionalmente con un grupo Rf ;

un grupo arilo, sustituido opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), haloalquilo( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi( $C_1-C_{10}$ ),

10 haloalcoxi( $C_1-C_{10}$ ), NRaRb, hidroxilo, nitro, ciano, alquil ( $C_1-C_{10}$ )(CO)-, CONRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCOalquilo( $C_1-C_{10}$ ), NRcC(O)ORe o arilo, estando el arilo sustituido opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), haloalquilo( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi( $C_1-C_{10}$ ), haloalcoxi( $C_1-C_{10}$ ), NRaRb, hidroxilo, nitro o ciano ;

15 Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), aril-alquilenos ( $C_1-C_{10}$ ) o arilo ;

o Ra y Rb forman juntos, con el átomo de nitrógeno al que están unidos, un grupo azetidina, pirrolidina, piperidina, azepina, morfolina, tiomorfolina, piperacina, homopiperacina, estando este grupo sustituido opcionalmente con un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), arilo o

20 arilalquilenos( $C_1-C_{10}$ ) ;

Rc y Rd representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), aril-alquilenos ( $C_1-C_{10}$ ), arilo;

o Rc y Rd forman juntos un grupo alquilenos( $C_2-C_5$ );

Re representa un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), aril-alquilenos ( $C_1-C_{10}$ ), arilo ;

25 o Rc y Re forman juntos un grupo alquilenos( $C_2-C_5$ );

Rf representa un átomo de halógeno, un grupo alcoxi ( $C_1-C_{10}$ ), halo-alcoxi ( $C_1-C_{10}$ ), hidroxilo, ciano, NRaRb, C(O)NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, OCO-alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), NRcCOORE, SO<sub>2</sub>NRaRb, NRcSO<sub>2</sub>Re, aril-alquilenos ( $C_1-C_{10}$ ), arilo, estando el arilo opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes elegidos entre un halógeno, un

30 grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), halo-alquilo ( $C_1-C_{10}$ ), alcoxi ( $C_1-C_{10}$ ), halo-alcoxi ( $C_1-C_{10}$ ), NRaRb, hidroxilo, nitro, ciano o OCO-alquilo ( $C_1-C_{10}$ );

en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

2. Compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1, caracterizados por que  $R_1$  representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo, benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
 pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo( $C_1-C_{10}$ ), oxo,  $NRaRb$  ; alcoxi( $C_1-C_{10}$ ), arilo,  $CONRaRb$  ;  
 Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo ( $C_1-C_{10}$ ) ;

3. Compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1 ó 2, caracterizados porque :

X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de halógeno.

4. Compuestos de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque :  
 R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ) ;

5. Compuestos de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque :  
 $R_2$  y  $R_3$  representan, independientemente uno del otro un átomo de hidrógeno o un grupo ( $C_1-C_{10}$ )alkyle.

6. Compuestos de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque :  
 $R_4$  representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo( $C_1-C_{10}$ ), opcionalmente sustituido con un grupo  $R_f$  ;  
 $R_f$  representa un grupo alcoxi( $C_1-C_{10}$ ).

7. Compuestos de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque :

el grupo  está en posición 2, 3 o 4 del fenilo al que está unido.

8. Compuestos de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque :

- R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo, benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
5 pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), oxo, NRaRb ; alcoxi(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), arilo, CONRaRb ;
- 10 Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;
- X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de halógeno ;
- R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;
- 15 R2 y R3 representan, independientemente uno del otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>);
- R<sub>4</sub> representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), opcionalmente sustituido con un grupo Rf ;
- Rf representa un grupo alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;
- 20 en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

9. Compuestos de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque :

- R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-*b*]piridinilo, pirimidinilo, benzotiazolilo, benzotiofenilo, bencimidazolilo, indazolilo, benzisoxazolilo, isoquinoleinilo, pirazolilo ;  
25 pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), oxo, NRaRb ; alcoxi(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), arilo, CONRaRb ;
- 30 Ra y Rb representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;
- X representa 1 o 2 átomos de hidrógeno o de halógeno ;
- R representa en posición 3, 5, 7 u 8 del imidazo[1,2-*a*]piridina un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;

R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independientemente uno del otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>);

R<sub>4</sub> representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), opcionalmente sustituido con un grupo R<sub>f</sub>;

- 5 R<sub>f</sub> representa un grupo alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;

estando el grupo  en posición 2, 3 o 4 del fenilo al que está unido ;  
en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

#### 10. Compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1, caracterizados por que

- 10 R<sub>1</sub> representa un grupo isoxazolilo, piridinilo, tiazolilo, quinoleinilo, benzo[1,3]dioxolilo, indolilo, 1,2,3,4-tetrahidroquinoleinilo, benzofuranilo, dihidrobenzofuranilo, dihidrobenzoxazolilo, furilo, tienilo, pirrolo[2,3-b]piridinilo, pudiendo estar estos grupos opcionalmente sustituidos con uno o varios átomos o grupos elegidos independientemente entre sí entre halógeno, alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), oxo, NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>, arilo ;

X representa un hidrógeno,

- 15 R representa un hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;

R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independientemente el uno del otro, un átomo de hidrógeno ;

R<sub>4</sub> representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), estando este grupo opcionalmente sustituido con un grupo R<sub>f</sub> ;

- 20 R<sub>a</sub> y R<sub>b</sub> representan, independientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;

R<sub>f</sub> representa un grupo alcoxi (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) ;

en el estado de base o de sal de adición a un ácido.

#### 11. Compuestos :

- {3-[2-(5-metilisoxazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- [3-[2-(piridin-4-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil]metanol y su hidrocloreuro ;
- Hidrocloreuro (2:1) de 6-(3-*terc*-butoximetilfenil)-2-(piridin-3-il)imidazo[1,2-a]piridina ;
- [3-[2-(tiazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil]metanol
- [3-[2-(quinolein-3-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil]metanol y su hidrocloreuro ;
- {3-[2-(1,3-benzodioxol-5-il)imidazo[1,2-a]piridin-6-il]fenil} metanol y su

hidrocloruro ;

- [3-[2-(piridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-[(1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- 6-[6-(3-hidroximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridin-2-il]-3,4-dihidro-1*H*-quinolein-2-ona y su hidrocloruro ;
- 2-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)-6-(3-*terc*-butoximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridina ;
- 6-[6-(3-hidroximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridin-2-il]-3*H*-benzoxazol-2-ona y su hidrocloruro ;
- Hidrocloruro (1:1) de [2-(2-furan-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {3-[2-(5-Bromo-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {3-[2-(5-clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il] fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(6-dimetilaminopiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(1*H*-indol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(6-aminopiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(1*H*-indol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(2-aminopiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(3-fenilisoxazol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [3-[2-(Benzofuran-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [4-[2-(Benzofuran-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;

- [3-[2-(piridin-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [4-[2-(piridin-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- [3-[2-(tien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil]metanol ;
- 2-(Benzofuran-2-il)-6-[3-(2-metoxietoximetil)fenil]imidazo[1,2-*a*]piridina ;
- 6-[3-(2-metoxietoximetil)fenil]-2-(tien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridina y su oxalato ;
- [3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [3-(3-metil-2-tien-2-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol y su hidrocloruro ; ;
- {3-[2-(1*H*-indol-3-il)-3-metilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(2-Etoxipirimidin-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- [2-(2-quinolein-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(2-Cloro-piridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- [3-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol y su hidrocloruro ;
- [3-(2-Benzo[b]tiofen-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol y su hidrocloruro ;
- [3-(2-Benzo[b]tiofen-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol y su hidrocloruro ;
- 3-(2-Benzo[b]tiofen-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol y su hidrocloruro ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- {3-[2-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;
- {2-[2-(1*H*-Indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol y su hidrocloruro ;

- [3-(2-Benzofuran-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {3-[2-(3-Clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(5-metilisoxazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- 2-{3-[2-(1H-Indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-[3-(3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-piridin-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(5-Clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]tienil-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-metil-1H-bencimidazol-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,3-Dihidrobzenofuran-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Furan-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzofuran-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Benzo[*b*]tienil-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-tiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1H-indazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreto ;
- 2-{3-[2-(1H-Indazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol y su hidrocloreto ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1H-indazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol y su hidrocloreto ;

- [2-Fluoro-6-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-piridin-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2-(2-Benzotiazol-2-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- [2-(2-Benzo[*b*]tiofen-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- {2-[2-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-6-fluorofenil} metanol ;
- [2-(2-Benzofuran-5-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- [2-(2-Benzo[*b*]tienil-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-tiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(3-metil-2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-tien-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-piridin-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {3-[2-(5-Clorotien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-2,6-difluorofenil} metanol ;
- [3-(2-Benzofuran-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-tien-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [3-(2-Benzofuran-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [3-(2-Benzotiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-tiazol-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- 6-(3-metoximetilfenil)-2-(1-metil-1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridina y su hidrocloreuro ;
- 2-(1*H*-Indol-6-il)-6-(3-metoximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridina y su hidrocloreuro ;
- 2-{3-[2-(5-metilisoxazol-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- [2-Fluoro-6-(3-metil-2-tienil-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- {2-[2-(5-Clorotiofén-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-6-fluorofenil} metanol ;
- [2-(2-Benzofuran-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;

- [2-(2-Benzofuran-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1-metil-1*H*-bencimidazol-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-furan-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]tienil-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-metil-1*H*-bencimidazol-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}metanol ;
- {3-[2-(2,3-Dihidrobenzofuran-5-il)-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-2,6-difluorofenil}metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-furan-2-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]metanol ;
- [3-(2-Benzofuran-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- [3-(2-Benzo[*b*]tienyl-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-2,6-difluorofenil]metanol ;
- 2-(1*H*-Indol-6-il)-6-[3-[2-(metoxietil)oximetil]fenil]imidazo[1,2-*a*]piridina ;
- 2-[3-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- [2-(2-Benzo[*d*]isoxazol-3-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)-6-fluorofenil]metanol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1*H*-Indol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(4-metiltien-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(1-metil-1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Isoquinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;
- 2-{3-[2-(2,6-Difluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil}-propan-2-ol ;
- 2-(3-{2-[1-(3-metilbutil)-1*H*-pirazol-4-il]imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il}fenil)propan-2-ol ;
- 2-[3-(2-Quinolin-3-il-imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil]propan-2-ol ;

- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(6-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(3-fluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-metiltien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-pirimidin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(2-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(4-metiltien-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2-Fluoro-6-[2-(1-metil-1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-quinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol ;
- [2-Fluoro-6-(2-isoquinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol ;
- {2-[2-(2,6-Difluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-6-fluorofenil} metanol ;
- (2-Fluoro-6-{2-[1-(3-metilbutil)-1*H*-pirazol-4-il]imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il}phenyl) metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(6-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-metiltien-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1*H*-indol-6-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(2-metoxipiridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(4-metiltien-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- {2,6-Difluoro-3-[2-(1-metil-1*H*-indol-5-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]fenil} metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-quinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol ;
- [2,6-Difluoro-3-(2-isoquinolin-5-ilimidazo[1,2-*a*]piridin-6-il)fenil] metanol ;
- {3-[2-(2,6-Difluoropiridin-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il]-2,6-

difluorofenil}metanol ;

- (2,6-Difluoro-3-{2-[1-(3-metilbutil)-1*H*-pirazol-4-il]imidazo[1,2-*a*]piridin-6-il}fenil)metanol ;

- *N*-*terct*-butil-5-[6-(2,4-difluoro-3-hidroximetilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridin-2-il]nicotinamida.

12. Un medicamento, caracterizado porque comprende un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una sal de adición de este compuesto a un ácido farmacéuticamente aceptable.

5 13. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable de este compuesto, así como al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.

10 14. La utilización de un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento y a la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

15 15. La utilización de un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento y a la prevención de traumatismos cerebrales y de la epilepsia.

16. La utilización de un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las 15 reivindicaciones 1 a 11, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento y a la prevención de enfermedades psiquiátricas.


17. La utilización de un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento y a la prevención de enfermedades inflamatorias.

20 18. La utilización de un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento y a la prevención de la osteoporosis y los cánceres.

25 19. La utilización de un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento y a la prevención de la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, las tauopatías, la esclerosis en placa.


20. La utilización de un compuesto de la fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, para la preparación de un medicamento destinado al tratamiento y a la prevención de la esquizofrenia, depresión, dependencia de una sustancia, trastornos de falta de atención y de hiperactividad.

- 5 21. Procedimiento de síntesis de los compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1, por reacción de compuestos de fórmula (XI)





- 10 en la que R, X, R3 y R2 son tal como se definen en la reivindicación 1 y GP es un grupo de protección de la función hidroxilo, con R1-W con R1 siendo tal como se define en la reivindicación 1 y W es un derivado de boro o de estaño, a continuación el producto obtenido se desprotege.

22. Procedimiento de síntesis de los compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1, por reacción de compuestos de fórmula (IX).




- 15 en la que R, X, R3, R4 y R2 son tal como se definen en la reivindicación 1 con R1-W con R1 siendo tal como se define en la reivindicación 1 y W es un derivado de boro o de estaño.

23. Procedimiento de síntesis de los compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1, por reacción de compuestos de fórmula (VIII).




en la que R es tal como se definen en la reivindicación 1 e Y es un derivado de boro, con un compuesto de la fórmula (VII) en la que R6 representa R4 y R2, R3, R4 y X son tal como se definen en la reivindicación 1 y Z es un halógeno.

24. Procedimiento de síntesis de los compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1, por reacción de compuestos de fórmula (XIII).



en la que R2 R3, R4 y X son tal como se definen en la reivindicación 1 con un compuesto de fórmula (VI), R1, R son tal como se definen en la reivindicación 1 y Hal es un halógeno.




25. Procedimiento de síntesis de los compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1, por reacción de compuestos de fórmula (XIV).






- en la que R2, R3, R4 y X son tal como se definen en la reivindicación 1 y GP es un grupo de protección de la función hidroxilo, con un compuesto de fórmula (VI), R1, R son tal como se definen en la reivindicación 1 y Hal es un halógeno, a continuación el producto obtenido se desprotege.

## 26. Compuestos intermedios







5



10



15



20

27. Procedimiento de síntesis según una cualquiera de las reivindicaciones 21 a 25 en el que los compuestos de fórmulas generales (VIII), (IX), (XI), (XIII) y (XIV) son los compuestos de fórmulas generales (VIII-1), (IX-1), (IX-2), (XI-1), (XI-2), (XI-3), (XI-4), (XIII-1), (XIII-2), (XIV-1), (XIV-2) y (XIV-3).

### Resumen

Compuestos de la fórmula (I) en la que: R<sub>1</sub> representa: un grupo fenilo o un grupo naftilo, pudiendo estar estos dos grupos opcionalmente sustituidos; X representa de 1 a 4 sustituyentes idénticos o diferentes uno del otro elegido entre hidrógeno, halógeno, alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), halo-alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), alcoxi(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>), NRaRb, ciano, nitro ; R representa en posición 3, 5, 7, 8 de la imidazo[1,2-*a*]piridina de 1 a 4 sustituyentes idénticos o diferentes uno del otro ; R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> representan, independientemente uno del otro, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) opcionalmente sustituido; un grupo arilo opcionalmente sustituido ; R<sub>2</sub> y X pueden formar junto con los átomos de carbono a los que están unidos un ciclo carbonado de 5 a 7 átomos de carbono; R<sub>4</sub> representa: un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo(C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>) opcionalmente sustituido o un grupo arilo opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes. Utilización en terapéutica y procedimiento de síntesis.

203

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/FR2009/000303

| <b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b><br>INV. C07D471/04 C07D213/28 C07D233/56 A61K31/437 A61P25/00<br>A61P19/00 A61P35/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  |
| <b>B. FIELDS SEARCHED</b><br>Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)<br>C07D A61K A61P<br>Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched<br>Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)<br>EPO-Internal, CHEM ABS Data, BEILSTEIN Data, WPI Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  |
| <b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Category*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                                  | Relevant to claim No.                                            |
| P, X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WO 2008/034974 A (SANOFI AVENTIS [FR];<br>ALMARIO GARCIA ANTONIO [FR]; LARDENOIS<br>PATRICK [F] 27 March 2008 (2008-03-27)<br>claim 1; compound ALL | 1-27                                                             |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FR 2 903 105 A (SANOFI AVENTIS SA [FR])<br>4 January 2008 (2008-01-04)<br>page 1, lines 1-4 - pages 18-19; table 1;<br>compounds 39-41              | 1-27                                                             |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FR 2 903 107 A (SANOFI AVENTIS SA [FR])<br>4 January 2008 (2008-01-04)<br>page 1, lines 1-4 - pages 13-16; table 1;<br>compounds 12, 34-36, 44, 48  | 1-27                                                             |
| <input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  |
| * Special categories of cited documents :<br>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance<br>"E" earlier document but published on or after the international filing date<br>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)<br>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means<br>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed<br>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention<br>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone<br>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.<br>"&" document member of the same patent family |                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Date of the actual completion of the international search<br>7 septembre 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | Date of mailing of the international search report<br>23/09/2009 |
| Name and mailing address of the ISA/<br>European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040,<br>Fax: (+31-70) 340-3016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | Authorized officer<br>Bareyt, Sébastien                          |

203

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No  
PCT/FR2009/000303

| Patent document<br>cited in search report | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| WO 2008034974 A                           | 27-03-2008          | AR 062897 A1               | 10-12-2008          |
|                                           |                     | AU 2007298856 A1           | 27-03-2008          |
|                                           |                     | CA 2662848 A1              | 27-03-2008          |
|                                           |                     | CL 27332007 A1             | 11-04-2008          |
|                                           |                     | EP 2069342 A1              | 17-06-2009          |
|                                           |                     | FR 2906250 A1              | 28-03-2008          |
|                                           |                     | KR 20090054449 A           | 29-05-2009          |
|                                           |                     | UY 30603 A1                | 02-05-2008          |
| FR 2903105 A                              | 04-01-2008          | AU 2007271082 A1           | 10-01-2008          |
|                                           |                     | CA 2656045 A1              | 10-01-2008          |
|                                           |                     | CN 101484163 A             | 15-07-2009          |
|                                           |                     | EP 2040703 A2              | 01-04-2009          |
|                                           |                     | WO 2008003854 A2           | 10-01-2008          |
|                                           |                     | KR 20090024775 A           | 09-03-2009          |
|                                           |                     | US 2009143420 A1           | 04-06-2009          |
| FR 2903107 A                              | 04-01-2008          | AU 2007271008 A1           | 10-01-2008          |
|                                           |                     | CA 2655713 A1              | 10-01-2008          |
|                                           |                     | CN 101484453 A             | 15-07-2009          |
|                                           |                     | EP 2041133 A1              | 01-04-2009          |
|                                           |                     | WO 2008003856 A1           | 10-01-2008          |
|                                           |                     | KR 20090024776 A           | 09-03-2009          |
|                                           |                     | US 2009149441 A1           | 11-06-2009          |

201

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande internationale n°<br>PCT/FR2009/000303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| <b>A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE</b><br>INV. C07D471/04 C07D213/28 C07D233/56 A61K31/437 A61P25/00<br>A61P19/00 A61P35/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| <b>B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE</b><br>Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)<br>C07D A61K A61P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)<br>EPO-Internal, CHEM ABS Data, BEILSTEIN Data, WPI Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| <b>C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Catégorie*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | no. des revendications visées                                                                                                                    |
| P,X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WO 2008/034974 A (SANOFI AVENTIS [FR]; ALMARIO GARCIA ANTONIO [FR]; LARDENOIS PATRICK [F] 27 mars 2008 (2008-03-27) revendication 1; composé ALL |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR 2 903 105 A (SANOFI AVENTIS SA [FR]) 4 janvier 2008 (2008-01-04) page 1, ligne 1-4 - pages 18-19; tableau 1; composés 39-41                   |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR 2 903 107 A (SANOFI AVENTIS SA [FR]) 4 janvier 2008 (2008-01-04) page 1, ligne 1-4 - pages 13-16; tableau 1; composés 12,34-36,44,48          |
| <input type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents <input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| * Catégories spéciales de documents cités:<br>"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent<br>"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date<br>"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)<br>"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens<br>"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée<br>"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention<br>"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément<br>"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier<br>"&" document qui fait partie de la même famille de brevets |                                                                                                                                                  |
| Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale                                                                                 |
| 7 septembre 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/09/2009                                                                                                                                       |
| Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonctionnaire autorisé                                                                                                                           |
| Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel (+31-70) 340-2040,<br>Fax: (+31-70) 340-3016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bareyt, Sébastien                                                                                                                                |

205


**RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE**

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets


Demande internationale n°

PCT/FR2009/000303


| Document brevet cité<br>au rapport de recherche |   | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s) | Date de<br>publication |
|-------------------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| WO 2008034974                                   | A | 27-03-2008             | AR 062897 A1                            | 10-12-2008             |
|                                                 |   |                        | AU 2007298856 A1                        | 27-03-2008             |
|                                                 |   |                        | CA 2662848 A1                           | 27-03-2008             |
|                                                 |   |                        | CL 27332007 A1                          | 11-04-2008             |
|                                                 |   |                        | EP 2069342 A1                           | 17-06-2009             |
|                                                 |   |                        | FR 2906250 A1                           | 28-03-2008             |
|                                                 |   |                        | KR 20090054449 A                        | 29-05-2009             |
|                                                 |   |                        | UY 30603 A1                             | 02-05-2008             |
| FR 2903105                                      | A | 04-01-2008             | AU 2007271082 A1                        | 10-01-2008             |
|                                                 |   |                        | CA 2656045 A1                           | 10-01-2008             |
|                                                 |   |                        | CN 101484163 A                          | 15-07-2009             |
|                                                 |   |                        | EP 2040703 A2                           | 01-04-2009             |
|                                                 |   |                        | WO 2008003854 A2                        | 10-01-2008             |
|                                                 |   |                        | KR 20090024775 A                        | 09-03-2009             |
|                                                 |   |                        | US 2009143420 A1                        | 04-06-2009             |
| FR 2903107                                      | A | 04-01-2008             | AU 2007271008 A1                        | 10-01-2008             |
|                                                 |   |                        | CA 2655713 A1                           | 10-01-2008             |
|                                                 |   |                        | CN 101484453 A                          | 15-07-2009             |
|                                                 |   |                        | EP 2041133 A1                           | 01-04-2009             |
|                                                 |   |                        | WO 2008003856 A1                        | 10-01-2008             |
|                                                 |   |                        | KR 20090024776 A                        | 09-03-2009             |
|                                                 |   |                        | US 2009149441 A1                        | 11-06-2009             |



(I)



(I)



(I)

DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION No. 4457

POR LA CUAL SE ACEPTA UN DESISTIMIENTO

EXPEDIENTE : 94 040.230

MARCA : RICH'S (MIXTA)

CLASE : 30

FOLIO : 32

LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que el solicitante a través de su apoderado debidamente facultado para el efecto, desistió de la solicitud contenida en el expediente indicado en la referencia, según obra en el folio anotado en el rubro.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar el DESISTIMIENTO que se da cuenta en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: Hacer las anotaciones correspondientes y archivar el expediente.

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente a el (la) Dr (a). JAMES W.F. RAISBECK apoderado (a) del solicitante, o a quien haga sus veces, del contenido de esta resolución, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de División de Signos Distintivos, y de apelación, para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Dada en Santafé de Bogotá D.C., a los 28 FEB 1996

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS  
LUZ HELENA LONDONO JARAMILLO.

APODERADO: JAMES W.F. RAISBECK

DIRECCION : CALLE 35 No. 7-25 PISO 4

CIUDAD : SANTA FE DE BOGOTA D.C.

208

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 67,851  
FECHA : AGOSTO 18 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-116608- -00000-0000

Fecha: 2010-09-21 12:45:47 Dep: 2020 DIR.NUEVASOR  
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act 411 PRESENTACION Folios: 210

\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*

| DEPOSITANTE       | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | Vr. PAGO      |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CAVELIER ABOGADOS | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754327 | 354662860 | 17/02/2010 | 60,833,000.00 |

\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*

| CANT. | RENTISTADO  | CONCEPTO                             | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-01 | SOLICITUDES                          |                |
|       |             | 32 INVOCACION DE UNA PRIORIDAD EN NU | 155,000.00     |
|       |             | TOTAL :                              | \$ 155,000.00  |

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

COLO: 14775-841-548-1



209

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 75,689  
FECHA : SEPTIEMBRE 13 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-116608- -00000-0000

Fecha: 2010-09-21 12:45:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 210

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE       | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | Vr. PAGO      |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CAVELIER ABOGADOS | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 156794820 | 13/09/2010 | 45,370,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                              | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-01 | SOLICITUDES                           |                |
|       |             | *** REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL | 26,000.00      |
|       |             | TOTAL :                               | \$ 26,000.00   |

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

COLO: 14775 - 841 - 548 - 5

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1964

210

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 75,766  
FECHA : SEPTIEMBRE 13 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-116608 - 00000-0000

Fecha: 2010-09-21 12:45:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 411 PRESENTACION Folios: 210

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE       | TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PGO  | Vr. PAGO      |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CAVELIER ABOGADOS | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 156794820 | 13/09/2010 | 45,370,000.00 |

\*\*\*\*\* CONCEPTO \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                    | TOTAL CONCEPTO |
|-------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 1     | 50005-01-02 | PRORROGAS Y RENOVACIONES    | 819,000.00     |
|       |             | 30 PRORROGAS Y RENOVACIONES | 819,000.00     |
|       |             | TOTAL :                     | \$ 819,000.00  |

SDN: OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

0010: 14775-841-148-1





Bogotá D.C.,  
2020



Doctor(a)  
SUAREZ DE PAEZ LUZ CLEMENCIA  
Apoderado(a) y/o Representante de  
SANOFI-AVENTIS


|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| REFERENCIA | Radicación No.             | 10 116608         |
|            | Solicitud internacional    | PCT/FR2009/000303 |
|            | Fecha inicio fase nacional | 21/10/2010        |
|            | Trámite                    | 11                |
|            | Evento                     | 378               |
|            | Actuación                  | 430               |
|            | Oficio No.                 | <b>14348</b>      |

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, estos deberán legalizarse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil. Cuando se trate de las declaraciones a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT., el alcance de las tales declaraciones se determinará según indiquen claramente una cesión de derechos del inventor al solicitante o su causante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2.15 del Capítulo Quinto, Título X de la Circular Única de Superintendencia de Industria y Comercio.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.

  
ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL  
Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha **05 NOV 2010**  
adpa11