

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 11-009246- -00009-0000
Fecha: 2013-04-01 16:40:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 15

Medellín

María Clara Múnera

Ref.: Expediente No. 11-009.246

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DERIVADOS DE 2-(2-
OXOIMIDAZOLIDIN-1-IL)PIRIDIN-4-CARBOXAMIDA"

Solicitante: NOVARTIS AG y XENON PHARMACEUTICALS INC

Nuestra Ref.: P2011/000003

RESPUESTA AL OFICIO No. 20722, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 445
DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2012
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio modificado voluntariamente el 10 de octubre de 2011.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 2, 3, 7 y 14;
- en la nueva Reivindicación 1, se limitó el significado de W y R¹, se eliminaron los radicales R³, R⁵, R^{5a}, R⁶, R⁷ y los subíndices n, p y q; se definió el número de átomos de carbono de cada grupo químico y el significado de los sustituyentes de cada uno de los grupos alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₁₋₆, alcoxilo C₁₋₆, arilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, heterociclilo y heteroarilo;

2

- en las nuevas Reivindicaciones 2 a 9 (antiguas Reivindicaciones 4 a 6 y 8 a 12), se definió el número de átomos de carbono de R^2 ;
- en la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 8), se definió el número de átomos de carbono de R^8 , y se eliminaron los radicales P, W y R^1 ;
- en la nueva Reivindicación 7 (antigua Reivindicación 10), se definió el número de átomos de carbono del radical R^1 , y se eliminaron los radicales P y W;
- en la nueva Reivindicación 8 (antigua Reivindicación 11) se eliminaron los radicales P, W y R^1 ;
- en la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 15) se eliminaron compuestos de acuerdo con las limitaciones realizadas en la Reivindicación 1, y se incluyó la frase “una sal farmacéuticamente aceptable del mismo”.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por el contrario, éstas corresponden a una franca limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador solicita que el título sea modificado de manera que defina con mayor precisión el objeto de la invención.

b- En atención a la anterior objeción, me permito modificar el título de la siguiente manera:

“DERIVADOS DE 2-(2-OXOIMIDAZOLIDIN-1-IL)PIRIDIN-4-CARBOXAMIDA”

3. a- El Examinador señala que las Reivindicaciones 1 a 4, 8, 10 y 11 no son claras pues son excesivamente amplias y contienen términos indefinidos e ilimitados tales como: alquilo, alquenilo, alquinilo, alcóxido, hidroxialquilo, alcóxialquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, haloalquilo, aralquilo, heterocicloalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, entre otros. Estos términos no definen el número de átomos de carbono ni de heteroátomos.

El Examinador sugiere limitar la materia reclamada a una generalización razonable de los ejemplos de la siguiente manera:

3

10

- en la Reivindicación 1, se limitó W a $-N(R^8)C(O)-$ únicamente; R^1 a hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , o heteroaril-alquilo C_{1-6} ; R^2 a hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , alcoxilo C_{1-6} , hidroxilo, hidroxil-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , haloalquilo C_{1-6} , aril C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} -alcoxilo C_{1-6} , heterociclilo, heterociclilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo o heteroarilo-alquilo C_{1-6} ; y R^8 a hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxil-alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , heteroarilo, heterociclilo o arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} ;
- se incluyó el significado de los sustituyentes que puede tener los grupos alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{1-6} , alcoxilo C_{1-6} , arilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , heterociclilo y heteroarilo, lo cual encuentra sustento en el Capítulo Descriptivo, páginas 9 a 21;

- en las nuevas Reivindicaciones 2 a 9 se definió el número de átomos de carbono de R^2 , de acuerdo con el Capítulo Descriptivo, páginas 9 a 21, 36 y 49;
- en la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 8), y se eliminaron los radicales P, W y R^1 ;
- en la nueva Reivindicación 7 (antigua Reivindicación 10), se definió el número de átomos de carbono del radical R^1 , y se eliminaron los radicales P y W;
- en la nueva Reivindicación 8 (antigua Reivindicación 11) se eliminaron los radicales P, W y R^1 ;
- por último, en la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 15) se eliminaron compuestos de acuerdo con las limitaciones realizadas en la Reivindicación 1, y se incluyó la frase “una sal farmacéuticamente aceptable del mismo” que encuentra sustento en la Reivindicación 1.

En este punto vale la pena considerar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.


En atención a lo anterior, no existe requerimiento alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva.

En el presente caso, el Capítulo Descriptivo incluye 26 ejemplos y 18 preparaciones de los compuestos de la invención, los cuales le permiten de manera clara e inequívoca a cualquier persona medianamente versada en la materia reproducir la invención.

Así, y de acuerdo con las limitaciones realizadas, considero respetuosamente que las objeciones han sido superadas en tanto el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde a una generalización razonable de la materia ilustrada en los ejemplos, y delimita claramente el alcance de la presente invención.

4. a- El Examinador señala que la patente WO2006/034446 (D1), afecta la novedad de la presente invención.

El Examinador señala que D1 divulga compuestos derivados de heterociclos como inhibidores de Estearoil CoA desaturasa cuya fórmula es:




El Examinador presenta una tabla comparativa entre las características esenciales de la presente invención y aquellas divulgadas en D1, con base en la cual concluye que todas las características esenciales de los compuestos reclamados ya se encontraban divulgadas en D1 por lo que la presente invención carece de novedad.

b- Nuevamente, llamo la atención del Examinador sobre las limitaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, donde los compuestos reclamados corresponden específicamente a los compuestos de la Fórmula (I), una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y una composición farmacéutica, con un alcance francamente restringido.

Los compuestos de la presente invención, de fórmula R¹-W-P-Q-R², de acuerdo con las limitaciones presentan un núcleo piridina (P) que en posición 2 está unida a un grupo 5-oxo-1H-1,2,4-triazol a través del nitrógeno de la posición 4 o a un grupo 2-oxoimidazolin por el nitrógeno de la posición 1 sustituido con uno o dos grupos metilo en las posiciones 4 y 5 (Q), sustituido a su vez por el radical R². Adicionalmente, dicha piridina central (P) está sustituida en posición 4 por un grupo carboxamida (W-isonicotinamidas), sustituido por el radical R¹.

De otra parte, D1 divulga de manera general compuestos de fórmula:



Sin embargo, **todos** los ejemplos de D1 (dicho documento sólo presenta 5 ejemplos) ilustran compuestos que incluyen en su estructura un grupo **trifluorobenzoilo** (cuando G, L y M son C en la Markush de Fórmula I) unido a un grupo **piperezinilo** (representado en la estructura de Fórmula I cuando J es C y K es N), mientras que los compuestos de la presente invención comprenden un núcleo **piridina** (P) unido a un grupo **1,2,4-triazolidin-5-ona** o **imidazolidin-2-onas** (Q).

Ahora bien, me permito anotar que recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio, en su Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad define, adopta y acepta el concepto de patente de selección en cuanto a invenciones farmacéuticas, de manera que consiste en una patente que “reivindica un solo elemento, o un grupo pequeño de elementos que pertenecen a un grupo extenso de elementos ya conocidos”¹. Así, la SIC define que para la evaluación de novedad de una patente de selección, es importante tener en cuenta que “una fórmula general del estado de la técnica no anula la novedad de un compuesto o subgrupo de compuestos reivindicados incluidos en ella”², concluyendo que “si el grupo específico de compuestos reivindicado no está descrito explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica por su nombre químico, ni por su fórmula química y está alejado de los ejemplos del estado de la técnica y de los extremos, tal grupo reivindicado es nuevo (selección)”³. Así, para la SIC es claro que si no existe tal divulgación concreta, entonces los compuestos serán considerados como una **selección nueva**.

Así, a la luz de lo establecido por la SIC en su Instructivo, la presente invención corresponde a una selección novedosa de la materia divulgada en D1, ya que en dicho documento no se revela de manera individual y concreta los compuestos de la presente invención, en los que un núcleo **piridina** (P) unido a un grupo **1,2,4-triazolidin-5-ona** o **imidazolidin-2-onas** (Q).. En conclusión, el compuesto reclamado es novedoso sobre D1.

¹ Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 3.5.1 (disponible electrónicamente en http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-106.pdf)

² Ibidem. Sección 3.5.4.

³ Ibidem.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo, han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295


Anexo: Capítulo Reivindicatorio Modificado




CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)


1. Un compuesto de la Fórmula (I):



en donde



Q es



W es $-N(R^8)C(O)-$;

R^1 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , o heteroaril-alquilo C_{1-6} ;

R^2 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , alcoxilo C_{1-6} , hidroxilo, hidroxil-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquil C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , halo-alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} -alcoxilo C_{1-6} , heterociclilo, heterociclilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo o heteroarilo-alquilo C_{1-6} ; y

R^8 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxil-alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , heteroarilo, heterociclilo o arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} ;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo;

en donde:

cualquier grupo alquilo C_{1-6} está opcionalmente sustituido por uno o más de los siguientes grupos: alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , halógeno, halo-alquilo C_{1-6} , ciano, arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-12} , heterociclilo, heteroarilo, $-OR^{14}$, $-OC(O)-R^{14}$, $-N(R^{14})_2$, $-C(O)R^{14}$, $-C(O)OR^{14}$, $-C(O)N(R^{14})_2$, $-N(R^{14})C(O)OR^{16}$, $-N(R^{14})C(O)R^{16}$, $-N(R^{14})(S(O)_tR^{16})$, $-SR^{16}$, $-S(O)_tR^{16}$, $-O-Si(R^{16})_3$ y $-S(O)_tN(R^{14})_2$, en donde cada R^{14} es independientemente

hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y cada R¹⁶ es alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y cada t es de 1 a 2;

cualquier alqueno C₂₋₆ está opcionalmente sustituido por uno o más de los siguientes grupos: alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, halógeno, halo-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, hetero-arilo, hetero-arilo-alquilo C₁₋₆, -OR¹⁴, -OC(O)-R¹⁴N(R¹⁴)₂, -C(O)R¹⁴, -C(O)OR¹⁴, -C(O)N(R¹⁴)₂, -N(R¹⁴)C(O)OR¹⁶, -N(R¹⁴)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁴)-(S(O)_tR¹⁶), -SR¹⁶, -S(O)_tR¹⁶, y -S(O)_tN(R¹⁴)₂, en donde cada R¹⁴ es independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y cada R¹⁶ es alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y en donde cada t es de 1 a 2;

cualquier alquino C₁₋₆ está opcionalmente sustituido por uno o más de los siguientes grupos: alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, halógeno, halo-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, heteroarilo-alquilo C₁₋₆, -OR¹⁴, -OC(O)-R¹⁴N(R¹⁴)₂, -C(O)R¹⁴, -C(O)OR¹⁴, -C(O)N(R¹⁴)₂, -N(R¹⁴)C(O)OR¹⁶, -N(R¹⁴)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁴)-(S(O)_tR¹⁶), -SR¹⁶, -S(O)_tR¹⁶, y -S(O)_tN(R¹⁴)₂, en donde cada R¹⁴ es independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y cada R¹⁶ es alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y en donde cada t es de 1 a 2;

cada alcoxilo C₁₋₆ está opcionalmente sustituido por uno o más de los siguientes grupos: alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, halógeno, halo-alquilo C₁₋₆, ciano, arilo C₆₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₂, heterociclilo, heteroarilo, -OR¹⁴, -OC(O)-R¹⁴, N(R¹⁴)₂, -C(O)R¹⁴, -C(O)OR¹⁴, -C(O)N(R¹⁴)₂, -N(R¹⁴)C(O)OR¹⁶, -N(R¹⁴)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁴)-(S(O)_tR¹⁶), -SR¹⁶, -S(O)_tR¹⁶, -O-Si(R¹⁶)₃ y -S(O)_tN(R¹⁴)₂, en donde cada R¹⁴ es independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y cada R¹⁶ es alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y en donde cada t es de 1 a 2;

cualquier arilo C₁₋₆ está opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes

9

seleccionados a partir del grupo que consiste en alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, halógeno, halo-alquilo C₁₋₆, ciano, nitro, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, heteroarilo-alquilo C₁₋₆, -R¹⁵-OR¹⁴, -R¹⁵-OC(O)-R¹⁴, -R¹⁵-N(R¹⁴)₂, -R¹⁵-C(O)R¹⁴, -R¹⁵-C(O)OR¹⁴, -R¹⁵-C(O)N(R¹⁴)₂, -R¹⁵-N(R¹⁴)C(O)OR¹⁶, -R¹⁵-N(R¹⁴)C(O)R¹⁶, -R¹⁵-N(R¹⁴)-(S(O)_t R¹⁶), -R¹⁵-SR¹⁶, -R¹⁵-S(O)_t R¹⁶, y -R¹⁵-S(O)_tN(R¹⁴)₂, en donde cada R¹⁴ es independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; cada R¹⁵ es independientemente un enlace directo, o una cadena de alqueno C₁₋₁₂ o alqueno C₂₋₁₂; y cada R¹⁶ es alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y en donde cada t es de 1 a 2;

cualquier cicloalquilo C₃₋₁₂ está opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, halógeno, halo-alquilo C₁₋₆, ciano, arilo C₆₋₁₀, arilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, heteroarilo-alquilo C₁₋₆, -R¹⁵-OR¹⁴, -R¹⁵-OC(O)-R¹⁴, -R¹⁵-N(R¹⁴)₂, -R¹⁵-C(O)R¹⁴, -R¹⁵-C(O)OR¹⁴, -R¹⁵-C(O)N(R¹⁴)₂, -R¹⁵-N(R¹⁴)C(O)OR¹⁶, -R¹⁵-N(R¹⁴)C(O)R¹⁶, -R¹⁵-N(R¹⁴)-(S(O)_t R¹⁶), -R¹⁵-SR¹⁶, -R¹⁵-S(O)_t R¹⁶, y -R¹⁵-S(O)_tN(R¹⁴)₂, en donde cada R¹⁴ es independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; cada R¹⁵ es independientemente un enlace directo, o una cadena de alqueno C₁₋₁₂ o alqueno C₂₋₁₂; y cada R¹⁶ es alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C₁₋₆; y en donde cada t es de 1 a 2;

cualquier "heterociclilo" es un sistema de anillo monocíclico, bicíclico o tricíclico de 3 a 18 miembros los cuales consisten en átomos de carbono de 1 a 5 heteroátomos que se seleccionan a partir del grupo que consiste de nitrógeno, oxígeno y azufre, y está opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en alquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, halógeno, halo-alquilo C₁₋₆, ciano, oxo, tioxo, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclilo-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, heteroarilo-alquilo C₁₋₆, -R¹⁵-OR¹⁴, -R¹⁵-OC(O)-R¹⁴, -R¹⁵-N(R¹⁴)₂, -R¹⁵-C(O)R¹⁴, -R¹⁵-C(O)OR¹⁴, -R¹⁵-C(O)N(R¹⁴)₂, -R¹⁵-N(R¹⁴)C(O)OR¹⁶, -R¹⁵-N(R¹⁴)C(O)R¹⁶, -R¹⁵-N(R¹⁴)-(S(O)_t R¹⁶), -R¹⁵-SR¹⁶, -R¹⁵-S(O)_t R¹⁶, y -R¹⁵-S(O)_tN(R¹⁴)₂, en donde cada R¹⁴ es independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂-alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆,

heterociclilo, heterociclilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C_{1-6} ; cada R^{15} es independientemente un enlace directo, o una cadena de alquilenos C_{1-12} o alquilenos C_{2-12} recta o ramificada; y cada R^{16} es alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , heterociclilo, heterociclilo-alquilo C_{1-6} , hetero-arilo, o hetero-arilo-alquilo C_{1-6} ; y en donde cada t es de 1 a 2;

cualquier heteroarilo es un sistema de anillo aromático monocíclico, bicíclico, o tricíclico de 5 a 18 miembros que consiste de átomos de carbono y de entre 1 a 5 heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, y está opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste de alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , halógeno, halo-alquilo C_{1-6} , ciano, oxo, tioxo, nitro, arilo C_{6-10} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , heterociclilo, heterociclilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo, heteroarilo-alquilo C_{1-6} , $-R^{15}-OR^{14}$, $-R^{15}-OC(O)-R^{14}$, $-R^{15}-N(R^{14})_2$, $-R^{15}-C(O)R^{14}$, $-R^{15}-C(O)OR^{14}$, $-R^{15}-C(O)N(R^{14})_2$, $-R^{15}-N(R^{14})C(O)OR^{16}$, $-R^{15}-N(R^{14})C(O)R^{16}$, $-R^{15}-N(R^{14})-(S(O)_tR^{16})$, $R^{15}-SR^{16}$, $-R^{15}-S(O)_tR^{16}$, y $-R^{15}-S(O)_tN(R^{14})_2$, en donde cada R^{14} es independientemente hidrógeno, alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , heterociclilo, heterociclilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C_{1-6} ; cada R^{15} es independientemente un enlace directo, o una cadena de alquilenos C_{1-12} o alquilenos C_{2-12} recta o ramificada; y cada R^{16} es alquilo C_{1-6} , halo-alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-12} , cicloalquilo C_{3-12} -alquilo C_{1-6} , arilo C_{6-10} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-6} , heterociclilo, heterociclilo-alquilo C_{1-6} , heteroarilo, o heteroarilo-alquilo C_{1-6} , y en donde cada t es de 1 a 2.


2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^2 es hidroxilo, alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, halo-alquilo C_{1-4} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alcoxilo C_{1-4} opcionalmente sustituido o heteroarilo-alquilo C_{1-4} .

3. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R^2 es hidroxilo, alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, halo-alquilo C_{1-4} , arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alcoxilo C_{1-4} opcionalmente sustituido o heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido;

en donde el cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:


10




el arilo C_{6-10} -alcoxilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:




el arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:




el alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:



el halo-alkiloC₁₋₄ es:




el heteroarilo-alkiloC₁₋₄ opcionalmente sustituido es:




4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R² es alquilo C₁₋₄ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃₋₇-alquilo C₁₋₄ opcionalmente sustituido, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₄ o heteroarilo-alkilo C₁₋₄ opcionalmente sustituido, en donde el cicloalquilo C₃₋₇-alquilo C₁₋₄ opcionalmente sustituido es:




el ariloC₆₋₁₀ alquiloC₁₋₄ opcionalmente sustituido es:




el alquiloC₁₋₄ opcionalmente sustituido es



el heteroarilo-alkiloC₁₋₄ opcionalmente sustituido es:



5. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




R^2 es hidroxilo, alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alcoxilo C_{1-4} opcionalmente sustituido o heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido; y


R^8 es hidrógeno o alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido.

6. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 5, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R^2 es hidroxilo, alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alcoxilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, o heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, el cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:




el arilo C_{6-10} alcoxilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:



el alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:




el arilo C_{5-10} alcoxilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:




y

el heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:



7. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




Q es ;

R^1 es hidrógeno, arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, o heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido;

R^2 es alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido o heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido; y

R^8 es hidrógeno.

8. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



Q es ;


R^2 es alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} opcionalmente sustituido, arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido o heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido; y

R^8 es hidrógeno o alquilo C_{1-4} .


9. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^2 es alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido, o arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} , o heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido;


en donde el cicloalquilo C_{3-7} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:




el arilo C_{6-10} -alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:



el alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:




el heteroarilo-alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido es:



10. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 es hidrógeno, alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido,



11. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es:
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-metil-isonicotinamida;
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(oxazol-4-il-metil)-isonicotinamida;
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida;
- 2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-pirazin-2-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(oxazol-2-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1-metil-1*H*-imidazol-4-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1,3,5-trimetil-1*H*-pirazol-4-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-metil)-isonicotinamida;

N-((1*H*-pirazol-3-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida;

N-((1,5-dimetil-1*H*-pirazol-3-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

(*R*)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(2-hidroxi-2-fenil-etil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((2-metil-tiazol-4-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(isoxazol-3-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((2-(trifluoro-metil)-tiazol-4-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((4-metil-2-fenil-tiazol-5-il)-metil)-isonicotinamida;

N-bencil-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-3-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-4-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida;

N-(4-fluoro-bencil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-(ciclopropil-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-fluoro-bencil)-isonicotinamida;

N-(2-ciclopropil-etil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-bencil-2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-3-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-4-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(ciclopropil-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(3,4-difluoro-bencil)-isonicotinamida;

N-bencil-2-(1-(ciclopropil-metil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-isonicotinamida;

N-(3,4-difluoro-bencil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-(4-fluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-2-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-(4-fluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-4-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-(3,4-difluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-3-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-(3,4-difluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(piridin-2-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-bencil-2-(2-oxo-3-(piridin-4-il-metil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-fluoro-bencil)-isonicotinamida;

2-(3-((4-(difluoro-metil)-fenil)-difluoro-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-fluoro-bencil)-isonicotinamida;

2-(3-(2,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(4-fluoro-bencil)-isonicotinamida;

N-bencil-2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-metil)-isonicotinamida;

N-(4-fluoro-bencil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(3-(benzo-[c][1,2,5]-tiadiazol-5-il-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-bencil-

24

isonicotinamida;

N-((1,3,4-oxadiazol-2-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-

isonicotinamida;

2-(3-(benzo-[c][1,2,5]-oxadiazol-5-il-metil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-bencil-

isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(1-fenil-etil)-isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-

isonicotinamida;

N-((3-bromo-isoxazol-5-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-

isonicotinamida;

2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-fenil-isoxazol-3-il)-metil)-

isonicotinamida;

N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(3-(4-fluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-

isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-

isonicotinamida;

N-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-

imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-

isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-

isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(piridin-3-il-metil)-

isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-

isonicotinamida;

N-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-

imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-

isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-

isonicotinamida;

N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-

1-il)-isonicotinamida;

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-

isonicotinamida;

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida;

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(tiazol-5-il-metil)-isonicotinamida;

2-(1-(4-fluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida;

2-(1-(3,4-difluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-((5-metil-isoxazol-3-il)-metil)-isonicotinamida;

2-(1-(3,4-difluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(tiazol-2-il-metil)-isonicotinamida;

2-(1-(3,4-difluoro-bencil)-5-oxo-1*H*-1,2,4-triazol-4(5*H*)-il)-*N*-(piridin-2-il-metil)-isonicotinamida;

2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metil)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(3-(3,4-difluoro-bencil)-2-oxo-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida; y

N-((2-cloro-tiazol-5-il)-metil)-2-(2-oxo-3-(4-(trifluoro-metoxi)-bencil)-imidazolidin-1-il)-isonicotinamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo

12. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la Fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

13. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en combinación con una cantidad terapéuticamente efectiva de insulina, derivado o mimético de insulina; secretagogo de insulina; ligando de receptor insulínico de sulfonil-urea; ligando de PPAR; sensibilizante a la insulina; biguanida; inhibidores de alfa-glucosidasa; GLP-1, análogo o mimético de GLP-1; inhibidor de DPPIV; inhibidor de HMG-CoA-reductasa; inhibidor de

10

sintasa de escualeno; ligando FXR o LXR; colestiramina; fibratos; ácido nicotínico; o aspirina.
