



FORMULARIO UNICO DE CORRECCION

1 SOLICITUD DE

☒ Corrección de Error Material ☐ Modificación de una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: ALLTECH, INC.

Dirección: 3031 Catnip Hill Pike Nicholasville, Kentucky 40356 , US.

Nacionalidad o Domicilio: Estados Unidos de América

Lugar de Constitución: Estados Unidos de América

Teléfono:

Fax:

E-Mail

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número Cual

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Dirección: Avenida 82 No.10-62 Piso 5

Teléfono: 634 1500

Fax: 376 2211

E-Mail: Alvaro.Correa@bakermckenzie.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número 79.143.366 TP 20.281

4 Numero de expediente

11 098.739

5 Descripción de la corrección o modificación solicitada

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, me permito presentar nuevas páginas 78 a 80, 90 y 94 a 98
en las cuales se han realizado correcciones de carácter tipográfico.

6 Comprobante de Pago No. 11-111660

Fecha 16-11-2011

7 Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes, si fuere el caso.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE ALVARO CORREA ORDOÑEZ

FIRMA

C.C. 79.143.366

T.P. 20.281

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

2000-F03

2011/018

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 11 - 111660

Bogotá D.C., Noviembre 16 de 2011 - 17:33:43

RECIBIDO DE : BAKER & MCKENZIE

NI 900.034.906

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	325105933	16/11/2011	113.695.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACION DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		118.000.00	118.000.00
				\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-098739- -00004-0000

Fecha: 2011-12-13 17:18:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 11

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Noviembre 16 de 2011 - 17:34:01

Metionina			0,5	
Calcio			1,1	
Fósforo disponible			0,52	
<u>Valores analizados</u>				
Proteína bruta	23,31	24,29	24,27	27,70
DM	89,30	88,99	88,54	88,38
Ceniza	6,33	6,39	6,73	6,75

(1) mezcla de vitaminas -minerales provista por kg de dieta: vitamina A (todo-trans-retinil palmitato), 8.800 UI; colecalciferol, 3.300 UI; vitamina E (todo rac- α -tocoferil acetato); 40 UI; menadiona, 3,3 mg; tiamina, 4,0 mg; riboflavina, 8,0 mg; ácido pantoténico, 15,0 mg; niacina, 50 mg; pirodoxina, 3,3 mg; colina, 600 mg; ácido fólico, 1,0 mg; biotina, 220 μ g; vitamina B₁₂, 12 μ g; etoxiquina, 120 mg; manganeso 70 mg; cinc, 70 mg; hierro, 60 mg; cobre, 10 mg; yodo, 1,0 g; selenio, 0,3 mg.

(2) Monensin sodio, 10 %

Las concentraciones dietarias de DON, 15-acetil-DON, ZEN, fumonisina y ochratoxina A se indican en la Tabla 2. Otras micotoxinas se hallaban por debajo de los límites de detección del método que eran de 0,12 mg/kg para el nivalenol, 0,05 mg/kg para el 3-acetil-DON, 0,07 mg/kg para el neosolaniol, 0,06 para el diacetoxiscirpenol y toxina T-2 y de 0,04 mg/kg para la toxina HT, y de 0,001 mg/kg para las aflatoxinas. Los límites de detección para DON, 15-acetil-DON, ZEN, fumonisina y ochratoxina A eran

de 0,06, 0,05, 0,025, 0,05 y 0,0003 mg/kg, respectivamente.

Tabla 2.- Concentraciones de micotoxina (µg/g) en dietas experimentales

Dieta	Micotoxina (1)				
	Deoxinivelenol	15-acetil-deoxinivalenol	Zearalenona	Fumonisin	Ochratoxina A
Inicial (semanas 0-3)					
Control	0,44	0,055	<0,025	BDL (2)	0,46
Control + CIYCW	0,53	0,087	<0,025	BDL	0,79
Contaminado	3,3	0,17	0,35	56	BDL
Cotaminado + CIYCW	4,1	0,17	0,47	BDL	BDL
De desarrollo (semanas 4-6)					
Control	0,44	0,12	BDL	BDL	0,62
Control + CIYCW	0,37	0,12	BDL	BDL	0,71
Contaminado	3,7	0,29	0,34	61	1,0
Contaminado + CIYCW	3,2	0,28	0,27	63	0,35

5 (1) En las dietas experimentales también se midieron otras micotoxinas, que incluyeron deacetoxicirpenol, toxina T-2, nivalenol, 3-acetil-DON, neosolaniol, toxina HT-2, y aflatoxinas, pero no se detectaron.

10 (2) BDL, por debajo del límite de detección.

La alimentación con granos contaminados no influyó de manera significativa sobre la ganancia de peso corporal, consumo de alimentos y eficiencia de la utilización del alimento al final de la fase inicial

(Tabla 3). La alimentación con dieta contaminada incrementó de manera significativa la ganancia de peso corporal y mejoró la eficiencia alimenticia en comparación con el control al final de la fase de desarrollo. No hubo un efecto de la dieta sobre la ingesta de alimentos durante la fase de desarrollo (Tabla 3). Al final de la fase de desarrollo, el añadido de pared de célula de levadura entrelazada con arcilla en las dietas contaminadas incrementó la ganancia de peso corporal, consumo de alimentos y mejoró la eficiencia de la utilización del alimento en comparación con el control. La ganancia de peso corporal y la eficiencia del alimento a lo largo de un período experimental de seis semanas fueron significativamente más elevadas en las aves alimentadas con dietas contaminadas y con dietas contaminadas complementadas con paredes de célula de levadura entrelazada con arcilla.

Tabla 3. Efecto de las micotoxinas dietarios de *Fusarium* sobre del desempeño en los pavos (1)

Dieta	Semanas 0-3	Semanas 4-6	Semanas 0-6
	Aumento (ganancia) de peso corporal (g/ave)		
Control	474,50	1.420,81	1.895,32
Control + CIYCW	501,45	1.461,74	1.963,19
Contaminado	511,93	1.572,97	2.084,90
Contaminado + CIYCW	502,00	1.627,63	2,129,64

Tabla 5. Efecto de micotoxinas de *Fusarium* sobre la química del plasma (1)

Dieta	Semana 3	Semana 6
Calcio (mmol/L)		
Control	3,05	2,94
Control + CIYCW	3,15	2,97
Contaminado	3,05	3,03
Contaminado + CIYCW	3,13	3,14
SEM	0,04	0,04
Control vs Control + CIYCW	NS (2)	NS
Control vs Contaminado	NS	NS
Control vs Contaminado +CIYCW	NS	0,002
Fósforo (mmol/L)		
Control	2,57	2,46
Control + CIYCW	2,59	2,44
Contaminado	2,67	2,47
Contaminado + CIYCW	2,64	2,64

Tabla 5. Efecto de micotoxinas de *Fusarium* sobre la química del plasma (1) (Continuación).

Dieta	Semana 3	Semana 6
Glucosa (mmol/L)		
Control	18,35	17,82
Control + CIYCW	18,13	17,45
Contaminado	17,31	17,52
Contaminado + CIYCW	17,63	17,23
SEM	0,37	0,34
Control vs Control + CIYCW	NS	NS
Control vs Contaminado	0,05	NS
Control vs Contaminado + CIYCW	NS	NS
Colesterol (mmol/L)		
Control	4,12	4,17
Control + CIYCW	3,99	4,23
Contaminado	4,10	4,04
Contaminado + CIYCW	4,03	3,73

SEM		0,12	0,13
Control vs Control + CIYCW		NS	NS
Control vs Contaminado		NS	NS
Control vs Contaminado + CIYCW		NS	0,02
bilirrubina total (mmol/L)			
Control		5,37	2,37
Control + CIYCW		5,87	2,37
Contaminado		4,87	2,12
Contaminado + CIYCW		5,12	2,62
SEM		0,70	0,38
Control vs Control + CIYCW		NS	NS
Control vs Contaminado		NS	NS
Control vs Contaminado + CIYCW		NS	NS

1) los valores son medios cuadráticos mínimos; para cada dieta y fase n = 4 corrales y dos aves por corral.

(2) $P > 0,05$

Tabla 5. Efecto de micotoxinas de *Fusarium* sobre la química del plasma (1) (Continuación).

Dieta	Semana 3	Semana 6
γ -glutamilttransferasa (U/L)		
Control	1,75	1,75
Control + CIYCW	2,00	1,50
Contaminado	0,75	1,87
Contaminado + CIYCW	0,87	1,00
SEM	0,33	0,18
Control vs Control + CIYCW	NS	NS
Control vs Contaminado	0,04	NS
Control vs Contaminado+CIYCW	NS	0,008
Aspartato aminotransferasa (U/L)		
Control	211,38	212,63
Control + CIYCW	226,25	207,75
Contaminado	226,75	211,63
Contaminado + CIYCW	205,00	203,75
SEM	8,15	6,42
Control vs	NS	NS

Control + CIYCW		
Control vs Contaminado	NS	NS
Control vs Contaminado + CIYCW	NS	NS
Creatina quinasa (U/L)		
Control	1.352,63	1.047,13
Control + CIYCW	1.309,38	907,63
Contaminado	1.649,25	953,38
Contaminado + CIYCW	1.147,00	1.086,63
SEM	173,46	145,41
Control vs Control + CIYCW	NS	NS
Control vs Contaminado	NS	NS
Control vs Contaminado + CIYCW	NS	NS

1) los valores son medios cuadráticos mínimos; para cada dieta y fase n = 4 corrales y dos aves por corral.

(2) $P > 0,05$

Tabla 5. Efecto de micotoxinas de *Fusarium* sobre la química del plasma (1) (Continuación).

Dieta	Semana 3	Semana 6
Amilasa (U/L)		
Control	809,63	877,38
Control + CIYCW	821,63	764,88
Contaminado	872,50	913,25
Contaminado + CIYCW	891,38	902,88
SEM	57,27	54,54
Control vs Control + CIYCW	NS	NS
Control vs Contaminado	NS	NS
Control vs Contaminado + CIYCW	NS	NS
Lipasa (U/L)		
Control	5,37	2,87
Control + CIYCW	4,37	4,50
Contaminado	4,75	3,62
Contaminado + CIYCW	5,87	4,25
SEM	0,94	0,72