



No. 11-124967- -00009-0000

Fecha: 2013-02-12 11:03:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 30

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

P2011/000164

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

MERCK SHARP & DOHME CORP.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

MARK R. DANIEL

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	126 East Lincoln Avenue, Rahway NJ	New Jersey
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

OLARTE GARCIA CARLOS R.

79.782.747 de Btá

74.295

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Cra 5 No. 34-03		BOGOTA
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
office@olartemoure.com	601-7799	601-7700

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 11-124.967

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.


6. Firma

CARLOS R. OLARTE

Nombre y apellidos

79.782.747 de Bogotá

C.C.


Firma

74.295

Tarjeta Profesional

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 12 - 143098

Bogotá D.C., Diciembre 27 de 2012 - 12:18:27

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	532931814	26/12/2012	14.990.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	BENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO	
33	50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	30.000.00	990.000.00
					\$990.000.00

SON: **NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-124967- -00009-0000
Fecha: 2013-02-12 11:03:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 30

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Diciembre 27 de 2012 - 12:18:31

11/164
J

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 -/-					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 143092	
				Bogotá D.C., Diciembre 27 de 2012 - 12:18:27	
RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS				NI 830.122.870	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	532931814	26/12/2012	14.990.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO		Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA			120.000.00	120.000.00
					\$120.000.00
=====					
SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: 					

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
					
No. 11-124967- -00009-0000					
Fecha: 2013-02-12 11:03:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR					
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI					
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 30					

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
, Diciembre 27 de 2012 - 12:18:31					

- / -



No. 13 - 008109

Bogotá D.C., Enero 28 de 2013 - 10:28:32

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	181303220	28/01/2013	15.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000.00	5.000.00
				\$5.000.00

SON: **CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-124967- -00009-0000

Fecha: 2013-02-12 11:03:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 30

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia


Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Enero 28 de 2013 - 10:28:33

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto que tiene la Fórmula estructural (I):



y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que:

(A) se elige entre el grupo que consiste en sistemas de anillos arilo bicíclicos de 9 miembros que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que están sustituidos en los átomos de C o N con u sustituyentes R^1 ;

cada R^1 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-\text{OR}^{3a}$, $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_{0-6}\text{C}(\text{O})\text{R}^3$, $-\text{CO}_2\text{R}^{3a}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{3a})_2$, $-\text{SR}^{3a}$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{3a}$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^{3a}$, $-(\text{CH}_2)_{0-6}\text{N}(\text{R}^{3a})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{SO}_2\text{R}^{3a}$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{CO}_2\text{R}^{3a}$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{C}(\text{O})\text{R}^3$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{COR}^{3a}$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{3a})$, alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} que contiene de 0 a 3 heteroátomos elegidos entre N, O y S, y fenilo, y el alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-\text{OR}^{3a}$, $-\text{CN}$, $-\text{CO}_2\text{R}^{3a}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{3a})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{CO}_2\text{R}^{3a}$, $-\text{SR}^{3a}$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{3a}$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^{3a}$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{SO}_2\text{R}^{3a}$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{CO}_2\text{R}^{3a}$, $-\text{N}(\text{R}^{3a})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{3a})$, alquilo C_{1-6} , $-\text{O}$ -alquilo C_{1-6} , $-\text{S}$ -alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

u es de 0 a 4;

cada R^3 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-\text{OH}$, $-\text{O}$ -alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

cada R^{3a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

(B) es un grupo elegido entre el grupo que consiste en

(a) $-\text{C}\equiv\text{C}-$; y

(b) sistemas de anillos arilo B' elegidos entre el grupo que consiste en:

(i) sistemas de anillos monocíclicos de 5 a 7 miembros; y

(ii) sistemas de anillos bicíclicos de 8 a 10 miembros;

y los sistemas de anillos arilo B' que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con v sustituyentes R^2 ;

cada R^2 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-\text{OR}^{4a}$, $-\text{CN}$, $-\text{CO}_2\text{R}^{4a}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{4a}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{4a})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{4a})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{4a})\text{COR}^4$,

$-N(R^{4a})CO_2R^{4a}$, $-N(R^{4a})C(O)N(R^{4a})$, $-N(R^{4a})SO_2R^{4a}$, $-SR^{4a}$, $-S(O)R^{4a}$, $-S(O_2)R^{4a}$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 4 R^4 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 4 R^4 ;

v es de 0 a 4;

cada R^4 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, $-OH$, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

cada R^{4a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

R^1 y R^2 pueden tomarse junto con $\textcircled{A}$ y $\textcircled{B}$ para formar un anillo carbocíclico de 5 a 9 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

cada D es un grupo independientemente elegidos entre el grupo que consiste en:

- (a) un enlace sencillo;
- (b) $-C(O)N(R^5)-$;
- (c) $-N(R^5)C(O)-$; y


(d) un sistema de anillos arilo de 5 o 6 miembros D' que contiene de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con 0 a 2 sustituyentes R^5 ;

cada R^5 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^6$, $-CN$, $-CO_2R^6$, $-C(O)N(R^6)_2$, $-N(R^6)_2$, $-N(R^6)COR^6$, $-SR^6$, $-S(O)R^6$, $-S(O_2)R^6$, $-N(R^6)SO_2R^6$, $-NCO_2R^6$, $-NC(O)N(R^6)_2$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 3 R^6 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 3 R^6 ; y

cada R^6 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

cada E es un grupo independientemente elegidos entre el grupo que consiste en:

- (a) un enlace sencillo;
- (b) $-(C(R^7)_2)_{0-2}NR^7C(O)O_{0-1}-$; y
- (c) un derivado de pirrolidinilo elegido entre el grupo que consiste en:



I es un grupo bivalente elegido entre $-C(O)-$, $-CO_2-$ y $-C(O)N(R^7)-$;

J es un sistema de anillos condensado elegido entre el grupo que consiste en carbociclos de 3 a 7 miembros y anillos arilo de 5 o 6 miembros que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con sustituyentes R^9 ;

cada R^{8a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OH, -Oalquilo C_{1-6} y alquilo C_{1-6} , o dos R^{8a} pueden tomarse juntos para formar oxo;

cada R^{8b} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OH, -Oalquilo C_{1-6} y alquilo C_{1-6} , o dos R^{8b} pueden tomarse juntos para formar oxo;

cada R^{8c} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-6} ;

o dos grupos cualquiera seleccionados entre R^{8a} , R^{8b} y R^{8c} pueden tomarse juntos para formar un anillo espiro-bicíclico o bicíclico puenteado;

cada R^9 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , -O-alquilo C_{1-6} , -S-alquilo C_{1-6} , -NH-alquilo C_{1-6} y -NHC(O)-alquilo C_{1-6} ;

cada R^7 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y fenilo, y el alquilo C_{1-6} y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , -O-alquilo C_{1-6} y -S-alquilo C_{1-6} ; y

cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

- (a) hidrógeno,
- (b) $-OR^{10a}$,
- (c) $-CN$;
- (d) $-CO_2R^{10a}$,
- (e) $-C(O)N(R^{10})_2$;
- (f) $-SR^{10a}$,
- (g) $-S(O)R^{10a}$,
- (h) $-S(O_2)R^{10a}$,
- (i) $-N(R^{10})_2$;
- (j) $-N(R^{10})SO_2R^{10a}$, (k) $-NCO_2R^{10a}$, (l) $-NC(O)N(R^{10})_2$;
- (m) alquilo C_{1-6} que tiene de 0 a 4 sustituyentes R^{11} ,

cada R^{11} se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

- (i) -OH;
- (ii) $-N(R^{10})_2$;
- (iii) $=NR^{10}$;
- (iv) -O-alquilo C_{1-6} ;
- (v) $-C(O)R^{10}$;
- (vi) -S-alquilo C_{1-6} ;
- (vii) $-SO_2$ -alquilo C_{1-6} ;



(viii) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tienen de 0 a 3 sustituyentes R^{12} en los átomos de N o C, y cada R^{12} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} que tiene de 0 a 3 sustituyentes elegidos entre R^{10} , -O-alquilo C_{1-6} , -S-alquilo C_{1-6} , -OR^{10a}, -CN, -C(O)R¹⁰, -CO₂R^{10a}, -C(O)N(R¹⁰)₂, -SR^{10a}, -S(O)R^{10a}, -S(O₂)R^{10a}, -N(R¹⁰)SO₂R^{10a}, -NCO₂R^{10a}, -NC(O)N(R¹⁰)₂ y -N(R¹⁰)₂, o dos R^{12} se toman juntos para formar oxo; y

(ix) arilo de 5 o 6 miembros que contiene de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tiene de 0 a 3 sustituyentes R^{13} en los átomos de N o C, y cada R^{13} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , -O-alquilo C_{1-6} y carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

(n) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tienen de 0 a 3 sustituyentes R^{10} en los átomos de N o C; y

(o) sistemas de anillos arilo G' elegidos entre el grupo que consiste en:

(i) sistemas de anillos monocíclicos de 5 a 7 miembros; y

(ii) sistemas de anillos bicíclicos de 8 a 10 miembros;

y los sistemas de anillos arilo G' que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con 0 a 3 sustituyentes R^{10} ;

cada R^{10} se elige independientemente entre el grupo que consiste en

- (i) hidrógeno;
- (ii) -CN;
- (iii) alquilo C_{1-6} ;
- (iv) -O-alquilo C_{0-6} ;
- (v) -S-alquilo C_{0-6} ;
- (vi) alquil C_{1-6} -O- R^{14} ;
- (vii) -C(O)R¹⁴;
- (viii) -CO₂R¹⁴;
- (ix) -SO₂R¹⁴;
- (x) -N(R¹⁴)₂;
- (xi) -N(R¹⁴)SO₂R¹⁴;
- (xii) -NCO₂R¹⁴;
- (xiii) -NC(O)N(R¹⁴)₂; y

(xiv) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

o dos R^{10} pueden tomarse juntos para formar oxo;

cada R^{10a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en


- (i) hidrógeno;
- (ii) -CN;
- (iii) alquilo C_{1-6} ;
- (iv) alquil C_{1-6} -O- R^{14} ;
- (v) -C(O) R^{14} ;
- (vi) -CO₂ R^{14} ;
- (vii) -SO₂ R^{14} ;
- (x) -N(R^{14})₂;
- (xi) -N(R^{14})SO₂ R^{14} ;
- (xii) -NCO₂ R^{14} ;
- (xiii) -NC(O)N(R^{14})₂; y

(xiv) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

y dos grupos R^{10} o R^{10a} pueden tomarse junto con el N al que están unidos para formar un anillo, que puede estar sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^{14} ; y

cada R^{14} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , -(CH₂)₀₋₃cicloalquilo C_{3-8} y fenilo.

2. Un compuesto que tiene la Fórmula estructural (I):



y/o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en la que:

$\bigcirc A$ se elige entre el grupo que consiste en sistemas de anillos arilo bicíclicos de 9 miembros que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que están sustituidos en los átomos de C o N con u sustituyentes R^1 ;

cada R^1 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OR^{3a}, -CN, -C(O)R³, -CO₂R^{3a}, -C(O)N(R^{3a})₂, -SR^{3a}, -S(O)R^{3a}, -S(O₂)R^{3a}, -(CH₂)₀₋₆N(R^{3a})₂, -N(R^{3a})SO₂R^{3a}, -N(R^{3a})CO₂R^{3a}, -N(R^{3a})C(O)R³, -N(R^{3a})COR^{3a}, -N(R^{3a})C(O)N(R^{3a}), alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} que contiene de 0 a 3 heteroátomos elegidos entre N, O y S, y fenilo, y el alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} y fenilo están sustituidos

con 0 a 3 sustituyentes independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{3a}$, $-CN$, $-CO_2R^{3a}$, $-C(O)N(R^{3a})_2$, $-N(R^{3a})_2$, $-N(R^{3a})CO_2R^{3a}$, $-SR^{3a}$, $-S(O)R^{3a}$, $-S(O_2)R^{3a}$, $-N(R^{3a})SO_2R^{3a}$, $-N(R^{3a})CO_2R^{3a}$, $-N(R^{3a})C(O)N(R^{3a})$, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} y $-S$ -alquilo C_{1-6} ;

u es de 0 a 4;

cada R^3 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-OH$, $-O$ -alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

cada R^{3a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

(B) es un grupo elegido entre el grupo que consiste en

(a) $-C\equiv C-$; y

(b) sistemas de anillos arilo B' elegidos entre el grupo que consiste en:

(i) sistemas de anillos monocíclicos de 5 a 7 miembros; y

(ii) sistemas de anillos bicíclicos de 8 a 10 miembros;

y los sistemas de anillos arilo B' que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con ν sustituyentes R^2 ;

cada R^2 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{4a}$, $-CN$, $-CO_2R^{4a}$, $-C(O)N(R^{4a})_2$, $-N(R^{4a})_2$, $-N(R^{4a})COR^{4a}$, $-N(R^{4a})CO_2R^{4a}$, $-N(R^{4a})C(O)N(R^{4a})$, $-N(R^{4a})SO_2R^{4a}$, $-SR^{4a}$, $-S(O)R^{4a}$, $-S(O_2)R^{4a}$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 4 R^4 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 4 R^4 ;

ν es de 0 a 4;

cada R^4 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, $-OH$, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

cada R^{4a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

R^1 y R^2 pueden tomarse junto con (A) y (B) para formar un anillo carbocíclico de 5 a 9 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

cada D es un grupo independientemente elegidos entre el grupo que consiste en:

(a) un enlace sencillo;

(b) $-C(O)N(R^5)-$;

(c) $-N(R^5)C(O)-$; y


(d) un sistema de anillos arilo de 5 o 6 miembros D' que contiene de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con 0 a 2 sustituyentes R^5 ;

cada R^5 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^6$, $-CN$, $-CO_2R^6$, $-C(O)N(R^6)_2$, $-N(R^6)_2$, $-N(R^6)COR^6$, $-SR^6$, $-S(O)R^6$, $-S(O_2)R^6$, $-N(R^6)SO_2R^6$, $-NCO_2R^6$, $-NC(O)N(R^6)_2$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 3 R^6 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 3 R^6 ; y

cada R^6 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

cada E es un grupo independientemente elegidos entre el grupo que consiste en:

- (a) un enlace sencillo;
- (b) $-(C(R^7)_2)_{0-2}NR^7C(O)O_{0-1}$; y
- (c) un derivado de pirrolidinilo elegido entre el grupo que consiste en:



I es un grupo bivalente elegido entre $-C(O)-$, $-CO_2-$ y $-C(O)N(R^7)-$;

J es un sistema de anillos condensado elegido entre el grupo que consiste en carbociclos de 3 a 7 miembros y anillos arilo de 5 o 6 miembros que contiene de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con sustituyentes R^9 ,

cada R^{8a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OH$, $-O$ alquilo C_{1-6} y alquilo C_{1-6} , o dos R^{8a} pueden tomarse juntos para formar oxo;

cada R^{8b} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OH$, $-O$ alquilo C_{1-6} y alquilo C_{1-6} , o dos R^{8b} pueden tomarse juntos para formar oxo;

cada R^{8c} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-6} ;

o dos grupos cualquiera seleccionados entre R^{8a} , R^{8b} y R^{8c} pueden tomarse juntos para formar un anillo espiro-bicíclico o bicíclico puenteado;

cada R^9 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-S$ -alquilo C_{1-6} , $-NH$ -alquilo C_{1-6} y $-NHC(O)$ -alquilo C_{1-6} ;

cada R^7 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y fenilo, y el alquilo C_{1-6} y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} y $-S$ -alquilo C_{1-6} ; y

cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

- (a) hidrógeno;

81

- (b) $-\text{OR}^{10a}$;
- (c) $-\text{CN}$;
- (d) $-\text{CO}_2\text{R}^{10a}$;
- (e) $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{10})_2$;
- (f) $-\text{SR}^{10a}$;
- (g) $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{10a}$;
- (h) $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^{10a}$;
- (i) $-\text{N}(\text{R}^{10})_2$;
- (j) $-\text{N}(\text{R}^{10})\text{SO}_2\text{R}^{10a}$, (k) $-\text{NCO}_2\text{R}^{10a}$, (l) $-\text{NC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{10})_2$;
- (m) alquilo C_{1-6} que tiene de 0 a 4 sustituyentes R^{11} ,

cada R^{11} se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

- (i) $-\text{OH}$;
- (ii) $-\text{N}(\text{R}^{10})_2$;
- (iii) $=\text{NR}^{10}$,
- (iv) $-\text{O}$ -alquilo C_{1-6} ;
- (v) $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{10}$;
- (vi) $-\text{S}$ -alquilo C_{1-6} ;
- (vii) $-\text{SO}_2$ -alquilo C_{1-6} ;

(viii) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tienen de 0 a 3 sustituyentes R^{12} en los átomos de N o C, y cada R^{12} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} que tiene de 0 a 3 sustituyentes elegidos entre R^{10} , $-\text{O}$ -alquilo C_{1-6} , $-\text{S}$ -alquilo C_{1-6} , $-\text{OR}^{10a}$, $-\text{CN}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{10}$, $-\text{CO}_2\text{R}^{10a}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{10})_2$, $-\text{SR}^{10a}$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{10a}$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{R}^{10a}$, $-\text{N}(\text{R}^{10})\text{SO}_2\text{R}^{10a}$, $-\text{NCO}_2\text{R}^{10a}$, $-\text{NC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{10})_2$ y $-\text{N}(\text{R}^{10})_2$, o dos R^{12} se toman juntos para formar oxo; y

(ix) arilo de 5 o 6 miembros que contiene de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tiene de 0 a 3 sustituyentes R^{13} en los átomos de N o C, y cada R^{13} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , $-\text{O}$ -alquilo C_{1-6} y carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,

(n) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tienen de 0 a 3 sustituyentes R^{10} en los átomos de N o C; y

(o) sistemas de anillos arilo G' elegidos entre el grupo que consiste en:

- (i) sistemas de anillos monocíclicos de 5 a 7 miembros; y
- (ii) sistemas de anillos bicíclicos de 8 a 10 miembros;

y los sistemas de anillos arilo G' que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con 0 a 3 sustituyentes R^{10} ;

cada R^{10} se elige independientemente entre el grupo que consiste en

- (i) hidrógeno;
- (ii) -CN;
- (iii) alquilo C_{1-6} ;
- (iv) -O-alquilo C_{0-6} ;
- (v) -S-alquilo C_{0-6} ;
- (vi) alquil C_{1-6} -O- R^{14} ;
- (vii) -C(O) R^{14} ;
- (viii) -CO₂ R^{14} ;
- (ix) -SO₂ R^{14} ;
- (x) -N(R^{14})₂;
- (xi) -N(R^{14})SO₂ R^{14} ;
- (xii) -NCO₂ R^{14} ;
- (xiii) -NC(O)N(R^{14})₂; y

(xiv) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,

o dos R^{10} pueden tomarse juntos para formar oxo;

cada R^{10a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en

- (i) hidrógeno;
- (ii) -CN;
- (iii) alquilo C_{1-6} ;
- (iv) alquil C_{1-6} -O- R^{14} ;
- (v) -C(O) R^{14} ;
- (vi) -CO₂ R^{14} ;
- (vii) -SO₂ R^{14} ;
- (x) -N(R^{14})₂;
- (xi) -N(R^{14})SO₂ R^{14} ;
- (xii) -NCO₂ R^{14} ;
- (xiii) -NC(O)N(R^{14})₂; y


(xiv) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

y dos grupo R^{10} o R^{10a} pueden tomarse junto con el N al que están unidos para formar un anillo, que puede estar sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^{14} ; y


cada R^{14} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , -(CH₂)₀₋₃cicloalquilo C_{3-8} y fenilo.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en el que

dicho (A) se elige entre el grupo que consiste en



en la que cada X se elige independientemente entre el grupo que consiste en CR¹ y N;




cada R¹ se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OR^{3a}, -CN, -C(O)R³, -CO₂R^{3a}, -C(O)N(R^{3a})₂, -SR^{3a}, -S(O)R^{3a}, -S(O₂)R^{3a}, -(CH₂)₀₋₆N(R^{3a})₂, -N(R^{3a})SO₂R^{3a}, -N(R^{3a})CO₂R^{3a}, -N(R^{3a})C(O)R³, -N(R^{3a})COR^{3a}, -N(R^{3a})C(O)N(R^{3a}), alquilo C₁₋₆, carbociclo C₃₋₈ que contiene de 0 a 3 heteroátomos elegidos entre N, O y S, y fenilo, y el alquilo C₁₋₆, carbociclo C₃₋₈ y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OR^{3a}, -CN, -CO₂R^{3a}, -C(O)N(R^{3a})₂, -N(R^{3a})₂, -N(R^{3a})CO₂R^{3a}, -SR^{3a}, -S(O)R^{3a}, -S(O₂)R^{3a}, -N(R^{3a})SO₂R^{3a}, -N(R^{3a})CO₂R³, -N(R^{3a})C(O)N(R^{3a}), alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆ y -S-alquilo C₁₋₆;

cada R³ se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁₋₆, -OH, -O-alquilo C₁₋₆ y cicloalquilo C₃₋₈; y

cada R^{3a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁₋₆ y cicloalquilo C₃₋₈.


4. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en el que

dicho (A) se elige entre el grupo que consiste en:




en el que dicho (A) está sustituido de 0 a 3 R¹ más.

5. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que dicho (A) se elige entre el grupo que consiste en:



en el que dicho (A) está sustituido con 0 a 3 R¹ más.

6. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que dicho (A) se elige entre el grupo que consiste en:



en el que dicho (A) está sustituido con 0 a 3 R¹ más.

7. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en el que cada R¹ se elige entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -CN y alquilo C₁₋₆.

8. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 7, en el que cada R¹ se elige entre el grupo que consiste en hidrógeno, flúor y -CN.

9. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en el que:

dicho (B) se elige entre el grupo que consiste en -C≡C-, fenilo, piridinilo, pirazinilo, pirimidilo, 1,2,4-triazinilo, piridazinilo, tiazilo y sistemas de anillos bicíclicos de 9 miembros que contienen de 1 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

v es de 0 a 4;

cada R² se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OR^{4a}, -CN, -CO₂R^{4a}, -C(O)N(R^{4a})₂, -N(R^{4a})CO₂R^{4a}, -SR^{4a}, -S(O)R^{4a}, -S(O₂)R^{4a}, -N(R^{4a})SO₂R^{4a}, -N(R^{4a})CO₂R^{4a}, -N(R^{4a})C(O)N(R^{4a}), alquilo C₁₋₆ sustituido con 0 a 4 R⁴ y cicloalquilo C₃₋₈ sustituido con 0 a 4 R⁴;

cada R^4 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, -OH, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

cada R^{4a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} .


10. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 9, en el que

dicho $\textcircled{B}$ es fenilo;

v es de 0 a 2; y

cada R^2 se elige independientemente entre el grupo que consiste en flúor, cloro, -OH, -CH₃, -OCH₃ y -CN.

11. Un compuesto que tiene la Fórmula estructural (I):



y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que:

$\textcircled{A}$ se elige entre el grupo que consiste en sistemas de anillos arilo bicíclicos de 9 miembros que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que están sustituidos en los átomos de C o N con u sustituyentes R^1 ,

cada R^1 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OR^{3a}, -CN, -(CH₂)₀₋₆C(O)R³, -CO₂R^{3a}, -C(O)N(R^{3a})₂, -SR^{3a}, -S(O)R^{3a}, -S(O₂)R^{3a}, -(CH₂)₀₋₆N(R^{3a})₂, -N(R^{3a})SO₂R^{3a}, -N(R^{3a})CO₂R^{3a}, -N(R^{3a})C(O)R³, -N(R^{3a})COR^{3a}, -N(R^{3a})C(O)N(R^{3a}), alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} que contiene de 0 a 3 heteroátomos elegidos entre N, O y S, y fenilo, y el alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OR^{3a}, -CN, -CO₂R^{3a}, -C(O)N(R^{3a})₂, -N(R^{3a})₂, -N(R^{3a})CO₂R^{3a}, -SR^{3a}, -S(O)R^{3a}, -S(O₂)R^{3a}, -N(R^{3a})SO₂R^{3a}, -N(R^{3a})CO₂R^{3a}, -N(R^{3a})C(O)N(R^{3a}), alquilo C_{1-6} , -O-alquilo C_{1-6} , -S-alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ,

u es de 0 a 4,

cada R^3 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , -OH, -O-alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} , y

cada R^{3a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

$\textcircled{B}$ es un grupo elegido entre el grupo que consiste en

(a) -C≡C- y

(b) sistemas de anillos arilo B' elegidos entre el grupo que consiste en:

(i) sistemas de anillos monocíclicos de 5 a 7 miembros y

(ii) sistemas de anillos bicíclicos de 8 a 10 miembros,

y los sistemas de anillos arilo B' que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con ν sustituyentes R^2 ,


cada R^2 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{4a}$, $-CN$, $-CO_2R^{4a}$, $-C(O)R^{4a}$, $-C(O)N(R^{4a})_2$, $-N(R^{4a})_2$, $-N(R^{4a})COR^4$, $-N(R^{4a})CO_2R^{4a}$, $-N(R^{4a})C(O)N(R^{4a})$, $-N(R^{4a})SO_2R^{4a}$, $-SR^{4a}$, $-S(O)R^{4a}$, $-S(O_2)R^{4a}$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 4 R^4 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 4 R^4 ,

ν es de 0 a 4,

cada R^4 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, $-OH$, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

cada R^{4a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

en el que dicho (A) y dicho (B), tomados junto con un sustituyente R^1 y un sustituyente R^2 , se representan por un grupo elegido entre el grupo que consiste en:



que

W se elige entre el grupo que consiste en $-(CH_2)_{1-3}-$, $-(CH_2)_{0-2}NH(CH_2)_{0-2}-$, $-(CH_2)_{0-2}N(\text{alquil } C_{1-6})(CH_2)_{0-2}-$, $-(CH_2)_{0-2}O(CH_2)_{0-2}-$ y $-(CH_2)_{0-2}C(O)(CH_2)_{0-2}-$, en el que W está sustituido con 0 a 4 R^w , en el que cada R^w se selecciona independientemente entre alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

V se elige entre el grupo que consiste en $-C(O)-$ y $-CH_2-$, y en el que V es $-CH_2-$, V está sustituido con 0 a 2 R^v , en el que cada R^v se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} .

cada D es un grupo independientemente elegidos entre el grupo que consiste en:

(a) un enlace sencillo,

(b) $-C(O)N(R^5)-$,

(c) $-N(R^5)C(O)-$, y

13


(d) un sistema de anillos arilo de 5 o 6 miembros D' que contiene de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con 0 a 2 sustituyentes R^5 ,

cada R^5 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^6$, $-CN$, $-CO_2R^6$, $-C(O)N(R^6)_2$, $-N(R^6)_2$, $-N(R^6)COR^6$, $-SR^6$, $-S(O)R^6$, $-S(O_2)R^6$, $-N(R^6)SO_2R^6$, $-NCO_2R^6$, $-NC(O)N(R^6)_2$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 3 R^6 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 3 R^6 , y

cada R^6 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

cada E es un grupo independientemente elegidos entre el grupo que consiste en:

- (a) un enlace sencillo,
- (b) $-(C(R^7)_2)_{0-2}NR^7C(O)O_{0-1}$, y
- (c) un derivado de pirrolidinilo elegido entre el grupo que consiste en:



I es un grupo bivalente elegido entre $-C(O)-$, $-CO_2-$ y $-C(O)N(R^7)-$,

J es un sistema de anillos condensado elegido entre el grupo que consiste en carbociclos de 3 a 7 miembros y anillos arilo de 5 o 6 miembros que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con sustituyentes R^9 ,

cada R^{8a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OH$, $-O$ alquilo C_{1-6} y alquilo C_{1-6} , o dos R^{8a} pueden tomarse juntos para formar oxo,

cada R^{8b} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OH$, $-O$ alquilo C_{1-6} y alquilo C_{1-6} , o dos R^{8b} pueden tomarse juntos para formar oxo,

cada R^{8c} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-6} ,

o dos grupos cualquiera seleccionados entre R^{8a} , R^{8b} y R^{8c} pueden tomarse juntos para formar un anillo espiro-bicíclico o bicíclico puentado;

cada R^9 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-S$ -alquilo C_{1-6} , $-NH$ -alquilo C_{1-6} y $-NHC(O)$ -alquilo C_{1-6} ,

cada R^7 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y fenilo, y el alquilo C_{1-6} y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes

independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆ y -S-alquilo C₁₋₆; y

cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

- (a) hidrógeno,
- (b) -OR^{10a},
- (c) -CN,
- (d) -CO₂R^{10a},
- (e) -C(O)N(R¹⁰)₂,
- (f) -SR^{10a},
- (g) -S(O)R^{10a},
- (h) -S(O₂)R^{10a},
- (i) -N(R¹⁰)₂,
- (j) -N(R¹⁰)SO₂R^{10a}, (k) -NCO₂R^{10a}, (l) -NC(O)N(R¹⁰)₂,
- (m) alquilo C₁₋₆ que tiene de 0 a 4 sustituyentes R¹¹,

cada R¹¹ se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

- (i) -OH,
- (ii) -N(R¹⁰)₂,
- (iii) =NR¹⁰,
- (iv) -O-alquilo C₁₋₆,
- (v) -C(O)R¹⁰,
- (vi) -S-alquilo C₁₋₆,
- (vii) -SO₂-alquilo C₁₋₆,

(viii) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tienen de 0 a 3 sustituyentes R¹² en los átomos de N o C, y cada R¹² se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₆ que tiene de 0 a 3 sustituyentes elegidos entre R¹⁰, -O-alquilo C₁₋₆, -S-alquilo C₁₋₆, -OR^{10a}, -CN, -C(O)R¹⁰, -CO₂R^{10a}, -C(O)N(R¹⁰)₂, -SR^{10a}, -S(O)R^{10a}, -S(O₂)R^{10a}, -N(R¹⁰)SO₂R^{10a}, -NCO₂R^{10a}, -NC(O)N(R¹⁰)₂ y -N(R¹⁰)₂, o dos R¹² se toman juntos para formar oxo, y

(ix) arilo de 5 o 6 miembros que contiene de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tiene de 0 a 3 sustituyentes R¹³ en los átomos de N o C, y cada R¹³ se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆ y carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,

(n) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tienen de 0 a 3 sustituyentes R¹⁰ en los átomos de N o C; y

19

(o) sistemas de anillos arilo G' elegidos entre el grupo que consiste en:

(i) sistemas de anillos monocíclicos de 5 a 7 miembros y

(ii) sistemas de anillos bicíclicos de 8 a 10 miembros,

y los sistemas de anillos arilo G' que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con 0 a 3 sustituyentes R^{10} ;

cada R^{10} se elige independientemente entre el grupo que consiste en

(i) hidrógeno,

(ii) -CN,

(iii) alquilo C_{1-6} ,

(iv) -O-alquilo C_{0-6} ,

(v) -S-alquilo C_{0-6} ,

(vi) alquil C_{1-6} -O- R^{14} ,

(vii) -C(O) R^{14} ,

(viii) -CO₂ R^{14} ,

(ix) -SO₂ R^{14} ,

(x) -N(R^{14})₂,

(xi) -N(R^{14})SO₂ R^{14} ,

(xii) -NCO₂ R^{14} ,

(xiii) -NC(O)N(R^{14})₂, y

(xiv) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,

o dos R^{10} pueden tomarse juntos para formar oxo;

cada R^{10a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en

(i) hidrógeno,

(ii) -CN,

(iii) alquilo C_{1-6} ,

(iv) alquil C_{1-6} -O- R^{14} ,

(v) -C(O) R^{14} ,

(vi) -CO₂ R^{14} ,

(vii) -SO₂ R^{14} ,

(x) -N(R^{14})₂,

(xi) -N(R^{14})SO₂ R^{14} ,

(xii) -NCO₂ R^{14} ,


(xiii) -NC(O)N(R^{14})₂, y

(xiv) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,

y dos grupos R^{10} o R^{10a} pueden tomarse junto con el N al que están unidos para formar un anillo, que puede estar sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^{14} , y

cada R^{14} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , $-(CH_2)_{0-3}$ cicloalquilo C_{3-8} y fenilo.


12. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en el que dicho (A) y dicho (B), tomados junto con un sustituyente R^1 y un sustituyente R^2 , se representan por un grupo elegido entre el grupo que consiste en:



13. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 12, en el que W se elige entre el grupo que consiste en $-CH_2-$, $-NH-$, $-N(\text{alquil } C_{1-6})-$, $-C(O)-$, $-CH_2NH-$, $-CH_2N(\text{alquil } C_{1-6})-$, $-CH_2CH_2-$, $-C(O)CH_2-$, $-CH_2C(O)-$, $-CH_2O-$, $-CH_2CH_2CH_2-$, $-C(O)CH_2CH_2-$, $-CH_2C(O)CH_2-$, $-CH_2OCH_2-$, $-CH_2CH_2C(O)-$, $-CH_2CH_2O-$, $-CH_2CH_2NH-$, $-CH_2CH_2N(\text{alquil } C_{1-6})-$, $-CH_2NHCH_2-$, $-CH_2N(\text{alquil } C_{1-6})CH_2-$, $-NHCH_2CH_2-$ y $-N(\text{alquil } C_{1-6})CH_2CH_2-$.

14. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1-13, en el que cada D se elige independientemente entre el grupo que consiste en;

un enlace sencillo, $-C(O)N(R^5)-$, $-NR^5C(O)-$;




en el que


R^5 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno -OR⁶, -CN, -CO₂R⁶, -C(O)N(R⁶)₂, -N(R⁶)₂, -N(R⁶)COR⁶, -SR⁶, -S(O)R⁶, -S(O₂)R⁶, -N(R⁶)SO₂R⁶, -NCO₂R⁶, -NC(O)N(R⁶)₂, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^6 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^6 ; y

cada R^6 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} .


15. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 14, en el que cada D se elige



16. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 15, en el que cada E se elige independientemente entre el grupo que consiste en un enlace sencillo, -CH₂NHC(O)-, -CH₂N(CH₃)C(O)-, -C(CH₃)HNHC(O)-, -C(CH₃)HN(CH₃)C(O)-, -C(CH₃)₂NHC(O)-, -C(CH₃)₂N(CH₃)C(O)-, -CH₂NHC(O)O-, -CH₂N(CH₃)C(O)O-, -C(CH₃)HNHC(O)O-, -C(CH₃)HN(CH₃)C(O)O-, -C(CH₃)₂NHC(O)O-,



17. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 16, en el que cada E se elige independientemente entre el grupo que consiste en un enlace sencillo,



18. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1-17, en el que cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

(a) alquilo C₁₋₆ que tiene de 0 a 4 sustituyentes R¹¹;
(b) carbociclos de 3 a 8 miembros que contienen de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y que tienen de 0 a 3 sustituyentes R¹⁰ en los átomos de N o C; y

(c) sistemas de anillos arilo G' elegidos entre el grupo que consiste en:

- (i) sistemas de anillos monocíclicos de 5 a 7 miembros; y
- (ii) sistemas de anillos bicíclicos de 8 a 10 miembros;

y los sistemas de anillos arilo G' que contienen de 0 a 4 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S, y están sustituidos en los átomos de C o N con 0 a 3 sustituyentes R¹⁰.

19. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 17, en el que cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en:

- (a) hidrógeno;
- (b) -CN;
- (c) alquilo C₁₋₅ que tiene de 1 a 3 sustituyentes R¹¹;

cada R¹¹ se elige independientemente entre el grupo que consiste en -OH, -NH₂, -NCH₃H, -N(CH₃)₂, -N(CH₂CH₃)₂, =NH, =NCH₃, -C(O)H, -C(O)OH, -C(O)CH₃, -C(O)OCH₃, -NHC(O)H, -NHC(O)OH, -NHC(O)CH₃, -NHC(O)OCH₃, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo y oxaciclohexilo, fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo, en el que:

el ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo y oxaciclohexilo están sustituidos con 0 a 2 sustituyentes R¹² en los átomos de N o C, y cada R¹² se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, carboxi, alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆ y -S-alquilo C₁₋₆; y



el fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes R¹³ en los átomos de N o C, y cada R¹³ se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₆ y cicloalquilo de 3 a 8 miembros que contiene de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,

(d) ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo y oxaciclohexilo que tienen de 0 a 3 sustituyentes R¹⁰ en los átomos de N o C, el R¹⁰ se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, carboxi, alquilo C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆, -S-alquilo C₁₋₆, fenilo y bencilo; y

(e) sistemas de anillos arilo G' elegidos entre el grupo que consiste en: fenilo, piridinilo y sistemas de anillos bicíclicos de 9 miembros que contienen de 0 a 2 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N y O.

20. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 19, en el que cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C₁₋₄ que tiene de 1 a 2 sustituyentes R¹¹, en el que cada R¹¹ se elige independientemente entre el grupo que consiste en -OH, -NH₂, -NCH₃H, -N(CH₃)₂, -N(CH₂CH₃)₂, -C(O)OCH₃, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo, oxaciclohexilo, fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo.

21. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en el que

dicho  se elige entre el grupo que consiste en: , en la que cada X se elige independientemente entre el grupo que consiste en CR¹ y N;

14

$\begin{matrix} Y \\ \diagup \\ Y \end{matrix}$ se elige entre el grupo que consiste en $\begin{matrix} CR^1 \\ \diagup \\ NR^1 \end{matrix}$, $\begin{matrix} NR^1 \\ \diagup \\ CR^1 \end{matrix}$, $\begin{matrix} N \\ \diagup \\ NR^1 \end{matrix}$, $\begin{matrix} NR^1 \\ \diagup \\ N \end{matrix}$, $\begin{matrix} CR^1 \\ \diagup \\ O \end{matrix}$, $\begin{matrix} N \\ \diagup \\ O \end{matrix}$, $\begin{matrix} O \\ \diagup \\ N \end{matrix}$ y $\begin{matrix} N \\ \diagup \\ S \end{matrix}$;

cada R^1 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{3a}$, $-CN$, $-C(O)R^3$, $-CO_2R^{3a}$, $-C(O)N(R^{3a})_2$, $-SR^{3a}$, $-S(O)R^{3a}$, $-S(O_2)R^{3a}$, $-(CH_2)_{0-6}N(R^{3a})_2$, $-N(R^{3a})SO_2R^{3a}$, $-N(R^{3a})CO_2R^{3a}$, $-N(R^{3a})C(O)R^3$, $-N(R^{3a})COR^{3a}$, $-N(R^{3a})C(O)N(R^{3a})$, alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} que contiene de 0 a 3 heteroátomos elegidos entre N, O y S, y fenilo, y el alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes elegidos independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{3a}$, $-CN$, $-CO_2R^{3a}$, $-C(O)N(R^{3a})_2$, $-N(R^{3a})_2$, $-N(R^{3a})CO_2R^{3a}$, $-SR^{3a}$, $-S(O)R^{3a}$, $-S(O_2)R^{3a}$, $-N(R^{3a})SO_2R^{3a}$, $-N(R^{3a})CO_2R^3$, $-N(R^{3a})C(O)N(R^{3a})$, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} y $-S$ -alquilo C_{1-6} ;

cada R^3 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-OH$, $-O$ -alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

cada R^{3a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

dicho $\textcircled{B}$ se elige entre el grupo que consiste en $-C\equiv C-$, fenilo, piridinilo, pirazinilo, pirimidilo, 1,2,4-triazinilo, piridazinilo, tiazilo y sistemas de anillos bicíclicos de 9 miembros que contienen de 1 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S;

v es de 0 a 4;

cada R^2 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{4a}$, $-CN$, $-CO_2R^{4a}$, $-C(O)N(R^{4a})_2$, $-N(R^{4a})_2$, $-N(R^{4a})CO_2R^{4a}$, $-SR^{4a}$, $-S(O)R^{4a}$, $-S(O_2)R^{4a}$, $-N(R^{4a})SO_2R^{4a}$, $-N(R^{4a})CO_2R^{4a}$, $-N(R^{4a})C(O)N(R^{4a})$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 4 R^4 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 4 R^4 ;

cada R^4 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, $-OH$, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

cada R^{4a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;




en los que cada D se elige independientemente entre el grupo que consiste en un

enlace sencillo, $\begin{matrix} H \\ | \\ \text{---}N\text{---} \\ | \\ \text{---}N\text{---} \end{matrix}$, $\begin{matrix} CH_3 \\ | \\ \text{---}N\text{---} \\ | \\ \text{---}N\text{---} \end{matrix}$, $\begin{matrix} \text{---}O\text{---} \\ | \\ \text{---}N\text{---} \end{matrix}$, $\begin{matrix} \text{---}S\text{---} \\ | \\ \text{---}N\text{---} \end{matrix}$, $\begin{matrix} \text{---}O\text{---} \\ | \\ \text{---}N\text{---}N\text{---} \end{matrix}$ y $\begin{matrix} H \\ | \\ \text{---}N\text{---} \\ | \\ \text{---}N\text{---}N\text{---} \end{matrix}$; en los que:

R^5 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^6$, $-CN$, $-CO_2R^6$, $-C(O)N(R^6)_2$, $-N(R^6)_2$, $-N(R^6)COR^6$, $-SR^6$, $-S(O)R^6$, $-S(O_2)R^6$, $-N(R^6)SO_2R^6$, $-NCO_2R^6$, $-NC(O)N(R^6)_2$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^6 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^6 ; y

cada R^6 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

en el que cada E se elige independientemente entre el grupo que consiste en un enlace sencillo, $-CH_2NHC(O)-$, $-CH_2N(CH_3)C(O)-$, $-C(CH_3)HNHC(O)-$, $-C(CH_3)HN(CH_3)C(O)-$, $-C(CH_3)_2NHC(O)-$, $-C(CH_3)_2N(CH_3)C(O)-$, $-CH_2NHC(O)O-$, $-CH_2N(CH_3)C(O)O-$, $-C(CH_3)HNHC(O)O-$, $-C(CH_3)HN(CH_3)C(O)O-$, -

$C(CH_3)_2NHC(O)O-$, $-C(CH_3)_2N(CH_3)C(O)O-$, , , y , en los que uno de R^{8a} y R^{8b} es -OH o flúor;

en los que cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en

- hidrógeno;
- CN;
- alquilo C_{1-5} que tiene de 1 a 3 sustituyentes R^{11} ;

cada R^{11} se elige independientemente entre el grupo que consiste en -OH, -NH₂, -NCH₃H, -N(CH₃)₂, -N(CH₂CH₃)₂, =NH, =NCH₃, -C(O)H, -C(O)OH, -C(O)CH₃, -C(O)OCH₃, -NHC(O)H, -NHC(O)OH, -NHC(O)CH₃, -NHC(O)OCH₃, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo, y oxaciclohexilo, fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo; en el que

el ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo y oxaciclohexilo están sustituidos con 0 a 2 sustituyentes R^{12} en los átomos de N o C, y cada R^{12} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, carboxi, alquilo C_{1-6} , -O-alquilo C_{1-6} y -S-alquilo C_{1-6} ; y

el fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes R^{13} en los átomos de N o C, y cada R^{13} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo de 3 a 8 miembros que contiene de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,


(d) ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo y oxaciclohexilo que tienen de 0 a 3 sustituyentes R^{10} en los átomos de N o C, el R^{10} seleccionado independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, carboxi, alquilo C_{1-6} , -O-alquilo C_{1-6} , -S-alquilo C_{1-6} , fenilo y bencilo; y

(e) sistemas de anillos arilo G' elegidos entre el grupo que consiste en: fenilo, piridinilo y sistemas de anillos bicíclicos de 9 miembros que contienen de 0 a 2 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N y O.

17

22. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, en el que

dicho (A) se elige entre el grupo que consiste en:




en los dicho (A) está sustituido con 0 a 3 R¹ más;

dicho (B) es fenilo;


v es de 0 a 2;

cada R² se elige independientemente entre el grupo que consiste en flúor, cloro, -OH, -CH₃, -OCH₃ y -CN;

cada D se elige independientemente entre el grupo que consiste en





cada E se elige independientemente entre el grupo que consiste en un enlace




cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C₁-₄ que tiene de 1 a 2 sustituyentes R¹¹, en el que cada R¹¹ se elige independientemente entre el grupo que consiste en -OH, -NH₂, -NCH₃H, -N(CH₃)₂, -N(CH₂CH₃)₂, -C(O)OCH₃, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo, oxaciclohexilo, fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo.


23. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 22, en el que el compuesto que tiene la Fórmula estructural (I) es un compuesto que tiene una Fórmula estructural (Ia):





o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho  está sustituido con u sustituyentes R¹, e Y se selecciona entre el grupo que consiste en O y NR¹.

24. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 23, en el que el compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ia)** es un compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ib)**:





o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho  está sustituido con μ sustituyentes R^1 , e Y se selecciona entre el grupo que consiste en O y NR^1 .


25. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 24, en el que dicho  está

sustituido con μ sustituyentes R^1 , Y es O, y ambos casos de G son .


26. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, en el que el compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ia)** es un compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ib)**:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho  está


sustituido con μ sustituyentes R^1 , Y es O, y ambos casos de G son .

27. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1-23, en el que el compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ia)** es un compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ib)**:







o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho



está


sustituido con u sustituyentes R^1 , y dicho




y dicho

, tomados junto con un sustituyente R^1 y un sustituyente R^2 , se representan por un grupo elegido entre el grupo que

consiste en



28. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 27, en el que dicho




y

dicho




, tomados junto con un sustituyente R^1 y un sustituyente R^2 , se representan por




, en la que V es $-\text{CH}_2-$, W es $-(\text{CH}_2)_{0-2}\text{O}(\text{CH}_2)_{0-2}-$, R^1 es flúor, y


ambos casos de G son



29. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 a la Reivindicación 11, en el que el compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ia)** es un compuesto que tiene la Fórmula estructural **(Ib)**:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que dicho




y

dicho




, tomados junto con un sustituyente R^1 y un sustituyente R^2 , se representan por




, en la que V es $-\text{CH}_2-$, W es $-(\text{CH}_2)_{0-2}\text{O}(\text{CH}_2)_{0-2}-$, R^1 es flúor, y

ambos casos de G son



30. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o la Reivindicación 11, en el que dicho (A) y dicho (B), tomados junto con un sustituyente R^1 y un sustituyente R^2 , se representan por un grupo elegido entre el grupo que consiste en:



en las que

W se elige entre el grupo que consiste en $-(CH_2)_{1-3}-$, $-(CH_2)_{0-2}NH(CH_2)_{0-2}-$, $-(CH_2)_{0-2}N(\text{alquilo } C_{1-6})(CH_2)_{0-2}-$, $-(CH_2)_{0-2}O(CH_2)_{0-2}-$ y $-(CH_2)_{0-2}C(O)(CH_2)_{0-2}-$, en el que W está sustituido con 0 a 4 R^w , en el que cada R^w se selecciona independientemente entre alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

V se elige entre el grupo que consiste en $-C(O)-$ y $-CH_2-$, y en el que V es $-CH_2-$, V está sustituido con 0 a 2 R^v , en el que cada R^v se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

cada R^1 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^3$, $-CN$, $-C(O)R^3$, $-CO_2R^3$, $-C(O)N(R^{3A})_2$, $-SR^3$, $-S(O)R^3$, $-S(O_2)R^3$, $-N(R^{3A})_2$, $-(CH_2)_{0-6}N(R^{3A})_2$, $-N(R^{3A})SO_2R^3$, $-N(R^{3A})CO_2R^3$, $-N(R^{3A})COR^3$, $-N(R^{3A})C(O)N(R^{3A})$, alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} que contiene de 0 a 3 heteroátomos elegidos entre N, O y S, y fenilo, y el alquilo C_{1-6} , carbociclo C_{3-8} y fenilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes independientemente elegidos entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{3a}$, $-CN$, $-CO_2R^{3a}$, $-C(O)N(R^{3A})_2$, $-N(R^{3A})_2$, $-N(R^{3A})CO_2R^{3a}$, $-SR^{3a}$, $-S(O)R^{3a}$, $-S(O_2)R^{3a}$, $-N(R^{3A})SO_2R^{3a}$, $-N(R^{3A})CO_2R^{3a}$, $-N(R^{3A})C(O)N(R^{3A})$, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} y $-S$ -alquilo C_{1-6} ;

cada R^3 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , $-OH$, $-O$ -alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

cada R^{3a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;


cada R^2 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $-OR^{4a}$, $-CN$, $-CO_2R^{4a}$, $-C(O)N(R^{4A})_2$, $-N(R^{4A})_2$, $-N(R^{4A})CO_2R^{4a}$, $-SR^{4a}$, $-S(O)R^{4a}$, $-S(O_2)R^{4a}$, $-N(R^{4A})SO_2R^{4a}$, $-N(R^{4A})CO_2R^{4a}$, $-N(R^{4A})C(O)N(R^{4A})$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 4 R^4 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 4 R^4 ;

cada R^4 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, $-OH$, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ; y

19

cada R^{4a} se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

en el que cada D se elige independientemente entre el grupo que consiste en un enlace sencillo, $-C(O)N(R^5)-$, $-NR^5C(O)-$,




en las que

R^5 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno $-OR^6$, $-CN$, $-CO_2R^6$, $-C(O)N(R^6)_2$, $-N(R^6)_2$, $-N(R^6)COR^6$, $-SR^6$, $-S(O)R^6$, $-S(O_2)R^6$, $-N(R^6)SO_2R^6$, $-NCO_2R^6$, $-NC(O)N(R^6)_2$, alquilo C_{1-6} sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^6 y cicloalquilo C_{3-8} sustituido con 0 a 3 sustituyentes R^6 ; y

cada R^6 se elige independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-8} ;

en el que cada E se elige independientemente entre el grupo que consiste en un enlace sencillo, $-CH_2NHC(O)-$, $-CH_2N(CH_3)C(O)-$, $-C(CH_3)HNHC(O)-$, $-C(CH_3)HN(CH_3)C(O)-$, $-C(CH_3)_2NHC(O)-$, $-C(CH_3)_2N(CH_3)C(O)-$, $-CH_2NHC(O)O-$, $-CH_2N(CH_3)C(O)O-$, $-C(CH_3)HNHC(O)O-$, $-C(CH_3)HN(CH_3)C(O)O-$,



en el que cada G se elige independientemente entre el grupo que consiste en

- hidrógeno;
- $-CN$;
- alquilo C_{1-5} que tiene de 1 a 3 sustituyentes R^{11} ;

cada R^{11} se elige independientemente entre el grupo que consiste en $-OH$, $-NH_2$, $-NCH_3H$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_2CH_3)_2$, $=NH$, $=NCH_3$, $-C(O)H$, $-C(O)OH$, $-C(O)CH_3$, $-C(O)OCH_3$, $-NHC(O)H$, $-NHC(O)OH$, $-NHC(O)CH_3$, $-NHC(O)OCH_3$, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo, y oxaciclohexilo, fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo, en el que:

el ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo y oxaciclohexilo están sustituidos con 0 a 2 sustituyentes R^{12} en los átomos de N o C, y cada R^{12} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, carboxi, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} y $-S$ -alquilo C_{1-6} ; y

el fenilo, piridinilo, pirimidinilo y pirrolilo están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes R^{13} en los átomos de N o C, y cada R^{13} se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C_{1-6} y cicloalquilo de 3 a 8 miembros que contiene de 0 a 3 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N, O y S,

(d) ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piranilo, pirrolidinilo, piperidinilo, oxaciclopentilo y oxaciclohexilo que tienen de 0 a 3 sustituyentes R^{10} en los átomos de N o C, el R^{10} seleccionado independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, carboxi, alquilo C_{1-6} , -O-alquilo C_{1-6} , -S-alquilo C_{1-6} , fenilo y bencilo; y

(e) sistemas de anillos arilo G' elegidos entre el grupo que consiste en: fenilo, piridinilo y sistemas de anillos bicíclicos de 9 miembros que contienen de 0 a 2 heteroátomos independientemente elegidos entre el grupo que consiste en N y O.

31. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, Reivindicación 2 o Reivindicación 11, elegido entre el grupo que consiste en:

N-{4-[5-(acetilamino)-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{2-[4-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil} amino)fenil]-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-2-[(2-{4-[(2S)-1-[(benciloxi)carbonil]pirrolidin-2-il]carbonil} amino)fenil]-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-5-il)carbamoil]pirrolidin-1-carboxilato de bencilo;

(1S)-2-[(2S)-2-{4-(5-bromo-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)fenil]carbamoil}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletíl]carbamato de terc-butilo;

(2S)-N-{3-cloro-2-[4-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil} amino)fenil]-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-5-il}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-N-{3-cloro-2-[4-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil} amino)fenil]-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

N-[4-(3-oxo-7-{2-oxo-2-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]etil}-3,7-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-2-il)fenil]-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

(2S)-1-(ciclobutilcarbonil)-N-{2-[4-({[(2S)-1-(piridin-3-ilcarbonil)pirrolidin-2-il]carbonil} amino)fenil]-1H-bencimidazol-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilcarbonil)-N-{4-[5-({[(2S)-1-(fenilcarbonil)pirrolidin-2-il]carbonil} amino)-1H-bencimidazol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(4Z,5Z)-4-etilidenohept-5-enoil]-N-{2-[4-({[(2S)-1-(3-fenilpropanoil)pirrolidin-2-il]carbonil} amino)fenil]-1H-bencimidazol-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(4Z,5Z)-4-etilidenohept-5-enoil]-N-{2-[3-([(2S)-1-(3-fenilpropanoil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-1H-bencimidazol-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-hidroxi-2-fenilacetil]-N-(4-{5-([(2S)-1-(2R)-2-hidroxi-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino)-1H-bencimidazol-2-il}fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{4-[5-([(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-bencimidazol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-({4-[5-([(2S)-1-{(2S)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-bencimidazol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-([(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-bencimidazol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-2-{[4-(4-{[(4-metilfenil)sulfonil]amino})-1H-bencimidazol-2-il]fenil}carbamoil}pirrolidin-1-carboxilato de bencilo;

(2S)-1-(3-fenilpropanoil)-N-{4-[5-([(2S)-1-(3-fenilpropanoil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1,3-benzoxazol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(3-fenilpropanoil)-N-{4-[5-([(2S)-1-(3-fenilpropanoil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1-benzofuran-5-il}-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}-L-prolinamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{4-[5-([(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-({4-[5-([(2S)-1-{(2S)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-([(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

[(1R)-2-oxo-1-fenil-2-{(2S)-2-[(4-{5-([(2S)-1-(2R)-2-fenil-2-{[(propan-2-ilo]carbonil}amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1-benzofuran-2-il}fenil}carbamoil]pirrolidin-1-il}etil}carbamato de propan-2-ilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-([(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-(4-{5-([(2S)-1-(2R)-2-

(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil)amino]-1-benzofuran-2-il} fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil)amino]-1-benzofuran-2-il} fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

[(1R)-2-[(2S)-2-[(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil)amino]-1-benzofuran-2-il} fenil)carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil]carbamato de propan-2-ilo;

N-[2-(4-aminofenil)-1-benzofuran-5-il]-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolinamida;

(2S)-1-{(2R)-2-[metil(3-metilbutil)amino]-2-fenilacetil}-N-{4-[5-[(2S)-1-{(2R)-2-[metil(3-metilbutil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil} amino)-1-benzofuran-2-il} fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1-benzofuran-5-il}-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]-L-prolinamida;

(2S)-1-acetil-N-(2-{4-[(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil)amino} fenil}-1-benzofuran-5-il)pirrolidin-2-carboxamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-[(4-[5-[(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il] carbonil} amino)-1-benzofuran-2-il} fenil} carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-1-acetil-N-(2-{4-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil)amino} fenil}-1-benzofuran-5-il)pirrolidin-2-carboxamida;

N-{4-[5-(acetilamino)-1-benzofuran-2-il]fenil}-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}-L-prolinamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-[(4-[5-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil} amino)-7-metil-1-benzofuran-2-il} fenil} carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

(2S)-1-{(2R)-2-[etil(propil)amino]-2-fenilacetil}-N-{4-[5-[(2S)-1-{(2R)-2-[etil(propil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il} carbonil} amino)-1-benzofuran-2-il} fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{4-[6-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il} carbonil} amino}imidazo[1,2-a]pirimidin-2-il}fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{4-[6-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il} carbonil} amino}imidazo[1,2-a]piridin-2-il}fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S,2'S)-N,N'-1H,1'H-2,2'-biindolo-5,5'-diilbis[1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida];

(1H,1'H-2,2'-biindolo-5,5'-diilbis{carbamoil(2S)pirrolidin-2,1-diil[(1R)-2-oxo-1-feniletano-2,1-diil]})biscarbamato de di-terc-butilo;

12

{{(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-({2-[4-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]etil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{2-[5-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]pirimidin-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

{{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-({[(2S)-1-((2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-({[(2S)-1-((2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-(pirrolidin-1-il)acetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-(pirrolidin-1-il)acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-((2R)-2-[(ciclopropilacetil)amino]-2-fenilacetil)-N-{4-[5-({[(2S)-1-((2R)-2-[(ciclopropilacetil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-((2R)-2-[(3-metilbutanoil)amino]-2-fenilacetil)-N-{4-[5-({[(2S)-1-((2R)-2-[(3-metilbutanoil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-(morfolin-4-il)-2-fenilacetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(morfolin-4-il)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(2,3-difenilpropanoil)-N-{4-[5-({[(2S)-1-(2,3-difenilpropanoil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-[(4-metilfenil)sulfonil]amino]-2-fenilacetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-[(4-metilfenil)sulfonil]amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-((2R)-2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-fenilacetil)-N-{4-[5-({[(2S)-1-((2R)-2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

{{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

{{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-(acetilamino)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}-1-[(2R)-2-(morfolin-4-il)-2-fenilacetil]-L-prolinamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

(2S)-1-[(2R)-2-[(ciclopentilcarbamoil)amino]-2-fenilacetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

{(2R)-1-[(2S)-2-({4-[5-[(2S)-1-[(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil]pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de terc-butilo;

N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}-1-[(2R)-2-fenil-2-(pirrolidin-1-il)acetil]-L-prolinamida;

(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-4-metilpentanoil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-4-metilpentanoil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-(piperidin-1-il)acetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-(piperidin-1-il)acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-(1H-imidazol-1-il)-2-fenilacetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(1H-imidazol-1-il)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]-N-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-({4-[5-[(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-[(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-({2-[4-[(2S)-1-(propan-2-il)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il}etil}carbamato de terc-butilo;

N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolinamida;

N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}-1-[(2R)-2-fenil-2-(piperidin-1-il)acetil]-L-prolinamida;

[(1R)-2-[(2S)-2-[(2-{4-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]fenil}-1H-indol-5-il)carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

[(1R)-2-[(2S)-2-[(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

22

(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-{4-[5-({[(2S)-1-[(2R)-2-[(3,3-dimetilbutanoil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(ciclopropilacetil)-N-(4-{5-({[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-(2-{4-({[(2S)-1-[(2R)-tetrahidrofurano-2-ilcarbonil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]fenil}-1H-indol-5-il)pirrolidin-2-carboxamida;

[(1R)-2-((2S)-2-[(4-{5-({[(2S)-1-[(2R)-2-(terc-butoxicarbonil)amino]-2-(4-fluorofenil)acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)carbamoil]pirrolidin-1-il)-1-(4-fluorofenil)-2-oxoetil]carbamato de terc-butilo;

(2S)-1-[(2R)-2-[metil(3-metilbutil)amino]-2-fenilacetil]-N-{4-[5-({[(2S)-1-[(2R)-2-[metil(3-metilbutil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(2S)-tetrahidrofurano-2-ilcarbonil]-N-(4-{5-({[(2S)-1-[(2S)-tetrahidrofurano-2-ilcarbonil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

N-(terc-butoxicarbonil)-D-valil-N-{4-[5-({1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-L-prolinamida;

(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-{2-[4-({[(2S)-1-(1,3-oxazol-2-ilcarbonil]pirrolidin-2-il}carbonil}amino)fenil]-1H-indol-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

[(1R)-2-({[(2S)-1-({4-[5-({(2S)-2-[(2R)-2-(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}(metil)amino]propanoil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}amino)-1-oxopropan-2-il}(metil)amino)-2-oxo-1-feniletil]carbamato de terc-butilo;

{[(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-(metilamino)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil]pirrolidin-1-il)-2-oxo-1-feniletil]carbamato de terc-butilo;

(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-{2-[4-({[(2S)-1-(fenilacetil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-1H-indol-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(3R)-1-bencilpirrolidin-3-il]carbonil}-N-(4-{5-({[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-[(3S)-1-bencilpirrolidin-3-il]carbonil}-N-(4-{5-({[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

N,N-dimetil-D-leucil-N-{4-[5-({1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-L-prolinamida;

N-(2-{4-[(ciclopentilcarbonil)amino]fenil}-1H-indol-5-il)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolinamida;

[(2S)-1-({4-[5-({1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolil} amino)-1H-indol-2-il]fenil} amino)-1-oxopropan-2-il]carbamato de terc-butilo;

[(1S)-2-({4-[5-({1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolil} amino)-1H-indol-2-il]fenil} amino)-2-oxo-1-feniletal]carbamato de terc-butilo;

[(2R)-1-({4-[5-({1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolil} amino)-1H-indol-2-il]fenil} amino)-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de terc-butilo;

(2S,2'S)-N,N'-5,6,7,12-tetrahidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2-b]indolo-3,9-diilbis[1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida];

(2S,2'S)-N,N'-6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3,8-diilbis[1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida];

dibencilo(2S,2'S)-2,2'-(6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3,8-diildicarbamoil)dipirrolidin-1-carboxilato;

N-(8-bromo-6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3-il)-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

(6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3,8-diilbis{carbamoil(2S)pirrolidin-2,1-diil[(1S)-2-oxo-1-feniletano-2,1-diil]})biscarbamato de di-terc-butilo;

[(1S)-2-((2S)-2-[(8-bromo-6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3-il)carbamoil]pirrolidin-1-il)-2-oxo-1-feniletal]carbamato de terc-butilo;

(2S,2'S)-N,N'-6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3,8-diilbis{1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-carboxamida};

(2S,2'S)-N,N'-5,6,7,12-tetrahidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2-b]indolo-3,9-diilbis{1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-carboxamida};

N-(6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3-il)-1-((2S)-2-[(3,3-dimetilbutanoil)amino]-2-fenilacetil)-L-prolinamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-(6,11-dihidro-5H-benzo[a]carbazol-3-ilcarbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletal}carbamato de terc-butilo;

(5,6,7,12-tetrahidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2-b]indolo-3,9-diilbis{carbamoil(2S)pirrolidin-2,1-diil[(1R)-2-oxo-1-feniletano-2,1-diil]})biscarbamato de di-terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-(5-{4-[5-({(2S)-1-[(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil} amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1H-imidazol-2-il)pirrolidin-1-il)-2-oxo-1-feniletal}carbamato de terc-butilo;

(2S)-2-[5-(4-{5-[(1-[(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil]-L-prolil]amino)-1H-indol-2-il}fenil)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-carboxilato de bencilo;

1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-{2-[4-(2-{(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}-1H-imidazol-5-il)fenil]-1H-indol-5-il}-L-prolinamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-((2-4-(1H-imidazol-4-il)fenil)-1H-indol-5-il)carbamoil]pirrolidin-1-il)-2-oxo-1-feniletal}carbamato de terc-butilo;



1-[(2S)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-{2-[4-(2-{(2S)-1-[(2S)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}-1H-imidazol-5-il)fenil]-1H-indol-5-il}-L-prolinamida;

{(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-{2-(4-{2-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1H-indol-5-il}carbamoil}pirrolidin-1-il}etil}carbamato de terc-butilo;

terc-butil{(1R)-2-[(2S)-2-{2-(4-{2-[(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1H-indol-5-il}carbamoil}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato;

(2S)-2-(5-{4-[5-({1-[(2R)-2-fenil-2-{[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]-L-prolil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1H-imidazol-2-il)pirrolidin-1-carboxilato de bencilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-(2-{(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}-1H-imidazol-5-il)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

[(1R)-2-[(2S)-2-[1-metil-4-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-{[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-{2-(4-{2-[(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1H-indol-5-il}carbamoil}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

{(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-{2-(4-{2-[(2S)-1-pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1H-indol-5-il}carbamoil}pirrolidin-1-il}etil}carbamato de propan-2-ilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-{5-[4-(1H-indol-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

(2R)-2-(dimetilamino)-1-[(2S)-2-{5-[4-(1H-indol-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-feniletanona;

[(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-[5-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-{[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il}etil}carbamato de propan-2-ilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-(2-{(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}-1H-imidazol-5-il)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-{4-[4-(3-cloro-1H-indol-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

N-(metoxicarbonil)-L-valil-N-{2-[4-(2-{(2S)-1-[N-(metoxicarbonil)-L-valil]pirrolidin-2-il}-1H-imidazol-5-il)fenil]-1H-indol-5-il}-L-prolinamida;

[(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-[3-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-{[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)-1H-pirazol-5-il]pirrolidin-1-il}etil}carbamato de propan-2-ilo;

[(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-[5-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-{[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)-1,3-tiazol-2-il]pirrolidin-1-il}etil}carbamato de propan-2-ilo;

[(1R)-2-oxo-1-fenil-2-[(2S)-2-[2-(4-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)-1H-imidazol-5-il]pirrolidin-1-il]etil]carbamato de propan-2-ilo;

1-[(2R)-2-fenil-2-[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]-N-{4-[5-(2-{(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}-1H-imidazol-5-il)-1-benzofuran-2-il]fenil}-L-prolinamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-(5-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}-1,3,4-oxadiazol-2-il)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{3-[5-({(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{4-[6-({(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{3-[6-({(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

[(1R)-2-[(2S)-2-[(2-{2-[(2S)-1-[(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il]-1H-benzimidazol-5-il}-1H-indol-5-il)carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil]carbamato de terc-butilo;

(2S)-N-{4-[3-bromo-5-({(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-({2-[4-(acetilamino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-N-{4-[3-cloro-5-({(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-N-{4-[3-fluoro-5-({(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-({4-[5-({(2S)-1-[(2S)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-3-fluoro-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1S)-2-[(2S)-2-({2-[4-(acetilamino)fenil]-3-cloro-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-N-{4-[3-yodo-5-({(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-({2-[4-({(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il}carbonil}amino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-1-[(2S)-2-[(3,3-dimetilbutanoil)amino]-2-fenilacetil]-N-{4-[5-({(2S)-1-[(2S)-2-[(3,3-dimetilbutanoil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil}amino)-3-fluoro-1H-indol-2-il]fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

29

{{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-({[(2S)-1-[(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-fluoro-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;
{{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-(acetilamino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;
{{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-({[(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;
{{(1R)-2-[(2S)-2-({3-fluoro-2-[4-(2-oxopirrolidin-1-il)fenil]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;
N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}-1-[(2R)-2-fenil-2-(pirrolidin-1-il)acetil]-L-prolinamida;
N-(terc-butoxicarbonil)-D-alanil-N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}-L-prolinamida;
N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolinamida;
N-(terc-butoxicarbonil)-D-leucil-N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-3-fluoro-1H-indol-5-il}-L-prolinamida;
[(1R)-2-[(2S)-2-[(4-{5-[({(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil)amino]-3-fluoro-1H-indol-2-il}fenil)carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil]carbamato) de propan-2-ilo;
(2S)-2-[(3-fluoro-2-{4-[({(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]fenil}-1H-indol-5-il)carbamoil]pirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo;
[(1R)-2-[(2S)-2-[(4-{3-bromo-5-[({(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1-benzofuran-2-il}fenil)carbamoil]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil]carbamato de propan-2-ilo;
(2S)-N-(4-{3-bromo-5-[({(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1-benzofuran-2-il}fenil)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-carboxamida;
{{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[3-bromo-5-({[(2S)-1-[(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;
{{(2S)-1-[(2S)-2-({4-[3-fluoro-5-({[(2S)-1-[(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;
N-{2-[4-(acetilamino)fenil]-3-bromo-1-benzofuran-5-il}-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-L-prolinamida;

(2S)-N-(4-{3-bromo-5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il}fenil)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-acetil-N-(4-{3-bromo-5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il}fenil)pirrolidin-2-carboxamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-({4-[3-bromo-5-[(2S)-1-[(2S)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo);

(2S)-N-{4-[3-bromo-5-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il}fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[3-bromo-5-[(2S)-1-[(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1-benzofuran-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-N-{4-[3-ciano-5-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il}fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-N-{4-[3-(2,2-dimetilpropanoil)-5-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il}fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

5-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-2-[4-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-1H-indolo-3-carboxamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-[(2S)-1-[(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-(ciclopropilcarbamoil)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-[(2S)-1-[(2R)-2-[(terc-butoxi-carbonil)amino]-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-(4-metoxifenil)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{4-[3-fenil-5-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il}fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-N-{4-[3-etil-5-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il}fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-N-{4-[3-acetil-5-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il}fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{4-[5-[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-(fenilcarbonil)-1H-indol-2-il}fenil}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-1-(fenilacetil)-N-{2-[4-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-3-(piridin-4-il)-1H-indol-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-2-[(4-{5-[(2S)-1-[(benciloxi)carbonil]pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-fenil-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-carboxilato de bencilo;

5

(2S)-N-{4-[3-ciano-5-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-N-{4-[3-ciclopropil-5-({[(2S)-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)pirrolidin-2-carboxamida;

(2S)-2-[(4-{5-({[(2S)-1-[(benciloxi)carbonil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-3-(3-metoxifenil)-1H-indol-2-il}fenil)carbamoil]pirrolidin-1-carboxilato de bencilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-(3-metilfenil)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-(2-metilfenil)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-3-(piridin-4-il)-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-ciano-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

(2S)-N-(4-{3-ciano-5-({[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1H-indol-2-il}fenil)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-carboxamida;

{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[4-(acetilamino)fenil]-3-ciano-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-({4-[5-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-3-(dimetilcarbamoil)-1H-indol-2-il]fenil}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

5-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-2-[4-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-1H-indolo-3-carboxilato de metilo;

ácido 5-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)-2-[4-({[(2S)-1-{(2R)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]carbonil}amino)fenil]-1H-indolo-3-carboxílico;

{(1R)-2-[(2S)-2-({2-[3-(acetilamino)prop-1-in-1-il]-1H-indol-5-il}carbamoil)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

N-{4-[5-(furan-3-il)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

N-(4-{5-[6-(dimetilamino)-4-metilpiridin-3-il]-1H-indol-2-il}fenil)-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

N-{4-[5-(1-benzotiofen-3-il)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

N-{4-[5-(1-bencil-1H-pirazol-4-il)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

N-{4-[5-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-1H-indol-2-il]fenil}-1-(fenilacetil)-L-prolinamida;

1-(fenilacetil)-N-{4-[5-(quinolin-8-il)-1H-indol-2-il]fenil}-L-prolinamida;

1-(fenilacetil)-N-{4-[5-(tiofen-3-il)-1H-indol-2-il]fenil}-L-prolinamida;

{(1S)-2-[(2S)-2-{4-(5-ciano-1H-indol-2-il)fenil}carbamoil}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de terc-butilo;

[(1R)-2-oxo-1-fenil-2-{(2S)-2-[4-(2-{4-[(2S)-1-[(2R)-2-fenil-2-{[(propan-2-iloxi)carbonil]amino}acetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]fenil}-1H-indol-5-il)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il}etil]carbamato de propan-2-ilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-(5-{2-[4-(acetilamino)fenil]-1H-indol-5-il}-1,3,4-oxadiazol-2-il)pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de propan-2-ilo;

N-{4-[5-(5-{(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1H-indol-2-il]fenil}acetamida;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(12-fluoro-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]-N-(2-{5-[(2S)-1-[(2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}carbonil)amino]-1,3-benzoxazol-2-il)-1H-indol-5-il}pirrolidin-2-carboxamida;

1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]-N-{2-[4-(5-{(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]-1H-indol-5-il}-L-prolinamida;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxi-carbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

(2R)-2-(dietilamino)-1-[(2S)-2-(5-{4-[5-(2-{(2S)-1-[(2R)-2-(dietilamino)-2-fenilacetil]pirrolidin-2-il}-1H-imidazol-5-il)-1-benzofuran-2-il]fenil}-1H-imidazol-2-il)pirrolidin-1-il]-2-feniletanona;

{(1S)-1-ciclopropil-2-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-ciclopropil-2-[(metoxicarbonil)amino]acetil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxoetil}carbamato de metilo;

{(1R)-1-ciclopropil-2-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-ciclopropil-2-[(metoxicarbonil)amino]acetil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxoetil}carbamato de metilo;

20

{{(2R)-1-[(2S)-2-{5-[2-(4-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3,3-dimetilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{{(1R)-2-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

{{(2S,3R)-1-[(2S)-2-(5-{2-[4-(2-{(2S)-1-[N-(metoxicarbonil)-L-aloisoleucil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il)fenil]-1-benzofuran-5-il}-1H-imidazol-2-il)pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxopentan-2-il}carbamato de metilo;

{{(2S)-3-hidroxi-1-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-3-hidroxi-2-[(metoxicarbonil)amino]propanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-1-oxopropan-2-il}carbamato de metilo;

{{(2S,3R)-3-hidroxi-1-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S,3R)-3-hidroxi-2-[(metoxicarbonil)amino]butanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-4-metilpentanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-4-metil-1-oxopentan-2-il}carbamato de metilo;

{{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[3-fluoro-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{{(1R)-2-[(2S)-2-{5-[3-fluoro-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

{{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[3-fluoro-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[2-(2,6-difluoro-4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{{(1R)-2-[(2S)-2-{5-[3-metoxi-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[2-(2-cloro-4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-4-il}fenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-{4-[3-ciano-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[2-(4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-2-metilfenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

[(1S)-2-[(2S)-2-(5-{3-fluoro-4-[5-(2-{(2S)-1-[(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)acetil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il)-1-benzofuran-2-il]fenil}-1H-imidazol-2-il)]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etil}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{4-[3-fluoro-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2[(metoxi-carbonil)amino]-2-fenilacetil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1,3-benzoxazol-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[2-(4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1,3-benzoxazol-5-il]-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(1R)-1-ciclopropil-2-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-ciclopropil-2-[(metoxicarbonil)amino]acetil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1,3-benzoxazol-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-2-oxoetil}carbamato de metilo;

(indolo[1,2-c][1,3]benzoxazina-3,10-diilbis{1H-imidazol-5,2-diil(2S)pirrolidin-2,1-diil[(1R)-2-oxo-1-feniletano-2,1-diil]})biscarbamato de dimetilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(11-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6,7-dihidroindolo[1,2-d][1,4]benzoxazepin-3-il)-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(3-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6,6-dimetilindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-10-il)-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(12-fluoro-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}]pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6-metilindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il}]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

2

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(3-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c]quinazolin-10-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(12-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-7,8-dihidro-6H-indolo[1,2-c][1,5]benzoxazocin-3-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(3-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6-oxo-5,6-dihidroindolo[1,2-c]quinazolin-10-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6-fenilindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(3-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6-metilindolo[1,2-c]quinazolin-10-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(10'-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}espiro[ciclohexano-1,6'-indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin]-3'-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(1,12-difluoro-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(12-ciano-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo; y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

32. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, elegido entre el grupo que consiste en:

{(2S)-1-{(2S)-2-[5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxi-carbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(2R)-1-{(2S)-2-[5-[2-(4-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-4-metilpentanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-4-metil-1-oxopentan-2-il}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[3-fluoro-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[3-fluoro-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[2-(2,6-difluoro-4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}fenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[2-(2-cloro-4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-4-il}fenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

{(1R)-2-[(2S)-2-{4-[3-ciano-4-(5-{2-[(2S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonil)amino]-2-fenilacetil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-1-benzofuran-2-il)fenil]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-2-oxo-1-feniletil}carbamato de metilo;

{(2S)-1-[(2S)-2-{5-[2-(4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-2-metilfenil)-1-benzofuran-5-il]-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo; y

sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

33. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o la Reivindicación 11, elegido entre el grupo que consiste en:

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(12-fluoro-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(3-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6,6-dimetilindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-10-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(12-fluoro-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6-metilindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}-6-fenilindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il}pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo;



[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(10'-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}espiro[ciclohexano-1,6'-indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin]-3'-il)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(1,12-difluoro-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo;

[(2S)-1-{(2S)-2-[5-(12-ciano-10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoxicarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il}indolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-il)-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il}-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo; y


sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

34. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las Reivindicaciones 1-33, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

35. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 34, que comprende adicionalmente un segundo agente terapéutico seleccionado entre el grupo que consiste en agentes antivirales del VHC, inmunomoduladores y agentes anti-infecciosos.

36. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 34, que comprende adicionalmente un segundo agente terapéutico seleccionado entre el grupo que consiste en inhibidores de proteasa del VHC e inhibidores de polimerasa NS5B del VHC.

37. Un compuesto de Fórmula (II):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

cada ocurrencia de R^a es la misma y es alquilo C_{1-6} o fenilo;


R^b es H, halógeno o -CN;

R^c es H o halógeno;

- cada ocurrencia de R^d es seleccionada de manera independiente de H y alquilo C_{1-6} ;
o una ocurrencia de R^d es H y la otra ocurrencia de R^d es fenilo;
o ambos grupos R^d y el átomo de carbono común al cual están unidos se combina para formar un grupo carbonilo;
o ambos grupos R^d y el átomo de carbono común al cual están unidos se combinan para formar un grupo cicloalquilo C_{3-8} espirocíclico; y
p es 0, 1 o 2.

38. El compuesto de la Reivindicación 37, en donde cada ocurrencia de R^a es isopropilo, R^b y R^c son cada uno H o F, y p es 1.





39. El compuesto de la Reivindicación 38, que tiene la siguiente estructura:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

29

40. El compuesto de la Reivindicación 38, que tiene la siguiente estructura:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

41. Una composición farmacéutica la cual comprende

- (i) una cantidad efectiva del compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 37 a 40, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y
- (ii) un vehículo farmacéuticamente aceptable.

42. La composición farmacéutica según la Reivindicación 41, en donde además comprende un segundo agente terapéutico seleccionado a partir del grupo que consiste de agentes antivirales del VHC, inmunomoduladores y agentes anti-infecciosos.

43. La composición farmacéutica según la Reivindicación 42, en donde además comprende un segundo agente terapéutico seleccionado a partir del grupo que consiste de inhibidores de la proteasa del VHC e inhibidores de la polimerasa NS5B del VHC.



ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- se eliminan las Reivindicaciones originales 37 a 39.
- se adicionan las Reivindicaciones 37 y 38, que se encuentran soportadas en el los Ejemplos 216 a 227 del Capítulo Descriptivo, páginas 171 a 175;
- se adicionan las Reivindicaciones 39 y 40, que se encuentran soportados específicamente en el Capítulo Descriptivo, Ejemplos 218, 219 y 223;
- se adicionan las Reivindicaciones 41 a 43, que se encuentran soportadas en las nuevas Reivindicaciones 34 a 36.