



No. 12-040232- -00003-0000

Fecha: 2012-10-31 16:14:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 112

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**

☐ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☒

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	Route 206 and Providence Line Road, Princeton NJ 08543-4000	Princeton
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Correa Ordoñez, Alvaro

79.143.366

20.281

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
AV. 82 No. 10-62 Piso 6		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 12.040.232

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 18 reivindicaciones, que reemplaza el inicialmente presentado, el cual no amplía de manera alguna el alcance de la presente invención.

☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**

☐ **Modificación al resumen.**

☐ **Modificación a los dibujos.**

☐ **Modificación al solicitante.**

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

Alvaro Correa Ordoñez
C.C. 79.143.366

Firma

Tarjeta Profesional 20.281

0012/0143



RECIBO DE CAJA

No. 12 - 0091817

Bogotá D.C., Septiembre 06 de 2012 - 16:45:20

RECIBIDO DE : BAKER & MCKENZIE

Ni 900.034.906

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	91810	06/09/2012		21.901.800.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIÓ DE MODALIDAD Y MODIFICACION DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	120.000.00	120.000.00
				\$120.000.00

SON: **CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-040232- -00003-0000

Fecha: 2012-10-31 16:14:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 112


Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Septiembre 6 de 2012 - 16:45:30

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula I



o un enantiómero, diastereómero, tautómero o sales del mismo, en la que:

X es H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -NR₁₁SO₂R₁₂, -SO₂NR₁₁R₁₂, -CONR₁₁R₁₂, -NR₁₁CONR₁₁R₁₂, -NCOR₁₁, -NR₁₁SO₂NR₁₁R₁₂, -OCONR₁₁R₁₂, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;


Y es H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -SO₂NR₁₁R₁₂, -CONR₁₁R₁₂, -NR₁₁CONR₁₁R₁₂, -NCOR₁₁, -NR₁₁SO₂NR₁₁R₁₂, -OCONR₁₁R₁₂, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;

Z es H, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 6 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, -NO₂, -NR₁₁SO₂R₁₂, -SO₂NR₁₁R₁₂, -NR₁₁CONR₁₁R₁₂, -NCOR₁₁, -NR₁₁SO₂NR₁₁R₁₂, -OCONR₁₁R₁₂, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;


A es -(CH₂)_m-R₂, -CH(R₂₅)(R₂₆), -CH(R₂₆)-CO₂-R_{2a} o -(CH₂)_{n-1}-NR₂₅-CO₂-R₂₄;

m es 0 a 4;


n es 1 a 4;




R_2 es alquilo C_{1-10} , ciclopropilo opcionalmente sustituido con uno o más R_{13} ; cicloalquilo C_{4-10} opcionalmente sustituido con uno o más R_{13bb} ; cicloalqueniilo C_{3-10} opcionalmente sustituido con uno o más R_{13b} ; o $-NR_{14}R_{14}$; con la condición de que R_2 no sea $-NR_{14}R_{14}$ cuando m sea 0, 1 ó 3; o



R_2 se selecciona del grupo constituido por:





R_{2a} es alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , $-NR_{14}R_{14}$, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más R_{13} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{11} y R_{12} , en cada aparición, se seleccionan independientemente de H, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros y un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{13} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

R_{11} y R_{12} se toman junto con el nitrógeno al que están unidos formando un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el heterociclilo opcionalmente

sustituido con uno o más R_{13} y el heterociclilo está constituido por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; con la condición de que cuando R_{13} sea alquilo sustituido con un R_{14a} , R_{14a} no sea -OH;

R_{13a} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados

independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13aa} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} ,

arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-4}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-

NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13bb}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄,

pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados

independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-5} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_n-OCONR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₂₆, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13cc} , en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo

C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-NO_2$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $=O$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-C(=NOR_{14})NR_{14}R_{14}$, $-CONR_{14}OR_{14}$, o $-NCOR_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-1} , en cada aparición, es independientemente H, $-OH$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 6 a 12 miembros, un heterociclilo de 6 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-NO_2$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $=O$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, $-C(=NOR_{14})NR_{14}R_{14}$, $-CONR_{14}OR_{14}$ o $-NCOR_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-2} , en cada aparición, es independientemente H, $-OH$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-NO_2$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $=O$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-$

NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-4}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-5}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y

heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13dd} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros,

un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-NO_2$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $=O$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-C(=NOR_{14})NR_{14}R_{14}$, $-CONR_{14}OR_{14}$ o $-NCOR_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e} , en cada aparición, es independientemente H, $-OH$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-NO_2$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $=O$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-C(=NOR_{14})NR_{14}R_{14}$, $-CONR_{14}OR_{14}$ o $-NCOR_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13ee} , en cada aparición, es independientemente H, $-OH$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-NO_2$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $=O$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-C(=NOR_{14})NR_{14}R_{14}$, $-CONR_{14}OR_{14}$ o $-NCOR_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₂₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e-2}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y

heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13f} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13h} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13h-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{7-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros,

un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -

NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh-2}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13j}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -

$\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{C}(=\text{NOR}_{14})\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$ o $-\text{NCOR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13m} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{C}(=\text{NOR}_{14})\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$ o $-\text{NCOR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13m-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{C}(=\text{NOR}_{14})\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$ o $-\text{NCOR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el

heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13n-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13p} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13p-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13p-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13q} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros,

un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13q-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄OR₁₄ o -NCOR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13q-2}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -

$\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{C}(=\text{NOR}_{14})\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$ o $-\text{NCOR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

dos R_{14} se toman junto con los átomos a los que están unidos formando un anillo cíclico, pudiendo estar el anillo cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R_{24a} y conteniendo opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CO}_2\text{R}_{26}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{24}\text{R}_{24}$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OR}_{25}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{24}\text{R}_{24}$, $-\text{COR}_{24}$, $-\text{SO}_2\text{R}_{24}$, $-\text{NR}_{24}\text{R}_{24}$, $-\text{NR}_{24}\text{CO}_2\text{R}_{24}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{24}\text{R}_{24}$, o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y

heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

dos R_{24} se toman junto con los átomos a los que están unidos formando un anillo cíclico, pudiendo estar el anillo cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R_{24a} y conteniendo opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -CO₂R₂₅, -OCF₃, -OR₂₅, =O, -CONR₂₅R₂₅, -COR₂₅, -NR₂₅R₂₅, -NR₂₅CO₂R₂₅, o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24b} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CO₂R₂₅, -SO₂NR₂₅R₂₅, -COR₂₅ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{25} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R_{26} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos

por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

con la condición de que:

(i) R_1 no sea Cl cuando m sea 0, 1 ó 2; R_{13a-1} es H, $-CF_3$, o metoxi; R_{13c-1} sea H, OH, metoxi o dimetilamino; X, Y, Z, R_{13b-1} , R_{13d-1} , R_{13a-2} , R_{13b-2} , R_{13c-2} , R_{13d-2} , R_{13e-2} , R_{13g-2} , R_{13a-4} , R_{13b-4} , R_{13c-4} , R_{13d-4} , R_{13b-5} , R_{13c-5} , R_{13m-1} , R_{13n-1} , R_{13p-1} y R_{13q-1} sean H; y

(ii) m no sea 0 ó 1 cuando X, Y, R_{13a} , R_{13d} , R_{13e} , R_{13g} , R_{13a-2} , R_{13b-2} , R_{13c-2} , R_{13d-2} , R_{13a-4} , R_{13b-4} , R_{13c-4} , R_{13d-4} , R_{13b-5} , R_{13c-5} , R_{13h-1} y R_{13hh-1} sean H; R_{13b} es H o $-SO_2NH_2$; R_{13c} sea H, $-CONH_2$, $-SO_2N(C_2H_4OH)_2$, $-SO_2NHC(O)CH_3$, $-SO_2NH_2$, -tetrazolilo o (4-aminopiperidinil)sulfonilo; R_{13f} sea H o $-NHC_2H_4OCH_3$; y Z sea H, $-CO_2H$, o $-CO_2CH_3$.

2. El compuesto, enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, de la reivindicación 1, en el que:

X es H, $-OH$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-CN$, $-NO_2$, $-SO_2NR_{11}R_{12}$, $-CONR_{11}R_{12}$, $-NR_{11}CONR_{11}R_{12}$, $-NCOR_{11}$, $-CO_2R_{11}$ o $-NR_{11}R_{12}$;

Y es H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-CN$, $-NO_2$, $-SO_2NR_{11}R_{12}$, $-CONR_{11}R_{12}$, $-NR_{11}CONR_{11}R_{12}$, $-NCOR_{11}$, $-CO_2R_{11}$ o $-NR_{11}R_{12}$;


Z es H, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 6 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-NO_2$, $-SO_2NR_{11}R_{12}$, $-NCOR_{11}$, $-NR_{11}SO_2NR_{11}R_{12}$, $-OCONR_{11}R_{12}$ o $-NR_{11}R_{12}$;


A es $-(CH_2)_m-R_2$, $-\text{CH}(R_{25})(R_{26})$ o $-\text{CH}(R_{26})-\text{CO}_2-R_{2a}$;

m es 0 a 4;


n es 1 a 4;

R_1 es $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , alquenilo C_{2-12} , cicloalquilo C_{3-10} , $-\text{CN}$, $-(CH_2)_n-\text{SO}_2\text{NR}_{11}\text{R}_{12}$ o $-(CH_2)_n-\text{NR}_{11}\text{SO}_2\text{R}_{12}$, pudiendo estar el alquenilo y cicloalquilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{13} ; o







R_2 es alquilo C_{1-10} , ciclopropilo opcionalmente sustituido con uno o más R_{13} ; cicloalquilo C_{4-10} opcionalmente sustituido con uno o más R_{13bb} ; o $-NR_{14}R_{14}$; con la condición de que R_2 no sea $-NR_{14}R_{14}$ cuando m sea 0, 1 ó 3; o



R_2 se selecciona del grupo constituido por:





R_{2a} es alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , $-NR_{14}R_{14}$, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más R_{13} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{11} y R_{12} , en cada aparición, se seleccionan independientemente de H, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros y un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{13} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

R_{11} y R_{12} se toman junto con el nitrógeno al que están unidos formando un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o más R_{13} y el heterociclilo está constituido por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; con la condición de que cuando R_{13} sea alquilo sustituido con un R_{14a} , R_{14a} no sea -OH;

R_{13a} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13aa} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} ,

arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-2}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-

NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-4}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo,

alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13bb} , en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido

por N, S u O;

R_{13b-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-5} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} ,

arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₂₆, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13cc}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -

$\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 6 a 12 miembros, un heterociclilo de 6 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{NO}_2$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-(\text{CH}_2)_m-$ $\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo

constituido por N, S u O;

R_{13c-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-5} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} ,

arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13dd}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₂₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄,

-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-2}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-4}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno

o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13ee} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13f} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-

alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g} , en cada aparición, es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g-2} , en cada aparición, es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

$\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13h} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13h-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{7-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno

o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13j} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13m} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros,

un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13m-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13n-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -

$\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13p} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13p-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno

o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13p-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13q} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13q-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13q-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo,

heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

dos R_{14} se toman junto con los átomos a los que están unidos formando un anillo cíclico, pudiendo estar el anillo cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R_{24a} y conteniendo opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, -CN, -NO₂, -CO₂R₂₆, -OCONR₂₄R₂₄, -CO₂NR₂₄R₂₄, -OCF₃, -OR₂₅, -CONR₂₄R₂₄, -COR₂₄, -SO₂R₂₄, -NR₂₄R₂₄, -NR₂₄CO₂R₂₄, -SO₂NR₂₄R₂₄, o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

dos R_{24} se toman junto con los átomos a los que están unidos formando un anillo cíclico, pudiendo estar el anillo cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R_{24a} y conteniendo opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12

miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CO}_2\text{R}_{25}$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OR}_{25}$, $-\text{CONR}_{25}\text{R}_{25}$, $-\text{COR}_{25}$, $-\text{NR}_{25}\text{R}_{25}$, $-\text{NR}_{25}\text{CO}_2\text{R}_{25}$, o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24b} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-\text{CO}_2\text{R}_{25}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{25}\text{R}_{25}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{25} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R_{26} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O.

3. El compuesto, enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, de la reivindicación 1, en el que:

X es H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CO}_2\text{R}_{11}$ o $-\text{NR}_{11}\text{R}_{12}$;

Y es H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;


Z es H, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 6 a 12 miembros, heterociclilo de 4 a 12 miembros, -NO₂ o -NR₁₁R₁₂;


A es -(CH₂)_m-R₂ o -CH(R₂₅)(R₂₆);

m es 0 a 4;

n es 1 a 4;

R₁ es F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, -(CH₂)_n-SO₂NR₁₁R₁₂ o -(CH₂)_n-NR₁₁SO₂R₁₂, pudiendo estar el alquenilo y cicloalquilo opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₃; o





R_{11} y R_{12} , en cada aparición, se seleccionan independientemente de H, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros y un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{13} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

R_{11} y R_{12} se toman junto con el nitrógeno al que están unidos formando un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el heterociclilo opcionalmente sustituido con uno o más R_{13} y el heterociclilo está constituido por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , alquino C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo

constituido por N, S u O; con la condición de que cuando R_{13} sea alquilo sustituido con un R_{14a} , R_{14a} no sea -OH;

R_{13a} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13aa} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-1} , en cada aparición, es independientemente -OH, F, Cl, Br, I, alquilo

C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-2}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-4}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -

NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13bb}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -

$\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de

carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-5} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo

C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₂₆, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13cc}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₂₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alqueno C₂₋₁₂, alquino C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 6 a 12 miembros, un heterociclilo de 6 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -NO₂, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -

$\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de

carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-5} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13dd} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo

C_{1-10} , alcoxí C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxí, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-1}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxí C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-2}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxí C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -

$(\text{CH}_2)_n\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-CO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $\text{-CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO_2 , $\text{-(CH}_2)_m\text{-SO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, =O , $\text{-CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-(CH}_2)_m\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-(CH}_2)_m\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-(CH}_2)_n\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-CO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $\text{-CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO_2 , $\text{-(CH}_2)_m\text{-SO}_2\text{R}_{14}$, =O , $\text{-CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-(CH}_2)_m\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-(CH}_2)_m\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-(CH}_2)_n\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $\text{-SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-CO}_2\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{R}_{14}$, $\text{-NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $\text{-CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo,

alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13ee} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido

por N, S u O;

R_{13e-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13f} , en cada aparición, es independientemente -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros,

un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g-2} , en cada aparición, es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13h} , en cada aparición, es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

$\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13h-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{7-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-\text{NO}_2$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $=\text{O}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$ o $-\text{CONR}_{14}\text{OR}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno

o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13hh-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13j} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13m} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13p} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , alquinilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros,

un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13q}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₂₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₂₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, alquinilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, -NO₂, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, =O, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄, -NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄ o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R₁₄, en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

dos R_{14} se toman junto con los átomos a los que están unidos formando un anillo cíclico, pudiendo estar el anillo cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R_{24a} y conteniendo opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, -CN, -NO₂, -CO₂R₂₆, -CO₂NR₂₄R₂₄, -OCF₃, -OR₂₅, -CONR₂₄R₂₄, -COR₂₄, -SO₂R₂₄, -NR₂₄R₂₄, -NR₂₄CO₂R₂₄, -SO₂NR₂₄R₂₄, o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

dos R_{24} se toman junto con los átomos a los que están unidos formando un anillo cíclico, pudiendo estar el anillo cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R_{24a} y conteniendo opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -NO₂, -CO₂R₂₅, -OCF₃, -OR₂₅, -CONR₂₅R₂₅, -COR₂₅, -NR₂₅CO₂R₂₅, o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u

O;

R_{24b} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-CO_2R_{25}$, $-SO_2NR_{25}R_{25}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{25} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R_{26} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O.

4. El compuesto, enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, de la reivindicación 1, en el que:

X es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-CO_2R_{11}$ o $-NR_{11}R_{12}$;

Y es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-CO_2R_{11}$ o $-NR_{11}R_{12}$;


Z es H, Cl, Br, I, alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , heterociclilo de 4 a 12 miembros o $-NR_{11}R_{12}$;

A es $-(CH_2)_m-R_2$;


m es 0 a 3;

n es 1 a 3;


R_1 es Cl, alquenilo C_{2-12} , cicloalquilo C_{3-10} , pudiendo estar el alquenilo y cicloalquilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{13} ; o



R_2 es ciclopropilo opcionalmente sustituido con uno o más R_{13} ; o



R_2 se selecciona del grupo constituido por:



R_{11} y R_{12} , en cada aparición, se seleccionan independientemente de H, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros y un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{13} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; con la condición de que cuando R_{13} sea alquilo sustituido con un R_{14a} , R_{14a} no sea -OH;

R_{13a} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente

sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13aa} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, -CONR₁₄R₁₄, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, -SO₂NR₁₄COR₁₄, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, -CONR₁₄R₁₄, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, -SO₂NR₁₄COR₁₄, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, o -CONR₁₄OR₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Br, I, alquilo C_{1-}

$_{10}$, alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-4} , en cada aparición, es independientemente H, $-OH$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b} , en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, -

$\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13bb} , en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-1} , en cada aparición, es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-5} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$,

-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₂₆ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13cc}, en cada aparición, es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos

seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 6 a 12 miembros, un heterociclilo de 6 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-4} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$,

-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-5}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₂₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos

seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13dd} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$ o $-CO_2R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, -

CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-4}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e}, en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos

por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13ee} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e-1} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{2-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13e-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril

de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13f} , en cada aparición, es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g} , en cada aparición, es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y

heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13g-2} , en cada aparición, es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{2-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, -CN, $-CO_2R_{26}$, $-CO_2NR_{24}R_{24}$, $-OCF_3$, $-OR_{25}$, $-CONR_{24}R_{24}$, $-SO_2R_{24}$, $-NR_{24}R_{24}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;


R_{24} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -CO₂R₂₅, -OCF₃, -OR₂₅, -CONR₂₅R₂₅, -NR₂₅R₂₅ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{25} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R_{26} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O.


5. El compuesto, enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, de la reivindicación 1, siendo el compuesto un compuesto de fórmula (Ia):



(Ia)


y m, Y, Z, R₁, R_{13a-2}, R_{13b-2}, R_{13c-2} y R_{13d-2} son como se definen en la reivindicación 1.

6. Un compuesto de fórmula (Ib) o (Ic):



Ib

o



Ic

o un enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, en las que:

X es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;

Y es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;

Z es H, Cl, Br, I, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, heterociclilo de 4 a 12 miembros o -NR₁₁R₁₂;

R₁₁ y R₁₂, en cada aparición, se seleccionan independientemente de H, alquilo C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12

miembros y un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{13} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-2} es independientemente H, -OH, F, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b} es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$ o $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-2} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c} es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , hidroxialquilo C_{1-10} , cianoalquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-ONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$,

-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₂₆, -NR₁₄R₁₄, -C(=NOR₁₄)NR₁₄R₁₄ o -NR₁₄CONR₁₄R₁₄, pudiendo estar el cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, o 3 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-2} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₂₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄COR₁₄, -SO₂NR₁₄CONR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂R₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados

independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-2} es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, -CN, $-CO_2H$, $-CO_2R_{26}$, $-OCONR_{24}R_{24}$, $-CO_2NR_{24}R_{24}$, $-OCF_3$, $-OR_{25}$, $-CONR_{24}R_{24}$, $-SO_2R_{24}$, $-NR_{24}R_{24}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o

heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; o

dos R_{24} se toman junto con los átomos a los que están unidos formando un anillo cíclico, pudiendo estar el anillo cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R_{24a} y conteniendo opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, $-CO_2R_{25}$, $-OCF_3$, $-OR_{25}$, $-CONR_{25}R_{25}$, $-NR_{25}R_{25}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{25} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R_{26} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

con la condición de que X, Y, Z, R_{13a} , R_{13b} , R_{13d} , R_{13a-2} , R_{13b-2} , R_{13c-2} y R_{13d-2} no sean todos H cuando R_{13c} sea $-C(=O)N(C_2H_4OCH_3)_2$, $-SO_2N(C_2H_4OH)_2$.

7. El compuesto, enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, de la reivindicación 6, en la que:

X es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;

Y es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, -CO₂R₁₁ o -NR₁₁R₁₂;

Z es H, Cl, Br, I, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀ o -NR₁₁R₁₂;

R₁₁ y R₁₂, en cada aparición, se seleccionan independientemente de H, alquilo C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros y un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₃ y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₂₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -CN, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄CO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄COR₁₄, -CO₂R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-2} es independientemente H, -OH, F, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, alcoxi C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquenilo C₂₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C₁₋₁₀, -(CH₂)_m-SO₂R₁₄, -NR₁₄SO₂R₁₄, -CONR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -(CH₂)_m-NR₁₄SO₂R₁₄, -(CH₂)_n-NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -NR₁₄SO₂NR₁₄R₁₄, -

$\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b} es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, o $-\text{NR}_{14}\text{CONR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-2} es independientemente H, $-\text{OH}$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-\text{CN}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_m-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{R}_{14}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{SO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{COR}_{14}$, $-\text{NR}_{14}\text{CO}_2\text{R}_{14}$, $-\text{CO}_2\text{R}_{14}$ o $-\text{NR}_{14}\text{R}_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c} es independientemente H, $-\text{OH}$, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , hidroxialquilo C_{1-10} , cianoalquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} ,

$_{12}$, arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-SO_2NR_{14}COR_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{26}$, $-NR_{14}R_{14}$, $-C(=NOR_{14})NR_{14}R_{14}$ o $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-2} es independientemente H, $-OH$, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d} es independientemente H, $-OH$, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alqueno, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados

independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-2} es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, -CN, $-CO_2R_{26}$, $-CO_2NR_{24}R_{24}$, $-OCF_3$, $-OR_{25}$, $-CONR_{24}R_{24}$, $-SO_2R_{24}$, $-NR_{24}R_{24}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y

heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, $-CO_2R_{25}$, $-OCF_3$, $-OR_{25}$, $-CONR_{25}R_{25}$, $-NR_{25}R_{25}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{25} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R_{26} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O.

8. El compuesto, enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, de la reivindicación 6, en el que:

X es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C_{1-10} o haloalquilo C_{1-10} ;

Y es H, F, Cl, Br, I, alcoxi C_{1-10} o haloalquilo C_{1-10} ;

Z es H, Cl, Br, I, alcoxi C_{1-10} o haloalquilo C_{1-10} ;

R_{13a} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alqueno C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a

12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13a-2} es independientemente H, $-OH$, F, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b} es independientemente H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , $-CN$, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}CO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, o $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13b-2} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c} es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , hidroxialquilo C_{1-10} , cianoalquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}COR_{14}$, $-NR_{14}CO_2R_{14}$, $-NR_{14}R_{14}$, $-C(=NOR_{14})NR_{14}R_{14}$ o $-NR_{14}CONR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13c-2} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-(CH_2)_n-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-NR_{14}SO_2NR_{14}R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4

heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d} es independientemente H, -OH, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{2-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{13d-2} es independientemente H, -OH, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , alcoxi C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , alquenilo C_{2-12} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, un heteroaril de 4 a 12 miembros-alquilo C_{1-10} , -CN, $-(CH_2)_m-SO_2R_{14}$, $-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CONR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-SO_2NR_{14}R_{14}$, $-(CH_2)_m-NR_{14}SO_2R_{14}$, $-CO_2R_{14}$ o $-NR_{14}R_{14}$, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14} se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a} se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} ,

haloalquilo C₁₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, -CN, -CO₂R₂₆, -CO₂NR₂₄R₂₄, -OCF₃, -OR₂₅, -SO₂R₂₄, -NR₂₄R₂₄ o aril C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₁₀, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R₂₄ se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, -CO₂R₂₅, -OCF₃, -OR₂₅, -CONR₂₅R₂₅, -NR₂₅R₂₅ o aril C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₁₀, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R₂₅ se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R₂₆ se selecciona independientemente de alquilo C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O.

9. El compuesto, enantiómero, diastereómero, tautómero o sal del mismo, de la reivindicación 6, en el que:

X, Y, Z, R_{13a}, R_{13a-2}, R_{13b-2}, R_{13c-2}, R_{13d} y R_{13d-2} son H;

R_{13b}, en cada aparición, es independientemente H, alcoxi C₁₋₁₀, o -NR₁₄R₁₄;

R_{13c}, en cada aparición, es independientemente H, alquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, -(CH₂)_m-SO₂NR₁₄R₁₄, -CONR₁₄R₁₄ o -NR₁₄R₁₄, pudiendo estar el cicloalquilo y heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{14a} y el heteroarilo está constituido por átomos de carbono y 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R₁₄, en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o un heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos con 0-3 R_{14a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{14a}, en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C₁₋₁₀, haloalquilo C₁₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, F, Cl, Br, I, -CN, -CO₂R₂₆, -CO₂NR₂₄R₂₄, -OCF₃, -OR₂₅, -SO₂R₂₄, -NR₂₄R₂₄ o aril C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₁₀, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R₂₄, en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₁₀, arilo C₆₋₁₀, un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, pudiendo estar el alquilo, arilo, heteroarilo y

heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o más R_{24a} y el heteroarilo y heterociclilo están constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{24a} , en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros, un heterociclilo de 4 a 12 miembros, -CN, $-CO_2R_{25}$, $-OCF_3$, $-OR_{25}$, $-CONR_{25}R_{25}$, $-NR_{25}R_{25}$ o aril C_{6-10} -alquilo C_{1-10} , estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O;

R_{25} , en cada aparición, se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O; y

R_{26} , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-10} , haloalquilo C_{1-10} , cicloalquilo C_{3-10} , arilo C_{6-10} , un heteroarilo de 4 a 12 miembros o heterociclilo de 4 a 12 miembros, estando el heteroarilo y heterociclilo constituidos por átomos de carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por N, S u O.

10. Un compuesto, enantiómero, diastereómero, o sal del mismo, seleccionado de los compuestos expuestos en los ejemplos.

11. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de al menos un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.


12. La composición farmacéutica de la reivindicación 11, que comprende al menos otro agente terapéutico.

13. Un procedimiento para tratar o prevenir arritmia que comprende administrar a un paciente que lo necesite una cantidad eficaz de al menos un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

14. Un procedimiento para controlar la frecuencia cardíaca que comprende administrar a un paciente que lo necesite una cantidad eficaz de al menos un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

15. Un procedimiento para tratar un estado patológico asociado a I_{Kur} que comprende administrar a un paciente que lo necesite una cantidad eficaz de al menos un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

16. Un compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es



o una sal del mismo.

17. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto de la reivindicación 16 o una sal del mismo.

18. La composición farmacéutica de la reivindicación 17, que comprende, además, al meno un otro agente terapéutico.

112.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
-/-

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 12 - 113304
		Bogotá D.C., Octubre 30 de 2012 - 08:09:16

RECIBIDO DE : BAKER & MCKENZIE NI 900.034.906 RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	91806	06/09/2012		140.000.00
RECIBO DE CA	999999999	105153	05/10/2012		100.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
8 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	30.000.00	240.000.00
			\$240.000.00

SON: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 12-040232- -00003-0000
Fecha: 2012-10-31 16:14:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 112