



No. 12-151258- -00003-0000

Fecha: 2013-05-03 16:33:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 47

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000. (US)	Princeton
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Correa Ordoñez, Alvaro

79.143.366

20.281

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
AV. 82 No. 10 62 Piso 5		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 12.151.258

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.** De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, presento una modificación al pliego reivindicatorio en el cual se agregó la reivindicación 21. Para tal efecto pago la tasa por modificación y por reivindicaciones adicionales

☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**

☐ **Modificación al resumen.**

☐ **Modificación a los dibujos.**

☐ **Modificación al solicitante.**

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

Alvaro Correa Ordoñez

C.C. 79.143.366

Firma

Tarjeta Profesional 20.281

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 13 - 0041038	
				Bogotá D.C., Abril 30 de 2013 - 16:53:09	
RECIBIDO DE : BAKER				NI 900.532.339	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR.PAGO
RECIBO DE CA	999999999	26421	18/03/2013		30.000.00
RECIBO DE CA	999999999	26422	18/03/2013		30.000.00
RECIBO DE CA	999999999	26472	18/03/2013		175.000.00
RECIBO DE CA	999999999	26473	18/03/2013		175.000.00
RECIBO DE CA	999999999	33581	10/04/2013		10.000.00
RECIBO DE CA	999999999	33592	10/04/2013		50.000.00
RECIBO DE CA	999999999	33593	10/04/2013		50.000.00
RECIBO DE CA	999999999	33594	10/04/2013		50.000.00
RECIBO DE CA	999999999	33924	10/04/2013		270.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT. RENTISTICO	CONCEPTO		Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO	
11 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC		30.000.00	330.000.00	
				\$330.000.00	
=====					
SON: **TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: _____ *****			SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
			No. 12-151258- -00003-0000		
			Fecha: 2013-05-03 16:33:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR		
			Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI		
			Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 47		
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
, Abril 30 de 2013 - 16:53:10					

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0026464

Bogotá D.C., Marzo 18 de 2013 - 07:55:41

RECIBIDO DE : BAKER

NI 900.532.339

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	557939340	15/03/2013	99.557.200.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N.CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	124.000.00	124.000.00
				\$124.000.00

SON: **CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-151258- -00003-0000

Fecha: 2013-05-03 16:33:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 47


Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Marzo 18 de 2013 - 07:57:20

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula (I):



o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o un profármaco del mismo, caracterizados porque:

el anillo A es independientemente un carbociclo C_{3-10} o un carbociclo de 5 a 10 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, NH, N(alquilo C_{1-4}), O y S(O)_p;

el anillo B es independientemente un anillo de benceno o un heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, O y S(O)_p;

el anillo C es independientemente un anillo de benceno o un heterociclo de 5 a 10 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del N, NH, N(alquilo C_{1-4}), O y S(O)_p;

L_1 se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace, $-CHR^5-$, $-CHR^5CHR^5-$, $-CR^5=CR^5-$, $-C\equiv C-$, $-OCH_2-$, $-CHR_5NH-$, $-CH_2O-$, $-SCH_2-$, $-SO_2CH_2-$, $-CN_2NH-$ y

CR^5R^5- ;

L se selecciona independientemente del grupo constituido por: alquilenos C_{3-8} , alquenilenos C_{3-8} y alquinilenos C_{4-8} , en donde alquilenos, alquenilenos y alquinilenos están sustituidos con 0-2 R^7 y opcionalmente uno o varios de los átomos de carbono de los alquilenos y alquenilenos pueden estar reemplazados por O, S, NH, N(alquilo C_{1-4}), CO, CONH, NHCO, OCONH, NHCO₂, -NHCONH-, SO₂NH, NHSO₂, CON(alquilo C_{1-4}) o N(alquilo C_{1-4})CO;

Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: CH₂, CH(alquilo C_{1-4}), C(alquilo C_{1-4})₂, CO, O, S, NH, N(alquilo C_{1-4}), N(CO₂(alquilo C_{1-4})), -N(alquilo C_{1-4})CH₂-, -N(CO₂(alquilo C_{1-4}))CH₂-, -N(CH₂CO₂(alquilo C_{1-4}))CH₂-, -CONH-, -NHCO-, -CONHCH₂-, -CON(alquilo C_{1-4})CH₂-, -OCONH-, OCON(alquilo C_{1-4})-, -NHCONH-, -SO₂NH-, -NHCO₂- y -NHSO₂-;

alternativamente, L-Y es alquilenos C_{3-6} -CH=N-;

R^1 , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-4} , alquiltio C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , OH, OCH₂F, OCHF₂, OCF₃, CN, NH₂, NH(alquilo C_{1-4}), N(alquilo C_{1-4})₂, -CO₂(alquilo C_{1-4}), -CO(alquilo C_{1-4}), -CH₂NH₂, -CONH₂, -CONH(alquilo C_{1-4}), -OCH₂CO₂H, -NHCO(alquilo C_{1-4}), -NHCO₂(alquilo C_{1-4}), -NHSO₂(alquilo C_{1-4}), -SO₂NH₂, -C(=NH)NH₂ y fenilo sustituido con 0-2 R^a ;

R^2 es independientemente un heterociclo de 5 a 7

7

miembros que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O, y S(O)_p, en el heterociclo está sustituido con 0-2 R^{2a};

R^{2a}, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C₁₋₄, -CH₂OH, alcoxi C₁₋₄, OH, CF₃, OCF₃, CN, NH₂, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), COalquilo C₁₋₄, -CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, -SO₂(alquilo C₁₋₄), -SO₂NH₂, -SO₂NH(alquilo C₁₋₄) y -SO₂N(alquilo C₁₋₄)₂;

R³ se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, =O, halógeno, OH, NH₂, CN, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, -CH₂OH, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), -C(O)NH₂, -C(O)NH(alquilo C₁₋₄), -C(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -CH₂CO₂H y cicloalquilo C₃₋₆;

R⁴ se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y alquilo C₁₋₄;

R⁵, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, OH y alquilo C₁₋₄;

R⁶, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C₁₋₄, CN, OH, CF₃, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), -CH₂CO₂H, -(CH₂)₂CO₂H, -CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₂CO₂(alquilo C₁₋₄), NH₂, -CH₂NH₂, -NHCO(alquilo C₁₋₄), -NHCOCF₃, -NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₃O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂CH₂CH(alquilo C₁₋₄)O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂OH, -NHCO₂(CH₂)₂NH₂, -

$\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CH}_2\text{NHCO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{NHSO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CONH}_2$, $-\text{CONH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{CH}_2\text{CONH}_2$ y $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_{0-2}\text{R}^9$;

R^7 , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, OH, NH_2 , CH_2NH_2 , haloalquilo C_{1-4} , OCH_2F , OCHF_2 , OCF_3 , $-\text{NH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, alcoxi C_{1-4} , CH_2OH , $\text{CH}_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_{1-4}\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, CO_2H , $\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $\text{CO}_2(\text{haloalquilo } \text{C}_{1-4})$, $\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{SO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, $\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, CONH_2 , $\text{CONH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{OCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CH}_2\text{NH}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CONH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $\text{alquilo } \text{C}_{1-4}$, $-\text{CONHBn}$, $-\text{CONH}(\text{OBn})$, $-(\text{CO})_{0-1}(\text{CH}_2)_{0-3}$ -carbociclo C_{3-6} y $-(\text{CH}_2)_{0-1}-(\text{CO})_{0-1}-(\text{W})_{0-1}-(\text{CH}_2)_{0-2}$ - (heterociclo de 4 a 6 miembros que comprende átomos de carbonos y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, NH, $\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, O y $\text{S}(\text{O})_p$); donde los carbociclo y heterociclo están sustituidos con 0-2 R^8 ;

R^8 , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, OH, CHF_2 , CF_3 , alcoxi C_{1-4} , CH_2OH , CO_2H , $\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, CONH_2 y $\text{alquilo } \text{C}_{1-4}$;

R^9 es un heterociclo de 4 a 6 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NH, N(alquilo C_{1-4}), $N(CO_2(\text{alquilo } C_{1-4}))$, O y $S(O)_p$;

R^a , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, OH, CF_3 , alcoxi C_{1-4} y alquilo C_{1-4} ;

W se selecciona independientemente del grupo constituido por: O, NH y N(alquilo C_{1-4}); y

p, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: 0, 1 y 2.

2. Compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque:


el anillo A es independientemente un carbociclo de 6 miembros, un carbociclo de 9 a 10 miembros o un heterociclo de 5 a 10 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-3 heteroátomos seleccionados de N, NH, N(alquilo C_{1-4}), O y $S(O)_p$;

el anillo B se selecciona independientemente del grupo constituido por: imidazol, oxazol, oxadiazol, triazol, piridina, piridazina, pirimidina y benceno y



el anillo C se selecciona independientemente del grupo constituido por: benceno, piridina, indazol, indol, bencimidazol, quinolina, isoquinolina, tetrahydroquinolina, tetrahydroisoquinilina y quinazolina.


3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque:

el anillo A se selecciona independientemente del grupo
constituido por: benceno, ciclohexano, indano,
tetrahidronaftaleno, naftaleno, isoxazolina, isoxazol, pirazol,
imidazol, triazol, piperidina, piridina, indazol, indol,
bencimidazol, quinolina, isoquinolina, tetrahydroquinolina y
tetrahydroisoquinolina;




se selecciona independientemente del grupo
constituido por:






se selecciona independientemente del grupo


constituido por:



4. Un compuesto de Fórmula:




o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o un profármaco del mismo, caracterizados porque:



se selecciona independientemente del grupo constituido

por:



L_1 se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace, $-\text{CHR}^5\text{CHR}^5-$, $-\text{CR}^5=\text{CHR}^5-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{OCH}_2-$, $-\text{CHR}^5\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}-$, $-\text{SCH}_2-$, $-\text{SO}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CN}_2\text{NH}-$ y $-\text{CR}^5\text{R}^5-$;

L se selecciona independientemente del grupo constituido por: alquileo C_{3-8} y alquilenilo C_{3-8} ; en el alquileo y alquilenilo están sustituidos con 0-2 R^7 y opcionalmente uno o dos de los átomos de carbono del alquileo y alquilenilo pueden estar reemplazados por O, CO, S, NH, N(alquilo C_{1-4}), CONH-, NHCO, OCONH, SO_2NH o CON(alquilo C_{1-4});

Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: CH_2 , CO, $\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, O, S, NH, N(alquilo C_{1-4}), $\text{N}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))$, $-\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$, $-\text{N}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-\text{N}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-\text{CONH}-$, $-\text{NHCO}-$, $-\text{CONHCH}_2-$, $-\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$, $-\text{OCONH}-$, $-\text{OCON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})-$, $-\text{NHCONH}-$ y $-\text{SO}_2\text{NH}-$;

alternativamente, $L-Y$ es $-\text{alquilenilo } \text{C}_{3-6}-\text{CH}=\text{N}-$;

R^1 , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-4} , alquiltio C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , OH, OCH_2F , $OCHF_2$, OCF_3 , CN, NH_2 , $NH(alquilo\ C_{1-4})_2$, $N(alquilo\ C_{1-4})_2$, $CO_2(alquilo\ C_{1-4})$, $CO(alquilo\ C_{1-4})$, $-OCH_2CO_2H$, $-CH_2NH_2$, $-CONH_2$, $-CONH(alquilo\ C_{1-4})$, $-SO_2NH_2$ y $-C(=NH)NH_2$;

R^2 es independientemente un heterociclo de 5 a 6 miembros que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, O y $S(O)_p$, en los que el heterociclo está sustituido con 0-2 R^{2a} ;

R^{2a} , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C_{1-4} , $-CH_2OH$, alcoxi C_{1-4} , OH, CF_3 , CN, NH_2 , CO_2H , $CO_2(alquilo\ C_{1-4})$, $COalquilo\ C_{1-4}$, $-CONH_2$, $-CONH(alquilo\ C_{1-4})$ y $-CON(alquilo\ C_{1-4})_2$;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, OH, NH_2 , CN, CF_3 , alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-CH_2OH$, CO_2H , $CO_2(alquilo\ C_{1-4})$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NH(alquilo\ C_{1-4})$, $-C(O)N(alquilo\ C_{1-4})_2$, $-CH_2CO_2H$ y cicloalquilo C_{3-6} ;

R^4 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y alquilo C_{1-4} ;

R^5 , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, OH y alquilo C_{1-4} ;

R^6 , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C_{1-4} , CN, OH, CF_3 ,

CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), -CH₂CO₂H, -(CH₂)₂CO₂H, -CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄),
 -(CH₂)₂CO₂(alquilo C₁₋₄), NH₂, -CH₂NH₂, -NHCO(alquilo C₁₋₄), -
 NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -
 NHCO₂(CH₂)₃O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂CH₂CH(alquilo C₁₋₄)O(alquilo C₁₋₄),
 -NHCO₂(CH₂)₂OH, -NHCO₂(CH₂)₂NH₂, -NHCO₂CH₂CO₂H, -CH₂NHCO₂(alquilo C₁₋₄),
 -NHC(O)NH(alquilo C₁₋₄), -NHC(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHCO₂(alquilo C₁₋₄),
 -SO₂NH(CH₂)₂OH, -SO₂NH(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -
 CONH(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), CONH₂, CONH(alquilo C₁₋₄), CON(alquilo C₁₋₄)₂,
 -CH₂CONH₂, -NHCO₂(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHCOCF₃ y -
 NHCO₂(CH₂)₀₋₁R⁹;

R⁷, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, haloalquilo C₁₋₄, OH, alcoxi C₁₋₄, CH₂OH, CH₂O(alcoxi C₁₋₄), CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), CO₂(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), CO₂CH₂CF₃, CO₂(CH₂)₂SO₂(alquilo C₁₋₄), CH₂CO₂H, CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄), CONH₂, CONH(alquilo C₁₋₄), CON(alquilo C₁₋₄)₂, -OCO(alquilo C₁₋₄), -CH₂NH(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -CO₂(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, -CONH(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -CONH(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, -CON(alquilo C₁₋₄)(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -CONH(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, -CON(alquilo C₁₋₄)(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, -CONH(alcoxi C₁₋₄), -CONHBn, -CONH(OBn), -(CH₂)₁₋₃Ph, alquilo C₁₋₄ y -(CH₂)₀₋₁-(CO)₀₋₁-(W)₀₋₁-(CH₂)₀₋₂-(heterociclo de 4 a 6 miembros que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)_p); en los que el heterociclo está sustituido con 0-2 R⁸;



R^8 , en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, OH, CHF_2 , CF_3 , alcoxí C_{1-4} y alquilo C_{1-4} ;

R^9 es un heterociclo de 4 a 6 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, NH, N(alquilo C_{1-4}), N(CO_2 (alquilo C_{1-4})), O y $\text{S}(\text{O})_p$;

W se selecciona independientemente del grupo constituido por: O y NH; y



p, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: 0, 1 y 2.

5. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque tiene la fórmula (IIa) o fórmula (IIb):





o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable, o un solvato de los mismos.

6. Compuesto de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque tiene la Fórmula (IIc) o Fórmula (IIId):



o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable, o un solvato de los mismos.

7. Compuesto de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque tiene la Fórmula (IIe) o Fórmula (IIIf):



o un estereoisómero, un tautómero, una sal

farmacéuticamente aceptable, o un solvato de los mismos.

8. Compuesto de conformidad con cualquiera de las reivndicaciones 1-7, caracterizado porque:

L_1 se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{C}(\text{Me})=\text{CH}-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$ y $-\text{CN}_2\text{NH}-$ en la fórmula (I), (II), (IIa), (IIb), (IIe) o (IIf);

L se selecciona independientemente del grupo constituido por: alquilenos C_{3-7} y alquenilenos C_{3-7} , en donde los alquilenos y alquenilenos están sustituido con 0-2 R^7 y opcionalmente uno o dos de los átomos de carbono de los alquilenos y alquenilenos pueden estar reemplazados por O, CO, NH, N(alquilo C_{1-4}), CONH, NHCO o CON(alquilo C_{1-4});

Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: CH_2 , CO, CH(alquilo C_{1-4}), C(alquilo C_{1-4})₂, O, S, NH, N(alquilo C_{1-4}), N(CO₂(alquilo C_{1-4})), $-\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$, $-\text{N}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-\text{N}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-\text{CONH}-$, $-\text{NHCO}-$, CONHCH_2- , $-\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$, $-\text{OCONH}-$, $-\text{NHCONH}-$ y $-\text{SO}_2\text{NH}-$;

alternativamente, $L-Y$ es $-(\text{CH}_2)_{4-6}-\text{CH}=\text{N}-$;

R^1 , en cada aparición, se selecciona independientemente de entre: halógeno, CN, OH, OCH_2F , OCHF_2 , OCF_3 , haloalquilo C_{1-4} , alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CO(alquilo C_{1-4}), NH_2 , NH(alquilo C_{1-4}), N(alquilo C_{1-4})₂, $-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{CH}_2\text{NH}_2$ y $-\text{SO}_2\text{NH}_2$;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, OH, NH_2 , CN, CF_3 , alquilo C_{1-4} ,

alcoxi C₁₋₄, -CH₂OH, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), -C(O)NH₂, -C(O)NH(alquilo C₁₋₄), -C(O)N(alquilo C₁₋₄)₂ y -CH₂CO₂H y cicloalquilo C₃₋₆; y

R⁶, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C₁₋₄, CN, OH, CF₃, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), -CH₂CO₂H, -(CH₂)₂CO₂H, -CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₂CO₂(alquilo C₁₋₄), NH₂, -CH₂NH₂, -NHCO(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₃O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂CH₂CH(alquilo C₁₋₄)O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂OH, -NHCO₂(CH₂)₂NH₂, -NHCO₂CH₂CO₂H, -CH₂NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -NHC(O)NH(alquilo C₁₋₄), -NHC(O)N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHSO₂(alquilo C₁₋₄), -SO₂NH(CH₂)₂OH, -SO₂NH(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), CONH₂, CONH(alquilo C₁₋₄), CON(alquilo C₁₋₄)₂, -NHCO₂(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHCOCF₃ y -NHCO₂(CH₂)₀₋₁R⁹.

9. Compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado porque:


L₁ se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace, -CH₂CH₂- y -CH=CH- en la fórmula (I), (II), (IIa), (IIb), (IIe) o (IIIf);

R¹, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, CN, alquilo C₁₋₄, OH, alcoxi C₁₋₄, CH₂F, CHF₂, CF₃, OCH₂F, OCHF₂, OCF₃, CO(alquilo C₁₋₄), NH₂, NH(alquilo C₁₋₄)₂, N(alquilo C₁₋₄)₂, -CH₂NH₂ y -C(=NH)NH₂;

R³ se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, CN, CF₃, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄),

alquilo C₁₋₄, CONH₂, CON(alquilo C₁₋₄)₂ y cicloalquilo C₃₋₆; y

R⁶, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, alquilo C₁₋₄, CN, OH, CF₃, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), -CH₂CO₂H, -CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄), NH₂, -CH₂NH₂, -NHCO(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -CH₂NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -CONH₂, CONH(alquilo C₁₋₄), CON(alquilo C₁₋₄)₂, -NHCO₂(CH₂)₂OH, -NHCO₂(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂CH₂CO₂H, -NHCO₂CH₂CH(alquilo C₁₋₄)O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂, -NHCOCF₃,




10. Compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado porque:

L₁ se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace y -CH=CH- en la fórmula (I), (II), (IIa), (IIb), (IIe) o (IIf);

L se selecciona independientemente del grupo constituido por: -(CH₂)₃₋₆-, -(CH₂)₂₋₄CH(alquilo C₁₋₄)(CH₂)₀₋₂-, -(CH₂)₁₋₂-CH=CH-(CH₂)₀₋₃-, -CH₂-CH=C(alquilo C₁₋₄)-(CH₂)₁₋₂-, -CH₂-C(alquilo C₁₋₄)=CH-(CH₂)₁₋₂-, -CH₂-CH=CH-CH₂CH(alquilo C₁₋₄)-, -CH₂-CH=CH-CH(alquilo C₁₋₄)-(CH₂)₀₋₂-, -CH₂-CH=CH-CH₂C(halo)₂-, -CH₂-CH=CH-(CH₂)₁₋₂CH(CF₃)-, -CH₂-CH=CH-CH(OH)CH₂-, -(CH₂)₃CH(halo)-, -

$(\text{CH}_2)_{3-4}\text{C}(\text{halo})_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-$, $-(\text{CH}_2)_{3-4}\text{CH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H})-$,
 $-(\text{CH}_2)_{4-5}\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{SO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{CF}_3)(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$,
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}(\text{CONH}_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{OBn}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}((\text{CH}_2)_3\text{Ph})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}(\text{halo})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_{4-5}\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{halo})_2\text{CH}_2-$,
 $(\text{CH}_2)_{1-3}\text{CH}(\text{OH})(\text{CH}_2)_{1-2}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_{2-4}-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_{2-4}-$,
 $(\text{CH}_2)_{2-3}\text{NH}(\text{CH}_2)_{1-2}-$, $-(\text{CH}_2)_{2-4}\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_{0-2}-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_{2-4}-$, $-\text{CH}_2\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_{2-4}-$,
 $-\text{CH}_2\text{NHCOC}(\text{halo})_2\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(3\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-oxetan-3-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{thiazol-4-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(4\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-thiazol-2-il})-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-imidazol-2-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-3-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})-$, $-\text{CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-3-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})-$; $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4})$




Y se selecciona independientemente del grupo
 constituido por: CH₂, CO, O, NH, N(alquilo C₁₋₄), N(CO₂(alquilo C₁₋₄)),
 -N(alquilo C₁₋₄)CH₂-, -N(CO₂(alquilo C₁₋₄))CH₂-,
 -N(CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄))CH₂-, -CONH-, -NHCO-, -CONHCH₂-,
 -CON(alquilo C₁₋₄)CH₂-, -OCONH-, -NHCONH- y -SO₂NH-; y
 alternatively, L-Y es -(CH₂)₃₋₆-CH=N-;
 R¹, en cada aparición, se selecciona independientemente


del grupo constituido por: halógeno, alquilo C₁₋₄, OH, alcoxi C₁₋₄, CO(alquilo C₁₋₄), CN, CH₂F, CHF₂, OCHF₂, CF₃, NH₂, N(alquilo C₁₋₄)₂, -CH₂NH₂ y -C(=NH)NH₂;


R³ se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, alquilo C₁₋₄, CN, CO₂(alquilo C₁₋₄), CONH₂, CON(alquilo C₁₋₄)₂ y cicloalquilo C₃₋₆; y

R⁶, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, NH₂, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), CONH₂, CONH(alquilo C₁₋₄), CON(alquilo C₁₋₄)₂, NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -CH₂NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂CH₂CO₂H, -NHCO₂(CH₂)₂OH, -NHCO₂(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂CH₂CH(alquilo C₁₋₄)O(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂N(alquilo



11. Un compuesto de Fórmula (III) o Fórmula (IIIa):







o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato, o un profármaco de los mismos, caracterizados porque:

L_1 se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace y $-\text{CH}=\text{CH}-$ en la fórmula (IIIa);

L se selecciona independientemente del grupo constituido por: $-(\text{CH}_2)_3-$, $-(\text{CH}_2)_4-$, $-(\text{CH}_2)_5-$, $-(\text{CH}_2)_6-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{alquilo } C_{1-4})-(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{C}(\text{halo})_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{halo})-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{halo})_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{halo})_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alcoxi } C_{1-4})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2(\text{alcoxi } C_{1-4}))-$, $-$

$(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3)-$,
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{SO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{CF}_3)(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}_2)-$,
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$,
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}(\text{CONH}_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))-$,
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{OBn}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}((\text{CH}_2)_3\text{Ph})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}(\text{halo})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CF}_3)-$,
 $-(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{halo})_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})(\text{CH}_2)_2-$,
 $(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$,
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_3-$,
 $\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_4-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_4-$,
 $(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$,
 $\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_4-$, $-\text{CH}_2\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$,
 $-\text{CH}_2\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_3-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{tiazol-4-il})-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(4\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-tiazol-2-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-imidazol-2-il})-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-3-il})-$,
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-3-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-4-halo-pirazol-3-il})-$,





Y se selecciona independientemente del grupo
constituido por: CH₂, CO, O, NH, N(alquilo C₁₋₄), N(CO₂(alquilo C₁₋₄)),
-N(alquilo C₁₋₄)CH₂-, -N(CO₂(alquilo C₁₋₄))CH₂-,
-N(CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄))CH₂-, -CONH-, -NHCO-, -CONHCH₂-,
CON(alquilo C₁₋₄)CH₂-, -OCONH-, -NHCONH- y -SO₂NH-;

alternativamente, L-Y es -(CH₂)₄-CH=N-;

L₁ se selecciona independientemente del grupo
constituido por: un enlace y -CH=CH-;

R¹, en cada aparición, se selecciona independientemente
del grupo constituido por: halógeno, alquilo C₁₋₄, OH, alcoxi C₁₋₄,
CO(alquilo C₁₋₄), CN, CH₂F, CHF₂, CF₃, OCHF₂, NH₂, N(alquilo C₁₋₄)₂,
-CH₂NH₂ y -C(=NH)NH₂ en la fórmula (IIIa);

R^{1b} se selecciona independientemente del grupo


constituido por: H y halógeno en la fórmula (IIIa);

R^2 es independientemente un heteroarilo de 5 miembros seleccionado de entre: triazolilo y tetrazolilo en la fórmula (IIIa);

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, alquilo C_{1-4} , CN CO_2 (alquilo C_{1-4}), $CONH_2$, CON (alquilo C_{1-4}) $_2$ y cicloalquilo C_{3-6} ; y

R^6 se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, NH_2 , CO_2H , $CONH_2$, CO_2 (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2OH$,

$NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2CH_2CO_2H$, $NHCO_2CH_2CH$ (alquilo C_{1-4}) O (alquilo C_{1-4}) $-NHCO_2(CH_2)_2N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-NHCOCF_3$,





12. Compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque:

L se selecciona independientemente del grupo constituido por: $-(CH_2)_4-$, $-(CH_2)_5-$, $-(CH_2)_6-$, $-(CH_2)_3CH$ (alquilo $C_{1-4})-$, $-(CH_2)_4CH$ (alquilo $C_{1-4})-$, $-(CH_2)_2CH$ (alquilo $C_{1-4})CH_2-$, $-(CH_2)_3CH$ (alquilo $C_{1-4})CH_2-$, $-(CH_2)_2CH$ (alquilo $C_{1-4})(CH_2)_2-$, $-(CH_2)_3CH$ (alquilo $C_{1-4})(CH_2)_2-$, $-(CH_2)_4CH$ (alquilo $C_{1-4})CH_2-$,

$(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$, $-$
 $\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})-$
 $(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$,
 $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{halo})_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-\text{CH}_2-$
 $\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{halo})-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{halo})_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{halo})_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4})-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H})-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{SO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{CF}_3)(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}_2)-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}(\text{CONH}_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{OBn}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}(\text{halo})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CF}_3)-$,
 $-(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{halo})_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})(\text{CH}_2)_2-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_3-$, $-$
 $\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_4-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_4-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$, $-$
 $\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_2-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_4-$, $-\text{CH}_2\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2-$,
 $-\text{CH}_2\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_3-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{tiazol-4-il})-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(4\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-tiazol-2-il})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}-$

por: halógeno, NH_2 , CO_2H , CONH_2 , $-\text{NHCO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$,




13. Compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque tiene la Fórmula (III), en donde:

L-Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: $-(\text{CH}_2)_6-$, $-(\text{CH}_2)_7-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}_2)\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CF}_2\text{CO}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_4-$, $\text{CH}_2\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}_2\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_4-$, $(\text{CH}_2)_4\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{N}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $(\text{CH}_2)_4\text{N}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{O}-$, $-(\text{CH}_2)_6\text{O}-$, $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{O}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{O}-$, $\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_4\text{O}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{O}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3\text{O}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_6\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{NH}-$, $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$, $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}((\text{CH}_2)_3\text{Ph})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$,

$-(CH_2)_4CH(CO_2CH_2CF_3)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2(CH_2)_2SO_2(alquilo\ C_{1-4}))NH-$, $-$
 $(CH_2)_5CH(CO_2(alquilo\ C_{1-4}))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CONH_2)NH-$, $-$
 $(CH_2)_4CH(CONH(alquilo\ C_{1-4}))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CON(alquilo\ C_{1-4})_2)NH-$,
 $-(CH_2)_4C(alquilo\ C_{1-4})(CO_2(alquilo\ C_{1-4}))NH-$, $-$
 $(CH_2)_4C(CF_3)(CO_2(alquilo\ C_{1-4}))NH-$, $-(CH_2)_3CH(alquilo\ C_{1-4})CH(CONH_2)NH-$,
 $-(CH_2)_4CH(CONH(alcoxi\ C_{1-4}))NH-$, $-$
 $(CH_2)_4CH(CONH(OBn))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CON(alquilo\ C_{1-4})(CH_2)_2O(alquilo\ C_{1-4}))NH-$,
 $-(CH_2)_4CH(CON(alquilo\ C_{1-4})(CH_2)_2N(alquilo\ C_{1-4})_2)NH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_2NH-$, $-CH_2-CH=CH-$
 $(CH_2)_3NH-$, $-(CH_2)_4CH(CHF_2)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CF_3)NH-$, $-(CH_2)_5CH(CF_3)NH-$,
 $-(CH_2)_3CF_2CH_2NH-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2CH(CF_3)NH-$, $-CH_2-CH=CH-$
 $(CH_2)_2CH(CF_3)NH-$, $-CH_2CONH(CH_2)_2NH-$, $-CH_2CONH(CH_2)_3NH-$, $-$
 $CH_2NHCOCF_2CH_2NH-$, $-CH_2CONH(CH_2)_4NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO-pirrolidin-1-il)NH-$,
 $-(CH_2)_4CH(tiazol-4-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(4-alquilo\ C_{1-4}-tiazol-2-il)NH-$,
 $-(CH_2)_4CH(1-alquilo\ C_{1-4}-imidazol-2-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1-alquilo\ C_{1-4}-pirazol-3-il)NH-$,
 $-(CH_2)_4CH(1-alquilo\ C_{1-4}-pirazol-5-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1-alquilo\ C_{1-4}-3-alquilo\ C_{1-4}-pirazol-5-il)NH-$,
 $-(CH_2)_4CH(1-alquilo\ C_{1-4}-4-halo-pirazol-3-il)NH-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2CH(1-alquilo\ C_{1-4}-pirazol-5-il)NH-$,
 $-(CH_2)_6N(alquilo\ C_{1-4})-$, $-(CH_2)_5N(CO_2(alquilo\ C_{1-4}))-$, $-(CH_2)_4CONH-$, $-(CH_2)_5CONH-$, $-$
 $(CH_2)_6CONH-$, $-(CH_2)_3CH(alquilo\ C_{1-4})CONH-$, $-(CH_2)_4CH(alquilo\ C_{1-4})CONH-$,
 $-(CH_2)_2CH(alquilo\ C_{1-4})CH_2CONH-$, $-(CH_2)_3CH(alquilo\ C_{1-4})CH_2CONH-$,
 $-(CH_2)_2CH(alquilo\ C_{1-4})(CH_2)_2CONH-$, $-(CH_2)_2-CH=CH-CONH-$,
 $-CH_2-CH=CH-CH_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3CONH-$,
 $-CH_2-CH=CH-CH_2CH(alquilo\ C_{1-4})CONH-$, $-CH_2-$


$\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CHFCONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CF}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CF}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{CF}_3)\text{CONH}-$,
 $\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_4\text{CONH}-$,
 $\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{NHCO}-$, $-\text{CH}_2-$
 $\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{NHCO}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{OCONH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{OCONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$
 $\text{CH}_2\text{OCONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{NHCONH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{SO}_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$
 $\text{CH}_2\text{SO}_2\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}=\text{N}-$,



R^{1b} se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y halógeno;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, alquilo C_{1-4} , CN, CO_2 (alquilo C_{1-4}), $CONH_2$, CON (alquilo C_{1-4}) $_2$ y cicloalquilo C_{3-6} ;

R^6 se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, NH_2 , CO_2H , $CONH_2$, $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2OH$, $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $NHCO_2CH_2CH$ (alquilo C_{1-4}) O (alquilo C_{1-4}),




14. Compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque tiene la Fórmula (III), en donde:

L-Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: $-(CH_2)_6-$, $-(CH_2)_7-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2H)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2$ (alquilo C_{1-4})) CH_2- , $-(CH_2)_4CH(CONH_2)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CONH$ (alquilo C_{1-4})) CH_2- , $-(CH_2)_4CH(CON$ (alquilo C_{1-4}) $_2)CH_2-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_4-$, $-CH_2CON$ (alquilo C_{1-4}) $(CH_2)_3-$, $-(CH_2)_5O-$, $-(CH_2)_6O-$, $-(CH_2)_3CH$ (alquilo C_{1-4}) $(CH_2)_2O-$, $-(CH_2)_4CH$ (alquilo C_{1-4}) CH_2O- , $-CH_2NH(CH_2)_4O-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3O-$, $-(CH_2)_5NH-$, $-(CH_2)_6NH-$, $-(CH_2)_3CH$ (alquilo C_{1-4}) CH_2NH- ,

$(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3)\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{SO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}_2)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{CF}_3)(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}(\text{CONH}_2)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{OBn}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2)\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CHF}_2)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{NH}-$,
 $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_3\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(3\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-oxetan-3-il})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO-pirrolidin-1-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{tiazol-4-il})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(4\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-tiazol-2-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-imidazol-2-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-3-il})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-3-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-4-halo-pirazol-3-il})\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{N}(\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{N}(\text{CH}_2\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_6\text{CONH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-$


$_4)CH_2CONH-$, $-(CH_2)_2CH(alquilo\ C_{1-4})(CH_2)_2CONH-$, $-(CH_2)_2-CH=CH-CONH-$,
 $-, -CH_2-CH=CH-CH_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-$
 $(CH_2)_3CONH-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2CH(alquilo\ C_{1-4})CONH-$, $-CH_2-CH=CH-$
 $CH(alquilo\ C_{1-4})CH_2CONH-$, $-CH_2-CH=C(alquilo\ C_{1-4})-(CH_2)_2CONH-$, $-$
 $(CH_2)_3CH(alquilo\ C_{1-4})CONH-$, $-(CH_2)_3CHFCONH-$, $-(CH_2)_3CF_2CONH-$, $-$
 $(CH_2)_4CF_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2CF_2CONH-$, $-(CH_2)_3CH(CF_3)CONH-$, $-$
 $CH_2CH(OH)(CH_2)_2CONH-$, $-(CH_2)_2CH(OH)CH_2CONH-$, $-(CH_2)_3CH(OH)CH_2CONH-$,
 $-CH_2CH(OH)CH(OH)CH_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-CH(OH)CH_2CONH-$, $-$
 $(CH_2)_3CH(alcoxi\ C_{1-4})CONH-$, $-(CH_2)_3CH(OCO(alquilo\ C_{1-4}))CH_2CONH-$, $-$
 $(CH_2)_3C(O)CH_2CONH-$, $-CH_2O(CH_2)_3CONH-$, $-CH_2O(CH_2)_4CONH-$, $-$
 $CH_2NH(CH_2)_2CONH-$, $-CH_2NH(CH_2)_3CONH-$, $-(CH_2)_2N(alquilo\ C_{1-4})CH_2CONH-$,
 $-(CH_2)_2N(alquilo\ C_{1-4})(CH_2)_2CONH-$, $-(CH_2)_5NHCO-$, $-CH_2-$
 $CH=CH-(CH_2)_2NHCO-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2OCONH-$, $-(CH_2)_4OCONH-$, $-CH_2-$
 $CH=CH-CH_2NHCONH-$, $-(CH_2)_4SO_2NH-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2SO_2NH-$,




R^{1b} se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y halógeno;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, alquilo C_{1-4} , CN, CO_2 (alquilo C_{1-4}), $CONH_2$, CON (alquilo C_{1-4}) $_2$ y ciclopropilo; y

R^6 se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, NH_2 , CO_2H , $CONH_2$, $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2OH$, $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}),

$-NHCO_2CH_2CH$ (alquilo C_{1-4}) O (alquilo C_{1-4}), y .




15. Compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque tiene la Fórmula (III), en donde:

L-Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: $-(CH_2)_6-$, $-(CH_2)_7-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2H)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2Me)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CONH_2)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CONHMe)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CON(Me)_2)CH_2-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_4-$, $-CH_2CON(CH_3)(CH_2)_3-$, $-(CH_2)_4N(CO_2Me)CH_2-$, $-(CH_2)_4N(CH_2CO_2Et)CH_2-$, $-(CH_2)_5O-$, $-(CH_2)_6O-$, $-(CH_2)_3CH(Me)(CH_2)_2O-$, $-(CH_2)_4CH(Me)CH_2O-$, $-CH_2NH(CH_2)_4O-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3O-$, $-(CH_2)_5NH-$, $-(CH_2)_6NH-$, $-(CH_2)_3CH(Me)CH_2NH-$, $-(CH_2)_4CH(Me)NH-$, $-(CH_2)_4CH(Me)CH_2NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2OH)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2OMe)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2H)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2Me)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2Et)NH-$, $-CH_2CONH(CH_2)_4NH-$,

$(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{i-Pr}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{t-Bu}))\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{SO}_2\text{Me})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CO}_2\text{Me})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{Me})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}_2)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{Me}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{t-Bu}))\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{Me})_2)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{OMe}))\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CONH}(\text{OBn}))\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{Me})(\text{CH}_2)_2\text{OMe})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{Me})(\text{CO}_2\text{Me})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{C}(\text{CF}_3)(\text{CO}_2\text{Me})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{Me})\text{CH}(\text{CONH}_2)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{Me})(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{Me})_2)\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-$
 $\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CHF}_2)\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$
 $(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_3\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(3\text{-Me-oxetan-3-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO-pirrolidin-1-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{thiazol-4-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(4\text{-Me-thiazol-2-il})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-Me-imidazol-2-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-Me-pirazol-3-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-(n-Pr)-pirazol-3-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-Me-pirazol-5-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1,3\text{-di-Me-pirazol-5-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-Me-4-Cl-pirazol-3-il})\text{NH}-$,
 $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(1\text{-Me-pirazol-5-il})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_6\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{Me})\text{CONH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{Me})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{Me})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{Me})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{Me})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$
 $\text{CH}_2\text{CH}(\text{Me})\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CHCH}(\text{Me})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-$
 $\text{CH}=\text{CHCH}(\text{Et})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{Me})-(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{Et})\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{i-Pr})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CHFCONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CF}_2\text{CONH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CF}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{CF}_3)\text{CONH}-$, $-$

$\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OMe})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OCOMe})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_4\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$,
 $\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{Me})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{Me})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$,
 $(\text{CH}_2)_5\text{NHCO}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{NHCO}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OCONH}-$,
 $(\text{CH}_2)_4\text{OCONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{NHCONH}-$,

$(\text{CH}_2)_4\text{SO}_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{SO}_2\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}=\text{N}-$,




R^{1b} se selecciona independientemente del grupo
 constituido por: H y F;

R^3 se selecciona independientemente del grupo
 constituido por: H, F, Cl, Br, CH_3 , CN, CO_2Me , CO_2Et , CONH_2 ,
 CONMe_2 y ciclopropilo; y

R^6 se selecciona independiente del grupo constituido


por: F, NH₂, CO₂H, CONH₂, -NHCO₂Me, -NHCO₂(CH₂)₂OH, -NHCO₂(CH₂)₂OMe, -NHCO₂(CH₂)₂OEt, -NHCO₂CH₂CH(Et)OMe,




16. Compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque tiene la Fórmula (III), en donde:

L-Y se selecciona independientemente del grupo constituido por: -(CH₂)₆-, -(CH₂)₇-, -(CH₂)₄CH(CO₂H)CH₂-, -(CH₂)₄CH(CO₂(alquilo C₁₋₄))CH₂-, -(CH₂)₄CH(CONH₂)CH₂-, -(CH₂)₄CH(CONH(alquilo C₁₋₄))CH₂-, -(CH₂)₄CH(CON(alquilo C₁₋₄)₂)CH₂-, -CH₂-CH=CH-(CH₂)₄-, -(CH₂)₄N(CO₂(alquilo C₁₋₄))CH₂-, -(CH₂)₆O-, -(CH₂)₃CH(alquilo C₁₋₄)(CH₂)₂O-, -CH₂NH(CH₂)₄O-, -(CH₂)₅NH-, -(CH₂)₆NH-, -(CH₂)₄CH(alquilo C₁₋₄)NH-, -(CH₂)₃CH(alquilo C₁₋₄)CH₂NH-, -(CH₂)₄CH(alquilo C₁₋₄)CH₂NH-, -(CH₂)₄CH(CH₂OH)NH-, -(CH₂)₄CH(CH₂(alcoxi C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₄CH(CO₂H)NH-, -(CH₂)₄CH(CH₂CO₂H)NH-, -(CH₂)₄CH(CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₄CH(CO₂(alquilo C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₄CH(CO₂CH₂CF₃)NH-, -(CH₂)₄CH(CO₂(CH₂)₂SO₂(alquilo C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₅CH(CO₂(alquilo C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₄CH(CONH₂)NH-, -(CH₂)₄CH(CONH(alquilo C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₄CH(CON(alquilo C₁₋₄)₂)NH-, -(CH₂)₄CH(CONH(alcoxi C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₄CH(CONH(OBn))NH-, -(CH₂)₄CH(CON(alquilo C₁₋₄)(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄))NH-, -(CH₂)₄CH(CON(alquilo C₁₋₄)(CH₂)₂N(alquilo C₁₋₄)₂)NH-, -CH₂-CH=CH-(CH₂)₂NH-, -CH₂-CH=CH-(CH₂)₃NH-, -(CH₂)₄CH(CHF₂)NH-, -

$(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{CF}_3)\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(3\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-oxetan-3-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO-pirrolidin-1-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{tiazol-4-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(4\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-tiazol-2-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-imidazol-2-il})\text{NH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-3-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-3-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-pirazol-5-il})\text{NH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(1\text{-alquilo } \text{C}_{1-4}\text{-4-halo-pirazol-3-il})\text{NH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_6\text{CONH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-$
 $(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$,
 $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})-(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CHFCONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CF}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_4\text{CF}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{CF}_3)\text{CONH}-$,
 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alcoxi } \text{C}_{1-4})\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{OCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4}))\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2)_4\text{CONH}-$,
 $\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_3\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})\text{CH}_2\text{CONH}-$,
 $-(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{CONH}-$, $-(\text{CH}_2)_5\text{NHCO}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2\text{NHCO}-$,
 $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OCONH}-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{OCONH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{NHCONH}-$, $-$




$(CH_2)_4SO_2NH-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2SO_2NH-$, $-(CH_2)_4-CH=N-$,



R^{1b} se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y halógeno;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, alquilo C_{1-4} , CN, CO_2 (alquilo C_{1-4}), $CONH_2$, CON (alquilo C_{1-4}) $_2$ y ciclopropilo;

R^6 se selecciona independientemente del grupo constituido por: F, NH_2 , CO_2H , $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2OH$, $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2CH_2CH$ (alquilo



17. Compuesto de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque tiene la Fórmula (III), en donde:


L-Y se selecciona independientemente del grupo

constituído por: $-(CH_2)_6-$, $-(CH_2)_7-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2H)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2Me)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CONH_2)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CONHMe)CH_2-$, $-(CH_2)_4CH(CON(Me)_2)CH_2-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_4-$, $-(CH_2)_4N(CO_2Me)CH_2-$, $-(CH_2)_6O-$, $-(CH_2)_3CH(Me)(CH_2)_2O-$, $-CH_2NH(CH_2)_4O-$, $-(CH_2)_5NH-$, $-(CH_2)_6NH-$, $-(CH_2)_4CH(Me)NH-$, $-(CH_2)_3CH(Me)CH_2NH-$, $-(CH_2)_4CH(Me)CH_2NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2OH)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2OMe)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2H)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2Me)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2Et)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2(i-Pr))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2(t-Bu))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2CH_2CF_3)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO_2(CH_2)_2SO_2Me)NH-$, $-(CH_2)_5CH(CO_2Me)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2CO_2H)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CH_2CO_2Me)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CONH_2)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CONH(Me))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CONH(t-Bu))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CON(Me)_2)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CONH(OMe))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CONH(Obn))NH-$, $-(CH_2)_4CH(CON(Me)(CH_2)_2OMe)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CON(Me)(CH_2)_2N(Me)_2)NH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_2NH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_3NH-$, $-(CH_2)_4CH(CHF_2)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CF_3)NH-$, $-(CH_2)_3CF_2CH_2NH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_2CH(CF_3)NH-$, $-(CH_2)_4CH(3-Me-oxetan-3-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(CO-pirrolidin-1-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(tiazol-4-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(4-Me-tiazol-2-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1-Me-imidazol-2-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1-Me-pirazol-3-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1-(n-Pr)-pirazol-3-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1-Me-pirazol-5-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1,3-di-Me-pirazol-5-il)NH-$, $-(CH_2)_4CH(1-Me-4-Cl-pirazol-3-il)NH-$, $-(CH_2)_4N(CO_2Me)CH_2-$, $-(CH_2)_4CONH-$, $-(CH_2)_5CONH-$, $-(CH_2)_6CONH-$, $-(CH_2)_3CH(Me)CONH-$, $-(CH_2)_4CH(Me)CONH-$, $-(CH_2)_2CH(Me)CH_2CONH-$, $-(CH_2)_3CH(Me)CH_2CONH-$, $-(CH_2)_2CH(Me)(CH_2)_2CONH-$, $-(CH_2)_2-CH=CH-CONH-$, $-CH_2-CH=CH-CH_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-(CH_2)_2CONH-$, $-CH_2-CH=CH-$


R^{1b} se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y F;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, F, Cl, Br, CH_3 , CN, CO_2Me , CO_2Et , $CONH_2$, $CONMe_2$ y ciclopropilo;


R^6 se selecciona independientemente del grupo constituido por: F, NH_2 , CO_2H , $NHCO_2Me$, $-NHCO_2(CH_2)_2OH$, $-NHCO_2(CH_2)_2OMe$, $-NHCO_2(CH_2)_2OEt$, $NHCO_2CH_2CH(Et)OMe$ y




18. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado porque tiene la Fórmula (IV):



o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable, o un solvato del mismo, en donde:




selecciona independientemente del grupo constituido por:



L_1 se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ y $-\text{CH}=\text{CH}-$;

L se selecciona independientemente del grupo constituido por: $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_4-$, $-(\text{CH}_2)_5-$, $-(\text{CH}_2)_3\text{CH}(\text{alquilo } C_{1-4})-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CF}_3)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{alquilo } C_{1-4}))-$, $-\text{CH}_2\text{CONH}(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } C_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } C_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})_2)-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } C_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } C_{1-4}))-$, $-(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CON}(\text{alquilo } C_{1-4})(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})_2)-$,



Y es independientemente -CONH-, O o NH;


R¹, en cada aparición, se selecciona independientemente del grupo constituido por: halógeno, CN, OCF₃, CHF₂, CF₃, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, CO(alquilo C₁₋₄), NH₂, -C(=NH)NH₂, -C(O)NH₂ y -CH₂NH₂;

R² es independientemente un heterociclo de 5 miembros seleccionado de entre: pirazolilo, imidazolilo, triazolilo y tetrazolilo;


R³ se selecciona independientemente del grupo constituido por: H y halógeno y alquilo C₁₋₄; y

R₆ se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, halógeno, CN, -NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -CH₂NHCO₂(alquilo C₁₋₄), -NHCO₂(CH₂)₂O(alquilo C₁₋₄), CO₂H y CONH₂.


19. Compuesto de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque tiene la fórmula (IVa):



o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable, o un solvato del mismo, en donde:



se selecciona independientemente del grupo constituido por:




Y es independientemente $-CONH-$ o NH ;

R^3 se selecciona independientemente del grupo constituido por: H, F, Cl y alquilo C_{1-4} ; y

R^6 se selecciona independientemente del grupo constituido por: F, $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-CH_2NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), CO_2H , $CONH_2$ y $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}).

20. Compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque tiene la Fórmula (V):



o un estereoisómero, un tautómero, una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato del mismo, en donde:

el anillo B se selecciona independientemente del grupo

...
constituido por: imidazol y piridina; y

R^1 se selecciona independientemente del grupo
constituido por: alquilo C_{1-4} y CH_2NH_2 .

21. Una composición farmacéutica que comprende uno o
más compuestos de acuerdo con la reivindicación 1 y un portador o
diluyente farmacéuticamente aceptable.