

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
caveller@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

198
198
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-106506-00012-0000

Fecha: 20080205 10:35:43 - Dep: 2008 NULC/CLAC/ONI
VIA: 19 - PALENNILEY - C/VO 378 CASA NACIONAL
Act: 449 - NULC/CLAC/ONI - Folios: 19

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 449

Referencia : Expediente No. 06106506
Asunto : Solicitud de patente para: FORMAS POLIMÓRFICAS DE
HIDROBROMURO ACETATO DE METIL (+) - (S)-ALFA-(2-
CLOROFENIL)-6,7-DIHIDROTIENO [3,2-C] PIRIDINA -
5(4H), HIDROBROMURO DE CLOPIDOGREL
Solicitante : SANOFI-AVENTIS
Clase : A61K 031/4365, A61P 007/002, C07D 495/004
Fecha solicitud: 20 de octubre de 2006

1. ALEGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Emilio FERRERO, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito doy respuesta a las oposiciones formuladas por:

-La sociedad LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A., opositora en el asunto de referencia.

-La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., opositora en el asunto de la referencia.

-La sociedad GYNOPHARM S.A., opositora en el asunto de la referencia.

2. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL

El oficio No. 10342, en el cual su Despacho dispuso otorgar a mi representada término para presentar sus argumentaciones a favor de la patentabilidad del invento de que trata el asunto en referencia, me fue notificado por fijación en lista el 15 de agosto de 2008. Mediante memorial radicado el día 10 de noviembre de 2008, solicité plazo de sesenta (60) días para atender el oficio No. 10342. Por lo tanto, la presente defensa es presentada en tiempo oportuno.

El oficio No. 10343, en el cual su Despacho dispuso otorgar a mi representada término para presentar sus argumentaciones a favor de la patentabilidad del invento de que trata el asunto en referencia, me fue notificado por fijación en lista el 15 de agosto de 2008. Mediante memorial radicado el día 10 de noviembre de 2008, solicité plazo de sesenta (60) días para atender el oficio No. 10343. Por lo tanto, la presente defensa es presentada en tiempo oportuno.

El oficio No. 10344, en el cual su Despacho dispuso otorgar a mi representada término para presentar sus argumentaciones a favor de la patentabilidad del invento de que trata el asunto en referencia, me fue notificado por fijación en lista el 15 de agosto de 2008. Mediante memorial radicado el día 10 de noviembre de 2008, solicité plazo de sesenta (60) días para atender el oficio No. 10344. Por lo tanto, la presente defensa es presentada en tiempo oportuno.

3. RESPUESTA A LAS PETICIONES

Me opongo a las peticiones de las sociedades opositoras y en consecuencia, solicito a ese Despacho que con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho que se presentan en este escrito se declaren sin fundamento las oposiciones presentadas por las sociedades LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A., TECNOQUÍMICAS S.A. y GYNOPHARM S.A.

En consecuencia, se declare que el invento titulado FORMAS POLIMÓRFICAS DE HIDROBROMURO ACETATO DE METIL (+) - (S)-ALFA-(2-CLOROFENIL)-6,7-DIHIDROTIENO [3,2-C] PIRIDINA -5(4H), HIDROBROMURO DE CLOPIDOGREL cumple con los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes.

4. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

A continuación procederé a enumerar de manera resumida los argumentos que la opositora LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A. considera pertinentes para presentar oposición a la presente solicitud:

4.1 En primer lugar se procede a definir el término 'polimorfismo' y se indica que su descubrimiento se atribuye a Martin Enrique Klaproth en

1978. Posteriormente se afirma que la solicitud carece de nivel inventivo toda vez que la difracción de rayos X corresponde a una técnica analítica útil y rutinaria en la caracterización de las formas cristalinas. Según la opositora, la caracterización de las formas cristalinas realizada por el solicitante, permite a cualquier persona versada en la materia identificar y caracterizar diversas variaciones en la estructura cristalina de una molécula.

4.2 La opositora concluye que la presente solicitud es un hallazgo previsible y no una invención, por cuanto constituye una propiedad inherente a la materia en su estado sólido.

4.3 Adicional a los argumentos anteriores, la opositora ha citado cuatro anterioridades y una definición contenida en el FDA Electronic Orange Book, las cuales han sido consideradas por la opositora como el estado de la técnica más cercano. Ahora bien, los argumentos que según la opositora afectan la patentabilidad de la presente solicitud dadas las diferentes anterioridades son los siguientes:

4.3.1 Anterioridad (Patente): US 4,847,265 (Publicada el 11 de julio de 1989): 'revela formas enantioméricas dextrorrotatorias de clopidogrel y de sus sales, cuya actividad farmacológica es la inhibición de la agregación plaquetaria'. Según la opositora, la presente solicitud carece de novedad porque 'se está frente a la misma sustancia'. Por último la opositora asegura que si la novedad de la presente solicitud está basada en las formas B, C y D del compuesto, la anterioridad mencionada 'tiene un punto de fusión para el bromhidrato de clopidogrel de 140°C, punto de fusión idéntico o que se encuentra dentro del rango propuesto en la reivindicaciones 5 a 12 de la solicitud en trámite, lo que llevaría a pensar que se trata de la misma sustancia, independientemente de la nomenclatura (...)'

4.3.2 Anterioridad: Clopidogrel Antiplatelet Activity is Independent of Age and Presence of Atherosclerosis (Publicada en 1999): la opositora copia el resumen en inglés del artículo citado, el cual parece hacer referencia a un estudio clínico de los efectos de una dosis de clopidogrel.

4.3.3 Anterioridad: Acute Antithrombotic Effect of a Front-Loaded Regimen of Clopidogrel in Patients with Atherosclerosis on Aspirin

(Publicada en el 2000): la opositora copia el resumen en inglés del artículo citado, el cual parece hacer referencia a un estudio clínico de los efectos de una dosis de clopidogrel.

4.3.4 Anterioridad: Hemorheological Effects in Subjects with Subclinical Atherosclerosis (Publicada en el 2001): la opositora copia el resumen en inglés del artículo citado, el cual parece hacer referencia a un estudio clínico de los efectos de una dosis de clopidogrel.

4.3.5 FDA Electronic Orange Book: se cita una formulación farmacéutica de clopidogrel.

4.4 Por su parte, los argumentos presentados por la opositora **TECNOQUÍMICAS S.A.** son exactamente los mismos que los presentados por la opositora **LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A.** arriba indicados.

4.5 Por último, los argumentos que la opositora **GYNOPHARM S.A.** considera pertinentes para presentar oposición a la presente solicitud son los siguientes:

En el escrito de oposición se señala que la presente invención, carece de novedad y aplicación industrial con fundamento en una anterioridad citada, la cual corresponde a la misma patente US 4,847,265, citada por las otras dos opositoras.

5. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

A continuación presento a su Despacho las razones que demuestran que contrario a lo señalado por los apoderados de las sociedades opositoras, el invento para el cual se solicita la protección a través de la concesión de la patente en el expediente de la referencia, cumple cabalmente con los requisitos del artículo 14 y demás normas concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, los argumentos que aquí se presentan demuestran que los fundamentos de la opositora carecen de fundamento válido y por tanto, no pueden ni deben ser tomados en cuenta para negar la patente solicitada.

5.1 Modificación de una solicitud en trámite: con el objeto de diferenciar mejor el objeto de la presente solicitud frente a los argumentos de oposición y en virtud de lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486, se ha modificado el pliego reivindicatorio para presentar 5 reivindicaciones.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:

Con base en los documentos señalados en el Informe de Búsqueda Internacional, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio que busca definir con mayor claridad las características técnicas que hacen novedosa e inventiva la presente solicitud.

Adicionalmente, se han eliminado las reivindicaciones relacionadas con métodos de tratamiento, de manera que los argumentos de las oposiciones en relación con la carencia de aplicación industrial de la invención ya no son válidos.

5.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud: de acuerdo con los argumentos expuestos por las partes opositoras, la presente solicitud carece de novedad frente a la materia revelada por el documento US 4,847,265. Es entonces relevante poner de presente lo que indica el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto al análisis de la novedad:

"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención".

De esta manera, a partir de la lectura del documento citado es posible establecer que éste describe el enantiómero dextrorrotatorio de clopidogrel, ilustrado a través de diferentes sales tales como el bromohidrato (hidrobromuro) de clopidogrel en el ejemplo 1 (f). Sin embargo, este documento no revela ni describe la forma polimórfica D de hidrobromuro de clopidogrel, característica técnica que hace novedosa a la forma polimórfica reivindicada.

Así las cosas, dado que el documento D1 no describe todas las características técnicas esenciales de la presente solicitud, no puede ser considerada una anterioridad válida capaz de afectar su novedad.

5.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud: de acuerdo con lo expuesto por las opositoras LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A. la presente solicitud resulta obvia para un técnico versado en la materia, a partir de la materia divulgada en el estado del arte.

Respecto a la evaluación del nivel inventivo el Manual Andino de Patentes precisa:

"La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)".

A este respecto y en respuesta a los argumentos de las opositoras se desea poner de presente que como concepto general, el polimorfismo es la capacidad de un compuesto para cristalizarse en más de un tipo de sistema cristalino, pero el sistema cristalino específico en el cual cristaliza un compuesto dado no es predecible.

Como ilustración de la no-obviedad de la existencia de las formas poliméricas puede consultarse el artículo "Disappearing Polymorphs" de Dünitz y Bernstein (Acc. Chem. Res., 1995, 28. 193-200) y que se presenta como anexo junto con este memorial. Nótese en particular en la página 96, segunda columna, el compuesto 1,2,3,5-tetra-O-acetil-/3-β-D-ribonufuranosa, la historia de este compuesto es inesperada, ya que se obtienen dos formas polimórficas en dos lugares diferentes.

Con el fin de identificar el sistema cristalino de un compuesto dado, se debe obtener de manera separada para su caracterización. Las formas polimórficas de la presente aplicación exhiben características que son útiles en la industria farmacéutica, tales como la no-higroscopia y la estabilidad.

A partir del estado del arte no es posible predecir la forma polimórfica y las propiedades fisicoquímicas que serán obtenidas por medio de un proceso específico.

A este respecto, se debe tener en cuenta que tratándose de patentes, el resultado al que se pretende llegar es siempre conocido, por cuanto es la solución al problema técnico planteado. Por lo tanto, el conocimiento de que un compuesto presente polimorfismo no impide considerar una forma cristalina específica como carente de novedad y de nivel inventivo.

En efecto, solamente la constatación de que dicha forma cristalina ya había sido revelada y/o sugerida con anterioridad es lo que permitiría a un Examinador de patentes objetar su novedad y nivel inventivo.

Así entonces, la constatación de que el polimorfismo existe no puede, como en el presente caso, ser fundamento válido de una oposición. Más aún, toda vez que en las oposiciones presentadas no se demostró que la presente invención ya había sido enseñada o sugerida con anterioridad, las mismas carecen de fundamento válido para impedir la patentabilidad del presente invento.

Por lo tanto, no es posible afirmar que para un técnico versado en la materia la presente solicitud sea obvia y por lo mismo posee nivel inventivo.

6. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Tal como lo indiqué en el capítulo anterior, junto con este escrito presento Formulario de Modificaciones y Correcciones, con nuevo capítulo reivindicatorio el cual solicito sea tenido en cuenta por ese Despacho.

7. PETICIONES

Con fundamento en lo anterior solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO S.A.

205
205

7.2 Declarar infundada la oposición presentada por TECNOQUÍMICAS S.A.

7.3 Declarar infundada la oposición presentada por GYNOPHARM S.A.

7.4 Declarar que el invento titulado "UTILIZACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRAZOL PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS ÚTILES EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES" para el cual mi representada solicita el otorgamiento de la patente de invención cumple con los requisitos del artículo 14 y concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. ANEXOS

Anexos a este escrito los siguientes documentos:

8.1 Formulario de Modificaciones y Correcciones.

8.2 Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones.


8.3 Recibo de pago por concepto de la tasa correspondiente para modificaciones.

8.4 Copia del artículo "Dissapearing Polymorphs" de Düñitz y Bernstein (Acc. Chem, Res., 1995, 28. 193-200).

9. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 4ª No. 72-35 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Jefe,




EMILIO FERRERO
T.P.A No. 31.929

COLO-14775-264-004-4
COLO-14775-264-005-1
COLO-14775-264-006-9
COLO-14775-841-028-5
JMS\JMS\ID-143477\WPC14775
No. M-2009-143477\JMS

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: SANOFI – AVENTIS Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia. Dirección: 174 Avenue de France, Paris 75013, Francia Domicilio: Paris, Francia Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019 TP 31.929</u>
4	Número de expediente: <u>06.106.506</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: <u>Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las</u> <u>objeciones presentadas por las Sociedades Opositoras a la presente solicitud de patente y pido</u> <u>respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindica-</u> <u>ciones presentadas.</u>	
6	Comprobante de pago No. <u>09-8.129</u> Fecha: <u>2 de febrero de 2009</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$111.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA: 	

207

REIVINDICACIONES

1. Forma polimórfica D del hidrobromuro de acetato de metil (+)-(S)- α -(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-C]piridina-5(4H).
2. Forma polimórfica D del hidrobromuro de acetato de metil (+)-(S)- α -(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-C]piridina-5(4H) según la reivindicación 1, que posee un espectro FTIR con picos en alrededor de 456, 723, 756, 1647 y 1748 cm^{-1} .
3. Forma polimórfica D del hidrobromuro de acetato de metil (+)-(S)- α -(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-C]piridina-5(4H) según la reivindicación 1, que presenta un patrón de difracción en polvo de rayos X sustancialmente como se describe en la figura 1D.
4. Forma polimórfica D del hidrobromuro de acetato de metil (+)-(S)- α -(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-C]piridina-5(4H) según la reivindicación 1, que posee un espectro FTIR sustancialmente como en la figura 5.
5. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, junto con un portador, coadyuvante, diluyente, o vehículo farmacéuticamente aceptable.

Disappearing Polymorphs

JACK D. DUNTZ*[†] AND JOEL BERNSTEIN*[‡]

Organic Chemistry Laboratory, Swiss Federal Institute of Technology, ETH-Zentrum, CH 8092 Zurich, Switzerland,
and Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel 84965

Received November 1, 1994

Introduction

When a compound exhibits polymorphism—the existence of more than one crystal structure—it may be important to obtain a particular polymorph under controlled and reproducible conditions. However, this is not always easy to achieve. Tales of difficulties in obtaining crystals of a particular known form or in reproducing results from another laboratory (or even from one's own!) abound. Indeed, there are cases where it was difficult to obtain a given polymorphic form even though this had previously been obtained routinely over long time periods. Several monographs contain explicit or passing references to these problems,¹ but much of this lore has gone undocumented, especially in the last 30 years or so. In this Account we present and discuss old and new examples.

Crystallization is a process taken for granted by most practicing chemists; the majority of the techniques were developed long ago and are described in all standard laboratory textbooks. It is the standard method for purifying solid compounds, and chemists generally believe that they can control the process, at least when it yields the desired product. What is disturbing about the phenomenon of disappearing or elusive polymorphs is the apparent loss of control over the process: we did the experiment last week and got this result, and now we cannot repeat it! This kind of statement can lead to raised eyebrows or even to outspoken expressions of disbelief. We have ourselves experienced the frustration of not being able to reproduce an experimental result that was undoubtedly obtained earlier.

Crystallization: Nucleation and Growth

The process of crystallization of a compound from solution or from the melt is poorly understood. At least two stages must be distinguished: the formation of a critical nucleus and its subsequent growth. The first step is decisive in that it can be regarded as being associated with a free energy of activation and is therefore rate limiting. Under suitable conditions, that step may be delayed almost indefinitely. For

instance, Faraday² observed that molten sulfur in a flask cooled to room temperature did not entirely solidify. When a drop of the fluid material was touched, it immediately crystallized; untouched, some drops were retained for a week in the fluid state. Faraday noted that this supercooled state of sulfur is analogous to that of water cooled below its freezing point, although the temperature difference is much greater (the freezing point of sulfur is 119 °C); De Coppel found that samples of salol (phenyl salicylate) could be kept in the liquid state at room temperature for periods of several years.³ When nucleation is rapid, the formation of many nuclei leads to many crystals, whereas slow nucleation tends to produce a smaller number of larger crystals. Of course, stirring, shaking, or other disturbances of the liquid phase during the crystallization process can affect the outcome.

A striking case where nucleation was decisive in determining the result of a crystallization experiment has been described recently.⁴ Sodium chlorate (NaClO₃) crystallizes in the chiral space group *P*2₁3; that is to say, individual crystals of this substance may occur in enantiomorphic forms. Normally, crystallization from solution produces the enantiomorphs in roughly equal numbers. Kondepudi, Kaufman, and Singh⁵ found, however, that stirring an aqueous solution of this substance leads to a predominance of

* Correspondence may be directed to either author.

[†] ETH.

[‡] Ben-Gurion University.

(1) Buckley, H. E. *Crystal Growth*; Wiley: New York, 1951. T. P. S. Crystallization and Recrystallization. In *Technique of Organic Chemistry*; Weissberger, A., Ed.; Interscience Publishers, Inc.: New York, 1958; Volume III, Part I, Chapter III, pp 395-562. Holden, A.; Singer, P. *Crystals and Crystal Growing*; Doubleday: New York, 1960.

(2) Faraday, M. *Experimental Researches in Chemistry and Physics*; Taylor and Francis: London, 1853; p 212. On the following page, Faraday apologized for not having acknowledged observations along similar lines made earlier (in 1813) by M. Ballan: "I very fully join in the regret...that scientific men do not know more perfectly what has been done, or what their companions are doing; but I am afraid the misfortune is inevitable. It is certainly impossible for any person who wishes to spend a portion of his time to chemical experiment, to read all the books and papers that are published in connection with his pursuit; their number is immense, and the labour of winnowing out the few experimental and theoretical truths which in many of them are embarrassed by a very large proportion of uninteresting matter, of imagination, and of error, is such, that most persons who try the experiment are quickly induced to make a selection in their reading, and thus, inadvertently, at times, pass by what is really good." Since Faraday's times, these difficulties have multiplied out of all proportion, but we may still use his words to apologize to any scientists whose works we may similarly have overlooked.

(3) De Coppel, M. L.-C. *Ann. Chim. Phys.* 1907, 10, 457. "La surfusion dure donc depuis bientôt 6 ans." In another experiment, de Coppel reported that a sample of sodium sulfate, supersaturated with respect to the decahydrate, had still not crystallized after 25 years. In general, the higher the temperature to which the liquid was raised and the longer the time it was held at high temperature, the more resistant the liquid was to crystallization. Heating a liquid destroys residual order.

(4) McBride, J. M.; Carter, R. L. *Angew. Chem.* 1991, 103, 298; *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* 1991, 30, 293.

Jack D. Duntz was born in Glasgow, Scotland, in 1923 and studied chemistry at Glasgow University. Following a decade of postdoctoral studies at Oxford, Caltech, NIH, and the Royal Institution, London, he moved to the ETH in Zurich as professor of chemical crystallography, a post he held until his retirement in 1990. He is the author of *X-Ray Analysis and the Structure of Organic Molecules* (1979) and (with E. Heilbronner) *Reflections on Symmetry in Chemistry... and Elsewhere* (1993).

Joel Bernstein was born in Cleveland, OH, in 1941. He received his B.A. in chemistry from Cornell University in 1962 and Ph.D. in physical chemistry from Yale in 1967. Following postdoctoral stints in chemical crystallography at UCLA with K. N. Trueblood and organic solid state chemistry at the Weizmann Institute with G. M. J. Schmidt he moved to the Ben-Gurion University of the Negev in Beer Sheva, Israel, where he is now professor of chemistry. His research interests include a

crystals of one handedness, sometimes right, sometimes left, but not depending on the direction of stirring. In checking this result, McBride and Carter⁴ showed by video recording that a single nucleation event can produce almost all of the crystals formed: "...Crystals begin nucleating at random, but the first crystal to be struck by the stirrer clones hundreds or thousands of new nuclei. Growth of so many nuclei soon lowers the concentration of the solute below the threshold for spontaneous formation of primary nuclei, so that there is no way to begin crystallization of the enantiomer."

Seeding

One way of influencing the crystallization process is by seeding, and here we need to differentiate between what we may term intentional and unintentional seeding. Intentional seeding is a common practice among chemists who wish to coax crystallization of a compound from solution or from the melt; small crystals or crystallites of the desired material (seeds) are added to the system. In this way, the rate-limiting nucleation step, which may be extremely slow, is circumvented. For this method to be applied, it is of course necessary that a sample of the crystalline material is available; that is, the compound must have been already crystallized in a previous experiment. When polymorphic forms of a substance are known to occur, intentional seeding with one of the polymorphs is a useful and often the most successful way of preferentially producing it rather than the other.

Seeding may also occur if small amounts of the crystalline material are present as contaminants: unintentional seeding.⁵ Unintentional seeding is often invoked as an explanation of phenomena which otherwise are difficult to interpret. We shall argue in favor of this explanation, although there is no consensus about the size and range of activity of such seeds, which have never actually been directly observed.⁷ Estimates of the size of a critical nucleus range from a few tens of molecules to a few million molecules.⁸ With a size of about a million molecules, even a speck (10^{-6} g) of a compound of molecular weight 100 contains approximately 10^{16} molecules, sufficient to make 10^{10} such nuclei. One can think of local seeding, where the contamination may apply to the experimentalist's clothing, a portion of a room, an entire room, a building, or even, with increasing degrees of implausibility, to a district, a town, a country, a continent, and so on. In the limit we have what has been proposed as universal seeding (planetary seeding would be a more accurate expression), where the whole planet is assumed to be contaminated.⁹ A seed that promotes formation of a crystallization nucleus need not necessarily be composed of the same molecules as the compound that is to be crystallized. Specks of dust, smoke particles, and other small foreign bodies can act as seeds in promot-

ing crystallization, which is the reason laboratory chemists often scratch the walls of a glass vessel with a glass rod to encourage a solute to crystallize.¹⁰

Polymorphism

We have mentioned the phenomenon of polymorphism, which is commonly understood as connecting the ability of a compound (or of an element) to crystallize in more than one distinct crystal structure. According to McCrone,¹¹ "A polymorph is a solid crystalline phase of a given compound resulting from the possibility of at least two different arrangements of the molecules of that compound in the solid state." Because polymorphs have different structures, they may differ greatly in density, hardness, solubility, and optical and electrical properties; e.g., diamond and graphite are two polymorphic forms (allotropes) of carbon. Many compounds are known to crystallize in polymorphic forms. In the inorganic and mineralogical fields, these sometimes have different names, e.g., ZnS, wurtzite and sphalerite; CaCO₃, calcite, aragonite, and vaterite; TiO₂, rutile, brookite, and anatase; but, more generally, different polymorphic forms are denoted by letters, A, B, C or α , β , γ , etc., or by Roman numerals, I, II, III, etc., depending on the preference of the discoverer. McCrone¹¹ has provocatively suggested that "every compound has different polymorphic forms, and that, in general, the number of forms known for a given compound is proportional to the time and money spent in research on that compound." In support of this, McCrone observes that many compounds of industrial importance (i.e., those on which a great deal of time and money are spent) are known to exhibit polymorphism: silica, iron, calcium silicate, sulfur, soap, pharmaceutical products, dyes, and explosives. Such compounds, unlike the vast majority of compounds that are isolated, are prepared and crystallized not just once but repeatedly, under conditions that may vary slightly from time to time. Similarly, in the biomolecular area, where much time and effort is invested in attempts to crystallize proteins under many slightly different conditions, polymorphism is frequently observed.¹² The universality suggested by McCrone's statement may, however, be considerably tempered by the fact that fewer than 5% of the compounds in the Cambridge Structural Database (CSD) are known to be polymorphic (although it must be admitted that crystallographers typically choose one crystal specimen from their sample and leave it at that). Moreover, some very widely studied compounds have shown no evidence of polymorphic behavior, even though they have been crystallized and handled for many years under a far-ranging variety of conditions; naphthalene is an example that immediately comes to mind.

Here we shall be concerned exclusively with molecular crystals, where the molecule may have the same shape in the two polymorphs or it may have a different shape, resulting in what has been termed "conforma-

(6) It is well-known that it is often difficult to crystallize a newly synthesized compound. Subsequent crystallizations may be easier, because of the presence of suitable seeds.

(7) Chemists and physicists have long become accustomed to postulating models as explanations for phenomena that cannot be directly observed. The existence of atoms is perhaps the classic example.

(8) Mullin, J. W. *Crystallization*, 3rd ed.; Butterworth-Heinemann Ltd.: Oxford, 1993; pp 182-185.

(10) "Auch das Reiben mit einem Glasstab an der Wandung des Gefässes schafft Keime, an deren Vorhandensein die Kristallisation gebunden ist." *Organikum*; VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften: Berlin, 1977; p 46.

(11) McCrone, W. C. *Polymorphism*; In *Physics and Chemistry of the Organic Solid State*; Fox, D., Labes, M. M., Weissberger, A., Eds.; Interscience: New York, 1965; Vol. II, pp 726-767.

(12) For example, according to the Protein Data Bank (distributed by the National Laboratory, Upton, NY), the extensively studied




Figure 1. Free energy vs temperature diagrams for two polymorphs, with crossing points where their free energies cross: left, enantiotropic system; right, monotropic system.

tional polymorphism".¹⁸ McCrone's criterion¹¹ is that polymorphs are different in crystal structure but identical in the liquid or vapor states. This implies that crystals containing molecules with different atomic arrangements are to be classed as polymorphs if the molecules concerned interconvert rapidly in the melt or in solution to give the same equilibrium mixture. Thus, this definition would encompass not only conformational isomers but all kinds of isomers in dynamic equilibrium. In phase-rule terminology,¹⁴ the various polymorphs and the liquid obtained by melting them constitute a one-component system (or a two-component system if we consider solution of the polymorphs in a given solvent).

Clearly, this definition is not completely satisfactory and leaves several kinds of borderline cases open: are *syn*- and *anti*-oximes in the solid state to be classed as polymorphs or as separate compounds? What about the various molecular species involved in the complex equilibria among open-chain and cyclic forms of saccharides (constitutional and configurational polymorphs)? How long are we supposed to wait for equilibrium to be established? Should different hydrates or solvates of a given compound be classified as polymorphs? (The term pseudopolymorphism has been proposed to cover such cases.) Definitive answers to these and similar questions cannot be given; they depend on one's point of view. In the same way, there seems to be no unequivocal way of distinguishing between polymorphic transformations and solid-state chemical reactions. There are borderline cases that show characteristic features of both.

In molecular crystals, free energy differences between polymorphs are usually quite small, a matter of a few kilocalories/mole at most,¹⁵ and depend on temperature, mainly because of the entropic contribution to the free energy. Because of the thermodynamic relation $G = H - TS$, the form with the higher entropy will tend to become the thermodynamically more stable form as the temperature is raised (Figure 1). Thus, over a small temperature range, and particularly between room temperature and the melting point, one polymorph or another can change from being the stable form to being metastable. If the

thermodynamic transition temperature is below the melting point, the polymorphic system is known as enantiotropic (not to be confused with enantiotopic, a term applied to atoms or groups in a molecule that are related by an improper symmetry operation but not by a proper one, e.g., the two methylene H atoms in ethanol) and the transition is in principle reversible; if the transition temperature is above the melting point, then the system is monotropic and the transition can take place only in one direction. A metastable form can persist for years, or it can undergo spontaneous transformation to the stable form.

Mechanisms of Polymorphic Transformations

The title of this section promises more than it can deliver, because the mechanisms of polymorphic transformations in molecular crystals are largely unknown. The one type of transformation for which some level of understanding can be claimed is order-disorder transformations, where the high-temperature phase has essentially the same molecular arrangement as the low-temperature one and differs from it only by an increase in the crystallographic site symmetry of the structural units. This increase in apparent molecular symmetry is due to an increase in crystal disorder such that the space-averaged, time-averaged distribution of matter has a higher symmetry than the instantaneous distribution in an individual unit cell. The reverse transformation corresponds to the onset of an ordering process. Such transitions are usually classified as "second-order" from the thermodynamic point of view, and, since they are virtually the only ones that can be handled on a theoretical basis, they receive the most attention in textbooks. From reading, one might even get the impression that order-disorder transformations are the prototype of phase transitions in general, but this is not the case.

Presumably, as in the primary crystallization process, the mechanisms of most solid-solid transformations involve the formation of critical nuclei of the new phase, followed by their growth. According to My-nukh,¹⁶ the nucleation step is critically dependent on the presence of "suitable" defects. Depending on the nature of these defects, nuclei of the new phase may be formed at different temperatures and grow at different rates. Thus, defects in the initial crystal structure may be necessary for initiating (or cata-

(18) Bernstein, J.; Hagler, A. T. *J. Am. Chem. Soc.* 1978, 100, 673. Bernstein, J. *Conformational Polymorphism In Organic Solid State Chemistry*; Desiraju, G., Ed.; Studies in Organic Chemistry, Vol. 32;

211
211

lyzing) nucleation of the new phase. Indeed, in some cases, the transformation can be induced by mechanically introducing defects, for example, by scratching the surface of the crystal with a pinpoint. On the other hand, there are also examples where the transformation is virtually instantaneous (and in one case even reversible), causing the crystals to "jump".¹⁷

Solid-state transformations in molecular crystals often show a high degree of hysteresis. It may be necessary to heat the low-temperature form to a temperature well above the thermodynamic transition temperature before signs of phase transformation can be detected. Even when no solid-solid transformation of the low-temperature form occurs below the melting point, this is not sufficient proof that the system is monotropic; the transformation may simply be too sluggish to be observed. Similarly, transformations in the reverse direction, produced by cooling the high-temperature form, are also invariably accompanied by hysteresis. This can be so severe that a high-temperature form can sometimes be kept indefinitely at temperatures well below the transition point. Thus, X-ray structure analyses at 100 K have been made of crystal phases more than 200 K below their thermodynamic range of stability.¹⁸


Vanishing Polymorphs

Woodard and McCrone¹⁹ described several cases where, after nucleation of a more stable crystal form, a previously prepared crystal form could no longer be obtained. Other examples were described by Webb and Anderson,²⁰ who wrote, "Within the fraternity of crystallographers anecdotes abound about crystalline compounds which, like legendary beasts, are observed once and then never seen again." In a sober comment on these views, Jaczewicz and Naylor²¹ criticized some of the more exaggerated claims. While admitting the role of seeding in promoting nucleation, they argue that the disappearance of the metastable form is a local and temporary phenomenon and conclude that "any authentic crystal form should be capable of being re-prepared, although selection of the right conditions may require some time and trouble."

In most of the examples cited by these authors, relevant questions are left unanswered. Many chemists remain skeptical about a subject that calls into question the criterion of reproducibility as a condition for acceptance of a phenomenon as being worthy of scientific inquiry. Nevertheless, there are well-documented cases of crystal forms that were observed over a period of time but not thereafter, having been apparently displaced by a more stable polymorph. The relevant literature is scattered and almost impossible to find by subject searches. In the remaining space

we review published examples, present some new results, and try to put the subject into perspective. We begin with one of the best-studied examples.

1,2,3,5-Tetra-O-acetyl- β -D-ribofuranose (I). The early history of this compound reads like a mystery story. As first prepared in 1946 in Cambridge, England, by Howard, Lythgoe, and Todd,²² the compound had melting point 58 °C.



Virtually the same melting point was measured for material prepared by a different method in Jena by Bredereck and Hoepfner.²³ When several batches of the same material were prepared soon afterward (1949) in a different laboratory on the other side of the Atlantic, in New York, by Davoll, Brown, and Visser,²⁴ the first three preparations had melting point 56–58 °C, but the fourth run yielded material with a distinctly higher melting point, 85 °C. Around the same time, in Jena, by direct acetylation of ribose, Zinner²⁵ obtained a mixture of two tetraacetyl derivatives, one the ribopyranose and the other the ribofuranose, with a melting point of 82 °C for the latter. The two high-melting compounds appeared to be identical, although the nature of the structural difference between them and the low-melting form was unknown. So far, so good; innumerable examples of polymorphism are known. The low-melting form can be called A, the high-melting one B.

After some time, however, the melting points of the early New York preparations had risen to 85 °C, and it was no longer possible to prepare the A form.²⁴ A sample of A was sent from Cambridge, but when it was exposed to the air in New York, in a laboratory that contained samples of B, the crystals of A rapidly became opaque and transformed to B. In the meantime, transformation of A to B was also found to have taken place in Cambridge. Since the A form could no longer be obtained in the New York laboratory, further experiments involving this form were moved to distant Los Angeles, where it was shown that when 1 g of A (melting point 57 °C) was inoculated with 1 mg of B (melting point 85 °C), the melting point of the sample was raised to 75–77 °C within 2 h and to 77–79 °C overnight.²⁴ Similar phenomena were observed in Manchester.²⁶ Low-melting A was first obtained, but when B was introduced into the laboratory, the whole of the material had the higher melting point and the low-melting form could no longer be prepared.²⁷

The scene now changes to Philadelphia, where Patterson and Groshens²⁸ (the same Patterson as in the Patterson function used in crystallography) took on the task of measuring X-ray diffraction data for the two crystalline forms. Low-melting A was found to be monoclinic, space group $P2_1$, and the crystal was

(17) Gigg, J.; Gigg, R.; Payne, S.; Conant, R. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1*, 1967, 2411. Ding, J.; Herbst, R.; Praefcke, K.; Kohne, B.; Saenger, W. *Acta Crystallogr., Sect. B* 1991, 47, 739. Steiner, T.; Ellrich, W.; Saenger, W.; Gigg, R. *Ibid.*, in press. Zamir, S.; Bernstein, J.; Greenwood, D. J. *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* 1994, 242, 193. Euter, M. C.; Seidel, A. R. *J. Am. Chem. Soc.* 1983, 105, 641. Kohne, B.; Praefcke, K.; Mann, G. *Chimia* 1988, 42, 139.

(18) For example, the white high-temperature modification of dimethyl 3,6-dichloro-2,5-dihydroxyterephthalate, unstable below about 340 K. Crystal structure analysis at 98 K. Yang, Q.-C.; Richardson, M. F.; Dunitz, J. D. *Acta Crystallogr., Sect. B* 1989, 45, 312. Richardson, M. F.; Yang, Q.-C.; Novotny-Bregger, E.; Dunitz, J. D. *Ibid.* 1990, 46, 659.

(19) Woodard, G. D.; McCrone, W. C. *J. Appl. Crystallogr.* 1978, 8,

(22) Howard, G. A.; Lythgoe, B.; Todd, A. R. *J. Chem. Soc.* 1947, 1062.

(23) Bredereck, H.; Hoepfner, E. *Chem. Ber.* 1949, 82, 51.

(24) Davoll, J.; Brown, E. R.; Visser, D. W. *Nature (London)* 1952,




Figure 2. Stereoviews of the two forms of I. In both cases the view is on the planes of C1—O—C4 of the furanose ring: upper, monoclinic A form, lower, orthorhombic B form. For clarity, only carbon atoms are labeled.

sufficiently stable to last for 7 weeks. At the end of this time, crystals of B were introduced into the room. After three days, the A crystal was unchanged, but when powdered B was sprinkled over the A crystal, the latter transformed completely to B in a few minutes. The transformed material still had the external shape of the original A crystal, but it was opaque and polycrystalline with no preferred orientation of the crystallites. Crystals of B were found to be orthorhombic, space group $P2_12_12_1$, with quite different cell dimensions from A. Patterson and Groshens noted that the molecular volume increased by about 2% during the A to B transformation (A, 383.9 Å³; B, 392.5 Å³).

In the early 1950s it would have been a major undertaking to determine the atomic arrangement in these noncentrosymmetric crystals by X-ray analysis, and it was only some 20 years later that the crystal structure of form B was determined.²⁹ The authors made no mention of the other polymorph. Essentially the same structure was found by Poppleton,³⁰ who commented that an attempt to prepare the "rare" A form by application of high pressure was unsuccessful.

Comparison of the structures of the two forms only became possible when the elusive A form was obtained

in Budapest and its crystal structure determined.³¹ There is no simple structural relationship between the two polymorphs; the crystal packing is quite different, and although the ribose ring and its directly attached atoms are nearly superimposable, the molecules adopt different conformations with respect to the orientations of the acetyl groups about the bonds C2—O2, C3—O3, and C5—O5 (Figure 2).

According to force-field calculations³² the intramolecular nonbonded potential energy of the form A conformation is lower than that of the B conformation by 15.7 kJ mol⁻¹; that is, the more stable molecular structure is found in the low-melting polymorph. This is reasonable, because, as mentioned earlier, the thermodynamic stability of a high-temperature form must be due to its higher entropy rather than to its lower potential energy (see Figure 1). The increase in molecular volume on going from the A to the B form is consistent with this.

In spite of all the work done on this system, we still do not know the thermodynamic transition point, where the two free energy curves cross. From the many instances where A has been reported to transform spontaneously to B, we can infer that the transition point lies somewhat below normal laboratory temperature. Thus, form A is likely to have been present as a metastable species during most of its existence. In spite of its thermodynamic instability with respect to form B, it may have tended to crystallize first from solution because of a more rapid rate of nucleation, a kinetic factor. Once formed, the crystals of A may endure for a longer or shorter period, depending on the local temperature and other factors,

(27) The state of affairs was summarized by Brown et al. (Brown, G. B.; Davoll, J.; Loopy, B. A. *Biochem. Prep.* 1955, 4, 70) as follows: "The form first reported melted at 58° or 56° and the form melting at 84° was initially termed the B form. A number of laboratories have observed the transformation of the low melting into the high melting form and once the latter is obtained the former is not encountered." For another contemporary account of the confusion, see: Overend, W. G.; Stacey, M. In *The Nucleic Acids*; Chargaff, E., Davidson, J. N., Eds.; Academic

The solid-state transformation to B may take place spontaneously, or it may be catalyzed by the presence of seeds of B. In subsequent crystallization experiments in the same laboratory the presence of B seeds will circumvent the kinetic advantage of form A; once such seeds are present in the laboratory atmosphere, the lower solubility of thermodynamically stable B must tip the balance in its favor, resulting in the virtual "disappearance" of metastable A from laboratories "contaminated" by B.

It is also possible that, when first prepared, the A form was preferred thermodynamically as well as kinetically. Although normal laboratory temperature is nowadays taken as around 25 °C, this can by no means be taken as typical of former times.³² Besides, the immediate postwar period was marked by severe fuel shortages in Europe. British and German laboratories at that time must often have been considerably colder than 25 °C, except in warm summer weather. Was form A obtained in Cambridge and Jena during cold weather conditions, when the ambient temperature fell below the thermodynamic transition point? After so many years it is difficult to find out.


There are clearly many questions left unanswered, and this is typical of the information that can be gathered today from the literature about these phenomena. The accounts of the optical rotation measurements are particularly confusing. For example, Davoll, Brown, and Visser³⁴ reported that when a methanolic solution of A was inoculated with a minute amount of B, the specific rotation $[\alpha]_D$ changed from about -3.5° (the normal value for solutions of A) to about -18.5° (the normal value for solutions of B). The authors were somewhat at a loss to explain this, since they considered α , β isomerism at the anomeric carbon atom to be unlikely (although we shall encounter examples later). In contrast, Farrar³⁶ found that solutions of the two forms in chloroform had nearly the same specific rotation $[\alpha]_D$ of about -12°, the value expected for B. From this result, correctly as we now know, Farrar considered the difference between the two forms to be merely one of dimorphism in the solid state; equilibrium among the various conformational states is attained rapidly in chloroform solution, regardless of whether the solution is prepared from the A or the B form. What about the different results in methanolic solutions of A and B? It seems most unlikely that interconversion would be slow enough to be observable from optical rotation measurements. Our tentative conclusion is that these measurements are unreliable.

Benzylidene-*dl*-piperitone (II). The compound was first prepared in Sydney, Australia, in 1921 as large pale yellow prisms (mp 59–60 °C, α form). After a second form appeared (mp 63–64 °C, yellow rhombic prisms, β form), it was difficult to reproduce the

form were carefully determined.³⁵ Several years later, in St. Andrews, Scotland, only a third polymorph (mp 69–70 °C, faintly yellow small needles, γ form) could be obtained,³⁴ and it was found that α and β transform readily into γ "by inoculation" (seeding). Once seeds of γ were present, even intentional seeding of solutions or melts with α or β seeds yielded only the γ form. The authors wrote, "It seems clear, however, that the fortuitous presence of a nucleus of the γ form is sufficient to suppress the production of the α and β forms: such nuclei may have been carried from one building to another in the two sets of St. Andrews experiments—for example, on the clothes of the operators—in spite of precautions."


In 1987, the same compound was prepared in Bangalore, India,³⁶ by the same method as used in Sydney.³⁸ Only the α form was obtained and used in solid-state photochemical reactions. The authors wrote, "Innumerable attempts to obtain the β form were met with failure", and they did not even mention the γ form.

Benzocaine Picrate (III). A low-melting (132 °C) form has been used as a pharmacopeial standard.³⁶ A higher-melting (162–163 °C) form is obtained by drying this material at 105 °C for at least 1 h or by vacuum drying/sublimation (100 °C/ 0.1 mmHg).³⁷ Experiments in two laboratories showed that, once the



latter form had been obtained, the lower-melting form could no longer be prepared. It was realized that drastic measures were called for. All samples were discarded, equipment and laboratory benches were washed, and, following a waiting period of 8–12 days, the low-melting form could again be obtained. This "purging" procedure was followed several times with reproducible results.

Melibiose (IV) and Mannose (V). The Pfanstiehl Chemical Company, in Waukegan, IL, specialized in isolating and purifying natural products. One of these was the disaccharide β -melibiose IV, with crystallization as the final purification step. The production ran into a problem:³⁸ "Then one day, for no apparent reason, the melibiose turned out to be of the α variety. Try as they might, the Pfanstiehl chemists could not get a batch of melibiose to crystallize in the β form. They finally concluded that mere traces of the α form in the air or on the equipment were enough to seed the solutions, but where it came from was never




(32) As an indication of earlier typical laboratory temperatures, it may be recalled that the calorie was defined as the amount of heat necessary to raise 1 g of water by 1 °C at 15 °C.

(33) Read, J.; Smith, G. S. *J. Chem. Soc.* 1921, 119, 779.

(34) Dewar, J.; Morrison, D. R.; Read, J. *J. Chem. Soc.* 1936, 1598.

(35) Kamagapushna, D.; Ramamurthy, V.; Venkatesan, K. *Acta Crystallogr., Sect. C* 1987, 43, 1128.

(36) *Pharmaceuticals Nordica*. See also *The Merck Index*, 8th ed., pp 134




determined. They gave up the manufacture of that particular item, but are convinced that in some other locality in which there is not a trace of α -melibiose, it could be possible to crystallize the β sugar.³⁹

Similar problems arise with mannose V. Once the α anomer was obtained, recrystallization from alcohol was no longer a suitable method for purifying the β anomer,⁴⁰ which could still be obtained from the mixture by extraction at 0 °C with 80% alcohol.⁴¹

We include these two cases involving epimerization at the anomeric carbon atom as examples of polymorphism because they fit McCrone's criterion; once dissolved, α - and β -melibiose equilibrate rapidly, and so do α - and β -mannose. Of course, each pair is usually regarded as two separate, isomeric compounds. We are here in one of those borderline areas where insistence on precise definitions may not be productive.

N-(4'-Methylbenzylidene)-4-methylaniline (VI). Over the years, we have been interested in benzylideneanilines. In 1968 J.D.D. reported the cell constants of several derivatives, among them the subtitle compound.⁴² This work was repeated in J.B.'s labora-



tory in 1973.⁴³ After a break of about 8 months the original crystals did not diffract well, and recrystallization experiments were undertaken to prepare crystals suitable for structure determination. For


(39) The problem may still exist. From a survey of chemical catalogs, including those of Merck, Fluka, BDH, Aldrich, and Sigma, only the α form seems to be available.

(40) Levene, P. A. *J. Biol. Chem.* 1935, 108, 419.

(41) Powers, H. E. C. *Z. Zuckerind.* 1971, 21, 272.

nearly three years, many recrystallization experiments, often preceded by the synthesis of fresh batches of the compound, were undertaken, resulting in the discovery of two new polymorphic forms, but the original one could not be obtained.⁴⁴ Suspecting that our laboratory had been "infected" by seeds of the two newer polymorphs, we took advantage of the opening of a new laboratory about a kilometer away, to try again from scratch, using new reagents, virgin glassware, and a "new" student, whose contact with the old laboratory and its inhabitants was forbidden. The first attempt to prepare the original form under these conditions was successful.

3-Phenyl-1-p-tolylprop-2-enone (p'-Methylchalcone) (VII). Experiments made in 1988-89 at the ETH provide another example. Following earlier reports that p'-methylchalcone was polymorphic,⁴⁵ the compound was obtained with a melting point close to 55 °C (Weygand's β form).⁴⁶ This was the average




onset temperature of the melting endotherm peak in a DSC apparatus, as observed for 21 crystalline samples, recrystallized from hexane and from ethanol. One sample, prepared by sublimation, had a higher melting point of 75.5 °C (Weygand's α form). Shortly afterward, it was noticed that the melting point of a sample that had been measured three weeks earlier had increased from 54.6 to 76 °C. From then on, only the high-melting form could be obtained from numerous recrystallization experiments from a variety of solvents. Only in the DSC apparatus could the low-melting form sometimes be obtained as microcrystals, by supercooling the molten liquid, but these reverted instantly to the high-temperature form when removed from the DSC cell (which is normally covered and shielded from the atmosphere). The most likely explanation is that after the high-melting α form had been prepared, the laboratory atmosphere was contaminated by seeds of this form, which acted as catalysts for the solid-state transformation and as critical nuclei in the subsequent crystallization experiments. The same explanation had been given many years earlier by Weygand.⁴⁵ "...Die Rückverwandlung in die stabile Form erfolgt beim Berühren mit einer Spur α -Produkt fast augenblicklich, in Räumen, die mit α -Keimen infiziert sind, meist sehr bald beim blossen Stehen an der Luft."

Xylitol (VIII). Two crystalline forms of xylitol were reported in the early literature: a metastable, hygroscopic monoclinic form melting at 61 °C and a stable orthorhombic form melting at 94 °C.⁴⁷ When a sample of the monoclinic form was introduced into a laboratory where the orthorhombic form had been prepared, the crystals "changed in a few days into the high-

(44) Bernstein, J.; Bar, I.; Christensen, A. *Acta Crystallogr., Sect. B* 1976, 32, 1609. Bar, I.; Bernstein, J. *Ibid.* 1977, 33, 1738; 1982, 38, 121.

(45) Weygand, F. *Monatsh. Chem.* 1909, 40, 469.



melting stable form on exposure to the air of the laboratory."⁴⁸ The crystal structure of the orthorhombic form was determined by Kim and Jeffrey,⁴⁹ who wrote: "Attempts to obtain the lower melting monoclinic form from alcoholic solutions either at room temperature or close to 0 °C have hitherto been unsuccessful. We invariably grow the orthorhombic crystals. It is interesting to note that although xylitol was first prepared as a syrup in 1891 there was no report of crystallization until fifty years later, when it was the metastable hygroscopic form that was prepared first. Having now obtained the stable form, it is difficult to recover the metastable crystals.... The availability of appropriate nuclei in the laboratory is clearly a determining factor, as is well known to carbohydrate chemists."

Concluding Remarks

While we are far from being able to present a theory of disappearing polymorphs, we hope that we have at least taken the mystery out of the phenomenon. Prospects for gaining additional control over the nucleation and growth processes are good. With the use of "tailor-made" impurities, the growth of a particular crystal form can be suppressed and thereby the growth of other forms can be promoted.⁵⁰ Generally, interest in polymorphs is on the increase, and even becoming almost fashionable, as polymorphism can be regarded as a topic in supramolecular chemistry: supramolecular isomerism, in fact.

One regular feature can be discerned. All our examples of disappearing polymorphs involve molecules that can adopt different shapes: mostly molecules with conformational freedom but some with different configurations (epimers such as α and β sugars) or different arrangements of their parts (e.g., benzocaine picrate). In solution or in the liquid phase, all these conformations will be in dynamic equilibrium. There is no reason why the conformer present in the thermodynamically stable crystal form should be the most stable conformer in solution. One can imagine that interconversion barriers run up to about 20 kcal/

mol, corresponding to interconversion rates up to a few seconds, certainly not immeasurably rapid compared with the rate of formation of critical nuclei. Thus, formation of nuclei of a stable crystal modification could easily be hampered by a low concentration of the particular conformer required, while another conformer could be incorporated in rapidly growing nuclei of a less stable crystal form. It is also possible that a metastable form (at room temperature and higher) was actually obtained as the thermodynamically stable form at somewhat lower temperature below the thermodynamic transition point. Unfortunately, we do not have the information that would be required to check all these points. In any case, we believe that once a particular polymorph has been obtained, it is *always* possible to obtain it again; it is only a matter of finding the right experimental conditions.

Postscript

A dramatic science-fictional implementation of the seeding phenomenon was presented over 30 years ago by Kurt Vonnegut, Jr., in his novel *Cat's Cradle*; the following is taken from the chapter entitled "Ice-Nine".⁵¹

"There are several ways," Dr. Breed said to me, "in which certain liquids can crystallize—can freeze—several ways in which their atoms can stack and lock in an orderly, rigid way."

That old man with spotted hands invited me to think of the several ways in which cannon balls might be stacked on a court-house lawn, of the several ways in which oranges might be packed into a crate.

"So it is with atoms in crystals, too; and two different crystals of the same substance can have quite different physical properties."

He told me about a factory that had been growing big crystals of ethylene diamine tartrate. The crystals were useful in certain manufacturing operations, he said. But one day the factory discovered that the crystals it was growing no longer had the properties desired. The atoms had begun to stack and lock—to freeze—in a different fashion. The liquid that was crystallizing hadn't changed, but the crystals it was forming were, as far as industrial applications went, pure junk.

How this had come about was a mystery. The theoretical villain, however, was what Dr. Breed called "a seed". He meant by that a tiny grain of the undesired crystal pattern. The seed, which had come from God-only-knows where, taught the atoms the novel way in which to stack and lock, to crystallize, to freeze....

J.B. is grateful to the Israel Academy of Sciences and the U.S.-Israel Binational Science Foundation, who have supported his studies of polymorphism. We both acknowledge our debt to many colleagues who have piqued our curiosity and excitement by making us aware of examples of disappearing polymorphs.

AR9400756

(48) Carlson, J. F.; Weisbrod, S. W.; Jones, F. T. *J. Am. Chem. Soc.* 1943, 65, 1777.

(49) Kim, H. S.; Jeffrey, G. A. *Acta Crystallogr., Sect. B* 1969, 25, 2607.

(50) Weisbuch, I.; Zbaida, D.; Leiserowitz, L.; Lahav, M. *J. Am. Chem. Soc.* 1987, 109, 1889.

(51) *Cat's Cradle* Copyright 1963, Kurt Vonnegut, Jr., reprinted by permission of Donald C. Farber, Attorney for Mr. Vonnegut.

216

NIT : 800176089-2

SUPLENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-106506-00012-0000

Fecha: 2009-02-05 10:55:43 Dep: 2020 NUL CREACION
Tr: 12 PATENTEDY, Lvs: 378 FASE NACIONAL
A: 140 (ELSPULSOSX)OS, CI Folios: 19

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 9 - 8,129
FECHA : FEBRERO 2 DE 2009

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	19779104	02/02/2009	29,003,000.00

CONCEPTO

RENISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LEÑAS COMERCIALES	111,000.00
	TOTAL :	\$ 111,000.00

SON: CIENTO ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL ASUNTO No.

Q10 14775-204-004-4

212
812




Fig. 30-43 Diagrama de fases para el sistema H₂O - H₂O₂ (1947)

concentración de agua en el punto V, se puede determinar a la concentración de agua en el punto V.

A 15 mm de Hg, la temperatura de ebullición del agua es de 17.5°C, que coincide al valor de ebullición observado por el autor en la cámara del cristalizador 23.5°C. De tabla de vapor correspondiente que a esa temperatura y a una presión de 15 mm Hg, la entalpía del vapor es de

$$608 \text{ cal/kg}$$

Las coordenadas del punto V, son entonces

$$H = 608 \text{ cal/kg} \quad x = 0$$

La entalpía de la alimentación, según surge del diagrama múltiple, con una concentración de 0.3 y una temperatura de 70°C es 0.

Las coordenadas del punto V (Fig. 30-43), son

$$H = 0 \text{ cal/kg} \quad x = 0.30$$

Trasamos la línea VF y buscamos su cruce con la horizontal de 22.5°C en la zona correspondiente al equilibrio entre el agua líquida cristalizada y la solución remanente. Este punto tiene por coordenadas los valores

$$H = 63.9 \text{ cal/kg} \quad x = 0.31$$

Las coordenadas correspondientes a la masa de cristales finales y a la solución saturada remanente son

$$\text{Entalpía} \quad H = 21.5 \text{ cal/kg} \\ x = 0.448$$

$$\text{solución} \quad H = 25 \text{ cal/kg} \\ x = 0.276$$

La masa de suspensión puede obtenerse a través del siguiente cálculo:

$$30,000 \times 0.3 = 35 \times 0.33 \\ M = 27,273 \text{ kg/h}$$

La masa de vapor saturado será

$$30,000 \times 0.27273 = 8,182 \text{ kg/h}$$

Las masas de cristales y solución final resultan de

$$27,273 \times 0.33 = 9,080 \text{ kg/h} \quad 8,182 \times 0.33 = 2,700 \text{ kg/h}$$

resultando, nos queda

$$S = 12,204 \text{ kg/h} \\ C = 8,068 \text{ kg/h}$$

A los mismos resultados también se llega por camino de segmentos y aplicación de la regla de 70 puntos

$$\frac{3}{C} = \frac{13}{51} \frac{S}{S+C} = \frac{13}{44} = 0.29545$$

$$S = 27,273 \times 0.29545 = 8,067 \text{ kg/h} \\ C = 12,204 \text{ kg/h}$$

30.9. POLIMORFISMO

En la época en que Haas, Meinel y otros establecieron las leyes que rigen la cristalización, se pensó que cada combinación química cristaliza de una sola manera. La experiencia demostró lo contrario que se demostró por las dos formas del carbonato de calcio (calcita y aragonita). A poco, Minchewitch demostró, sin lugar a dudas, que el fosfato monomérico monohidratado puede cristalizar en dos formas diferentes. Desde entonces se ha aceptado el concepto de polimorfismo. En la actualidad son conocidas las estructuras químicas de sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas, que presentan polimorfismo. O sea, sustancias que son capaces de presentarse al estado sólido bajo distintas formas cristalinas o amorfas.

El fundamento mismo de esta propiedad surge de la estructura molecular, con distintos tipos de enlaces químicos entre los átomos de la molécula. En los casos de los elementos, igualmente prevalecen en las propiedades del punto de transformación, van a llevar a cristales de configuración también diversa. Serán distintos los puntos de fusión, solubilidad, densidad, dureza, propiedades ópticas y eléctricas, presión de vapor, etc., y como resultado directo de esa diversidad, existirá en sus aplicaciones farmacológicas consecuencias farmacológicas diferentes. Se veían así alteradas propiedades tan importantes como la absorción de los medicamentos por el organismo, estrecha mente ligada a la velocidad de disolución, lo mismo que los niveles en sangre y la velocidad de eliminación urinaria. La velocidad de hidrólisis en función de su distinta reactividad química y biológica y, por último, la estabilidad.



Figura 1
Superficie de metal



Figura 2
Superficie recubierta de óxido de hierro

Figura 3
Superficie recubierta de óxido de hierro

La corrosión es un fenómeno que se produce en la superficie de los metales, debido a la acción de los agentes oxidantes presentes en el medio ambiente. Este proceso puede ser acelerado por la presencia de impurezas en el metal o por la formación de películas de óxido que facilitan la penetración de los agentes oxidantes.

Factores que influyen

La corrosión es un fenómeno que depende de muchos factores, entre los que se encuentran: la naturaleza del metal, la naturaleza del medio ambiente, la temperatura, la humedad, la presencia de impurezas, etc.

El tipo de metal que se utiliza es un factor muy importante en la corrosión. Algunos metales son más resistentes a la corrosión que otros, debido a su estructura atómica y a la formación de películas de óxido que los protegen.

La temperatura también influye en la corrosión. Generalmente, a mayor temperatura, mayor es la velocidad de corrosión. Esto se debe a que a mayor temperatura, mayor es la energía cinética de las partículas, lo que facilita la penetración de los agentes oxidantes.




Figura 4
Relación entre la concentración de un agente oxidante y la velocidad de corrosión




Figura 5
Relación entre la concentración de un agente oxidante y la velocidad de corrosión

La humedad también influye en la corrosión. Generalmente, a mayor humedad, mayor es la velocidad de corrosión. Esto se debe a que a mayor humedad, mayor es la cantidad de agua disponible para la reacción de corrosión.

La presencia de impurezas en el metal también influye en la corrosión. Algunas impurezas pueden actuar como catalizadores de la corrosión, acelerando el proceso.

La corrosión es un fenómeno que puede ser evitado o retardado mediante el uso de recubrimientos protectores, la selección de materiales adecuados, el control del medio ambiente, etc.

El estudio de la corrosión es muy importante para la selección de materiales y para el diseño de estructuras que estarán expuestas a condiciones de corrosión.

La corrosión es un fenómeno que puede ser evitado o retardado mediante el uso de recubrimientos protectores, la selección de materiales adecuados, el control del medio ambiente, etc.

La corrosión es un fenómeno que puede ser evitado o retardado mediante el uso de recubrimientos protectores, la selección de materiales adecuados, el control del medio ambiente, etc.

La corrosión es un fenómeno que puede ser evitado o retardado mediante el uso de recubrimientos protectores, la selección de materiales adecuados, el control del medio ambiente, etc.




Fig. 21.2. Dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero.

Una vez se ha establecido que un fenómeno químico es de tipo cinético, se debe determinar si se trata de un fenómeno de tipo cinético o de tipo termodinámico. Cada uno de estos fenómenos tiene características propias que permiten identificarlos. Los fenómenos cinéticos se caracterizan por ser fenómenos que dependen de la velocidad de reacción, mientras que los fenómenos termodinámicos dependen de la energía libre de Gibbs. En este caso, se trata de un fenómeno cinético, ya que la velocidad de reacción depende de la concentración de monómero.

Los resultados de la cinética de la reacción de polimerización se pueden representar gráficamente de varias maneras. Una de las más comunes es la representación de la velocidad de reacción en función de la concentración de monómero. En este caso, se obtiene una curva que inicialmente aumenta y luego se vuelve a disminuir, lo que indica que la reacción es de tipo cinético.

En la figura 21.2 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.3 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.4 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.5 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.6 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.7 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.8 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.9 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.




Fig. 21.3. Dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero.

En la figura 21.4 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.5 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.6 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.

En la figura 21.7 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.




Fig. 21.4. Dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero.

En la figura 21.5 se muestra la dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero para dos temperaturas diferentes: 40°C y 50°C. Se puede observar que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura.




Fig. 21.6. Dependencia de la velocidad de reacción de la concentración de monómero.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO
Apoderado

ASUNTO	Radicación	06-106506
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	230

08810

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒ Cap. II ☐
No. Sol. Internacional		PCT/US2005/013146	
Fecha de Presentación Internat.		2005/04/18	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios: 20 a 27
Reivindicaciones:	Folios 28 a 30 como se radicó inicialmente Folio 207 modificadas como respuesta a los oposidores.
Oposiciones:	Folios 58 a 69 y 83 y 102 Nombre(s) del opositor(es) GYNOPHARM S.A. TECNOQUIMICAS S.A. LAFRANCOL S.A.

Prioridad: Fecha: 2004/04/20, país: US y número: 60/563.796

Respuesta del solicitante: Folios: 198 a 205 Defensa por las oposiciones

0 Obiecte de la invenție

226

- Título de la solicitud: Formas polimórficas de hidrobromuro acetato de metil(+)-(S)-alfa-(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-C]piridina-5(4H), hidrobromuro de clopidrogel. Número de folio:1

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de nuevas formas polimórficas de clopidrogel.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona formas polimórficas B, C y D de hidrobromuro acetato de metil(+)-(S)-alfa-(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-C]piridina-5(4H), hidrobromuro de clopidrogel

Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K 31/4365

3. Análisis de la(s) Oposición(es): (artículo 43 D. 486):

Después de la lectura de los argumentos presentados por parte de los 3 opositores así como de la respuesta por parte del solicitante se concluye lo siguiente:

La oposición presentada por GYNOPHARM S.A. se fundamenta en que:

El documento US4847265 (D1) revela en la descripción un enantiómero dextrógiro, un proceso para la preparación de compuestos y sus composiciones, en el ej 1(f), col 6, ln 64 a col 7 ln 14 y reivindicación 4 define formas polimórfas de hidrobromuro de clopidogrel y su uso como inhibidor de la acumulación plaquetaria. Las formas polimórfas de la presente solicitud no son claramente distinguibles de las sales de hidrobromuro de acuerdo al ej 1(f) de D1, cl 6, ln 64. Los puntos de fusión dados en las reivindicaciones no son claramente distinguibles de los polimorfos desde el segundo producto de hidrobromuro de D1 que tiene un punto de fusión de 140°C según el ej 1(f), col 7, ln 9-13. Por lo tanto no hay novedad.

A partir de D1 ya era conocido un proceso para preparar formas polimórfas de hidrobromuro de clopidogrel o su sal.

La oposición presentada por TECNOQUIMICAS S.A. se fundamenta en que:

El polimorfismo es la capacidad de cualquier elemento o compuesto de cristalizar en mas de un sistema cristalino. Como el tema del polimorfismo es un tema ampliamente divulgado y discutido, es necesario recordar que, el descubrimiento del polimorfismo como propiedad de las entidades químicas se atribuye a Klaproth en 1798, así mismo, la tesis según la cual los mismos elementos químicos pueden adoptar formas sólidas diversas y mostrar propiedades físicas diferentes, se atribuye a Thénard 1777-1857 y Biot 1774-1862, lo que indiscutiblemente demuestra que el encontrar o el atribuir a un compuesto nuevas formas polimórficas no es algo que se conozca recientemente, es una propiedad inherente de la molécula y está influenciada por el medio y las condiciones en que se encuentre. De igual manera, la caracterización de dicha forma cristalina, dada por los patrones de difracción de rayos X en polvo carece de nivel inventivo

227

227

caracterización por difracción de Rx son una manifestación del comportamiento natural de una molécula, en función de las condiciones ambientales y demás variables a que sea sometida, incluyendo desde luego la orientación e intensidad de los rayos, sin que dichos resultados constituyan de manera alguna aporte inventivo de quien realiza el procedimiento de identificación.

El documento US4847265 (D1) revela formas enantioméricas acetate hidrogenosulfato, taurocolato y bromhidrato dextrorrotatorias de clopidogrel y sus sales cuya actividad es la inhibición de la agregación plaquetaria obtenidas de manera convencional mediante la reacción de un ácido sobre una base en solución en un solvente adecuado y posterior precipitación espontánea o luego de la adición de un no-solvente. Se describe claramente la obtención del bromhidrato de clopidogrel dextrorrotatorio (col 6, ln 64 a col 7 ln 13). Por lo tanto la solicitud carece de novedad ya que se está frente a la misma sustancia, es decir, en los dos casos se revela la forma dextro-rotatoria del compuesto. Si la novedad está dada en que la solicitud colombiana se refiere a las formas B, C y D, se hace notar que la anterioridad tiene un punto de fusión para el bromhidrato de clopidogrel de 140°C, el cual es idéntico ya que está dentro del rango propuesto en las reivindicaciones 5 - 12 de la solicitud (140°C-143°C forma B y 138°C-148°C forma C), lo que llevaría a pensar que se trata de la misma sustancia, independientemente de la nomenclatura que se le haya dado a dicha forma polimórfica, o se esperaría de forma implícita que, el bromhidrato de clopidogrel dextrorrotatorio pudiera generar o dar lugar a distintas formas polimórficas.

Así mismo, es importante resaltar que la solicitud no resalta el efecto inesperado de tales polimorfos dentro de una formulación con respecto a las formas ya existentes. La formación de sales es un recurso que es ampliamente reconocido en la industria farmacéutica y se aplica sobre diversos compuestos ya sea para modificar sus características de estabilidad durante el proceso de producción, de estabilidad en la formulación, de solubilidad, de biodisponibilidad o de cualquier otro tipo de consideraciones biofarmacéuticas que deban ser tenidas en cuenta para asegurar la efectividad y seguridad del medicamento.

Cualquier persona medianamente versada en la materia reconoce, que el compuesto debido a su actividad antiagregaria sobre las plaquetas es utilizado y formulado con bastante anterioridad para este y otros tipos de trastornos cardiovasculares relacionados. Prueba de esto es la amplia cantidad de información de carácter científico que demuestra la aplicación de clopidogrel en este tipo de trastorno (el opositor relaciona varias publicaciones al respecto).

Así mismo en el FDA Electronic orange book se puede apreciar que se han probado formulaciones farmacéuticas de clopidogrel en su forma de sal bisulfato.

La oposición presentada por LAFRANCOL S.A. se fundamenta en los mismos argumentos exactos correspondientes a la oposición de TECNOQUIMICAS S.A.

El solicitante argumenta en su respuesta a las oposiciones el documento citado describe el enantiómero dextrorrotatorio de clopidogrel ilustrado a través de

228
~~278~~

reivindicada.

Dice el solicitante que "el polimorfismo es la capacidad de un compuesto para cristalizarse en más de un tipo de sistema cristalino, pero el sistema cristalino específico en el cual cristaliza un compuesto dado no es predecible. Como ilustración de la no-obviedad de la existencia de las formas poliméricas puede consultarse el artículo "Disappearing Polymorphs" de Dunitz y Bernstein y que se presenta como anexo junto con este memorial. Nótese en particular en la página 96, segunda columna, el compuesto 1,2,3,5-tetra-O-acetil-3-β-D-ribonufuranosa, la historia de este compuesto es inesperada, ya que se obtienen dos formas polimórficas en dos lugares diferentes. Con el fin de identificar el sistema cristalino de un compuesto dado, se debe obtener de manera separada para su caracterización. Las formas polimórficas de la presente aplicación exhiben características que son útiles en la industria farmacéutica. Tales como la no higroscopia y la estabilidad. A partir del estado del arte no es posible predecir la forma polimórfica y las propiedades fisicoquímicas que serán obtenidas por medio de un proceso específico. A este respecto, se debe tener en cuenta que tratándose de patentes, el resultado al que se pretende llegar es siempre conocido, por cuanto es la solución al problema técnico planteado. Por lo tanto, el conocimiento de que un compuesto presente polimorfismo no impide considerar una forma cristalina específica como carente de novedad y de nivel inventivo. En efecto, solamente la constatación de que dicha forma cristalina ya había sido revelada y/o sugerida con anterioridad es lo que permitiría a un examinador de patentes objetar su novedad y nivel inventivo. Así entonces, la constatación de que el polimorfismo existe no puede, como en el presente caso, ser fundamento válido de una oposición. Más aún, toda vez que en las oposiciones presentadas no se demostró que la presente invención ya había sido enseñada o sugerida con anterioridad, las mismas carecen de fundamento válido para impedir la patentabilidad del presente invento.

En respuesta a las oposiciones, el solicitante presenta modificaciones en el capítulo reivindicatorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las oposiciones se demuestra que anterior a la fecha de prioridad reivindicada, el estado de la técnica muestra de manera clara la carencia de nivel inventivo de las formas polimórficas reivindicadas.

En cuanto a la respuesta del solicitante, si bien las formas polimórficas se consideran nuevas, es claro que éste sí se ven afectadas por el documento US4847265 (D1).

En conclusión, el documento US4847265 (D1) presentado en las oposiciones es relevante y se tendrá en cuenta para la evaluación de la patentabilidad de la presente solicitud.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 2004/04/20

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D ₁	US4847265	DEXTRO ROTATORY ENANTIOMER OF METHYL ALPHA-5 (4,5,6,7-TETRAHYDRO (3,2-C) THIENO PYRIDYL) (2-CHLOROPHENYL)-ACETATE AND THE PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS CONTAINING IT	1989/07/11
D ₂	LIBRO	Remington de farmacia	1995/12/31
D ₃	LIBRO	Farmacotecnica teórica y practica	1980/12/31

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente Solicitud de Patente reivindica

(1 - 4): forma polimórfica D del hidrobromuro de acetato de metil (+)-(S)- α -(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno [3,2-C] piridina-5(4H):

Dicha forma polimórfica D está afectada por los siguientes documentos del Estado de la Técnica:

D₁ que enseña en la descripción un enantiómero dextrógiro acetate hidrogenosulfato, taurocolato y bromhidrato dextrorrotatorias de clopidogrel y sus sales, un proceso para la preparación de compuestos obtenidos de manera convencional mediante la reacción de un ácido sobre una base en solución en un solvente adecuado y posterior precipitación espontánea o luego de la adición de un no-solvente y sus composiciones. Se describe claramente la obtención del bromhidrato de clopidogrel dextrorrotatorio (col 6, ln 64 a col 7 ln 13). En el ej 1(f), col 6, ln 64 a col 7 ln 14 y reivindicación 4 define formas polimorfas de hidrobromuro de clopidogrel y su uso como inhibidor de la acumulación plaquetaria. Se enseña el punto de fusión para el bromhidrato de clopidogrel de 140°C.

D₂ y D₃ enseñan el fenómeno del polimorfismo en los compuestos de origen farmacéutico y la importancia de determinarlo para llegar a materias primas aceptables para su formulación a nivel industrial.

La única diferencia con D₁ es que esta solicitud enseña la forma polimérica D de hidrobromuro de clopidogrel.

No puede determinarse un efecto técnico que logre la diferencia con la anterioridad encontrada porque la descripción no muestra un efecto inesperado contra lo previamente conocido.

El Problema Técnico Obetivo se puede definir en como lograr polimorfos

230
230

Por tanto, la solicitud, tal como se reivindica, es obvia, porque el experto medio en la materia enfrentado al problema de conseguir polimorfos para el clopidogrel y conociendo que en el estado de la técnica ya se había comprobado que dicho compuesto tenía la posibilidad del polimorfismo haría lo que dice en D1 mediante los conocimientos básicos en la materia enseñados por D2 y D3 logrando así lo reivindicado.

En conclusión, no se considera que la presente solicitud merezca reconocimiento de nivel inventivo.


6. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D ₁	US4847265	1-4	NIVEL INVENTIVO
D ₂	LIBRO	1-4	NIVEL INVENTIVO
D ₃	LIBRO	1-4	NIVEL INVENTIVO

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única Nº 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

09 JUL. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1135	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202087
-------------------------------------	--