

PETITORIO

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

PCT

ENTRADA EN FASE NACIONAL

14-Dic-06

SOLICITUD DE:

☒ Patente de Invención

Patente de Modelo de Utilidad

☒ Capítulo I

Capítulo II

**SOLICITANTE** (71) Nombre: **IMMUNOGEN, INC.**  
Dirección: **128 Sidney Street**  
Teléfono: **3132408** Fax: **3131647**  
Domicilio: **CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
Lugar de constitución: **MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**REPRESENTANTE** (74) Nombre: **HUMBERTO RUBIO CAMACHO** IDENTIFICACIÓN  
**O APODERADO** Dirección: **Carrera 7 No. 74 - 64, Of. 506 C.C. No. 17'192.062 de Bogotá**  
Teléfono: **3132408** Fax: **3131647** T.P. **50.007 CSJ**

**INVENTOR(ES)** (72) Nombre: **Erkan BALOGLU**  
Dirección: **8 Benjamin Terrace, Stoneham**  
Teléfono: **3132408** Fax: **3131647**  
E-mail:  
Domicilio: **MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

PCT (86)

Solicitud Internacional No. **PCT/US2005/016497** Fecha **11 DE MAYO DE 2.005**

Publicación Internacional No. **WO 2005/113528** Fecha **01 DE DICIEMBRE DE 2.005**

**TITULO (54)** "UN METODO FACIL PARA SINTETIZAR COMPUESTOS DE BACATINA III"

Clasificación **A61K 31/357** Internacional **C07D 305/34** (51)  
**A61P 20/00**

Prioridad (33) País de origen (32) Fecha (31) Número de Solicitud

**SIX NO** **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** **14 DE MAYO DE 2.004** **60/570,834**


Comprobante de pago No. **06-82,413** Fecha: **25 DE OCTUBRE DE 2.006**

cpfm

## ANEXOS

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☒ Documento que acredita la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica. *Se adjunta copia simple. Copia autentica reposa en el Exp. 06-046.036*
- ☒ Poderes, si fuere el caso. *Se adjunta copia simple. Copia autentica reposa en el Exp. 06-046.036*
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☐ Declaraciones
- ☒ Copia de la publicación PCT
- ☒ Copia informe búsqueda internacional.
- ☐ Copia de la solicitud internacional. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)
- ☐ Traducción de la solicitud internacional al castellano. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)
- ☐ Copia del examen preliminar internacional efectuado por la Autoridad Internacional de Examen Preliminar (IPEA).
- ☐ Traducción del examen preliminar internacional efectuado por la IPEA.
- ☐ Copia de las modificaciones efectuadas de acuerdo con el Artículo 28 PCT en Fase Nacional.
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico.
- ☒ Arte final 12 x 12
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.
- ☐ De ser el caso, modificaciones efectuadas a la solicitud internacional.
- ☐ Otros

(11) Figura característica:



(12)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

FIRMA

*[Handwritten signature]*

C.C.

17'192.062 de Bogotá

T.P.

50.007 Consejo Superior de  
La Judicatura

43  
PARA USO EXCLUSIVO DE  
HUMBERTO RUBIO & CIA. LTDA

**REGISTRO  
PATENTE DE INVENCIÓN: "UN METODO  
FACIL PARA SINTETIZAR COMPUESTOS DE  
BACATINA III"**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 300070007-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Rad: 06-108806- -00000-0000  
Fec: 2006-10-25 09:41:50 Dep. 2020 NUECREACIONES  
Tm. 11 PATENTEIYII  
Eve. 378 FASENACIONALI  
Act 411 PRESENTACION Folio 6: 54

RECIBO OFICIAL DE CAJA . 00 . 62.411  
FECHA : OCTUBRE 25 DE 2006

\*\*\*\*\* DECLARACION \*\*\*\*\*

| DEBITANTE                            | TIPO PAGO     | BANCO       | CUENTA   | N.º        | FECHA PAGO   | VALOR |
|--------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------|--------------|-------|
| HUMBERTO RUBIO ABOGADOS LEGALIZACION | BANCO POPULAR | 050-00110-6 | 21141-40 | 25/10/2006 | 1,447,000.00 |       |

\*\*\*\*\* C O N C E P T O \*\*\*\*\*

| CONCEPTO                            | TOTAL CONCEPTO |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. TRAMITE DE SOL. DE PATENTE DE IN | 447,000.00     |
| TOTAL :                             | 447,000.00     |

CON: CUATROCIENTOS CIENTO Y TRES MIL PESOS

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE N.º: \_\_\_\_\_

*The Commonwealth of Massachusetts*

William Francis Galvin  
Secretary of the Commonwealth

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

*This public document*

2. has been signed by: Kelly Donnelly

3. acting in the capacity of: Notary Public

4. bears the seal/stamp of:

the State of Massachusetts, whose commission expires on July 18, 2008

**Certified**

5. at: Boston, Massachusetts

6. the: 16 March, 2005

7. by: the Secretary of the Commonwealth

8. No.: 1055182


9. Seal/stamp:

*Great Seal of the Commonwealth*

10. Signature:

*William Francis Galvin*

William Francis Galvin  
Secretary of the Commonwealth



5 f

**HUMBERTO RUBIO & CIA LTDA.**  
**ABOGADOS**

**PODER**

El abajo firmado, en nombre y representación de

**IMMUNOGEN, INC.**

Domiciliado en:

*128 Sidney Street, Cambridge,  
Massachusetts, Estados Unidos  
de América.*

por el presente conferimos poder amplio y suficiente a HUMBERTO RUBIO CAMACHO y/o TINEKE STOL TERZANI y/o HUMBERTO RUBIO STOL y/o ALVARO DIAZ LOZANO y/o MARCELA GOMEZ RUBIO domiciliados en Bogotá, Colombia, para solicitar de las oficinas y autoridades correspondientes la obtención de registros, renovaciones, trasposos y en general todo lo relacionado con el mantenimiento, obtención y protección de sus marcas de fábrica, denominaciones comerciales, marcas de comercio y patentes, licencias sanitarias a cuyo efecto le faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios en cumplimiento del objeto indicado; elevar solicitudes, descripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos; abonar todos los impuestos y cuotas de cualquier otros pagos determinados por la Ley; recibir todos los documentos presentados, solicitar testimonios, desistir y enmendar solicitudes, cobrar y percibir para oponerse y protestar contra cualquier solicitud, que a juicio del apoderado, pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier modo perjudicar las marcas, denominaciones o patentes del Mandante. A los mandatarios se les otorga autorización amplia y bastante para contestar todos los reclamos y las demandas presentadas ante autoridades administrativas y judiciales, desistir de procedimientos, transar conflictos, pudiendo así mismo sustituir este Poder en todo o en parte y revocar dichas sustituciones.

Dado y firmado hoy

En

Firma(s)/ Signature(s)

*W. Blattler*  
Walter A. Blattler, ~~Vice President, Research~~

Nombre de cada firmante/  
Name of each signor

*Executive Vice President,  
Science and Technology*

Cargo de cada firmante/  
Position of each signor

**POWER OF ATTORNEY**

The undersigned, in the name and on behalf of

**IMMUNOGEN, INC.**

with domicile at:

128 Sidney Street  
Cambridge, MA 02139-4239, US

hereby grant full and sufficient Power of Attorney to a HUMBERTO RUBIO CAMACHO y/o TINEKE STOL TERZANI y/o HUMBERTO RUBIO STOL y/o ALVARO DIAZ LOZANO y/o MARCELA GOMEZ RUBIO from Bogotá, Colombia, to apply to the proper officers and authorities for the issue of registrations, renewals, assignments, proofs of renewals and in general all that is related to the maintenance, obtention and protection of its trademarks, tradenames, commercial marks, patents and sanitary licenses; to which end it empowers them to take all steps necessary before said authorities for the object stated; to file petitions, prepare descriptions; make protests, declarations, appeals and objections; pay taxes and other charges required by law; apply for certifications, receive documents and take testimony abandon and amend applications and collect refunds; to oppose, ask for the cancellation of and protest any application or registration which in their judgment could lend to confusion or could be considered an infringement or could in any form prejudice the undersigned's trademarks, tradenames, patents and commercial marks. To the said mandatory sufficient Power is granted hereby to answer in the matter of all claims and demands that maybe presented, before administrative or judicial officers of any class, giving them likewise Power to abandon proceeding, settle conflicts, substitute these present in whole or in part and revoke such substitutions.

Given and signed this

in Cambridge, MA, USA

6 \*

HUMBERTO RUBIO & CIA LTDA.  
ABOGADOS

**CERTIFICADO NOTARIAL (Individuo)**

A los            días del mes de            ante mi,  
Notario Público de compareció personalmente

a quien(es) doy fe de conocer y me consta que  
es(son) la(s) persona(s) firmante(s) del documento  
que precede, y quien(es) tiene(n) capacidad legal para  
otorgarlo.

**CERTIFICADO NOTARIAL (SOCIEDAD)**

Hoy 8 de Mayo de 2005  
compareció(eron) personalmente

Walter A Blattler

a quien(es) conozco como la(s) persona(s) que  
firma(n) este documento en representación de la  
sociedad/compañía denominada

IMMUNOGEN, INC.

Certifico:

a) Que

IMMUNOGEN, INC.

es una sociedad/compañía legalmente constituida y  
existente de acuerdo con las Leyes de U.S.A.

b) Que el domicilio de dicha sociedad/compañía es

128 Sidney Street, Cambridge

Massachusetts U.S.A.

c) Que el objeto u objetos para los cuales se otorga el  
presente poder están comprendidos dentro del objeto  
social de la mencionada sociedad/compañía.

d) Que

Walter A Blattler

está autorizado para otorgar el presente poder. Lo  
anterior está probado por medio de los documentos.  
que certifico he visto.

Ciudad            hoy 8 de Mayo  
de 2005.

**NOTARIAL CERTIFICATE (Individual)**

On this 8 day of March before me, a Notary  
Public of Massachusetts personally appeared to

me known, and known to me to be the person(s) who  
executed that foregoing document, and who has  
(have) legal capacity to execute it.

**NOTARIAL CERTIFICATE (Corporation)**

On this 8 day of March, 2005  
personally appeared Walter Blattler

whom I know to be the person(s) who signed this  
document as representative(s) of the  
corporation/company named

ImmunoGen, Inc.

I Certify:

a) That

ImmunoGen, Inc.

is a corporation/company legally constituted and in  
existence accordance with the law of U.S.A.

b) That the domicile of said corporation/company is

c) That the purpose or purposes for which the present  
Power of Attorney is granted are compromised  
within the object set forth in the charter of the  
mentioned corporation/company.

d) That Mr(s).

Walter Blattler Ph.D.

is authorized to grant the present Power of Attorney.  
The aforementioned was duly proven through the  
documents and I duly verify having seen them.  
State MA

This 8 day of March, 2005

Kelly A. Donnelly

7-18-08 Commission

8  
2

TRADUCCION OFICIAL No. 064-05, DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS, SELLADO CON EL SELLO DEL SUSCRITO TRADUCTOR OFICIAL, HOY MARZO 28, 2005, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., REPUBLICA DE COLOMBIA.

La Comunidad de Massachusetts  
William Francis Galvin  
Secretario de la Comunidad  
Apostilla  
(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

1. Ciudad: Estados Unidos de América  
Este documento publico
2. Ha sido firmado por: KELLY DONNELLY
3. Actuando como: NOTARIO PUBLICO
4. Porta el sello y estampilla de:  
El Estado de Massachusetts, cuyo nombramiento vence Julio 18. 2008

#### CERTIFICADO

5. En: Boston-Massachusetts
6. El 16 de Marzo del 2005
7. por: el Secretario de la Comunidad
8. No. 1055182
9. Sello y estampilla:
10. Firma:

Gran Sello de la Comunidad

William Francis Galvin  
Secretario de la Comunidad

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
BOGOTÁ D.C.  
2005 MAR 28 A P 46  
Jefe de LEGALIZACIONES  
BOGOTÁ D.C.

30/03/05  
Sergio Cloutier Latorre  
BOGOTÁ D.C.  
DOCUMENTO DESAMPARADO  
LAS FUNCIONES INDICADAS

Sergio Cloutier Latorre Mendoza  
Traductor e Interprete Oficial  
Resol. No. 2839 Minjusticia 1991

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property  
Organization  
International Bureau



(43) International Publication Date  
1 December 2005 (01.12.2005)

PCT

(10) International Publication Number  
WO 2005/113528 A1

(51) International Patent Classification<sup>7</sup>: C07D 305/14

(21) International Application Number:  
PCT/US2005/016497

(22) International Filing Date: 11 May 2005 (11.05.2005)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:  
60/570,834 14 May 2004 (14.05.2004) US

(71) Applicant (for all designated States except US): IM-  
MUNOGEN, INC. [US/US]; 128 Sidney Street, Cam-  
bridge, MA 02139-4239 (US).

(72) Inventor; and

(75) Inventor/Applicant (for US only): BALOGLU, Erkan  
[TR/US]; 8 Benjamin Terrace, Stoneham, MA 02180 (US).

(74) Agents: MACK, Susan, J. et al.; Sughrue Mion, PLLC,  
2100 Pennsylvania Ave., N.W., Suite 800, Washington, DC  
20037-3213 (US).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every  
kind of national protection available): AE, AG, AL, AM,

AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,  
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,  
MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,  
OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,  
VN, YU, ZA, ZM, ZW.


(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every  
kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,  
ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  
European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO,  
SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,  
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

- with international search report
- before the expiration of the time limit for amending the  
claims and to be republished in the event of receipt of  
amendments

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guid-  
ance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the begin-  
ning of each regular issue of the PCT Gazette.

(54) Title: A FACILE METHOD FOR SYNTHESIZING BACCATIN III COMPOUNDS



(57) Abstract: A process for synthesizing a C-7 protected baccatin III compound represented by formula (A), which comprises reacting a 10-deacetylbaccatin III compound represented by formula (B) with a protecting agent and an acylating agent in the presence of a secondary amine and a nitrogen-containing compound. Also, a process for synthesizing a C-7 protected 10-deacetylbaccatin III compound represented by formula (C), which comprises reacting a 10-deacetylbaccatin III compound represented by formula (B) with a protecting agent in the presence of a secondary amine and a nitrogen-containing compound. In both processes the nitrogen-containing compound is selected from a nitrogen-containing heterocycle or a trialkylamine. When the nitrogen-containing heterocycle is selected, it may be an unsubstituted or a substituted pyridine or an unsubstituted or a substituted pyrazine. When a trialkylamine is selected, it may be, for example, triethylamine or diisopropylethylamine. (A, B, C) wherein PG<sub>1</sub> represents the organic residue of the protecting agent, PG<sub>2</sub> represents the organic residue of the acylating agent, and R represents a simple or substituted aryl group or a heterocyclic group.

WO 2005/113528 A1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US05/16497

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC(7) : C07D 305/14

US CL : 549/510

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

U.S. : 549/510

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
CAS ONLINE-search terms:pyridine, secondary amine, trialkylamine, 10-deacetylbaecatin III, triethylsilyl, imidazole

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| X          | US 6,706,896 B1 (HOLTON et al) 16 March 2004 (16.03.2004),column 13,lines 1-27.    | 39-69                 |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Special categories of cited documents:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance                                                                | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention                                              |
| "B" earlier application or patent published on or after the international filing date                                                                                   | "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone                                                                     |
| "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) | "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means                                                                                            | "A" document member of the same patent family                                                                                                                                                                                                    |
| "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Date of the actual completion of the international search

23 August 2005 (23.08.2005)

Date of mailing of the international search report

19 SEP 2005

Name and mailing address of the ISA/US

Mail Stop PCT, Attn: ISA/US  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, Virginia 22313-1450

Facsimile No. (703) 305-3230

Authorized officer

Bernard Dentz

Telephone No. 571 272-1600

**UN METODO FACIL PARA SINTETIZAR COMPUESTOS DE BACATINA III**


Esta solicitud reclama el beneficio de la solicitud provisional de los Estados Unidos No. 60/570,834, presentada el 14 de mayo del 2004, la descripción completa de la cual está expresamente incorporada aquí mediante referencia.

**CAMPO DE LA INVENCION**

La presente invención se refiere a un procedimiento para la síntesis de compuesto de bacatina III. Estos compuestos son precursores útiles para la síntesis de taxoides. La presente invención también se refiere a un procedimiento para la síntesis de un intermediario para los compuestos de bacatina III.


**ANTECEDENTES DE LA INVENCION**

Los diterpenoides de taxano o taxoides son de gran interés debido a sus potentes actividades anti-tumor de dos miembros de esta familia, el producto natural paclitaxel (Taxol™, 1) y su análogo semi-sintético docetaxel (Taxotere™, 2).




Paclitaxel primero se aisló de la corteza del árbol de tejo del pacífico (*Taxus brevifolia*), con rendimientos muy bajos. Subsiguientemente, se reportó una ruta semi-

sintética para paclitaxel de un producto natural más fácilmente disponible, 10-deacetilbacatina III (3).



3


Para síntesis de taxoides, la cadena lateral C-13 se sintetizó separadamente y se acopló a bacatina adecuadamente modificada, principalmente, derivado de 10-deacetilbacatina III (3), en donde los grupos hidroxilo C-7 y el C-10 se protegieron selectivamente, de tal forma que el único lugar para el acoplamiento podría ser a través del grupo C-13 hidroxilo. El grupo protector utilizado para el grupo C-7 hidroxilo usualmente es el grupo trietilsililo (TES), mientras la posición C-10 está protegida según su éster de acetato para dar 7-trietilsililbacatina III (5).



5

En 10-deacetilbacatina III (3), el grupo C-1 hidroxilo terciario estéricamente inhibido es menos efectivo, seguido por el grupo C-13 hidroxilo. El grupo C-7 hidroxilo es más fácil de acceder y por lo tanto más reactivo que el grupo C-10 hidroxilo.

Como resultado de la reactividad más alta del grupo hidroxilo en la posición C-7, se han dirigido intentos para la conversión de 10-deacetilbacatina III (3) a bacatina III (4) o 7-trietilsililbacatina III (5) para la protección del grupo hidroxilo en la posición C-7 primero, usualmente en la forma de su éster de dietilsililo, según se reporta en Denis y otros (*J. Am. Chem. Soc.*, 1988, 110, 5917). Esto fue seguido por la acilación en la posición C-10. De acuerdo con este reporte, se utilizó una cantidad en exceso de clorotrietilsilano y piridina. El tiempo de reacción fue de 20 horas para la protección del grupo C-7 hidroxilo según su éster de trietilsililo, y 48 horas para la protección del C-10 hidroxilo como su éster de acetato.



4

Se reportó un método similar a través de Bastart y otros (WO 95/26967), excepto que esta vez se reportó una temperatura más baja (5°C) y un tiempo de reacción aún más largo (40 horas) para la protección de C-7 hidroxilo y su éster de trietilsililo, y se reportaron 48 horas para la acilación de C-10 hidroxilo.

Otro método de 2 pasos (US2002/0087013 A1) utiliza clorotrietilsilano e imidazol en dimetilformamida a 0°C en el primer paso para formar el éster trietilsililo seguido por purificación cromatográfica. El siguiente paso de acetilación se condujo a -40°C, seguido por otra purificación cromatográfica para dar 7-trietilsililbacatina III (5).

Los métodos alternativos para la producción de 7-trietilsililbacatina III (5) también se reportaron por Sist. y otros (patente de E. U. A. No. 5,914,411) y Holton y otros (*Tetrahedron Lett.*, 1998, 39, 2883). En estos procedimientos, la posición C-10 primero se

acila selectivamente, seguida por la protección del C-7 hidroxilo. Sin embargo, estos métodos tienen varias desventajas que incluyen: a) requerir dos pasos con la purificación después de cada paso, b) un tiempo de reacción más largo, y c) el potencial de una incorporación no deseada de los grupos trietilsililo simultáneamente tanto en la posición C-7 como en la posición C-10.


De esta forma, todos los métodos para incorporación de grupos protectores apropiados en las posiciones C-7 y C-10 de 10-deacetilbacatina III (3), descritas hasta ahora, involucran tiempos de reacción muy largos, utilizan reactivos en exceso, temperaturas estrictamente controladas o múltiples pasos de reacción y purificación, y la generación potencial de productos laterales indeseados, haciendo el proceso difícil y costoso de perfeccionar.

#### **BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION**


Por consiguiente, un objeto de esta invención es proveer un nuevo, útil, perfeccionable y no costoso método para la conversión de un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) a un compuesto de bacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (A), que puede ser fácilmente utilizado en procedimientos comerciales para la semi-síntesis de paclitaxel, docetaxel y otros taxoides. Otros taxoides incluyen aquellos que contienen varios grupos R que comprenden fenilo o heterociclos sustituidos. Dichos grupos R son conocidos por un experto en la técnica y se pueden encontrar, por ejemplo, en las patentes de E. U. A. Nos. 5,728,725 y 6,340,701, las descripciones de las cuales se incorporan expresamente aquí por referencia.

Otro objeto de esta invención es proveer un nuevo, útil, perfeccionable, y no costoso método para la conversión del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) a un compuesto 10-deacetilbacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (C) que puede a su vez convertirse a un compuesto de bacatina III C-7

protegido representado por la fórmula (A).




Estos y otros objetos han sido logrados a través de la provisión de un procedimiento para sintetizar un compuesto de bacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (A) que comprende la reacción de un compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente protector y un agente de acilación en la presencia de una amina secundaria y un compuesto que contiene nitrógeno. El compuesto que contiene nitrógeno se selecciona de un heterociclo que contiene nitrógeno o de una trialquilamina como se describe de forma más completa a continuación.



en donde  $PG_1$  representa el residuo orgánico del agente protector,  $PG_2$  representa el residuo orgánico del agente de acilación y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

Preferiblemente, el grupo arilo representado por R es un grupo representado por la siguiente fórmula:




en donde las R's pueden ser iguales o diferentes y cada una representa H, un grupo de extracción de electrón o un grupo de donación de electrón y n representa 0, o un entero de 1 a 3. Más preferiblemente, el grupo arilo es fenilo o fenilo sustituido.


Preferiblemente, el grupo de extracción de electrón representado por R' se selecciona del grupo que consiste de -F, -NO<sub>2</sub>, -CN, -Cl, -CHF<sub>2</sub> y -CF<sub>3</sub>, y el grupo donador de electrón representado por R' se selecciona del grupo que consiste de -NR<sub>7</sub>R<sub>8</sub> y -OR<sub>9</sub>, en donde R<sub>7</sub> y R<sub>8</sub> son iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono, y R<sub>9</sub> representa un grupo alquilo lineal y tiene de 1 a 10 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono.

R<sub>7</sub> y R<sub>8</sub> son preferiblemente iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 4 átomos de carbono. También se prefiere que R<sub>7</sub> y R<sub>8</sub> sean iguales y representen un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono. Además, más preferiblemente, el sustituyente -NR<sub>7</sub>R<sub>8</sub> se selecciona del grupo que consiste de dimetilamino, dietilamino, dipropilamino y dibutilamino, en donde la porción de propilo representa propilo o isopropilo normal, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo o isobutilo terciario. Más preferiblemente, R' es -OCH<sub>3</sub> o un cloro.

El grupo arilo representado por R es preferiblemente fenilo o fenilo sustituido, tal como metoxifenilo, dimetoxifenilo, o clorofenilo, y más preferiblemente está representado por la siguiente fórmula:



El grupo heterocíclico representado por R es un anillo de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 2 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste de oxígeno, nitrógeno, y azufre. Los ejemplos incluyen furilo, dihidrofurilo, tetrahydrofurilo, pirrolilo, pirrolidinilo, tienilo, tiazolilo, imidazolilo, piridilo, morfolinilo, piperidinilo, piperazinilo, y oxazinilo. Preferiblemente, el grupo heterocíclico representado por R es furilo o tienilo. Más preferible, el grupo heterocíclico representado por R se representa por la siguiente fórmula:



PG<sub>1</sub> es preferiblemente trialkilsililo. PG<sub>2</sub> es preferiblemente acilo. Más preferiblemente, PG<sub>1</sub> es trietilsililo y PG<sub>2</sub> es acetilo. El grupo alquilo es igual o diferente y se selecciona de metilo, etilo, propilo o butilo, en donde la porción de propilo representa propilo normal o isopropilo, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo terciario o isobutilo.

En la presente invención, el agente de protección preferiblemente es un compuesto de organosilano y más preferiblemente, un compuesto de organosilano representado por la fórmula (R')<sub>3</sub>SiX, en donde las R' pueden ser iguales o diferentes y cada una independientemente representa metilo, etilo, propilo normal, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, isobutilo o ter-butilo, y X representa un grupo saliente. Preferiblemente, el

grupo saliente representado por X es un átomo de halógeno, tosilato, mesilato, o trifluorometansulfonato. Más de preferencia, el agente protector es clorotriethylsilano.

En la presente invención, el agente de acilación preferiblemente se selecciona del grupo que consiste de haluros de acilo y anhídridos de acilo. Más preferible, el agente de acilación se selecciona del grupo de cloruro de acetilo y anhídrido acético. Más preferible, el agente de acilación es anhídrido acético.

En la presente invención, la amina secundaria preferiblemente se selecciona del grupo que consiste de imidazol, o imidazoles sustituidos, y más preferible imidazol.

En la presente invención, el compuesto que contiene nitrógeno es preferiblemente anhidro y también preferiblemente se selecciona de una trialkilamina o un heterociclo que contiene nitrógeno, preferiblemente piridina.

Ejemplos de dialquilaminas adecuados incluyen trimetilamina, trietilamina, diisopropiletilamina, tri-n-propilamina y tri-n-butilamina.


Ejemplos de heterociclos que contienen nitrógeno adecuados incluyen piridina no sustituida o sustituida tal como 2-picolina, 3-picolina, y 4-picolina y pirazina no sustituida o sustituida, tal como metilpirazina.

De acuerdo con la presente invención, la cantidad del agente protector es preferiblemente alrededor de 2 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). La cantidad del agente de acilación está preferiblemente en la escala de aproximadamente 1 a aproximadamente 20 equivalentes con base en la cantidad del compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). La cantidad de la amina secundaria preferiblemente alrededor de 1 a aproximadamente 6 equivalentes con base en la cantidad del compuesto de 10-diacetilbacatina III representado por la fórmula (B). La cantidad del compuesto que contiene nitrógeno es preferiblemente de 0.5 ml por 0.1 g del compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B).

La reacción continua suavemente a atmósfera ambiente y temperatura ambiente.


El procedimiento también se puede llevar a cabo en una atmósfera seca. El procedimiento está sustancialmente completo en menos de aproximadamente 5 horas.

La invención también provee un procedimiento para sintetizar un compuesto de 10-deacetilbacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (C) que comprende reaccionar un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente de protección en la presencia de una amina secundaria y un compuesto que contiene nitrógeno. El compuesto que contiene nitrógeno se selecciona de un heterociclo que contiene nitrógeno o una trialquilamina como se describe más completamente a continuación.



en donde  $PG_1$  representa el residuo orgánico del agente de protección, y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

Preferiblemente, el grupo arilo representado por R es un grupo representado por la siguiente fórmula:




en donde  $R'$  pueden ser iguales o diferentes y cada una representa H, un grupo de extracción de electrón o un grupo de donación de electrón, y n representa 0, o un entero de 1 a 3. Más preferiblemente, el grupo arilo representado por R es fenilo o fenilo sustituido.

Preferiblemente, el grupo de extracción de electrón representado por  $R'$  se

selecciona del grupo que consiste de  $-F$ ,  $-NO_2$ ,  $-CN$ ,  $-Cl$ ,  $-CHF_2$  y  $-CF_3$ , y el grupo donador de electrón representado por  $R'$  se selecciona del grupo que consiste de  $-NR_7R_8$  y  $-OR_9$ , en donde  $R_7$  y  $R_8$  son iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono, y  $R_9$  representa un grupo alquilo lineal y tiene de 1 a 10 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono.


$R_7$  y  $R_8$  son preferiblemente iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 4 átomos de carbono. También se prefiere que  $R_7$  y  $R_8$  sean iguales y representen un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono. Además, más preferiblemente, el sustituyente  $-NR_7R_8$  se selecciona del grupo que consiste de dimetilamino, dietilamino, dipropilamino y dibutilamino, en donde la porción de propilo representa propilo o isopropilo normal, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo terciario o isobutilo. Más preferiblemente,  $R'$  es  $-OCH_3$  o un cloro.

El grupo arilo representado por  $R$  es preferiblemente fenilo o fenilo sustituido, tal como metoxifenilo, dimetoxifenilo, o clorofenilo, y más preferiblemente está representado por la siguiente fórmula:



El grupo heterocíclico representado por  $R$  es un anillo de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 2 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste de oxígeno, nitrógeno, y

azufre. Los ejemplos incluyen furilo, dihidrofurilo, tetrahydrofurilo, pirrolilo, pirrolidinilo, tienilo, tiazolilo, imidazolilo, piridilo, morfolinilo, piperidinilo, piperazinilo, y oxazinilo. Preferiblemente, el grupo heterocíclico representado por R es furilo o tienilo. Más preferible, el grupo heterocíclico representado por R se representa por la siguiente fórmula:



PG<sub>1</sub> es preferiblemente trialquilsililo. Más preferiblemente, PG<sub>1</sub> es trietilsililo. El grupo alquilo es igual o diferente y se selecciona de metilo, etilo, propilo o butilo, en donde la porción de propilo representa propilo o isopropilo normal, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo terciario o isobutilo.

En la presente invención, el agente de protección preferiblemente es un compuesto de organosilano y más preferiblemente, un compuesto de organosilano representado por la fórmula (R'')<sub>3</sub>SiX, en donde las R'' pueden ser iguales o diferentes y cada una independientemente representa metilo, etilo, propilo normal, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, isobutilo o ter-butilo, y X representa un grupo saliente. Preferiblemente, el grupo saliente representado por X es un átomo de halógeno, tosilato, mesilato, o trifluorometansulfonato. Más de preferencia, el agente protector es clorotrietilsilano.

En la presente invención, la amina secundaria preferiblemente se selecciona del grupo que consiste de imidazol, e imidazoles sustituidos, y más preferible imidazol.

En la presente invención, el compuesto que contiene nitrógeno es preferiblemente anhidro y selecciona de una trialquilamina o un heterociclo que contiene nitrógeno, preferiblemente piridina.

Ejemplos de dialquilaminas adecuados incluyen trimetilamina, trietilamina, diisopropiletilamina, tri-n-propilamina y tri-n-butilamina.

Ejemplos de heterociclos que contienen nitrógeno adecuados incluyen piridina no sustituida o sustituida tal como 2-picolina, 3-picolina, y 4-picolina y pirazina no sustituida o sustituida, tal como metilpirazina.

De acuerdo con la presente invención, la cantidad del agente protector es preferiblemente alrededor de 2 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). La cantidad de la amina secundaria preferiblemente alrededor de 2 a aproximadamente 6 equivalentes con base en la cantidad del compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). La cantidad del compuesto que contiene nitrógeno es preferiblemente de 0.5 ml por 0.1 g del compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B).

La reacción continua suavemente a atmósfera ambiente y temperatura ambiente. El procedimiento también se puede llevar a cabo en una atmósfera seca. El procedimiento está sustancialmente completo en menos de aproximadamente 20 minutos.

#### **BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS**

La Figura 1 describe la conversión de los compuestos de 10-deacetilbacatina III de la fórmula (B) en compuestos de bacatina III C-7 protegidos de la fórmula (A). En la fórmula A y B, PG<sub>1</sub> representa el residuo orgánico del agente protector, PG<sub>2</sub> representa el residuo orgánico del agente de acilación y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

La Figura 2 describe la conversión de los compuestos de 10-deacetilbacatina III de la fórmula (B) en compuestos de 10-deacetilbacatina III C-7 protegidos de la fórmula (C). En la fórmula B y C, PG<sub>1</sub> representa el residuo orgánico del agente protector y R representa un grupo arilo cíclico sustituido o un grupo heterocíclico.

La Figura 3 describe la conversión de los compuestos 10-deacetilbacatina III (3a-d) dentro de los compuestos de 7-trietilsililbacatina III (5-d).

La Figura 4(a) describe la síntesis de

7-trietil-2-debenzoil-2-(2-tiofenoil)bacatina III (7) de

2-debenzoil-2-(2-tiofenil)10-deacetilbacatina III (6).

La Figura 4(b) describe la síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(3-furoil)bacatina III

(9) de 2-debenzoil-2-(3-furoil)-10-deacetilbacatina III (8).


La Figura 5 describe la conversión de 10-deacetilbacatina III y derivados (3a-d) al compuesto 7-trietilsilil-10-deacetilbacatina III y sus derivados (3e-h).

La 6(a) describe la síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(2-tiofenoil)-10-deacetilbacatina III (7a) de 2-debenzoil-2-(2-tiofenoil)-10-deacetilbacatina III (6a).

La Figura 6(b) describe la síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(3-furoil)-10-deacetilbacatina III (9a) de 2-debenzoil-2-(3-furoil)-10-deacetilbacatina III (8a).

### **DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION**

La presente invención provee un método para la síntesis de un compuesto de bacatina III C-7 protegida de la fórmula (A) de un compuesto de 10-deacetilbacatina III de la fórmula (B) en un paso (Figura 1) sin la necesidad de la purificación de ningún intermediario. La presente invención también provee una síntesis mejorada de un compuesto de 10-deacetilbacatina III C-7 protegida de la fórmula (C) (Figura 2). El compuesto 10-deacetilbacatina III C-7 protegida de la fórmula (C) puede a su vez convertirse en el compuesto de bacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (A) de acuerdo con los métodos descritos aquí o a través de los procedimientos publicados, tales como aquellos descritos en Denis y otros, *J. Am. Chem. Soc.*, 1988, 110, 5917, WO 95/26967 y US 2002/0087013 A1, las descripciones de las cuales se incorporan expresamente aquí por referencia.




Una característica clave de esta invención es la adición de una amina secundaria a la mezcla de reacción en la presencia de un compuesto que contiene nitrógeno, que acelera extremadamente la reacción. La reacción continúa en un tiempo considerablemente más corto que cualquiera de los métodos previamente reportados, y producen los productos deseados con altos rendimientos. Por ejemplo, la conversión de un compuesto de 10-deacetyl bacatin III de la fórmula (B) en su compuesto de éter 7- protegido de la fórmula (C) se completa en menos de aproximadamente 20 minutos y en rendimientos cuantitativos. El proceso de un paso para la conversión del compuesto 10-deacetyl bacatin III de la fórmula (B) a un compuesto de bacatin III C-7 protegido de la fórmula (A) también continúa con rendimientos cuantitativos, y se completa en menos de 5 horas. Sin embargo, la reacción se puede agitar durante la noche sin la formación de una cantidad observable de productos laterales.

El procedimiento completo se puede llevar a cabo a temperatura ambiente sin la necesidad de enfriar o calentar. Generalmente, "temperatura ambiente" es de aproximadamente 15 a 35°C, preferiblemente aproximadamente de 20 a 30°C, e incluye la temperatura ambiente la cual es generalmente de alrededor de 20-25°C.

El procedimiento es fácilmente perfeccionable. El procedimiento descrito aquí continúa suavemente en una atmósfera ambiente, por ejemplo, sin el uso de una atmósfera de argón o nitrógeno. La reacción también se puede llevar a cabo bajo una atmósfera seca, tal como bajo una atmósfera de argón o de nitrógeno. Un experto en la técnica conocerá, según sea necesario la temperatura y condiciones apropiadas para

llevar a cabo el procedimiento completo.

En la fórmula estructural (A), (B) y (C), R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico. Ejemplos del grupo arilo representados por R incluyen los compuestos representados por la siguiente fórmula:



5

en donde las R's pueden ser iguales o diferentes y cada una representa H, un grupo de extracción de electrón o un grupo de donación de electrón, y n representa 0, o un entero de 1 a 3. R es preferible fenilo o fenilo sustituido.

10

Ejemplos del grupo de extracción de electrón representado por R' incluyen -F, -NO<sub>2</sub>, -CN, -C1, -CHF<sub>2</sub> y -CF<sub>3</sub>. Ejemplos del grupo donador de electrón incluyen -NR<sub>7</sub>R<sub>8</sub> y -OR<sub>9</sub>, en donde R<sub>7</sub> y R<sub>8</sub> son iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono, y R<sub>9</sub> representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono. R<sub>7</sub> y R<sub>8</sub> también son preferiblemente un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 4 átomos de carbono. Preferiblemente R<sub>7</sub> y R<sub>8</sub> son iguales y representen un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono. Los ejemplos preferidos de -NR<sub>7</sub>R<sub>8</sub> incluyen dimetilamino, dietilamino, dipropilamino y dibutilamino, en donde la porción de propilo representa propilo o isopropilo normal, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo terciario o isobutilo. Más preferiblemente, R' es -OCH<sub>3</sub> o un cloro.


20

25

El grupo arilo representado por R es preferiblemente fenilo o fenilo sustituido, tal

como metoxifenilo, dimetoxifenilo, o clorofenilo, y más preferiblemente está representado por la siguiente fórmula:

5



El grupo heterocíclico representado por R es un anillo de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 2 heteroátomos. Ejemplos de los heteroátomos incluyen oxígeno, nitrógeno, y azufre. Ejemplos del grupo heterocíclico representados por R incluyen furilo, dihidrofurilo, tetrahydrofurilo, pirrolilo, pirrolidinilo, tienilo, tiazolilo, imidazolilo, piridilo, morfolinilo, piperidinilo, piperazinilo, y oxazolilo. Preferiblemente, el grupo heterocíclico representado por R es furilo o tienilo, más preferiblemente 2-tienilo o 3-tienilo, o 3-furilo

10

15

20


Los análogos de 10-deacetilbacatina III, que llevan diferentes sustituyentes C-2, por ejemplo, los compuestos representados por la fórmula (B) en donde R es 3-metoxifenilo, 2,5-dimetoxifenilo, 3-clorofenilo, 2-tienilo y 3-furilo pueden prepararse de acuerdo con el procedimiento como se describe previamente en Ojiva y otros, BioOrg. Med. Chem. Lett., 9; 3423-3428, 1999, y E. Baloglu y otros, BioOrg. Med. Chem., 11; 1557-1568, 2003. Las descripciones completas de Ojiva y otros, y Baloglu, y otros, se incorporan expresamente aquí por referencia. Se pueden preparar otros análogos a través de un procedimiento análogo, fácilmente determinado por un experto en la técnica.

25

De acuerdo con la presente invención, el proceso para sintetizar un compuesto de bacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (A) comprende reaccionar un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente protector y un agente de acilación en la presencia de una amina secundaria y un compuesto que contiene nitrógeno seleccionado de una trialkilamina, o un heterociclo que contiene nitrógeno seleccionado del grupo que consiste de piridina no sustituida o

sustituida y pirazina no sustituida o sustituida.

5



10

en donde PG<sub>1</sub> representa el residuo orgánico del agente de protección, PG<sub>2</sub> representa el residuo orgánico del agente de acilación, y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

15

Más específicamente, se disolvió una cantidad seleccionada de un compuesto 10-deacetilbacatina III representada por la fórmula (B) en un solvente que comprende un compuesto que contiene nitrógeno. Es deseable que el compuesto que contiene nitrógeno sea anhidro. Después, se introdujo una amina secundaria a esta solución, seguido por la adición secuencial de un agente de protección y un agente de acilación. En este método se prefiere que se utilicen 0.5 ml de un compuesto que tiene nitrógeno para cada 0.1 g del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). También se prefiere que se utilicen 2 equivalentes del agente de protección con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). Cuando se utilizan menos de aproximadamente 2 equivalentes del agente de protección, la protección C-7 podría no completarse. Cuando se utilizan más de 2 equivalentes del agente de protección, los productos multi-protegidos podrían observarse. La cantidad de la amina secundaria es preferiblemente de aproximadamente 2 a aproximadamente 6 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B), y la cantidad del agente de acilación está preferiblemente en la escala de aproximadamente 1 a aproximadamente 20 equivalentes con base en el compuesto 10-

20

25

deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). Se prefiere utilizar alrededor de 6 equivalente de la amina secundaria y alrededor de 15 equivalentes del agente de acilación. La cantidad del agente de acilación utilizada se puede incrementar hasta aproximadamente 20 equivalentes sin la formación de productos laterales.

5 Un experto en la técnica sabrá como agregar, según sea necesario un solvente apropiado tal como tetrahidrofurano, éter, 1,2-dimetoxietano y dioxano.

La reacción da excelentes rendimientos con un mínimo de 95% de rendimiento para la trietilsililación de la posición C-7 y de un 90-95% de rendimiento para la acilación del hidroxilo C-10.

10 Un agente de protección adecuado es un compuesto de organosilano. Ejemplos de agentes protectores incluyen compuestos de organosilano representados por la fórmula  $(R^i)_3SiX$ , en donde las  $R^i$  pueden ser iguales o diferentes y cada una independientemente representa metilo, etilo, normal-propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, isobutilo o ter-butilo, y X representa un grupo saliente. Preferiblemente, el grupo saliente representado por X es un átomo de halógeno, tosilato, mesilato, o trifluorometansulfonato. El agente de protección es preferiblemente cloruros de trialquilsililo, tosilatos de trialquilsililo, mesilatos de trialquilsililo y trifluorometansulfonatos de trialquilsililo y más preferiblemente clorotrietilsilano

20 Ejemplos del agente de acilación preferiblemente incluyen haluros de acilo y anhídridos de acilo. Más preferible, el agente de acilación es cloruro de acetilo o anhídrido acético. Más preferible, el agente de acilación es anhídrido acético.

25  $PG_1$  es preferiblemente trialquilsililo. El grupo alquilo es igual o diferente y selecciona de metilo, etilo, propilo o butilo, en donde la porción de propilo representa propilo o isopropilo normal, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo terciario o isobutilo.  $PG_2$  es preferiblemente acilo. Más preferiblemente,  $PG_1$  es trietilsililo y  $PG_2$  es acetilo.

Ejemplo de la amina secundaria incluyen imidazol e imidazoles sustituidos.

264  
78

Preferiblemente, la amina secundaria es imidazol. Con base en las enseñanzas de la presente invención, un experto en la técnica también puede utilizar otras aminas secundarias tales como pirazol, triazol, o tetrazol no sustituidos o sustituidos.

5 Ejemplos del compuesto que contienen nitrógeno incluyen trialquilamina y un heterociclo que contiene nitrógeno, tal como piridina no sustituido o sustituida o pirazina no sustituida o sustituida.



En la trialquilamina, el grupo alquilo puede ser igual o diferente y se selecciona de metilo, etilo, propilo o butilo, en donde el propilo puede ser propilo o isopropilo normal y el grupo butilo puede ser butilo normal, sec-butilo, ter-butilo o iso-butilo.

10 Ejemplos de trialquilaminas adecuadas incluyen trimetilamina, trietilamina, diisopropiletilamina, tri-n-propilamina y tri-n-butilamina.

Ejemplos de heterociclos que contienen nitrógeno adecuados incluyen piridina no sustituida o sustituida tal como 2-picolina, 3-picolina y 4-picolina y pirazina no sustituida o sustituida, tal como metilpirazina.

15 Preferiblemente, el compuesto que contiene nitrógeno es piridina.

La presente invención también provee un procedimiento para sintetizar el compuesto 10-deacetilbacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (C), que comprende reaccionar un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente de protección en la presencia de una amina secundaria y un compuesto que contiene nitrógeno seleccionado de trialquilamina (por ejemplo trietilamina) o un heterociclo que contiene nitrógeno seleccionado del grupo que consiste de piridina no sustituida y sustituida o pirazina no sustituida o sustituida,



en donde  $PG_1$  representa el residuo orgánico del agente de protección, y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

Más específicamente, se disolvió una cantidad seleccionada de un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) en un solvente que comprende un compuesto que contiene nitrógeno. Es deseable que el compuesto que contiene nitrógeno sea anhidro. Después, se introdujo una amina secundaria a esta solución, seguido por la adición un agente de protección y un agente de protección. En este método se prefiere que se utilicen 0.5 ml de un compuesto que tiene nitrógeno para cada 0.1 g del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). También se prefiere que se utilicen 2 equivalentes del agente de protección con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). Cuando se utilizan menos de aproximadamente 2 equivalentes del agente de protección, la protección C-7 podría no completarse. Cuando se utilizan más de 2 equivalentes del agente de protección, los productos multi-protegidos podrían observarse. La cantidad de la amina secundaria es preferiblemente de aproximadamente 2 a aproximadamente 6 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B). Se prefiere utilizar alrededor de 6 equivalentes de la amina secundaria.

Un experto en la técnica sabrá como agregar, según sea necesario un solvente apropiado tal como tetrahidrofurano, éter, 1,2-dimetoxietano o dioxano.

Un agente de protección adecuado es un compuesto de organosilano. Ejemplos de agentes protectores incluyen compuestos de organosilano representados por la fórmula  $(R'')_3SiX$ , en donde las  $R''$  pueden ser iguales o diferentes y cada una independientemente representa metilo, etilo, normal-propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, isobutilo o ter-butilo, y X representa un grupo saliente. Preferiblemente, el grupo saliente representado por X es un átomo de halógeno, tosilato, mesilato, o trifluorometansulfonato. El agente de protección es preferiblemente cloruro de trialquilsililo, tosilato de trialquilsililo, mesilato de trialquilsililo y trifluorometansulfonato de trialquilsililo y más preferiblemente

clorotrietilsilano

Ejemplos de la amina secundaria incluyen imidazol e imidazoles sustituidos. Preferiblemente, la amina secundaria es imidazol. Con base en las enseñanzas de la presente invención, un experto en la técnica también puede utilizar otras aminas secundarias tales como pirazol, triazol, o tetrazol no sustituidos o sustituidos.

Ejemplos del compuesto que contienen nitrógeno incluyen trialquilamina y un heterociclo que contiene nitrógeno, tal como piridina no sustituido o sustituida o pirazina no sustituida o sustituida.

En la trialquilamina, el grupo alquilo puede ser igual o diferente y se selecciona de metilo, etilo, propilo o butilo, en donde el grupo propilo puede ser propilo o isopropilo normal y el grupo butilo puede ser butilo normal, sec-butilo, ter-butilo o iso-butilo.

Ejemplos de trialquilaminas adecuadas incluyen trimetilamina, trietilamina, diisopropiletilamina, tri-n-propilamina y tri-n-butilamina.

Ejemplos de heterociclos que contienen nitrógeno adecuados incluyen piridina no sustituida o sustituida tal como 2-picolina, 3-picolina y 4-picolina y pirazina no sustituida o sustituida, tal como metilpirazina.

Preferiblemente, el compuesto que contiene nitrógeno es piridina.

La presente invención también se describe en los siguientes ejemplos. Sin embargo, la presente invención no está limitada a esto. A menos que se especifique otra cosa, todos los porcentajes y proporciones descritos aquí son en moles con base en la cantidad del compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B).

Todas las referencias aquí y los ejemplos que siguen están incorporados expresamente por referencia en su totalidad.

## EJEMPLOS

### EJEMPLO 1 Síntesis de 7-trietilsililbacatina III (5a, Figura 3)

Se disolvió 10-deacetilbacatina III (3a) (0.1 g, 0.18 mmoles) en 0.5 ml de piridina a aproximadamente 20 a 25°C. No se utilizó una atmósfera de argón con nitrógeno. Se agregó imidazol (0.074 g, 1.08 mmoles) a la mezcla de reacción a aproximadamente 20 a 25°C, seguido por una adición por goteo de clorotriethylsilano (0.06 ml, 0.36 mmoles). La mezcla de reacción se agitó durante 5 minutos a aproximadamente 20 a 25°C, y después se trató con anhídrido acético (0.37 ml, 3.9 mmoles). La reacción se completó en 4 horas para dar el producto deseado (5a).

## **EJEMPLO 2 Síntesis de 7-triethylsilyl-2-debenzoil-2-(2,5-dimethoxybenzoil)bacatina III (5b, Figura 3)**

Se trató una solución de 2-debenzoil-2-(2,5-dimethoxybenzoil)-10-deacetilbacatina III (3b) (1.50 g, 2.48 mmoles) en 7 ml de piridina con imidazol (0.675 g, 9.93 mmoles), seguido por clorotriethylsilano (0.830 ml, 4.97 mmoles). La mezcla se dejó en agitación a aproximadamente 20 a 25°C, y el avance de la reacción se monitoreó a través de TLC (60%) de acetato de etilo en hexano). Después de 15 minutos, la mono-protección se completó y se introdujo anhídrido acético (9.2 ml, 97.6 mmoles) en la reacción. El avance de la reacción después se monitoreó a través de TLC (30% de acetato de etilo en cloruro de metileno), y se encontró que se completó en 5 horas a aproximadamente 20 a 25°C. La mezcla de reacción se diluyó con 40 ml de acetato de etilo, y se lavó con 25 ml de agua, seguido por 25 ml de salmuera. La capa orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro, se filtró y se concentró al vacío. El producto crudo se purificó sobre una columna de gel de sílice, utilizando 30% de acetato de etilo en cloruro de metileno como eluyente para dar el producto deseado (5b) como un sólido blanco (1.25 g, 71% de rendimiento):  $^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  0.55 (m, 6 H), 0.91 (t,  $J = 8.0$  Hz, 9 H), 1.06 (s, 3 H), 1.18 (s, 3 H), 1.70 (s, 3 H), 1.72 (m, 1 H), 1.86 (m, 1 H), 2.15 (s, 3 H), 2.17 (s, 3 H), 2.22 (m, 3H), 2.49 (m, 1 H), 2.61 (s, 1 H), 3.80 (s, 3 H), 3.81 (d,  $J = 7.1$  Hz, 1 H), 3.88 (s, 3 H), 4.28 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 4.31 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 4.44 (dd,  $J = 6.4, 10.4$  Hz, 1 H), 4.84 (br t, 1 H), 4.91 (d,  $J = 8.6$  Hz, 1

23  
32

H), 5.61 (d,  $J = 6.4$  Hz, 1 H), 6.43 (s, 1 H), 6.93 (d,  $J = 9.2$  Hz, 1 H), 7.06 (dd,  $J = 9.2, 3.2$  Hz, 1 H), y 7.37 (d,  $J = 3.2$  Hz, 1 H). Espectro de masa:  $m/z$  para  $C_{39}H_{56}O_{13}SiNa^+$ : calculado: 783.35; encontrado: 783.36.

5 **EJEMPLO 3 Síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(3-metoxibenzoil)bacatina (5d, Figura 3)**

A una solución de 2-debenzoil-2-(3-metoxibenzoil)-10-deacetilbacatina III) (3d, 222 mg, 0.39 mmoles) en 1.5 ml de piridina se agregó imidazol (105 mg, 1.55 mmoles) seguido por clorotrietilsilano (0.129 ml, 0.77 mmoles). La mezcla de reacción se dejó agitar a temperatura ambiente, y el avance de la reacción se monitoreó a través de análisis TLC (60% de acetato de etilo en hexano). Después de 5 minutos, se completó la mono-protección, y se introdujo anhídrido acético (0.78 ml, 7.73 mmoles) a la reacción. El avance de la reacción después se monitoreó a través de TLC (30% de acetato de etilo en diclorometano) y se encontró que se completó en 4 horas a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se diluyó con 10 ml de acetato de etilo, se lavó con 5 ml de agua, después 5 ml de salmuera y la capa orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro, y se concentró al vacío. El producto crudo se purificó a través de TLC de preparación sobre gel de sílice utilizando 30% de acetato de etilo en diclorometano (v/v) como eluyente para dar 5d como un sólido blanco (219 mg, 78% de rendimiento).  $^1H$  NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  0.57 (m, 6 H), 0.92 (m, 9 H), 1.03 (s, 3 H), 1.18 (s, 3 H), 1.67 (s, 3 H), 1.86 (m, 1 H), 2.168 (s, 3 H), 2.174 (s, 3 H), 2.24 (m, 2 H), 2.26 (s, 3 H), 2.52 (m, 1 H), 3.87 (m, 3 H), 4.13 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 4.33 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 4.48 (dd,  $J = 6.8, 10.4$  Hz, 1 H), 4.82 (m, 1 H), 4.95 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 5.61 (d,  $J = 7.2$  Hz, 1 H), 6.45 (s, 1 H), 7.13 (m, 1 H), 7.37 (t,  $J = 8.0$  Hz, 1 H), 7.63 (m, 1 H), 7.69 (dd,  $J = 1.2, 8.0$  Hz, 1 H).  $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ) 5.6, 7.0, 10.2, 15.2, 20.4, 21.2, 23.0, 27.1, 37.6, 38.7, 43.1, 47.6, 55.7, 59.0, 68.2, 72.7, 75.1, 76.1, 76.8, 79.0, 81.2, 84.5, 115.0, 120.3, 122.8, 129.9, 131.0, 132.9, 144.4, 160.0, 167.2, 169.7, 171.0, 202.6.  $\delta$   $m/z$  MS para  $C_{38}H_{54}O_{12}SiNa^+$ : calculado: 753.3; se encontró: 753.2.


**EJEMPLO 4 Síntesis de 7-trietilsililoxi-2-debenzoil-2-(3-furoil)-bacatina III (9, Figura 4b)**

Se agregó por goteo 2 equivalentes de cloroetilsilano a una mezcla de 2-debenzoil-2-(3-furoil)-10-deacetilbacatina III (8, 1 equivalente) y 6 equivalentes de imidazol, en piridina. La mezcla de reacción se dejó agitar durante 10 minutos a temperatura ambiente, después de lo cual se completó. Se agregaron por goteo 20 equivalentes de anhídrido acético a la mezcla. La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente. Después de la terminación de la reacción, el producto se extrajo en acetato de etilo, se lavó secuencialmente con agua, solución de bicarbonato de sodio acuoso saturado, agua y salmuera. La capa orgánica se separó y se secó sobre sulfato de sodio, y se concentró al vacío. El material crudo se purificó sobre gel de sílice, eluyendo con 10% de acetato de etilo/diclorometano (v/v) para dar el producto 9 deseado.  $^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  0.58 (m, 6H), 0.92 (t,  $J = 8.0$  Hz, 9H), 1.04 (s, 3H), 1.17 (s, 3H), 1.64 (s, 1H), 1.66 (s, 3H), 1.87 (m, 1H), 2.10 (d,  $J = 5.2$  Hz, 1H), 2.17 (s, 6H), 2.21 (m, 1H), 2.24 (s, 3H), 2.52 (m, 1H), 3.83 (d,  $J = 7.2$  Hz, 1H), 4.17 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1H), 4.38 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1H), 4.47 (dd,  $J = 6.8, 10.4$  Hz, 1H), 4.82 (m, 1H), 4.96 (dd,  $J = 1.6, 9.2$  Hz, 1H), 5.51 (d,  $J = 7.2$  Hz, 1H), 6.44 (s, 1H), 6.77 (dd,  $J = 0.8, 1.6$  Hz, 1H), 7.46 (t,  $J = 1.6$  Hz, 1H), 8.07 (dd,  $J = 0.8, 1.6$  Hz, 1H).  $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  5.5, 6.9, 10.1, 15.2, 20.2, 21.1, 22.9, 27.0, 37.4, 38.3, 42.9, 47.4, 58.8, 68.1, 72.5, 74.3, 75.9, 76.8, 78.9, 81.1, 84.4, 110.0, 119.2, 132.8, 144.1, 144.3, 148.8, 163.7, 169.6, 170.9, 202.3.  $m/z$  MS para  $\text{C}_{35}\text{H}_{50}\text{O}_{12}\text{SiNa}^+$ : calculado: 713.3; se encontró: 713.1

35  
4


REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para sintetizar un compuesto representado por la fórmula (A) que comprende hacer reaccionar un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente de protección y un agente de acilación en la presencia de una amina secundaria y un compuesto que contiene nitrógeno seleccionado de una trialquilamina o un heterociclo que contiene nitrógeno seleccionado del grupo que consiste de piridina no sustituida o sustituida y pirazina no sustituida o sustituida,



en donde PG<sub>1</sub> representa el residuo orgánico del agente de protección, PG<sub>2</sub> representa el residuo orgánico del agente de acilación, y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

2. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo arilo es un grupo representado por la siguiente fórmula:



en donde R' puede ser igual o diferente y cada uno representa H, un grupo de extracción de electrón o un grupo donador de electrón, y n representa 0 o un entero de 1 a 3.

3. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo arilo representado por R es fenilo o fenilo sustituido.


4. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado por el grupo de extracción de electrón se selecciona del grupo que consiste de  $-F$ ,  $-NO_2$ ,  $-CN$ ,  $-C1$ ,  $-CHF_2$  y  $-CF_3$ .

5. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el grupo donador de electrón se selecciona del grupo que consiste de  $-NR_7R_8$  y  $-OR_9$ , en donde  $R_7$  y  $R_8$  son iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono, y  $R_9$  representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono.

6. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado por  $R'$  representa  $-OCH_3$  o cloro.

7. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo arilo representado por  $R$  se selecciona del grupo que consiste de metoxifenilo, dimetoxifenilo y clorofenilo.

8. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo arilo representado por  $R$  se selecciona del grupo que consiste de la siguiente fórmula:



9. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque  $R_7$  y  $R_8$  son iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 4 átomos de carbono.

10. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque

$R_7$  y  $R_8$  son iguales y representan un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono.


11. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado por que  $-NR_7R_8$  se selecciona del grupo que consiste de dimetilamino, dietilamino, dipropilamino y dibutilamino, en donde la porción de propilo representa propilo o isopropilo normal, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo terciario o isobutilo.

12. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R es un anillo de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 2 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste de oxígeno, nitrógeno, y azufre.

13. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R se selecciona del grupo que consiste de furilo, dihidrofurilo, tetrahidrofurilo, pirrolilo, pirrolidinilo, tienilo, tiazolilo, imidazolilo, piridilo, morfolinilo, piperidinilo, piperazinilo y oxazolilo.

14. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R se selecciona de tienilo o furilo.

15. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R se selecciona de la siguiente fórmula:



16. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque  $PG_1$  es trialkilsililo.

17. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque  $PG_2$  es acilo.

18. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 16 o 17, caracterizado

porque PG<sub>1</sub> es trietilsililo y PG<sub>2</sub> es acetilo.

19. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el agente de protección es un compuesto de organosilano.

5 20. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el agente de protección es un compuesto de organosilano representado por la fórmula (R'')<sub>3</sub>SiX, en donde las R'' pueden ser iguales o diferentes y cada una independiente representa metilo, etilo, propilo normal, isopropilo o ter-butilo, y X representa un grupo saliente.

10 21. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el grupo saliente representado por X se selecciona del grupo consiste de un átomo de halógeno, tosilato, mesilato, y trifluorometansulfonato.

22. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el agente de protección es clorotrietilsilano.

15 23. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el agente de acilación se selecciona del grupo que consiste de haluros de acilo y anhídridos de acilo.

24. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el agente de acilación se selecciona del grupo que consiste de cloruro de acetilo y anhídrido acético.

20 25. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado por el agente de acilación es anhídrido acético.

26. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la amina secundaria es un imidazol sustituido.

25 27. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la amina secundaria es imidazol.

28. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto que contiene nitrógeno es un heterociclo que contiene nitrógeno

seleccionado del grupo que consiste de piridina, 2-picolina, 3-picolina, 4-picolina, pirazina y metilpirazina o una trialkilamina seleccionada del grupo que consiste de trimetilamina, trietilamina, diisopropiletilamina, tri-n-propilamina, y tri-n-butilamina.

5 29. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto que contiene nitrógeno es piridina o trietilamina.

30. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto que contiene nitrógeno es anhidro.

10 31. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad del agente protector es de aproximadamente 2 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representada por la fórmula (B).

32. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad del agente de acilación está en la escala de aproximadamente 1 a aproximadamente 20 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B).

15 33. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad del la amina secundaria es de aproximadamente 2 a aproximadamente 6 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por (B).

20 34. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad del compuesto que contiene nitrógeno es de aproximadamente 0.5 ml por 0.1 g del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B).

35. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procedimiento se lleva a cabo a temperatura ambiente.


25 36. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procedimiento se lleva a cabo en una atmósfera seca.

37. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procedimiento se lleva a cabo a atmósfera ambiente.

40  
39


38. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el procedimiento sustancialmente se completa en menos de aproximadamente 5 horas.

39. Un procedimiento para sintetizar un compuesto representado por la fórmula (C), que comprende hacer reaccionar un compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente de protección en la presencia de una amina secundaria y compuesto que contiene nitrógeno seleccionado de una trialquilamina o un heterociclo que contiene nitrógeno seleccionado del grupo que consiste de piridina no sustituida o sustituida y pirazina no sustituida o sustituida,



en donde PG<sub>1</sub> representa el residuo orgánico del agente de protección y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

40. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo arilo representado por R es un grupo representado por la siguiente fórmula:



en donde las R' pueden ser iguales o diferentes y cada una representa H, un grupo de extracción de electrón o un grupo de donación electrón, y n representa 0 o un entero de 1 a 3.

41. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo arilo representado por R es fenilo o fenilo sustituido.

42. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 40, caracterizado porque


el grupo de extracción de electrón se selecciona del grupo que consiste de  $-F$ ,  $-NO_2$ ,  $-CN$ ,  $-C1$ ,  $-CHF_2$  y  $-CF_3$ .

43. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 40, caracterizado porque el grupo donador de electrón se selecciona del grupo que consiste de  $-NR_7R_8$  y  $-OR_9$ , en donde  $R_7$  y  $R_8$  son iguales o diferentes y cada uno representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono, y  $R_9$  representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono.

44. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 40, caracterizado porque  $R'$  representa  $-OCH_3$  o cloro.

45. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo arilo representado por  $R$  se selecciona del grupo que consiste de metoxifenilo, dimetoxifenilo y clorofenilo.

46. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo arilo representado por  $R$  se selecciona del grupo que consiste de la siguiente fórmula:



47. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado por que  $R_7$  y  $R_8$  son iguales o diferentes y cada una representa un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 4 átomos de carbono, o un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 4 átomos de carbono.

48. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado porque

$R_7$  y  $R_8$  son iguales y representan un grupo alquilo lineal que tiene de 1 a 10 átomos de carbono, un grupo alquilo ramificado o cíclico que tiene de 3 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo no sustituido o sustituido que tiene de 6 a 10 átomos de carbono.


49. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 43, caracterizado porque  $-NR_7R_8$  se selecciona del grupo que consiste de dimetilamino, dietilamino, dipropilamino y dibutilamino, en donde la porción de propilo representa propilo o isopropilo normal, y la porción de butilo representa butilo normal, butilo secundario, butilo terciario o isobutilo.

50. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R es un anillo de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 2 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste de oxígeno, nitrógeno, y azufre.

51. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R se selecciona del grupo que consiste de furilo, dihidrofurilo, tetrahidrofurilo, pirrolilo, pirrolidinilo, tienilo, tiazolilo, imidazolilo, piridilo, morfolinilo, piperidinilo, piperazinilo y oxazolilo.

52. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R se selecciona de tienilo o furilo.

53. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el grupo heterocíclico representado por R se selecciona de la siguiente fórmula:



54. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque  $PG_1$  es trialquilsililo.

55. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el agente de protección es un compuesto de organosilano.

56. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado por el agente de protección es un compuesto de organosilano representado por la fórmula  $(R'')_3SiX$ , en donde las  $R''$  pueden ser iguales o diferentes y cada una independiente representa metilo, etilo, propilo normal, isopropilo o ter-butilo, y X representa un grupo saliente.

57. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 56, caracterizado porque el grupo saliente representado por X se selecciona del grupo que consiste de un átomo de halógeno, tosilato, mesilato, y trifluorometansulfonato.

58. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el agente de protección es clorotrietilsilano.

59. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque la amina secundaria es un imidazol sustituido.

60. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque la amina secundaria es imidazol.

61. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el compuesto que contiene nitrógeno es un heterociclo que contiene nitrógeno seleccionado del grupo que consiste de piridina, 2-picolina, 3-picolina, 4-picolina, pirazina y metilpirazina o una trialkilamina selecciona del grupo que consiste de trimetilamina, trietilamina, diisopropiletilamina, tri-n-propilamina, y tri-n-butilamina.

62. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el compuesto que contiene nitrógeno es piridina o trietilamina.

63. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el compuesto que contiene nitrógeno es anhidro.

64. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el procedimiento se lleva a cabo a temperatura ambiente.

65. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el procedimiento se lleva a cabo en una atmósfera seca.

66. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el procedimiento se lleva a cabo a atmósfera ambiente.

67. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque el procedimiento se completa sustancialmente en menos de aproximadamente 20 minutos.

68. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque la cantidad del agente de protección es de aproximadamente 2 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B).

69. El procedimiento de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque la cantidad de la amina secundaria es de aproximadamente 2 a aproximadamente 6 equivalentes con base en la cantidad del compuesto 10-deacetilbacatina III representado por (B).

### RESUMEN

Un proceso para sintetizar un compuesto de la bacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (A), que comprende reaccionar un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente de protección y un agente de acilación en la presencia de una amina secundaria y un compuesto que contiene nitrógeno. También, un procedimiento para sintetizar un compuesto de 10-deacetilbacatina III C-7 protegido representado por la fórmula (C), que comprende reaccionar un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente de protección en la presencia de una amina secundaria y compuesto que contiene nitrógeno. En ambos procedimientos el compuesto que contiene nitrógeno se selecciona de un heterociclo que contiene nitrógeno o una tiralquilamina. Cuando se selecciona el heterociclo que contiene nitrógeno, puede ser una piridina no sustituida o sustituida, o una pirazina no sustituida o sustituida. Cuando se selecciona una tiralquilamina, puede ser, por ejemplo trietilamina o diisopropiletilamina. (A, B, C) en donde  $PG_1$  representa el residuo orgánico del agente de protección,  $PG_2$  representa el residuo orgánico del agente de acilación, y R representa un grupo arilo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

FIGURA 1.-






FIGURA 2.-






FIGURA 3.-

Conversión de los compuestos 10-deacetilbacatina III (3a-d) dentro de los compuestos de 7-trietilsililbacatina III (5-d)






**FIGURA 4a.-**

**Síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(2-tiofenoil)bacatina III (7)**




**FIGURA 4b.-**

**Síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(3-furoil)bacatina III (9)**







**FIGURA 5.-**

**Conversión de 10-deacetilbacatina III y derivados (3a-d) al compuesto 7-trietilsilil-10-deacetilbacatina III y sus derivados (3e-h).**



**3a:**  $\text{R}_1, \text{R}_1', \text{R}_1'' = \text{H}$

**3b:**  $\text{R}_1 = \text{OMe}, \text{R}_1' = \text{H}, \text{R}_1'' = \text{OMe}$

**3c:**  $\text{R}_1 = \text{H}, \text{R}_1' = \text{Cl}, \text{R}_1'' = \text{H}$

**3d:**  $\text{R}_1 = \text{H}, \text{R}_1' = \text{OMe}, \text{R}_1'' = \text{H}$

**3e:**  $\text{R}_1, \text{R}_1', \text{R}_1'' = \text{H}$

**3f:**  $\text{R}_1 = \text{OMe}, \text{R}_1' = \text{H}, \text{R}_1'' = \text{OMe}$

**3g:**  $\text{R}_1 = \text{H}, \text{R}_1' = \text{Cl}, \text{R}_1'' = \text{H}$

**3h:**  $\text{R}_1 = \text{H}, \text{R}_1' = \text{OMe}, \text{R}_1'' = \text{H}$

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding dates. The names are listed in a column on the left, and the dates are listed in a column on the right. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The dates are: 1/1/2020, 2/1/2020, and 3/1/2020.

**FIGURA 6a.-**

**Síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(2-tiofenoil)-10-deacetilbacatina III (7a)**











**FIGURA 6b.-**

**Síntesis de 7-trietilsilil-2-debenzoil-2-(3-furoil)-10-deacetilbacatina III (9a)**









**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA


|                                                                                                                                                                              |                    |                                                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b><br><b>DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES</b><br><b>TARJETA ARCHIVO PROPIETARIOS</b>                                               |                    |                                                 |                           |
| PATENTE DE INVENCION <input type="checkbox"/> PCT <input checked="" type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD <input type="checkbox"/> DISEÑO INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> |                    |                                                 |                           |
| (21) N° de solicitud:                                                                                                                                                        |                    | (22) Fecha de solicitud: 26 DE OCTUBRE DE 2.006 |                           |
| (51) Clasificación Internacional:                                                                                                                                            |                    |                                                 |                           |
| (71) Solicitante(s) IMMUNOGEN, INC.                                                                                                                                          |                    |                                                 |                           |
| (72) Inventor(es) Erkan BALOGLU                                                                                                                                              |                    |                                                 |                           |
| (74) Agente: HUMBERTO RUBIO CAMACHO                                                                                                                                          |                    |                                                 |                           |
| (30) Prioridad                                                                                                                                                               | (31) No. Prioridad | (32) Fecha                                      | (33) País                 |
| ESTADOUNIDENSE                                                                                                                                                               | 60/570,834         | 14/05/2004                                      | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
| (85) Fecha inicio fase nacional:                                                                                                                                             |                    | (87) Publicación internacional                  |                           |
| (86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT                                                                                                                   |                    | Fecha: 01/12/2005                               |                           |
| Fecha de presentación de la solicitud: 11/05/2005                                                                                                                            |                    | N° publicación: WO 2005/113528                  |                           |
| No. de solicitud: PCT/US2005/016497                                                                                                                                          |                    |                                                 |                           |
| (54) Título: UN MÉTODO FÁCIL PARA SINTETIZAR COMPUESTOS DE BACATINA III                                                                                                      |                    |                                                 |                           |

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

TARJETA ARCHIVO TEMÁTICO

PATENTE DE INVENCION \_\_\_\_\_ PCT X MODELO DE UTILIDAD \_\_\_\_\_ DISEÑO INDUSTRIAL \_\_\_\_\_


|                                                                                    |      |                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------------|
| (21) N° de solicitud: _____ (22) Fecha de solicitud: <b>26 DE OCTUBRE DE 2.006</b> |      |                                        |                           |
| (3) Clasificación Internacional: _____                                             |      |                                        |                           |
| (71) Solicitante(s) <b>IMMUNOGEN, INC.</b>                                         |      |                                        |                           |
| (72) Inventor(es) <b>Erkan BALOGLU</b>                                             |      |                                        |                           |
| (74) Agente: <b>HUMBERTO RUBIO CAMACHO</b>                                         |      |                                        |                           |
| (30) Prioridad                                                                     | (31) | No. Prioridad                          | 32) Fecha                 |
| ESTADOUNIDENSE                                                                     |      | 60/570,834                             | 14/05/2004                |
|                                                                                    |      | (33) País                              | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| (85) Fecha inicio fase nacional:                                                   |      | (87) Publicación internacional:        |                           |
| (86) Datos relativos a la presentación de la solíc. PCT                            |      | Fecha: <b>01/12/2005</b>               |                           |
| Fecha de presentación de la solicitud: <b>11/05/2005</b>                           |      | No. Publicación: <b>WO 2005/113528</b> |                           |
| No. de solicitud: <b>PCT/US2005/016497</b>                                         |      |                                        |                           |



(54) Título: **UN MÉTODO FÁCIL PARA SINTETIZAR COMPUESTOS DE BACATINA III**

(57) Resumen:

Un procedimiento para sintetizar un compuesto representado por la fórmula (A) que comprende hacer reaccionar un compuesto de 10-deacetilbacatina III representado por la fórmula (B) con un agente de protección y agente de acilación en la presencia de una amina secundaria y un compuesto que contiene nitrógeno seleccionado de una trialkilamina o un heterociclo que contiene nitrógeno seleccionado del grupo que consiste de piridina no sustituida o sustituida y pirazina no sustituida o sustituida,



en donde PG<sub>1</sub> representa el residuo orgánico del agente de protección, PG<sub>2</sub> representa el residuo orgánico del agente de acilación, y R representa un grupo anillo simple o sustituido o un grupo heterocíclico.

**REQUISITOS MINIMOS PARA ADMISION A TRAMITE  
PCT**

PATENTE DE INVENCION

☒

MODELO DE UTILIDAD ☐

- ◆ Indicación de que se solicita la concesión de una patente ☐
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud ☐
- ◆ Descripción de la invención ☐
- ◆ Dibujos de ser estos pertinentes ☒
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas ☐

COMPLETA ☐

INCOMPLETA ☐

DISEÑO INDUSTRIAL ☐

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial ☐
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud ☐
- ◆ Representación gráfica y fotográfica del Diseño Industrial o muestra del material que incorpora el diseño ☐
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas ☐

COMPLETA ☐


INCOMPLETA ☐

ESQUEMA DE TRAZADO ☐

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de un Esquema de Trazado ☐
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud ☐
- ◆ Representación gráfica del esquema trazado ☐
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas ☐

COMPLETA ☐

INCOMPLETA ☐

  
Firma Responsable

Fecha **26 OCT. 2006**

Carrera 13 No. 27-00 Piso 5, 7 y 10  
Conmutador: 3 82 08 40  
Fax: 350 52 20  
E-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co)  
[www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co)  
Bogotá, D.C., Colombia