



No. 14-073129- -00005-0000

Fecha: 2015-08-25 17:05:33 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 21

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Wagner F. Torres
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sierra
Gina A. Árias
Guillermo Parra
Erika Jhisset Suárez
Liliana Galindo

Medellín

Maria C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Maritza P. Ruiz
Camilo A. Bernal

Barranquilla

Gina De Echeona
José J. Dangond

Re: Expediente N°. 14-073.129

Solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS SUSTITUIDOS DE 2-[1-BENCIL-1H-INDAZOL-3-IL]-N-(PIRIDIN-4-IL)-PIRIMIDIN-4-AMINA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, UN COMPUESTO INTERMEDIARIO, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN"

Solicitante: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH Y BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2014/000053

RESPUESTA AL OFICIO No. 4080, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 016

DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prorroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado en el momento de la solicitud.

Así las cosas, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto presenta las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 2 a 4, 10 a 14 y 16 y 17;

- la nueva Reivindicación 1 fue modificada de manera de definir claramente todos los radicales y sustituyentes de los compuestos de fórmula general (I). Todas las estructuras reivindicadas han sido limitadas a una generalización razonable de los compuestos ilustrados en los ejemplos de la solicitud de patente a fin de cumplir con los requisitos de claridad, concisión y sustento en la memoria descriptiva;
- la nueva Reivindicación 2 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 5 y fue adaptada a las modificaciones y limitaciones realizadas en la nueva Reivindicación 1;
- las nuevas Reivindicaciones 3 a 7 equivalen a las antiguas Reivindicaciones 6 a 9 y 15.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- El Examinador señala que el título es genérico, ambiguo e impreciso ya que no menciona el grupo farmacofórico particular que contiene los compuestos reclamados y hace referencia al uso y al método de tratamiento que se realiza con los compuestos de la invención.

b- Atendiendo la amable sugerencia del Examinador, me permito modificar el título de la presente solicitud como sigue:

“DERIVADOS SUSTITUIDOS DE 2-[1-BENCIL-1H-INDAZOL-3-IL]-N-(PIRIDIN-4-IL)-
PIRIMIDIN-4-AMINA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, UN COMPUESTO
INTERMEDIARIO, Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS
CONTIENEN”

De esta manera es claro que el título menciona el grupo farmacofórico particular que contienen los compuestos reclamados y del cual se han eliminado todas las referencias al uso y al método de tratamiento que se realiza con los compuestos de la invención.

3. a- El Examinador señala que la Reivindicación 16 se refiere a un método de tratamiento lo cual se considera materia no patentable; adicionalmente la Reivindicación 17 se refiere a una combinación, la cual según el Examinador hace también referencia a un método de tratamiento, el cual no es materia patentable. El Examinador también argumenta que las Reivindicaciones 10 a 14 tampoco son materia patentable ya que se refieren a usos o a un segundo uso.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto se eliminaron las Reivindicaciones 10 a 14 y 16 y 17 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

4. a- El Examinador presenta las siguientes objeciones respecto de la claridad y concisión de las reivindicaciones:

- La Reivindicación 1 no es clara ni concisa cuando menciona lo siguiente:
 - o para las definiciones de R^4 que es en forma independiente hidrógeno, hidroxilo, halógeno, ciano, NO_2 , $1-6\text{C}$ -alquilo, $2-6\text{C}$ -alqueno, $2-6\text{C}$ -alquino, $1-6\text{C}$ -haloalquilo, $1-6\text{C}$ -hidroxialquilo, $1-6\text{C}$ -alcoxi, $-\text{O}-(2-6\text{C}-\text{alquilen})-\text{OC}(\text{O})-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$, $1-6\text{C}$ -haloalcoxi, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, $-(1-6\text{C}-\text{alquilen})-\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, $-\text{C}(\text{O})-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $3-7\text{C}$ -cicloalquilo, $-\text{S}-(1-6\text{C}-\text{haloalquilo})$, SF_5 , $-\text{SO}_2\text{NH}-(3-7\text{C}-\text{cicloalquilo})$, $-\text{SO}_2\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, $\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, heteroarilo;
 - o R^6 es (a) hidrógeno; (b) hidroxilo; (c) ciano; (d) $1-6\text{C}$ -alcoxi opcionalmente sustituido en forma independiente una o más veces con (d1) OH, (d2) $-\text{O}-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$ (d3) $\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, (d4) $\text{C}(\text{O})\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, (d5) $\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, (d6) $-\text{S}-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$, (d7) $-\text{S}(\text{O})-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$, (d8) $-\text{SO}_2-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$ (d9) $\text{SO}_2\text{NR}^{10}\text{R}^{11}$, (d10) heterociclilo, que está opcionalmente sustituido con $\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, o oxo ($=\text{O}$), (d11) heteroarilo;
 - o R^7 es (a) hidrógeno, (b) $1-6\text{C}$ -alquilo, que está opcionalmente sustituido con heteroarilo (c) $1-6\text{C}$ haloalquilo, (d) $1-6\text{C}$ -hidroxialquilo, (e) , donde * es el punto de unión, (f) $-\text{C}(\text{O})-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$, (g) $-\text{C}(\text{O})-(1-6\text{C}-\text{alquilen})-\text{O}-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$, (h) $-\text{C}(\text{O})-(1-6\text{C}-\text{alquilen})-\text{O}-(2-6\text{C}-\text{alquilen})-\text{O}-(1-6\text{C}-\text{alquilo})$, (i) $-\text{C}(\text{O})$ - heterociclilo, (j) bencilo donde el anillo fenilo está opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, $1-4\text{C}$ -alquilo, $1-4\text{C}$ -haloalquilo, $1-4\text{C}$ -alcoxi, $1-4\text{C}$ -haloalcoxi, ciano, $\text{C}(\text{O})\text{OR}^9$, (k) heteroarilo,

con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos ya que el núcleo farmacofórico podría contener diversos anillos que no permiten conocer el objeto que se pretende proteger. Adicionalmente al referirse al heteroarilo no se menciona el número de átomos totales de dicho heteroarilo y tampoco se menciona cuáles y cuantos heteroátomos hacen parte de la estructura;

- del mismo modo las Reivindicaciones 2 a 5 no son claras ya que emplean las definiciones ambiguas e imprecisas antes mencionadas;

- la Reivindicación 17 no es clara ya que tal como se encuentra definida, se pueden presentar múltiples opciones de combinaciones farmacéuticas puesto que se mencionan familias completas genéricas y no compuestos específicos de interés, hace referencia a un método de tratamiento terapéutico el cual tampoco sería patentable y no encuentran sustento en el Capítulo Descriptivo.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde la Reivindicación 1 fue limitado a una generalización razonable de los Ejemplos del Capítulo Descriptivo. En este sentido, todas las definiciones empleadas permiten comprender claramente el número de átomos totales de los radicales empleados, el número y tipo de sus heteroátomos, la cantidad y tipo de sustituyentes, etc. Al respecto, cabe resaltar que el mero hecho de que la búsqueda de antecedentes y el examen de patentabilidad requieran de un análisis extenso, no es una condición que pueda descalificar al invento por falta de claridad. La SIC no debe basarse en apreciaciones subjetivas para privar al inventor de la protección merecida de la totalidad del concepto inventivo desarrollado. En el presente caso, la nueva reivindicación 1 que se acompaña junto con el presente memorial le permite comprender claramente a cualquier persona versada en la materia el alcance de protección pretendido y, por consiguiente, no existe ambigüedad alguna respecto de los límites de la invención.

Más aún, la descripción estructural de compuestos químicos por medio de fórmulas generales del tipo Markush es un método usualmente utilizado para definir una familia de compuestos que comparten el mismo núcleo. Durante estos últimos años es claro que han sido concedidas solicitudes de patente dirigidas a compuestos abarcados por fórmulas Markush con un alcance amplio, en los cuales no existió la necesidad de limitar estrictamente a los ejemplos o a la denominación IUPAC de los compuestos reivindicados (como pareciera ser la idea del Examinador a cargo de la presente solicitud de patente).

También cabe destacar que la amplitud de las reivindicaciones que se adjuntan junto con el presente memorial se encuentran completamente sustentadas por los ejemplos incluidos en el Capítulo Descriptivo ya que los compuestos ejemplificados ilustran moléculas estructuralmente diferentes que comparten un mismo núcleo común y una actividad biológica similar, tal como se puede observar a partir de los ejemplos de las páginas 224 a 425 del Capítulo Descriptivo.

Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, con el único objetivo de facilitar el trámite, el Solicitante decidió limitar el alcance, de tal forma que la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto es completamente clara y concisa para cualquier persona medianamente versada en la materia.

5. Por todo lo anterior, considero que todas las objeciones presentadas por el Examinador en su primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295


Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de fórmula (I)



en donde

R^1 es hidrógeno;

R^2/R^3 son en forma independiente entre sí hidrógeno, halógeno, ciano, 1-6C-haloalquilo, 1-4C-haloalcoxi;

R^4 es en forma independiente hidrógeno; hidroxilo; halógeno; ciano; 1-6C-alquilo; 2-6C-alqueno; 2-6C-alquino; 1-6C-haloalquilo; 1-6C-hidroalquilo; 1-6C-alcoxi opcionalmente sustituido con OH; -O-(2-6C-alqueno)-O-C(O)-(1-4C-alquilo); 1-6C-haloalcoxi; -C(O)OR⁹; -(1-6C-alqueno)-C(O)OR⁹; -C(O)-(1-4C-alquilo); -C(O)-morfolino; -C(O)NR¹⁰R¹¹; ciclopropilo; -S-(1-4C-haloalquilo); SF₅; -SO₂NH-ciclopropilo; morfolino-4-il-sulfonilo; NH₂; NHC(O)-(1-4C-alquilo); heteroarilo de 5 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados entre N y O, y que está opcionalmente sustituido con 1-4C-alquilo;

donde dos de R^2 , R^3 (R^4)_n, cuando se encuentran en posición *orto* entre sí, pueden formar junto con los dos átomos de carbono a los cuales están unidos un anillo heterocíclico de 5, 6 ó 7 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre O y N, y que opcionalmente contiene un enlace doble adicional y/o está opcionalmente sustituido con un grupo oxo (=O) y/o un grupo 1-4C-alquilo;

n es 0 – 3;


R^6 es (a) hidrógeno; (b) hidroxilo; (c) ciano; (d) 1-6C-alcoxi opcionalmente sustituido en forma independiente con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo formado por (d1) OH, (d2) -O-(1-6C-alquilo), (d3) C(O)OR⁹, (d4) C(O)NR¹⁰R¹¹, (d5) NR¹⁰R¹¹, (d6) -NHC(O)-O-(1-6C-alquilo), (d7) -S-(1-4C-alquilo), (d8) -S(O)-(1-4C-alquilo), (d9) -SO₂-(1-6C-alquilo), (d10) SO₂NH₂, (d11) heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O y N, y que está opcionalmente

sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo formado por $C(O)OR^9$ y oxo ($=O$), (d12) heteroarilo de 5 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados entre O y N, y que está opcionalmente sustituido con (1-6C-alquilen)-O-(1-4C-alquilo);



(e) 3-6C-cicloalcoxi; (f) 1-4C-haloalcoxi; (g) , donde * es el punto de unión; (h) $-O-(2-6C\text{-alquilen})-O-(1-4C\text{-alquilo})$ que está opcionalmente sustituido con hidroxilo, $NH(CO)OR^9$; (i) $O-(3\text{-ciano-piridin-4-il})$;

R^7 es (a) hidrógeno; (b) 1-4C-alquilo, que está opcionalmente sustituido con un



grupo tetrazolilo; (c) 1-4C-haloalquilo; (d) 1-4C-hidroxialquilo; (e) , donde * es el punto de unión; (f) $-C(O)-(1-4C\text{-alquilo})$; (g) $-C(O)-(1-6C\text{-alquilen})-O-(1-4C\text{-alquilo})$; (h) $-C(O)-(1-6C\text{-alquilen})-O-(2-6C\text{-alquilen})-O-(1-4C\text{-alquilo})$; (i) $-C(O)$ -tetrahidropiraniilo; (j) bencilo, donde el anillo fenilo está opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo formado por hidrógeno, halógeno, 1-4C-alquilo, 1-4C-haloalquilo, 1-4C-alcoxi, 1-4C-haloalcoxi, ciano, $C(O)OR^9$; (k) un grupo piridilo; u opcionalmente R^6 y R^7 , junto con el átomo de nitrógeno al cual R^7 está unido, forman un anillo de 6 miembros que puede contener otro átomo de oxígeno, y que está opcionalmente sustituido con (1-6C-alquil)-OH, (1-6C-alquil)-NHCHO;

R^8 es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, 1-6C-alquilo, 1-6C-hidroxialquilo, 1-6C-haloalquilo, $C(O)OR^9$, $C(O)NR^{10}R^{11}$, 1-3C-alcoxi;

m es 0-2

R^9 es (a) hidrógeno, (b) 1-6C-alquilo que está opcionalmente sustituido con hidroxilo;

R^{10} , R^{11} son, en forma independiente entre sí, hidrógeno, 1-4C-alquilo, 1-4C-hidroxialquilo, o en el caso particular del radical R^6 , forman, junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que opcionalmente contiene un átomo de oxígeno adicional, y que está opcionalmente sustituido con 1-2 átomos de flúor;

o un N-óxido, una sal, un tautómero o un estereoisómero de dicho compuesto, o una sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

2. El compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, donde,

R^1 es hidrógeno,

R^2/R^3 es en forma independiente hidrógeno, flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxilo, CF_3 , $-O-CH_3$ o $-O-CH_2-CF_3$,


R^4 es, en forma independiente en cada caso, hidrógeno, flúor, cloro, bromo o

iodo, ciano, hidroxilo, $-\text{CH}_3$, $-\text{C}_3\text{H}_7$, ciclopropilo, 1-propenilo, $-\text{C}\equiv\text{CH}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{-OH}$, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{-OH}$, $-\text{CH}_2\text{-C}(\text{CH}_3)_2\text{-OH}$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}_2\text{-OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{O-CH}_2\text{-CH}_3$ que está opcionalmente sustituido con un grupo OH, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCF}_2\text{H}$, $-\text{OCH}_2\text{CF}_3$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)\text{-O-C(O)-CH}_3$, $-\text{C(O)CH}_3$, $-\text{COOH}$, $-\text{C(O)OCH}_3$, $-\text{C(O)OC}_2\text{H}_5$, $-\text{C(O)OC}(\text{CH}_3)_3$, $-\text{CH}_2\text{-COOH}$, $-\text{CH}_2\text{-COOC}_2\text{H}_5$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{-COOC}_2\text{H}_5$, $-\text{C(O)NH}_2$, $-\text{C(O)NH}(\text{CH}_3)$, $-\text{C(O)N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{C(O)NH-}(\text{CH}_2)_2\text{-OH}$, $-\text{C(O)-(N-morfolinilo)}$, $-\text{SO}_2\text{-NH-ciclopropilo}$, $-\text{SO}_2\text{-(N-morfolino)}$, NH_2 , $\text{NH-C(O)(CH}_3)$, 5-metil-oxa-diazol-3-ilo, N-pirrolilo, N-pirazolilo, $-\text{S-CF}_3$, SF_5 , donde dos de R^2 , R^3 (R^4)_n, cuando se encuentran en posición *orto* entre sí, forman juntos $-\text{O-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-}$, $-\text{O-CH}_2\text{-CH}_2\text{-}$, $-(\text{CH}_3)\text{C=CH-(C=O)-O-}$, $-\text{CH}_2\text{-(C=O)-O-}$, $-(\text{CH}_2)_2\text{-(C=O)-NH-}$, que junto con los dos átomos de carbono a los cuales están unidos forman un anillo de 5, 6 o 7 miembros,

n es 0, 1, 2, 3,

R^6 es hidrógeno, hidroxilo, ciano, $-\text{O-ciclopropilo}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{OCF}_2\text{H}$, $-\text{OCH}_2\text{CF}_3$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-OH}$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-NH}_2$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{-N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-O-CH}_3$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-O-}(\text{CH}_2)_2\text{-OH}$, $-\text{O-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{OH}$, $-\text{O-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-NH-C(O)OC}(\text{CH}_3)_3$, $-\text{O-CH}_2\text{-COOH}$, $-\text{O-CH}_2\text{-COOC}_2\text{H}_5$, C(O)NH_2 , $-\text{O-CH}_2\text{-C(O)-(3-fluoro-N-azetidina)}$, $-\text{O-CH}_2\text{-C(O)-(3,3-difluoro-N-azetidina)}$, $-\text{O-CH}_2\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-N-piperidinilo}$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{(morfolina-4-ilo)}$, $-\text{O-CH}_2\text{-(morfolina-2-ilo)}$, $-\text{O-CH}_2\text{-(morfolina-2-il-4-tert.-butoxicarboxilato)}$, $-\text{O-CH}_2\text{-(pirrolidin-2-ona-5-ilo)}$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-S-CH}_3$, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-SO-CH}_3$,

$-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-SO}_2\text{-CH}_2$, $-\text{O-CH}_2\text{-SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{SO}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)_2$, , donde * es el punto de unión, $-\text{O-}(\text{CH}_2)_2\text{-tetrazolilo}$, $-\text{O-CH}_2\text{-tetrazolilo}$, $-\text{O-piridin-4-ilo}$, $-\text{O-(3-ciano-piridin-4-ilo)}$, o $-\text{O-CH}_2\text{-(oxadiazol)-CH}_2\text{-O-CH}_3$,

R^7 es hidrógeno, metilo, difluorometilo, hidroxietilo, , donde * es el punto de unión, $-(\text{CH}_2)_2\text{-tetrazolilo}$, piridin-4-ilo, $-\text{C(O)-tetrahidropiran-4-ilo}$, $-\text{C(O)-CH}_2\text{-O-CH}_3$, $-\text{C(O)-CH}_3$, $-\text{C(O)CH}_2\text{-O-}(\text{CH}_2)_2\text{-O-CH}_3$, o bencilo cuyo anillo fenilo está opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes seleccionados en forma independiente del grupo formado por flúor, cloro, bromo, ciano, metilo, difluorometilo, metoxi, etoxi, difluormetoxi, trifluormetoxi, $-\text{O-CH}_2\text{-CF}_3$, $-\text{C(O)OCH}_3$, u opcionalmente R^6 y R^7 , junto con el átomo de nitrógeno al cual R^7 está unido, forman un anillo de 6 miembros que puede contener otro átomo de oxígeno y que, además, está opcionalmente sustituido con $-\text{CH}_2\text{-OH}$ o $-\text{CH}_2\text{-NH-CHO}$;

R^8 es hidrógeno, flúor, hidroxilo, ciano, CH_3 , CF_3 , $\text{CH}_2\text{-OH}$, OCH_3 , C(O)OH , C(O)OCH_3 , $\text{C(O)OC}_2\text{H}_5$, $\text{C(O)O}(\text{CH}_2)_2\text{-OH}$, C(O)NH_2 , C(O)NHCH_3 ,

m es 0, 1 o 2

o un N-óxido, una sal, un tautómero o un estereoisómero de dicho compuesto, o una

sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

3. Los compuestos de fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, que se seleccionan del grupo formado por:

- 2-[1-(6-cloro-2-fluoro-3-metilbencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-[1-(6-cloro-2-fluoro-3-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 5-metoxi-2-{1-[3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencil]-1H-indazol-3-il}-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-[1-(2-cloro-4,5-dimetilbencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 5-metoxi-2-{1-[4-(pentafluoro- λ^6 -sulfanil)bencil]-1H-indazol-3-il}-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-[1-(2,6-difluoro-3-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- N-(2,6-difluoro-3-metoxibencil)-2-[1-(2,6-difluoro-3-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-{1-[(6-bromo-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- N-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzonitrilo,
- 2-[1-(2-cloro-4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-[1-(3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ilmetil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 2-[1-(2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- N-(2,6-difluorobencil)-2-[1-(2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- 5-metoxi-N-(piridin-4-il)-2-(1-{3-[(trifluorometil)sulfanil]bencil}-1H-indazol-3-il)pirimidin-4-amina,
- 2-[1-(2,3-difluoro-4-metilbencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
- N-(2,3-difluoro-4-metilbencil)-2-[1-(2,3-difluoro-4-metilbencil)-1H-indazol-3-il]-5-

metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
5-metoxi-2-{1-[4-(1H-pirazol-1-il)bencil]-1H-indazol-3-il}-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina
2-[1-(2,6-diclorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
N-(2,6-diclorobencil)-2-[1-(2,6-diclorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
5-metoxi-N-(piridin-4-il)-2-(1-{4-[(trifluorometil)sulfanil]bencil}-1H-indazol-3-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-clorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
N-(2-clorobencil)-2-[1-(2-clorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
3-cloro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzoato de metilo,
3-cloro-4-{{2-[1-(2-cloro-4-(metoxicarbonil)bencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-il}(piridin-4-il)amino}metil}benzoato de metilo,
2-[1-(4-bromo-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-cloro-4-fluoro-3-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-etoxi-2,3-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
N-(4-etoxi-2,3-difluorobencil)-2-[1-(4-etoxi-2,3-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
5-metoxi-N-(piridin-4-il)-2-{1-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)bencil]-1H-indazol-3-il}pirimidin-4-amina,
5-metoxi-N-(piridin-4-il)-N-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)bencil]-2-{1-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)bencil]-1H-indazol-3-il}pirimidin-4-amina,
2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzoato de metilo,
5-metoxi-N-(piridin-4-il)-2-[1-(2,4,6-trifluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-amina,
5-metoxi-N-(piridin-4-il)-N-(2,4,6-trifluorobencil)-2-[1-(2,4,6-trifluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina
2-[1-(2,4-diclorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluoro-4-iodobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-bromobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,

N-(2-bromobencil)-2-[1-(2-bromobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
ácido [3-fluoro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)fenil]acético,
5-metoxi-N-(piridin-4-il)-2-[1-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-amina,
5-metoxi-2-[1-(4-propilbencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-{1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometoxi)bencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
N-[2,6-dicloro-4-(trifluorometoxi)bencil]-2-{1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometoxi)bencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
7-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona,
2-[1-(2-cloro-4-iodobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(3,5-dimetoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-{1-[2-cloro-6-(trifluorometil)bencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-cloro-5-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
7-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)-4-metil-2H-cromen-2-ona,
3-fluoro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)benzonitrilo,
4-{ [2-[1-(4-ciano-2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-il} (piridin-4-il)amino]metil}-3-fluorobenzonitrilo,
2-{1-[2,6-dicloro-3-(trifluorometil)bencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
[3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)fenil]acetato de etilo,
2-[1-(4-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
N-ciclopropil-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)bencensulfonamida,
6-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)-1-benzofuran-2(3H)-ona,
2-{1-[4-(difluorometoxi)-2,6-difluorobencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
tert-butilo 3-cloro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}

il}metil)benzoato de,
2-[3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]-2-metilpropanoato de etilo,
4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzonitrilo,
5-metoxi-2-{1-[4-(morfolin-4-ilsulfonil)bencil]-1H-indazol-3-il}-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2,6-dicloro-3-nitrobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzonitrilo,
N-[4-(difluorometoxi)-2,6-difluorobencil]-2-{1-[4-(difluorometoxi)-2,6-difluorobencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
5-metoxi-N-(piridin-4-il)-2-{1-[3-(1H-pirrol-1-il)bencil]-1H-indazol-3-il}pirimidin-4-amina,
3,5-difluoro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzonitrilo
5-metoxi-2-{1-[2-metoxi-4-(trifluorometil)bencil]-1H-indazol-3-il}-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2,6-difluoro-3-metilbencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluoro-6-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
3,5-difluoro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzamida,
acetato de 2-[3,5-difluoro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenoxi]etilo,
2-[1-(2,6-difluoro-4-propoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-etoxi-2-fluoro-6-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-ol
2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-ol,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-ol,
2-[1-(4-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-ol,
{3-[(2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)metil]oxetan-3-il}metanol,
{3-[(2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)metil]oxetan-3-il}metanol,

(3-{{(2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-{{[3-(hidroximetil)oxetan-3-il]metoxi}}pirimidin-4-il)(piridin-4-il)amino]metil}oxetan-3-il)metanol,
1-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)metansulfonamida,
5-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)-5-[2-(1H-tetrazol-5-il)etoxi]pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)-5-[2-(1H-tetrazol-5-il)etoxi]-N-[2-(1H-tetrazol-5-il)etil]pirimidin-4-amina,
5-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-[1-(4-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)-5-(1H-tetrazol-5-il)metoxi]pirimidin-4-amina,
5-[2-(dimetilamino)etoxi]-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
1-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)-3-(piperidin-1-il)propan-2-ol,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-(2-metoxietoxi)-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[(2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)metil]morfolina-4-carboxilato de tert-butilo,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-[2-(morfolin-4-il)etoxi]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-{{[3-(metoximetil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metoxi}}-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
(2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)acetato de etilo,
1-(3,3-difluoroazetidín-1-il)-2-((2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)etanona,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-[2-(metilsulfanil)etoxi]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[2-((2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)etoxi]etanol,
ácido fórmico - (5S)-5-[(2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)metil]pirrolidin-2-ona (1:1),
(5R)-5-[(2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-

ilamino)pirimidin-5-il}oxi)metil]pirrolidin-2-ona,
{2-[2-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)etoxi]etil}carbamato de tert-butilo,
2-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)-1-(3-fluoroazetidín-1-il)etanona,
(5S)-5-[(2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)metil]pirrolidin-2-ona,
[2-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)etil]carbamato de tert-butilo,
N-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-8-(piridin-4-il)-7,8-dihidro-6H-pirimido[5,4-b][1,4]oxazin-7-il}metil)formamida,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-ciclopropil-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-(1-{2,6-difluoro-4-[(1E)-prop-1-en-1-il]bencil}-1H-indazol-3-il)-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
1-[3,5-difluoro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]etanona,
[2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]metanol,
2-[3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]etanol,
2-[3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]-2-metilpropan-1-ol,
[4-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-il}amino)piridin-3-il]metanol,
2-[3-cloro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]propan-2-ol,
1-[3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]-2-metilpropan-2-ol,
2-[2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]propan-2-ol,
5-(difluorometoxi)-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
5-(difluorometoxi)-N-(difluorometil)-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-

N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
4-[(difluorometil)(piridin-4-il)amino]-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-5-ol,
2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)-5-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)-5-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirimidin-4-amina,
3-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)propan-1,2-diol,
(2S)-3-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)propan-1,2-diol,
(2R)-3-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)propan-1,2-diol,
2-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)etanol,
2-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)etanol,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)pirimidin-4-il}amino)piridin-3-carboxilato de etilo,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)pirimidin-4-il}amino)-N-metilpiridin-3-carboxamida,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)pirimidin-4-il}amino)piridin-3-carboxamida,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)pirimidin-4-il}amino)piridin-3-carboxilato de 2-hidroxietilo,
5-(ciclopropiloxi)-2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
clorhidrato de 2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina (1:1),
clorhidrato de (2S)-3-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)propan-1,2-diol (1:1),
clorhidrato de 2-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)etanol (1:1),
2-[1-(2,6-diclorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina clorhidrato de (1:1),
clorhidrato de [2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]metanol (1:1),
clorhidrato de (2R)-3-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-

ilamino)pirimidin-5-il}oxi)propan-1,2-diol (1:1),
N-{2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il}-N-(piridin-4-il)acetamida,
N-{2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il}-2-metoxi-N-(piridin-4-il)acetamida,
N-{2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il}-N-(piridin-4-il)tetrahidro-2H-piran-4-carboxamida,
N-{2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il}-2-(2-metoxietoxi)-N-(piridin-4-il)acetamida,
2-[2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il}(piridin-4-il)amino]etanol,
(3-{[2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il}(piridin-4-il)amino]metil}oxetan-3-il)metanol,
2-{1-[4-bromo-2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroetoxi)bencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-{1-[4-bromo-2,6-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)bencil]-1H-indazol-3-il}-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
ácido 2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzoico,
ácido ({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-il}oxi)acético,
2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)-N-metilbenzamida,
2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzamida,
2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)-N,N-dimetilbenzamida,
2,4-dicloro-N-(2-hidroxietil)-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)benzamida,
[2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil](morfolin-4-il)metanona,
3,5-difluoro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)-N-metilbenzamida,
2-[1-(4-etinil-2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
{2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-8-(piridin-4-il)-7,8-dihidro-6H-pirimido[5,4-b][1,4]oxazin-7-il}metanol,

2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-metil-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-
amina,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-
carbonitrilo,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N,N-di(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-
carboxilato de metilo,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
4-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-
il} amino)piridin-3-carbonitrilo,
2-[(3-{4-[(2,6-dimetilpiridin-4-il)amino]-5-metoxipirimidin-2-il}-1H-indazol-1-il)metil]-
5-etoxi-3-fluorofenol,
4-({5-metoxi-2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il} amino)piridin-2(1H)-
ona,
4-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-
il} amino)piridin-2(1H)-ona,
4-({5-metoxi-2-[1-(4-propilbencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il} amino)nicotinonitrilo,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-
carboxamida,
4-({5-metoxi-2-[1-(4-propilbencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-il} amino)piridin-3-
carboxamida,
4-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-
il} amino)piridin-3-carboxamida,
4-({2-[1-(2,6-difluoro-4-hidroxibencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-
il} amino)piridin-3-carboxamida,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-hidroxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-
carbonitrilo,
4-({4-[(3-cianopiridin-4-il)amino]-2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-5-
il} oxo)piridin-3-carbonitrilo,
5-metoxi-2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-N-[3-(trifluorometil)piridin-4-
il]pirimidin-4-amina,
ácido 3-cloro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-
il} metil)benzoico,
ácido fórmico - 3-cloro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-
1-il} metil)-N-metilbenzamida (1:1),
3-cloro-4-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il} metil)-N-
metilbenzamida,

4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-hidroxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-carboxamida,
ácido 4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-hidroxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-carboxílico,
4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-hidroxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-carboxilato de etilo,
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-carbonitrilo
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-5-carboxamida,
clorhidrato de ácido 4-({2-[1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)pirimidin-4-il} amino)piridin-3-carboxílico (1:1),
N-(2-fluoropiridin-4-il)-5-metoxi-2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-amina,
N-(2,6-difluoropiridin-4-il)-5-metoxi-2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-amina,
N-(3-fluoropiridin-4-il)-5-metoxi-2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]pirimidin-4-amina,
5-metoxi-2-[1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-3-il]-N-(2-metilpiridin-4-il)pirimidin-4-amina,
N-(difluorometil)-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-[2-(metilsulfinil)etoxi]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-[2-(metilsulfinil)etoxi]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina (Enantiómero 1),
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-[2-(metilsulfinil)etoxi]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina (Enantiómero 2),
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-[2-(metilsulfonil)etoxi]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
5-(2-aminoetoxi)-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-(morfolin-2-ilmetoxi)-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,
4-({2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-il} amino)piridin-3-carboxilato de etilo,
N-(3,5-difluoropiridin-4-il)-2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxipirimidin-4-amina,
2-[1-(3-amino-2,6-diclorobencil)-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-


amina,

N-[2,4-dicloro-3-({3-[5-metoxi-4-(piridin-4-ilamino)pirimidin-2-il]-1H-indazol-1-il}metil)fenil]acetamida,

2-[1-(4-etoxi-2,6-difluorobencil)-4-metil-1H-indazol-3-il]-5-metoxi-N-(piridin-4-il)pirimidin-4-amina,


o un N-óxido, una sal, un tautómero o un estereoisómero de dicho compuesto, o una sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

4. Un proceso para la fabricación de compuestos de fórmula general (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, donde R^7 es hidrógeno tal como se indica en la fórmula (Ia), caracterizado porque un compuesto de fórmula (1-4)



donde R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^6 y n tienen los significados de acuerdo con la Reivindicación 1,


se hace reaccionar con un compuesto de fórmula (C)



donde R^8 y m tienen los significados de acuerdo con la Reivindicación 1, y X' representa F, Cl, Br, I, ácido borónico o un ester de ácido borónico,

en presencia de una base adecuada, y un catalizador de paladio adecuado, opcionalmente en presencia de un ligando adecuado,


formando un compuesto de fórmula (Ia)




que opcionalmente luego se desprotege para formar un compuesto de fórmula general (I) donde R^7 es hidrógeno y R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^6 , R^8 y n y m tienen los significados que se definen en la Reivindicación 1.

5. Un proceso para la fabricación de compuestos de fórmula general (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, donde


un compuesto de fórmula (Ib)



donde R¹, R², R³, R⁶, R⁷, R⁸ y m tienen los significados de acuerdo con la Reivindicación 1 y R' es 1-6C-alquilo o bencilo, se trata con un sistema ácido adecuado para separar el grupo bencílico con el fin de obtener un compuesto de fórmula 1-5



y luego se hace reaccionar el compuesto de fórmula 1-5 con un compuesto de fórmula general (B),




donde R^2 , R^3 , R^4 y n tienen los significados de acuerdo con la Reivindicación 1 y X representa un grupo saliente,

en un sistema de solventes adecuado, en presencia de una base adecuada, en un rango de temperatura entre temperatura ambiente y el punto de ebullición del solvente respectivo, para obtener compuestos de fórmula general (I).

6. Un compuesto intermediario de fórmula general (1-5) de acuerdo con la

Reivindicación 5,



donde R¹, R⁶, R⁷ R⁸ y m tienen los significados de acuerdo con la Reivindicación 1.

7. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, junto con al menos un auxiliar farmacéuticamente aceptable.
