



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO6



No. 14-218656- -00000-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-054164- -00030-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 851 DIVISIONAL Folios: 4

T=f=2

SOLICITUD
PATENTE DE INVENCION

21. EXPEDIENTE No. _____

54. TÍTULO **“ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECÍFICO
BETA 1-42 CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS”**

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL **A61K 39/395**

71. SOLICITANTE **AC IMMUNE S.A.**

DOMICILIO **LAUSANNE, SUIZA**

74. REPRESENTANTE LEGAL **ALICIA LLOREDA RICAURTE**
T.P. 53.215

22. BOGOTÁ, D.C. **- 2 OCT 2014**

(FORMA P 10)



No. 08-054164- -00030-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 851 DIVISIONAL Folios: 4



No. 14-218656- -00000-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 851

1. Identificación del Trámite

- ☐ Conversión
- ☒ División
- ☐ Fusión
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del Solicitante:

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

AC IMMUNE S.A.

Nombre o Denominación / Nombre o Razón Social Completa

ALICIA LLOREDA RICAURTE

Nombre Representante Legal

Tipo de Empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☒

Documento de Identificación ☒ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número **39.690.713**

Nacionalidad / País de Constitución	Dirección y Domicilio del Titular	Ciudad
Suiza	EPFL-PSE Building B, CH-1015, Lausanne, Suiza	Lausanne
Dirección Electrónica		Número Telefónico
notificacionespatentes@lloredacamacho.com		3264270
Fax		Número Telefónico
6069701		3264270

☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del Apoderado:

LLOREDA RICAURTE ALICIA

Apellidos y Nombre

C.C. 39.690.713

Documento de Identificación

53.215

Tarjeta Profesional

Dirección y Domicilio		Ciudad
Calle 72 No. 5-83 Piso 5°		Bogotá D.C.
Dirección Electrónica		Número Telefónico
notificacionespatentes@lloredacamacho.com		3264270
No. Fax		Número Telefónico
6069701		3264270

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del Trámite		
CONVERSIÓN Expediente No. _____ De: _____ A: _____	DIVISIÓN Expediente No. <u>08-054.164</u> No. Divisionales <u>1</u>	FUSIÓN Expediente No. _____ Expediente No. _____

5. Comprobante de Pago No. <u>14-0079623</u>	Fecha: <u>Julio 28, 2014</u>

6.	Anexos
☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación. ☒ Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación. ☐ Número de documento que ordena la comisión o fusión o división. ☒ Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud. ☒ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético	

7. Firma		
ALICIA LLOREDA RICAURTE		
Nombre y apellidos	Representante Apoderado	Firma
C.C. 39.690.713 de Usaquéen		53.215
Identificación	Tarjeta Profesional	

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	PLANILLA DE RADICACIÓN - DIGITALIZACIÓN DIARIA RELACIÓN DE ANEXOS		
Dependencia: 2020	Fecha: 14 10 21 AAAA MM DD		Recorrido: 4
Tipo de Radicación: Entrada: ☒ Salida: ☐ Traslado: ☐ Convenio: ☐			
Radicador:			Planilla:

ID	No. Radicación	Consecutivo	Item
1	08 54164	030	
2	14 218 656	0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Item	Unidad de Conservación
1	Bolsa
2	Caja
3	Libro
4	Sobre
5	Tomo
6	Otro
Item	Soporte Documental
7	CD <i>x</i>
8	Disquete
9	DVD
10	Folleto
11	Foto
12	Periódico
13	Plano
14	Publicación Periódica
15	USB
16	Otro

Observaciones: El cd anexo contiene: 8 archivos en formato PDF, los cuales son procesados y subidos al sistema
Chacra

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0079623

Bogotá D.C., Julio 28 de 2014 - 14:34:36

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	636817845	28/07/2011	7.710.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1603 INVOCAR LA NOTORIEDAD DENTRO DE UN TRAMITE DE OPOSICION	464.000.00	464.000.00
				\$464.000.00

SON: **CUATROCIÉNTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

*****_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-218656- -00000-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-054164- -00030-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 851 DIVISIONAL Folios: 4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Julio 28 de 2014 - 14:34:40

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 104245

Bogotá D.C., Octubre 01 de 2014 - 09:02:05

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	12471	03/02/2014		93.000.00
RECIBO DE CA	999999999	61161	09/06/2014		403.000.00
RECIBO DE CA	999999999	74373	15/07/2014		496.000.00
RECIBO DE CA	999999999	84872	06/08/2014		217.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO

39 50005-01-01 SOLICITUDES

CONCEPTO

1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA
ADICIONAL A LAS 10 INIC

Vr.UNDITARIO

31.000.00

Vr.CONCEPTO

1.209.000.00

\$1.209.000.00

SON: **UN MILL&OACUTE;N DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-218656- -00000-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:29

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 411 PRESENTACION

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-054164- -00030-0000

Fecha: 2014-10-02 16:58:28

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 851 DIVISIONAL

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Octubre 1 de 2014 - 09:02:06

A β ₁₋₁₅ (ACI-24)

H₂N-Lys-Lys-Asp(OtBu)-Ala-Glu(OtBu)-Phe-Arg(Pbf)-His(Trt)-Asp(OtBu)-
Ser(tBu)-Gly-Tyr(tBu)-Glu(OtBu)-Val-His(Trt)-His(Trt)-Gln(Trt)-Lys-Lys-OH

A β ₁₋₁₆ (ACI-01)

Ac-Lys-Asp(OtBu)-Ala-Glu(OtBu)-Phe-Arg(Pbf)-His(Trt)-Asp(OtBu)-Ser(tBu)-
Gly-Tyr(tBu)-Glu(OtBu)-Val-His(Trt)-His(Trt)-Gln(Trt)-Lys(Boc)-Lys-Gly-OH

A β _{1-16(Δ 14)} (ACI-02)

Ac-Lys-Asp(OtBu)-Ala-Glu(OtBu)-Phe-Arg(Pbf)-His(Trt)-Asp(OtBu)-Ser(tBu)-
Gly-Tyr(tBu)-Glu(OtBu)-Val-His(Trt)-Gln(Trt)-Lys(Boc)-Lys-Gly-OH

A β ₂₂₋₃₅ (ACI-11)

Ac-Lys-Glu(OtBu)-Asp(OtBu)-Val-Gly-Ser(tBu)-Asn(Trt)-Lys(Boc)-Gly-Ala-
Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Lys-Gly-OH

A β ₂₉₋₄₀ (ACI-12)

Ac-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Lys-Gly-OH

FIG 1




FIG. 2a




FIG. 2b




FIG. 3a




FIG 3b





FIG. 4

TRADUCCION OFICIAL No. 2008-08-13-587
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS

Poder de Representación Legal, documento escrito en inglés y en español.

Certificado Notarial, documento escrito en inglés y en español.



Atestación

Yo, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, Dr. Ronald M. Müller, por el presente certifico que las firmas adjuntas al presente son las firmas auténticas del Profesor Andrea Pfeifer, ciudadano alemán, residente en Saint-Légier-La Chiésaz, Suiza, y del Dr. Andreas Muhs, ciudadano alemán, residente en Pully, Suiza, ambos actuando por AC Immune SA, en Ecublens/VD, Suiza, una compañía debidamente constituida y legalmente existente bajo las leyes de Suiza, con oficina registrada en Parc scientifique EPFL, PSE-B en Ecublens/VD, evidenciado por un resumen del registrador comercial, Profesor Andrea Pfeifer registrado como "directora", Dr. Andreas Muhs, registrado como "director", ambos con firma conjunta por AC Immune SA, ambos teniendo suficiente autoridad para ejecutar el poder anterior.

La autenticidad de las firmas fue establecida por medio de comparación.

Basilea, Suiza, este día 23 (veintitrés) de julio de 2008 (dos mil ocho).

Oblea notarial.

Leg. Prot. No. 907/2008

(firma: ilegible)

Dr. R. M. Müller

Notario



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Suiza
Este documento oficial
2. ha sido firmado por (ilegible)
3. actuando como (ilegible)
4. y certificado por el sello de (ilegible)

Certificado

5. en Basilea
6. el día 23 de julio de 2008
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea
8. No. 6'614/11'100
9. Sello/Estampilla
Sello de la Cancillería de Estado
10. Firma: ilegible
Heidi Fischer

Autenticación de firma No. 092 en el Consulado de Colombia en Berna.

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 13 de agosto de 2008, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177 DE 1989 MINISTERIO DE JUSTICIA
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

ANITA ESCOBAR
804637

JEFE DE LEGALIZACIÓN
BOGOTÁ D.C.
13 AGO 14 A 10:26

RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO

MINISTERIO DE JUSTICIA
BOGOTÁ D.C.



Los abajo firmados,



AC Immune SA

con domicilio en

EPFL - PSE Building B,
CH - 1015 Lausanne, Switzerland

nombramos por el presente a ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, domiciliados en Bogotá, Colombia, con oficinas en dicha ciudad, Calle 72 No. 5-83, piso 6o., nuestros representantes legales y verdaderos en Bogotá, con facultades para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales, con el fin de dar cumplimiento al parágrafo 1o. del artículo 543 del decreto 410 de 1971.

Los doctores ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, o los apoderados que cualquiera de ellos designe, quedan especialmente facultados para representarnos ante las autoridades colombianas, administrativas, judiciales o de policía, en todos los trámites relativos a la propiedad industrial, a cuyo efecto les facultamos para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado; elevar solicitudes, declaraciones, reclamos, recursos y presentar desistimientos; formular descripciones, enmiendas, limitar el alcance de las solicitudes, presentar oposiciones y apelaciones; instaurar cancelaciones, renunciar total o parcialmente a los registros, abonar todos los impuestos y cuotas y efectuar todo otro pago determinado por la ley; recibir todos los documentos y valores, dando el descargo respectivo; llenar cualesquiera otros requisitos y tomar, en fin, todas las medidas que creyeren conducentes al resguardo de nuestros intereses; y en caso de producirse oposición, pasando los antecedentes a los tribunales, quedan facultados para tomar intervención como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo transar, someter a árbitros, desistir, percibir y apelar, con todas las demás facultades que resulten necesarias, y por el presente declaramos desde ahora válido y bueno cuanto dichos representantes y/o los apoderados que cualquiera de ellos nombre hicieren en nuestro beneficio.

Asimismo, facultamos a los doctores ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, para solicitar en la Oficina de Propiedad Industrial la protocolización de este documento y de cualquier poder que cualquiera de ellos otorgue a nombre nuestro.

Dado y firmado

The undersigned,


AC Immune SA

domiciled at

EPFL - PSE Building B,
CH - 1015 Lausanne, Switzerland

hereby appoint, ALICIA LLOREDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, of Bogota, Colombia, with offices in said town, Calle 72 No. 5-83, Sixth Floor, our true and legal representatives in Bogotá, with power to receive notifications and to appoint judicial or extrajudicial agents, so as to comply with paragraph 1o. of article 543 of decree 410 of 1971.

Doctors ALICIA LLOREDA and/or GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, or the agents by any one of them appointed, are especially empowered to represent us before the administrative, judicial or police authorities of Colombia, in all proceedings pertaining to industrial property, for which purpose we authorize them to take before the said authorities all the necessary steps for the said end; to file petitions, declarations, claims, recourses and withdrawals, to draw up specifications; to file amendments, to limit the scope of applications, file oppositions; file cancellations total or partially waive registrations, to pay all installments and effect all other payments prescribed by law; to receive proper receipts, to comply with all other requirements and, in short, to take all those measures which they may deem fit for the protection of our interests; and in case of opposition, where the proceedings be passed over to the courts, we authorize said agents to act on our behalf, as complainants as well as defendants, before the competent judges, with full powers to make arrangements, to submit to arbitrators, to desist, to collect, to appeal and, in short, with all such further powers as may be required, and we hereby declare ~~from now on as valid and good all that said representatives and their agents by any one of them appointed may do for our benefit~~



We ~~MARIA FERNANDA ROSA ALCALA~~ LLOREDA and/or ~~GUSTAVO TAMAYO~~ and/or ~~IGNACIO SANTAMARIA~~ and/or ~~ENRIQUE ALVAREZ~~, to apply for protocolization of this document and of any power of attorney by any one of them conferred in our name, before the Office of Industrial Property.

Given and signed this

A. P. L.
Alicia P. Lloreda, CEO

A. M.
Alicia M. Lloreda, CEO

NOTARY SHOULD EXECUTE OTHER SIDE

CERTIFICADO NOTARIAL (SOCIEDAD)

Estado
Ciudad
Hoy de de 200 , compareció
a quien conozco y
de quien me consta que firmó el anterior documento,
y quien debidamente juramentado declaró y dijo que
él es

de
la compañía nombrada en
el documento que antecede, una sociedad
debidamente organizada y existente conforme a las
leyes del Estado de
domiciliada en la ciudad de
Condado de

Estado de
legalmente constituida para un período de duración
que aún no ha terminado, que ejerce su objeto
social; conforme a las leyes del Estado de

que el declarante está autorizado por dicha
Compañía para conferir este poder; que el sello
estampado por él al pie de tal poder, en nombre y en
representación de la expresada Compañía, es el
sello oficial de ella; y que el objeto para el cual se
confiere este instrumento está comprendido dentro
del de la sociedad.

El suscrito Notario ha visto los Estatutos de
incorporación firmados en

Estado de , con fecha , y
certifica que de conformidad con la legislación de
dicho Estado la anterior declaración juramentada es
prueba suficiente de que los hechos sobre que ella
versa son ciertos o verdaderos, de lo cual da fe.

Notary Public (Notario Público).

NOTARIAL CERTIFICATE (CORPORATION)

State
City
On this day of 200
personally
came
to me known, and known to me to be the person who
signed the foregoing instrument, who being by me
duly sworn did depose and say that he is the

of
the company named
within, a Corporation organized and existing under
the laws of the State of
domiciled at the City of
County of State of

legally constituted for a period
of tenure not yet expired, which exercises its
corporate purposes according to the laws of the State
of ; that the
deponent is authorized by said Company to confer
this power of attorney; that the seal affixed hereunto
by the deponent in the name and on behalf of said
Corporation is the corporate seal thereof; and that
the purpose for which this instrument is granted is
included within the corporate purposes of the
Company.

The undersigned Notary Public has seen the articles
of Incorporation of said Corporation executed at

State of , under date of
, and hereby
certifies that under the laws of said State the
foregoing acknowledgment is sufficient proof that the
facts therein contained are true, which he attests.





Consulado de Colombia
Berna



AUTENTICACION DE FIRMA No.

092

BERNA, 29 DE JULIO DEL 2008

El suscrito Segundo Secretario Encargado
de las Funciones Consulares de la Embajada de la República de
Colombia

CERTIFICA

Que la señora **HEIDI FISCHER**, que autoriza el presente documento, ejerce legalmente en la fecha expresada, las funciones de Oficial de la Cancillería de Estado del Cantón de Basilea y que la firma y sello que en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales, de acuerdo con el registro que se lleva en este Consulado.

El suscrito Segundo Secretario Encargado de las Funciones Consulares de la Embajada, no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento autenticado.



CESAR H. ESTRADA MOLINA

- Pagado Impuesto de Timbre: U\$ 10.00
- Pagado Derechos Consulares: U\$ 15.00

ATION



Attestation

I, the undersigned notary public of Basel, Switzerland, Dr. Roland M. Müller, certify herewith that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Prof. Andrea Pfeifer**, German citizen, residing in Saint-Légier-La Chiésaz, Switzerland, and **Dr. Andreas Muhs**, German citizen, residing in Pully, Switzerland, both acting for **AC Immune SA**, in Écublens/VD, Switzerland, a company duly organized and legally existing under the laws of Switzerland, with registered seat at Parc scientifique EPFL, PSE-B in Écublens/VD, evidenced by an extract from the register of commerce, Prof. Andrea Pfeifer registered as "directrice", Dr. Andreas Muhs registered as "directeur", both with joint signature for AC Immune SA, both having sufficient authority to execute the above power of attorney.

The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 23rd (twenty-third) day of July 2008 (twothousandandeight).

Dr. R.M. Müller
Notar

Dr. R.M. Müller
Notar

Leg.Prot.Nr. 907/2008



APOSTILLE
(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)
This official document

2. is signed by *Dr. R.M. Müller*

3. in his/her function as *Notar*

4. and certified by the seal of the *Notar*

5. in Basel (Bâle)

6. on *23. Juli 2008*

7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. no. *6674/2008*

9. Stamp: *6674/2008*

10. Signature: *[Signature]*

COMO NOTARIA SEXTA (EN EL MARCO DE BOGOTÁ)
D. C. CHAGO CON SU ORIGINAL EN FOTOCOPIA
GGINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO EN VISTA
BOGOTÁ - REPUBLICA DE COLOMBIA

09 ENE 2009

MARIA FERNANDA CASAS COLL
NOTARIA ENCARGADA

264891.TXT
LISTADO DE SECUENCIAS

<110> GREFERATH, RUTH
HICKMAN, DAVID
MUHS, ANDREAS
PFEIFER, ANDREA
NICOLAU, CLAUDE

<120> ANTICUERPO MONOCLONAL

<130> 12593-001-999 (089667-0106)

<140> 11/637,213

<141> 2006-12-11

<150> EP 05027092.5

<151> 2005-12-12

<150> EP 06014729.5

<151> 2006-07-14

<150> EP 06020766.9

<151> 2006-10-02

<160> 45

<170> PatentIn version 3.3

<210> 1

<211> 15

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 1

Asp Ala Glu Phe Arg His Asp Ser Gly Tyr Glu Val His His Gln
1 5 10 15

<210> 2

<211> 16

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 2

Asp Ala Glu Phe Arg His Asp Ser Gly Tyr Glu Val His His Gln Lys
1 5 10 15

<210> 3

<211> 15

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 3

Asp Ala Glu Phe Arg His Asp Ser Gly Tyr Glu Val His Gln Lys
1 5 10 15

<210> 4

<211> 14

<212> PRT

<213> Homo sapiens

264891.TXT

<400> 4
Glu Asp Val Gly Ser Asn Lys Gly Ala Ile Ile Gly Leu Met
1 5 10

<210> 5
<211> 12
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 5
Gly Ala Ile Ile Gly Leu Met Val Gly Gly Val Val
1 5 10

<210> 6
<211> 17
<212> PRT
<213> Homo sapiens

<400> 6
Asp Ala Glu Phe Arg His Asp Ser Gly Tyr Glu Val His His Gln Lys
1 5 10 15

Leu

<210> 7
<211> 112
<212> PRT
<213> Mus musculus

<400> 7
Asp Val Val Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Ser Leu Gly
1 5 10 15

Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Val Tyr Ser
20 25 30

Asn Gly Asp Thr Tyr Leu His Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
35 40 45

Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro
50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Phe Cys Ser Gln Ser
85 90 95

Thr His Val Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
100 105 110

264891.TXT

<210> 8
 <211> 112
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 8
 Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1 5 10 15
 Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
 20 25 30
 Gly Met Ser Trp Val Arg Gln Thr Pro Asp Lys Arg Leu Glu Leu Val
 35 40 45
 Ala Ser Ile Asn Ser Asn Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val
 50 55 60
 Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Tyr
 65 70 75 80
 Leu Gln Met Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys
 85 90 95
 Ala Ser Gly Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Ser Thr Leu Thr Val Ser Ser
 100 105 110

<210> 9
 <211> 336
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<400> 9
 gatgttgatga tgacccaaac tccactctcc ctgcctgtca gtcttggaga tcaagcctcc 60
 atctcttgca gatctagtca gagccttgta tatagtaatg gagacaccta ttacattgg 120
 tacctgcaga agccaggcca gtctccaaag ctctgatct acaaagtttc caaccgattt 180
 tctgggggtcc cagacagggt cagtggcagt ggatcaggga cagatttcac actcaagatc 240
 agcagagtgg aggctgagga tctgggagtt tatttctgct ctcaaagtac acatgttcct 300
 tggacgttcg gtggaggcac caagctagaa atcaaaa 336

<210> 10
 <211> 417
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<400> 10
 atgaagttgc ctgttaggct gttggtgctg atgttctgga ttcctgcttc cagcagtgat 60
 gttgtgatga cccaaactcc actctccctg cctgtcagtc ttggagatca agcctccatc 120

264891.TXT

tcttgcagat ctagtcagag ccttgtatat agtaatggag acacctat	180
ttt acattggtac	
ctgcagaagc caggccagtc tccaaagctc ctgatctaca aagtttccaa	240
ccgattttct	
ggggtcccag acaggttcag tggcagtgga tcagggacag atttcacact	300
caagatcagc	
agagtggagg ctgaggatct gggagtttat ttctgctctc aaagtacaca	360
tggtccttgg	
acgttcggtg gaggcaccaa gctagaaatc aaacgggctg atgctgcacc	417
aactgta	

<210> 11
 <211> 336
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<400> 11	
gagggtgcagc tgggtggagtc tggggggaggc ttagtgcagc ctggaggggc	60
cctgaaactc	
tcctgtgcag cctctggatt cactttcagt agctatggca tgtcttgggt	120
tcgccagact	
ccagacaaga ggctggaatt ggtcgcaagc atcaatagta atgggtggtag	180
cacctattat	
ccagacagtg tgaagggccg attcaccatc tccagagaca atgccaagaa	240
caccctgtac	
ctgcaaata gacagtctgaa gtctgaggac acagccatgt attactgtgc	300
aagtgggtgac	
tactgggggcc aaggctccac tctcacagtc tcctca	336

<210> 12
 <211> 408
 <212> DNA
 <213> Mus musculus

<400> 12	
atgrastts ggytcagmtt grttttcctt gcccttattt taaaagggtg	60
ccaatgtgag	
gtgcagctgg tggagtctgg gggaggccta gtgcagcctg gagggccct	120
gaaactctcc	
tgtgcagcct ctggattcac ttctcagtagc tatggcatgt cttggggttcg	180
ccagactcca	
gacaagaggc tggaattggt cgcaagcatc aatagtaatg gtggtagcac	240
ctattatcca	
gacagtgtga agggccgatt caccatctcc agagacaatg ccaagaacac	300
cctgtacctg	
caaatgagca gtctgaagtc tgaggacaca gccatgtatt actgtgcaag	360
tggtgactac	
tggggccaag gctccactct cacagtctcc tcagccaaaa caacaccc	408

<210> 13
 <211> 10
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (2)..(2)
 <223> Asn or Gln

<220>

<221> MOD_RES
 <222> (5)..(5)
 <223> Ala, Val, Leu, noleucine, Met, Phe o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (6)..(6)
 <223> Ala, Val, Leu, noleucine, Met, Phe o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (7)..(7)
 <223> Ala, Val, Leu, noleucine, Met, Phe or Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (8)..(8)
 <223> Ala, Val, Leu, Ser or Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (9)..(9)
 <223> Glu o Asp

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (10)..(10)
 <223> Glu o Asp

<400> 13
 His Xaa Lys Leu Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
 1 5 10

<210> 14
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (1)..(1)
 <223> His, Asn, Gln, Lys o Arg

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (3)..(3)
 <223> Asn o Gln

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (4)..(4)
 <223> His, Asn, Gln, Lys o Arg

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (5)..(5)
 <223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (6)..(6)

<223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>

<221> MOD_RES

<222> (9)..(9)

<223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>

<221> MOD_RES

<222> (10)..(10)

<223> Glu o Asp

<220>

<221> MOD_RES

<222> (11)..(11)

<223> Glu o Asp

<400> 14

Xaa His Xaa Xaa Xaa Xaa Phe Phe Xaa Xaa Xaa
1 5 10

<210> 15

<211> 10

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> MOD_RES

<222> (1)..(1)

<223> His, Asn, Gln, Lys o Arg

<220>

<221> MOD_RES

<222> (2)..(2)

<223> Asn o Gln

<220>

<221> MOD_RES

<222> (5)..(5)

<223> Ala, Val, Leu, noleucine, Met, Phe o Ile

<220>

<221> MOD_RES

<222> (8)..(8)

<223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>

<221> MOD_RES

<222> (9)..(9)

<223> Glu o Asp

<220>

<221> MOD_RES

<222> (10)..(10)

<223> Glu o Asp

<400> 15

Xaa Xaa Lys Leu Xaa Phe Phe Xaa Xaa Xaa
1 5 10

<210> 16
 <211> 10
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (2)..(2)
 <223> Asn or Gln

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (5)..(5)
 <223> Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (8)..(8)
 <223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (9)..(9)
 <223> Glu o Asp

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (10)..(10)
 <223> Glu or Asp

<400> 16
 His Xaa Lys Leu Xaa Phe Phe Xaa Xaa Xaa
 1 5 10

<210> 17
 <211> 10
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (1)..(1)
 <223> His, Asn, Gln, Lys o Arg

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (2)..(2)
 <223> Asn o Gln

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (5)..(5)
 <223> Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (8)..(8)
 <223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>

<221> MOD_RES
 <222> (9)..(9)
 <223> Glu or Asp

<400> 17
 Xaa Xaa Lys Leu Xaa Phe Phe Xaa Xaa Asp
 1 5 10

<210> 18
 <211> 10
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (2)..(2)
 <223> Asn or Gln

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (5)..(5)
 <223> Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (8)..(8)
 <223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (9)..(9)
 <223> Glu o Asp

<400> 18
 His Xaa Lys Leu Xaa Phe Phe Xaa Xaa Asp
 1 5 10

<210> 19
 <211> 10
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (1)..(1)
 <223> His, Asn, Gln, Lys o Arg

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (2)..(2)
 <223> Asn o Gln

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (3)..(3)
 <223> Lys, His, Asn, Gln o Arg

<220>
 <221> MOD_RES

264891.TXT

<222> (5)..(5)
 <223> Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (8)..(8)
 <223> Ala, Val, Leu, Ser o Ile

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (9)..(9)
 <223> Glu o Asp

<220>
 <221> MOD_RES
 <222> (10)..(10)
 <223> Glu o Asp

<400> 19
 Xaa Xaa Xaa Leu Xaa Phe Phe Xaa Xaa Xaa
 1 5 10

<210> 20
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 20
 Val His His Lys Leu Val Phe Phe Ala Glu Asp
 1 5 10

<210> 21
 <211> 219
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 21
 Asp Val Val Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Ser Leu Gly
 1 5 10 15

Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Val Tyr Ser
 20 25 30

Asn Gly Asp Thr Tyr Leu His Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
 35 40 45

Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro
 50 55 60

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
 65 70 75 80

Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Phe Cys Ser Gln Ser
 85 90 95

Thr His Val Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
 100 105 110

Arg Ala Asp Ala Ala Pro Thr Val Ser Ile Phe Pro Pro Ser Ser Glu
 115 120 125

Gln Leu Thr Ser Gly Gly Ala Ser Val Val Cys Phe Leu Asn Asn Phe
 130 135 140

Tyr Pro Lys Asp Ile Asn Val Lys Trp Lys Ile Asp Gly Ser Glu Arg
 145 150 155 160

Gln Asn Gly Val Leu Asn Ser Trp Thr Asp Gln Asp Ser Lys Asp Ser
 165 170 175

Thr Tyr Ser Met Ser Ser Thr Leu Thr Leu Thr Lys Asp Glu Tyr Glu
 180 185 190

Arg His Asn Ser Tyr Thr Cys Glu Ala Thr His Lys Thr Ser Thr Ser
 195 200 205

Pro Ile Val Lys Ser Phe Asn Arg Asn Glu Cys
 210 215

<210> 22
 <211> 448
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 22
 Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
 1 5 10 15

Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
 20 25 30

Gly Met Ser Trp Val Arg Gln Thr Pro Asp Lys Arg Leu Glu Leu Val
 35 40 45

Ala Ser Ile Asn Ser Asn Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val
 50 55 60

Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Tyr
 65 70 75 80

Leu Gln Met Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys
 85 90 95

Ala Ser Gly Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Ser Thr Leu Thr Val Ser Ser
 Página 10

100 105 110
 Ala Lys Thr Thr Pro Pro Ser Val Tyr Pro Leu Ala Pro Gly Cys Gly
 115 120 125
 Asp Thr Thr Gly Ser Ser Val Thr Leu Gly Cys Leu Val Lys Gly Tyr
 130 135 140
 Phe Pro Glu Ser Val Thr Val Thr Trp Asn Ser Gly Ser Leu Ser Ser
 145 150 155 160
 Ser Val His Thr Phe Pro Ala Leu Leu Gln Ser Gly Leu Tyr Thr Met
 165 170 175
 Ser Ser Ser Val Thr Val Pro Ser Ser Thr Trp Pro Ser Gln Thr Val
 180 185 190
 Thr Cys Ser Val Ala His Pro Ala Ser Ser Thr Thr Val Asp Lys Lys
 195 200 205
 Leu Glu Pro Ser Gly Pro Ile Ser Thr Ile Asn Pro Cys Pro Pro Cys
 210 215 220
 Lys Glu Cys His Lys Cys Pro Ala Pro Asn Leu Glu Gly Gly Pro Ser
 225 230 235 240
 Val Phe Ile Phe Pro Pro Asn Ile Lys Asp Val Leu Met Ile Ser Leu
 245 250 255
 Thr Pro Lys Val Thr Cys Val Val Val Asp Val Ser Glu Asp Asp Pro
 260 265 270
 Asp Val Gln Ile Ser Trp Phe Val Asn Asn Val Glu Val His Thr Ala
 275 280 285
 Gln Thr Gln Thr His Arg Glu Asp Tyr Asn Ser Thr Ile Arg Val Val
 290 295 300
 Ser Thr Leu Pro Ile Gln His Gln Asp Trp Met Ser Gly Lys Glu Phe
 305 310 315 320
 Lys Cys Lys Val Asn Asn Lys Asp Leu Pro Ser Pro Ile Glu Arg Thr
 325 330 335
 Ile Ser Lys Ile Lys Gly Leu Val Arg Ala Pro Gln Val Tyr Ile Leu
 340 345 350

264891.TXT

Pro Pro Pro Ala Glu Gln Leu Ser Arg Lys Asp Val Ser Leu Thr Cys
355 360 365

Leu Val Val Gly Phe Asn Pro Gly Asp Ile Ser Val Glu Trp Thr Ser
370 375 380

Asn Gly His Thr Glu Glu Asn Tyr Lys Asp Thr Ala Pro Val Leu Asp
385 390 395 400

Ser Asp Gly Ser Tyr Phe Ile Tyr Ser Lys Leu Asn Met Lys Thr Ser
405 410 415

Lys Trp Glu Lys Thr Asp Ser Phe Ser Cys Asn Val Arg His Glu Gly
420 425 430

Leu Lys Asn Tyr Tyr Leu Lys Lys Thr Ile Ser Arg Ser Pro Gly Lys
435 440 445

<210> 23

<211> 16

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 23

Arg Ser Ser Gln Ser Leu Val Tyr Ser Asn Gly Asp Thr Tyr Leu His
1 5 10 15

<210> 24

<211> 7

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 24

Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser
1 5

<210> 25

<211> 9

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 25

Ser Gln Ser Thr His Val Pro Trp Thr
1 5

<210> 26

<211> 10

<212> PRT

<213> Mus musculus

<400> 26

Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr Gly Met Ser
1 5 10

<210> 27
 <211> 17
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 27
 Ser Ile Asn Ser Asn Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val Lys Gly
 1 5 10 15

<210> 28
 <211> 3
 <212> PRT
 <213> Mus musculus

<400> 28
 Gly Asp Tyr
 1

<210> 29
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> péptido usado en la segunda librería

<400> 29
 Val His His Gln Lys Leu Val Phe Phe
 1 5

<210> 30
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> péptido usado en la segunda librería

<400> 30
 Ala His His Gln Lys Leu Val Phe Phe
 1 5

<210> 31
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> péptido usado en la segunda librería

<400> 31
 Val Ala His Gln Lys Leu Val Phe Phe
 1 5

<210> 32
 <211> 9
 <212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 32

Val His Ala Gln Lys Leu Val Phe Phe
1 5

<210> 33

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 33

Val His His Ala Lys Leu Val Phe Phe
1 5

<210> 34

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 34

Val His His Gln Ala Leu Val Phe Phe
1 5

<210> 35

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 35

Val His His Gln Lys Ala Val Phe Phe
1 5

<210> 36

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 36

Val His His Gln Lys Leu Ala Phe Phe
1 5

<210> 37

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 37

Val His His Gln Lys Leu Val Ala Phe
1 5

<210> 38

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 38

Val His His Gln Lys Leu Val Phe Ala
1 5

<210> 39

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la segunda librería

<400> 39

His His Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala
1 5

<210> 40

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la tercera librería

<400> 40

His His Gln Lys Leu Val Phe Phe Gly
1 5

<210> 41

<211> 9

<212> PRT

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> péptido usado en la tercera librería

<400> 41

His Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala Glu
1 5

<210> 42
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> péptido usado en la tercera librería

<400> 42
 His Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala Ala
 1 5

<210> 43
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> péptido usado en la tercera librería

<400> 43
 Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala Glu Asp
 1 5

<210> 44
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Secuencia artificial

<220>
 <223> péptido usado en la tercera librería

<400> 44
 Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala Glu Ala
 1 5

<210> 45
 <211> 12
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

<400> 45
 Val His His Gln Lys Leu Val Phe Phe Ala Glu Asp
 1 5 10

TRADUCCION OFICIAL No. 2008-08-13-584
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS

Traspaso de la invención llamada "PCT/EP2006/011862", documento escrito en inglés y en español.

Certificado Notarial, documento escrito en inglés y en español.

Traspaso de la invención llamada "PCT/EP2006/011862", documento escrito en inglés y en español.

Certificado Notarial, documento escrito en inglés y en español.

Atestación

Yo, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, Dr. Ronald M. Müller, por el presente certifico que las firmas adjuntas al presente son las firmas auténticas de la Dra. Ruth Greferath, ciudadana alemana, residente en Kehl, Alemania, y del Profesor Claude Nicolau, ciudadano francés, residente en Newton, Massachussets, Estados Unidos de América.

La autenticidad de las firmas fue establecida por medio de comparación.

Basilea, Suiza, este día 23 (veintitrés) de julio de 2008 (dos mil ocho).

Oblea notarial.

Leg. Prot. No. 909/2008

(firma: ilegible)
Dr. R. M. Müller
Notario

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Suiza
Este documento oficial
2. ha sido firmado por (ilegible)
3. actuando como (ilegible)
4. y certificado por el sello de (ilegible)

Certificado

5. en Basilea
6. el día 23 de julio de 2008
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea
8. No. 6'615/11'099
9. Sello/Estampilla
Sello de la Cancillería de Estado
10. Firma: ilegible
Heidi Fischer

Autenticación de firma No. 090 en el Consulado de Colombia en Berna.

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 13 de agosto de 2008, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTORA OFICIAL
RES. 2177/89 MIN. JUSTICIA
Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

MINISTERIO DE JUSTICIA
BOGOTÁ D.C.
2008 AGO 14 A 10:24
[Firma]
JEF. DE REGISTRO Y CONTROL
BOGOTÁ D.C.

ASSIGNMENT

TRASPASO

The undersign,

1. Ruth Greferath
2. David Hickman
3. Andreas Muhs
4. Andrea Pfeifer
5. Claude Nicolau

domiciled in

1. Am Ziegelhof 2, 77694 Kehl, Germany
2. Cité St. Michel 12, 1635 La Tour de Treme, Switzerland
3. Avenue des Cerisiers 39b, 1009 Pully, Switzerland
4. Route de Fenil 16A, 1806 St.-Légier, Switzerland
5. 166 Greenwood Street, Newton, MA 02459, USA

Los abajo firmados

1.

Domiciliado en

hereby state under oath to be sole and true inventor
of PCT/EP2006/011862

declaramos bajo juramento ser únicos y verdaderos
inventor de

State, as well that assign, without reservations or
imitation, in favor of

Declaramos así mismo que cedemos y transferimos
sin reserva ni limitación, a favor de

AC Infune SA

A corporation organized and existing under the laws
of Switzerland

Una sociedad organizada y existente de conformidad
con las leyes de

domiciled at

EPFL-PSE Building B
1015 Lausanne
Switzerland

domiciliada en

all rights inherent to said invention, and that the
above mentioned corporation hereby is enabled to
apply, in its name, for the corresponding patent in the
Republic of Colombia.

todos los derechos inherentes a dicha invención y
que la citada sociedad queda facultada para solicitar
en su nombre la patente correspondiente en la
República de Colombia


Claude Nicolau

CERTIFICADO NOTARIAL

A los días del mes de
de 200 , compareció personalmente ante
mí, Notario Público,

a quien doy fe de conocer y me consta que
persona descrita y firmante
del documento que precede, declarando ante mí que
otorga el mismo para los fines y propósitos que
en él se expresan.

Notario Público

NOTARIAL CERTIFICATE

On this day of
200 personally appeared before me, a Notary
Public,

to me known and known to me to be the person
described in and who executed the foregoing
document, and duly acknowledged to
me that executed the same for
the uses and purposes therein expressed.

Notary Public

ASSIGNMENT

TRASPASO

The undersign,

1. Ruth Greferath
2. David Hickman
3. Andreas Muhs
4. Andrea Pfeifer
5. Claude Nicolau

domiciled in

1. Am Ziegelhof 2, 77694 Kehl, Germany
2. Cité St. Michel 12, 1635 La Tour de Treme, Switzerland
3. Avenue des Cerisiers 39b, 1009 Pully, Switzerland
4. Route de Fenil 16A, 1806 St.-Légier, Switzerland
5. 166 Greenwood Street, Newton, MA 02459, USA

Los abajo firmados

1.

Domiciliado en

1.

hereby state under oath to be sole and true inventor
of PCT/EP2006/011862

declaramos bajo juramento ser únicos y verdaderos
inventor de

State, as well that assign, without reservations or
limitation, in favor of

Declaramos así mismo que cedemos y transferimos
sin reserva ni limitación, a favor de

AC Infune SA

A corporation organized and existing under the laws
of Switzerland

Una sociedad organizada y existente de conformidad
con las leyes de


domiciled at

domiciliada en

EPFL-PSE Building B
1015 Lausanne
Switzerland

all rights inherent to said invention, and that the
above mentioned corporation hereby is enabled to
apply, in its name, for the corresponding patent in the
Republic of Colombia.

todos los derechos inherentes a dicha invención y
que la citada sociedad queda facultada para solicitar
en su nombre la patente correspondiente en la
República de Colombia



RUTH GREFERATH

CERTIFICADO NOTARIAL

NOTARIAL CERTIFICATE

A los días del mes de
de 200 , compareció personalmente ante
mí, Notario Público,

On this day of
200 personally appeared before me, a Notary
Public,

a quien doy fé de conocer y me consta que
la persona descrita y firmante
del documento que precede, declarando ante mí que
otorga el mismo para los fines y propósitos que
en él se expresan.

Notario Público

to me known and known to me to be the person
described in and who executed the foregoing
document, and duly acknowledged to
me that executed the same for
the uses and purposes therein expressed.

Notary Public



Attestation

I, the undersigned notary public of Basel, Switzerland, Dr. Roland M. Müller, certify herewith that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Dr. Ruth Greferath**, German citizen, residing in Kehl, Germany, and of **Prof. Claude Nicolau**, French citizen, residing in Newton, Massachusetts, United States of America.

The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 23rd (twenty-third) day of July 2008 (two thousand and eight).

[Handwritten signature of Dr. R.M. Müller]
[Handwritten signature of Notary]

Dr. R.M. Müller
Notar

Leg.Prot.Nr. 909/2008

APOSTILLE

(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)

This official document

2. is signed by *[Handwritten signature]*

3. in his/her function as *[Handwritten signature]*

4. and certified by the seal of the *[Handwritten signature]*

Certified *[Handwritten date: 23. Juli 2008]*

5. in Basel (Bâle) 6. on *[Handwritten date: 23. Juli 2008]*

7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. no. *[Handwritten number: 66751M'099]*

9. seal/stamp:

10. Signature:

[Handwritten signature]
Heidi Fischer





Consulado de Colombia
Berna

Liberado

AUTENTICACION DE FIRMA No.

090

BERNA, 29 DE JULIO DEL 2008

El suscrito Segundo Secretario Encargado
de las Funciones Consulares de la Embajada de la República de
Colombia

CERTIFICA

Que la señora **HEIDI FISCHER**, que autoriza el presente documento, ejercía legalmente en la fecha expresada, las funciones de Oficial de la Cancillería de Estado del Cantón de Basilea y que la firma y sello que en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales, de acuerdo con el registro que se lleva en este Consulado.

El suscrito Segundo Secretario Encargado de las Funciones Consulares de la Embajada, no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento autenticado.

CESAR H. ESTRADA MOLINA



- Pagado Impuesto de Timbre: U\$ 10.00
- Pagado Derechos Consulares: U\$ 15.00

TRADUCCION OFICIAL No. 2008-08-13-585
DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS

Traspaso de la invención llamada "PCT/EP2006/011862", documento escrito en inglés y en español.

Certificado Notarial, documento escrito en inglés y en español.

Atestación

Yo, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, Dr. Matthias Staehelin, por el presente certifico que las firmas anteriores son las firmas auténticas del Dr. David Hickman, ciudadano británico, residente en La Tour-de-Trême, Suiza, del Dr. Andreas Muhs, ciudadano alemán, residente en Pully, Suiza, y del Profesor Andrea Pfeifer, ciudadano alemán, residente en Saint-Légier-La Chiésaz, Suiza.

Además por el presente certifico que las firmas anteriores son las firmas auténticas del Profesor Andrea Pfeifer, ciudadano alemán, residente en Saint-Légier-La Chiésaz, Suiza, y del Dr. Andreas Muhs, ciudadano alemán, residente en Pully, Suiza, ambos actuando por AC Immune SA, en Ecublens/VD, Suiza, al primera registrada como "directora", el segundo registrado como "director", ambos con firma conjunta.

La autenticidad de las firmas fue establecida por medio de comparación.

Basilea, Suiza, este día 25 (veinticinco) de junio de 2008 (dos mil ocho).

Oblea notarial.

Leg. Prot. No. 1453/2008

(firma: ilegible)
Dr. M. Staehelin
Notario

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Suiza
- Este documento oficial
2. ha sido firmado por (ilegible)
3. actuando como (ilegible)
4. y certificado por el sello de (ilegible)

Certificado

5. en Basilea
6. el día 27 de junio de 2008
7. por la Cancillería de Estado del Cantón de la Ciudad de Basilea
8. No. 5'775/9'656
9. Sello/Estampilla
10. Firma: ilegible
- Sello de la Cancillería de Estado
- Heidi Fischer

Autenticación de firma No. 089 en el Consulado de Colombia en Berna.

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 13 de agosto de 2008, en la ciudad de Bogotá, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficial, Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

COLOMBIA
BOGOTÁ
13 AGO 2008
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

TRADUCTORA OFICIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

COLOMBIA
BOGOTÁ
13 AGO 2008
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO

L3017 Co ACI

ASSIGNMENT

TRASPASO

The undersign,

Los abajo firmados

1. Ruth Greferath
2. David Hickman
3. Andreas Muhs
4. Andrea Pfeifer
5. Claude Nicolau

Domiciliado en

1. Am Ziegelhof 2, 77694 Kehl, Germany
2. Cité St. Michel 12, 1635 La Tour de Treme, Switzerland
3. Avenue des Cerisiers 39b, 1009 Pully, Switzerland
4. Route de Fenil 16A, 1806 St.-Légier, Switzerland
5. 166 Greenwood Street, Newton, MA 02459, USA

hereby state under oath to be sole and true inventor
of PCT/EP2006/011862

declaramos bajo juramento ser únicos y verdaderos
inventor de

State, as well that assign, without reservations or
limitation, in favor of

Declaramos así mismo que cedemos y transferimos
sin reserva ni limitación, a favor de

AC Imune SA

A corporation organized and existing under the laws
of Switzerland

Una sociedad organizada y existente de conformidad
con las leyes de

domiciled at

domiciliada en

EPFL-PSE Building B
1015 Lausanne
Switzerland

all rights inherent to said invention, and that the
above mentioned corporation hereby is enabled to
apply, in its name, for the corresponding patent in the
Republic of Colombia.

todos los derechos inherentes a dicha invención y
que la citada sociedad queda facultada para solicitar
en su nombre la patente correspondiente en la
República de Colombia


Andrea Pfeifer
CEO


Andreas Muhs
CSO

CERTIFICADO NOTARIAL

A los días del mes de
de 200 , compareció personalmente ante
mí, Notario Público,

a quien doy fé de conocer y me consta que
la persona descrita y firmante
del documento que precede, declarando ante mí que
otorga el mismo para los fines y propósitos que
en él se expresan.

Notario Público

NOTARIAL CERTIFICATE

On this day of
200 personally appeared before me, a Notary
Public,

to me known and known to me to be the person
described in and who executed the foregoing
document, and duly acknowledged to
me that executed the same for
the uses and purposes therein expressed.

Notary Public

Attestation

I, the undersigned notary public of Basel, Switzerland, Dr. Matthias Staehelin, certify herewith that the above signatures are the genuine signatures of **Dr. David Hickman**, British citizen, residing in La Tour-de-Trême, Switzerland, of **Dr. Andreas Muhs**, German citizen, residing in Pully, Switzerland, and of **Prof. Andrea Pfeifer**, German citizen, residing in Saint-Légier-La Chiésaz, Switzerland.

I further certify herewith that the above signatures are the genuine signatures of **Prof. Andrea Pfeifer**, German citizen, residing in Saint-Légier-La Chiésaz, Switzerland, and **Dr. Andreas Muhs**, German citizen, residing in Pully, Switzerland, both acting for **AC Immune SA**, in Écublens/VD, Switzerland, the first registered as "directrice", the second registered as "directeur", both with joint signature.

The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 25th (twenty-fifth) day of June 2008 (twothousandandeight).

M. Staehelin, Notar

Dr. M. Staehelin
Notar

Leg.Prot.Nr. 1453/2008



APOSTILLE	
(Hague Convention of October 5th, 1961)	
1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)	
This official document	
2. is signed by	<i>Dr. M. Staehelin</i>
3. in his/her function as	<i>Notar</i>
4. and certified by the seal of the	<i>Basel</i>
Certified <i>7. June 2008</i>	
5. in Basel (Bâle)	6. on
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt	
8. no. <i>5'775/19'656</i>	
9. Seal/stamp:	10. Signature: <i>Heidi Fischer</i>



Consulado de Colombia
Berna

AUTENTICACION DE FIRMA No.

089

BERNA, 29 DE JULIO DEL 2008

El suscrito Segundo Secretario Encargado
de las Funciones Consulares de la Embajada de la República de
Colombia

CERTIFICA

Que la señora **HEIDI FISCHER**, que autoriza el presente documento, ejerce legalmente en la fecha expresada, las funciones de Oficial de la Cancillería de Estado del Cantón de Basilea y que la firma y sello que en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales, de acuerdo con el registro que se lleva en este Consulado.

El suscrito Segundo Secretario Encargado de las Funciones Consulares de la Embajada, no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento autenticado.

CESAR H. ESTRADA MOLINA



- Pagado Impuesto de Timbre: U\$ 10.00
- Pagado Derechos Consulares: U\$ 15.00

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION PCT

Resumen -

(21) N° de solicitud:					(51) Int Cl:		A61K 39/395				
(22) Fecha de solicitud:					28-05-08		(71)Solicitante(s)		AC IMMUNE SA		
(30) Prioridad		(31)	No. Prioridad	(32)	Fecha	(33)	País	(72) Inventor(es)		GREFERATH, Ruth; HICKMAN, David; MUHS, Andreas; PFEIFER, Andrea y y NICOLAU, Claude.	
			05027092.5		12-12-05		EP				
			06014729.5		14-07-06		EP				
			06020766.9		02-10-06		EP				
							(74) Apoderado:		ALICIA LLOREDA RICAURTE		
(85)		Fecha limite inicio fase nacional:				12-07-08		(87)		Publicación internacional	
(86)		Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT						Fecha:		21/06/07	
		Fecha de presentación de la solicitud:				08/12/06		N° publicación:		WO 2007/068412 A3	
		No. de solicitud				PCT/EP2006/011862					
(54) Titulo:					ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECÍFICO BETA 1-42 CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS						

La presente invención proporciona nuevos métodos y composiciones que comprenden anticuerpos altamente específicos y altamente efectivos que tienen la capacidad de reconocer específicamente y unirse a los epítopes específicos de una gama de proteínas β -amiloides. Los anticuerpos habilitados por la enseñanza de la presente invención son particularmente útiles para el tratamiento de enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de placas amiloides que incluyen amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad, que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tales como la enfermedad de Alzheimer (AD).

(21) N° de solicitud:

(22) Fecha de solicitud: 28-05-08

(51) Clasificación Internacional: A61K 39/395

(71) Solicitante(s): **AC IMMUNE SA.**

(72) Inventor(es): GREFERATH, Ruth; HICKMAN, David; MUHS, Andreas; PFEIFER, Andrea y NICOLAU, Claude.

(74) Apoderado: **ALICIA LLORED RICAURTE**

(30) Prioridad	(31) No. Prioridad	(32) Fecha	(33) País
	05027092.5	12/12/05	EP
	06014729.5	14/07/06	EP
	06020766.9	02/10/06	EP

(85) Fecha límite inicio fase nacional: 12-07-08

(87) Publicación internacional

(86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT

Fecha: **21-06-07**

Fecha de presentación de la solicitud: 08-12-06

N° publicación: **WO 2007/068412 A3**

No. De solicitud: **PCT/EP2006/011862**

(54) Título: **ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECÍFICO BETA 1-42 CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS**

(21) N° de solicitud:

(22) Fecha de solicitud: 28-05-08

(51) Clasificación Internacional: A61K 39/395

(71) Solicitante(s): **AC IMMUNE SA**

(72) Inventor(es): GREFERATH, Ruth; HICKMAN, David; MUHS, Andreas; PFEIFER, Andrea y NICOLAU, Claude

(74) Apoderado: **ALICIA LLOREDA RICAURTE**

(30) Prioridad	(31) No. Prioridad	(32) Fecha	(33) País
	05027092.5	12/12/05	EP
	06014729.5	14/07/06	EP
	06020766.9	02/10/06	EP

FIGURA CARACTERISTICA
6 x 6 cm

(85) Fecha límite inicio fase nacional: 12-07-08

(86) Datos relativos a la presentación de la solíc. PCT
Fecha de presentación de la solicitud: 08-12-06
No. de solicitud: **PCT/EP2006/011862**

(87) Publicación internacional:

Fecha: **21-06-07**

No. Publicación: **WO 2007/068412 A3**

(54) Título: **ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECIFICO BETA 1-42 CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS**

(57) Resumen:

La presente invención se relaciona con métodos y composiciones para uso terapéutico y diagnóstico en el tratamiento de enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de trastornos y anomalías asociados con la proteína amiloide tales como la enfermedad de Alzheimer.

La presente invención proporciona nuevos métodos y composiciones que comprenden anticuerpos altamente específicos y altamente efectivos que tienen la capacidad de reconocer específicamente y unirse a los epítopes específicos de una gama de proteínas β -amiloides. Los anticuerpos habilitados por la enseñanza de la presente invención son particularmente útiles para el tratamiento de enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de placas amiloides que incluyen amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad, que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tales como la enfermedad de Alzheimer (AD).

ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECIFICO BETA 1-42 CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS

RESUMEN-OBJETO Y FINALIDAD DE LA INVENCION

La presente invención se relaciona con métodos y composiciones para uso terapéutico y diagnóstico en el tratamiento de enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de trastornos y anomalías asociados con la proteína amiloide tales como la enfermedad de Alzheimer.

La presente invención proporciona nuevos métodos y composiciones que comprenden anticuerpos altamente específicos y altamente efectivos que tienen la capacidad de reconocer específicamente y unirse a los epítopes específicos de una gama de proteínas β -amiloides. Los anticuerpos habilitados por la enseñanza de la presente invención son particularmente útiles para el tratamiento de enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de placas amiloides que incluyen amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad, que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tales como la enfermedad de Alzheimer (AD).

ANTICUERPO MONOCLONAL ESPECIFICO BETA 1-42 CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS

La presente invención se refiere a métodos y composiciones para uso terapéutico y diagnóstico en el tratamiento de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de enfermedades y anormalidades asociadas con la proteína amiloide tales como la enfermedad de Alzheimer.

La amiloidosis no es una entidad de enfermedad única sino más bien un grupo diverso de procesos de enfermedades progresivas caracterizados por depósitos en el tejido extracelular de una proteína cerosa semejante a almidón llamada amiloide, que se acumula en uno o más órganos o sistemas corporales. Una vez que se forman los depósitos de amiloide, comienzan a interferir en la función normal del órgano o sistema corporal. Existen por lo menos 15 tipos diferentes de amiloidosis. Las formas principales son la amiloidosis primaria sin antecedentes conocidos, la amiloidosis secundaria después de alguna otra afección y la amiloidosis hereditaria.

La amiloidosis secundaria se produce en gente que tiene una infección crónica o enfermedad inflamatoria, tal como tuberculosis, una infección bacteriana llamada fiebre Mediterránea familiar, infecciones óseas (osteomielitis), artritis reumatoide, inflamación del intestino delgado (ileítis granulomatosa), enfermedad de Hodgkin y lepra.

Los depósitos de amiloide típicamente contienen tres componentes. Las fibrillas de la proteína amiloide, que representan aproximadamente el 90% del material amiloide, comprenden uno de varios tipos diferentes de proteínas. Estas proteínas se pueden plegar en las llamadas fibrillas de hojas "beta-plegadas", una configuración proteica única que exhibe sitios de unión para el rojo Congo que producen las propiedades de tinción únicas de la

proteína amiloide. Además, los depósitos de amiloide está estrechamente asociados con el componente amiloide P (pentagonal) (AP), una glicoproteína relacionada con el amiloide P sérico normal P (SAP), y con glicosaminoglicanos sulfatados (GAG), carbohidratos complejos del tejido conectivo.

Muchas enfermedades del envejecimiento se basan en o están asociadas con proteínas de tipo amiloide y se caracterizan, en parte, por la formación de depósitos extracelulares de material amiloide o de tipo amiloide que contribuyen a la patogénesis, además del avance de la enfermedad. Estas enfermedades incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tales como la enfermedad de Alzheimer (AD), que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tales como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve (MCI), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam. Otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide son la parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeldt Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionada con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular.

Si bien la patogénesis de estas enfermedades puede ser diversa, sus depósitos característicos con frecuencia contienen muchos constituyentes moleculares compartidos. En gran medida, esto se puede atribuir a la activación local de las vías pro-inflamatorias que de este modo producen la deposición concurrente de los componentes del complemento activado,

reactantes de fase aguda, moduladores inmunes y otros mediadores inflamatorios (McGeer et al., 1994).

La enfermedad de Alzheimer (AD) es un trastorno neurológico que se considera que está causado principalmente por las placas amiloides, una acumulación de depósito anormal de proteínas en el cerebro. El tipo de amiloide hallado con mayor frecuencia en el cerebro de los individuos afectados está compuesto principalmente de fibrillas $A\beta$. Las evidencias científicas demuestran que un aumento de la producción y acumulación de proteína beta-amiloide en las placas conduce a la muerte de la célula nerviosa, lo que contribuye al desarrollo y avance de la AD. La pérdida de células nerviosas en áreas cerebrales estratégicas, su vez, causa la reducción de los neurotransmisores y el deterioro de la memoria. Las proteínas principalmente responsables de la formación de la placa incluyen la proteína precursora de amiloide (APP) y dos presenilinas (presenilina I y presenilina II). La escisión secuencial de la proteína precursora de amiloide (APP), que se expresa en forma constitutiva y es catabolizada en la mayoría de las células por las enzimas β y γ secretasa conduce a la liberación de un péptido $A\beta$ de 39 a 43 aminoácidos. La degradación de las APP probablemente aumenta su propensión a agregarse en placas. El fragmento de $A\beta(1-42)$ es el que tiene principalmente una alta propensión a formar agregados debido a dos residuos de aminoácidos muy hidrofóbicos en su extremo C-terminal. El fragmento $A\beta(1-42)$ por consiguiente se considera que está principalmente involucrado y es el responsable de la iniciación de la formación de la placa neurítica en la AD y tiene, en consecuencia, un alto potencial patológico. Por lo tanto, se necesitan anticuerpos específicos que puedan localizar y dispersar la formación de placa amiloide.

Los síntomas de AD se manifiestan lentamente y el primer síntoma puede ser sólo olvido leve. En esta etapa, los individuos pueden olvidar eventos recientes, actividades, los nombres de gente o cosas familiares y pueden no ser capaces de resolver problemas de matemática simples. Debido a que la enfermedad avanza, los síntomas se advierten más fácilmente y se convierten en suficientemente graves y origina que la gente con AD o los miembros de su familia busquen ayuda médica. Los síntomas del estadio medio de AD incluyen el olvido de cómo realizar tareas simples tales como el arreglo personal y desarrollo de problemas con el lenguaje, comprensión, lectura o escritura. En el estadio tardío de la AD los pacientes se pueden volver ansiosos o agresivos, pueden alejarse del hogar y finalmente necesitan atención total.

En la actualidad, la única manera definida para diagnosticar AD es identificar las placas y ovillos en el tejido cerebral en una autopsia después de la autopsia del individuo. En consecuencia, los médicos sólo pueden hacer un diagnóstico de AD "posible" o "probable" mientras la persona está todavía viva. Mediante los métodos actuales, los médicos pueden diagnosticar AD en forma correcta hasta el 90 por ciento de las veces empleando diversas herramientas para diagnosticar AD "probable". Los médicos realizan preguntas acerca de la salud general de la persona, problemas médicos del pasado y los antecedentes de cualquier dificultad de la persona para llevar a cabo las actividades diarias. Las pruebas conductuales de memoria, resolución de problemas, atención, cálculo y lenguaje proporcionan información sobre la degeneración cognitiva y pruebas médicas tales como exámenes de sangre, orina o líquido espinal y barridos cerebrales pueden proporcionar alguna información adicional.

El manejo de la AD consiste en tratamientos basados en medicación y no medicación. Los tratamientos destinados a cambiar el curso subyacente de la enfermedad (retardar o revertir el avance) han sido hasta el momento en gran parte infructuosos. Los medicamentos que restauran el déficit (defecto), o mal funcionamiento, de los mensajeros químicos de las células nerviosas (neurotransmisores), en particular los inhibidores de colinesterasa (ChEI) tales como tacrina y rivastigmina, han demostrado mejorar los síntomas. Los ChEI impiden la degradación enzimática de los neurotransmisores, de este modo aumenta la cantidad de mensajeros químicos disponibles para transmitir las señales nerviosas en el cerebro.

Para algunas personas en los estadios temprano y medio de la enfermedad, los fármacos tacrina (COGNEX[®], Morris Plains, NJ), donepezil (ARICEPT[®], Tokyo, JP), rivastigmina (EXELON[®], East Hanover, NJ), o galantamina (REMINYL[®], New Brunswick, NJ) pueden ayudar a prevenir algunos síntomas del empeoramiento durante un tiempo limitado. Otro fármaco, la memantina (NAMENDA[®], New York, NY), ha sido aprobado para el tratamiento de la AD de moderada a severa. Las medicaciones están también disponibles para tratar las manifestaciones psiquiátricas de la AD. También, algunas medicinas pueden ayudar a controlar los síntomas conductuales de la AD tal como insomnio, agitación, deambulación errática, ansiedad y depresión. El tratamiento de estos síntomas con frecuencia brinda mayor comodidad a los pacientes y hace más fácil la atención a sus cuidadores. Desafortunadamente, a pesar de que los significativos avances del tratamiento con esta clase de agentes muestran que este es regularmente mejor que un placebo, la enfermedad continúa su avance y el efecto promedio en el funcionamiento mental solo ha sido modesto. Muchos de estos fármacos usados en la medicación de la AD tal como, por ejemplo, los ChEI

también tienen efectos secundarios que incluyen disfunción gastrointestinal, toxicidad hepática y pérdida de peso.

Otras enfermedades que se basan o asocian con la acumulación y depósito de proteína de tipo amiloide son deterioro cognitivo leve, demencia de cuerpos de Lewy (LBD), esclerosis lateral amiotrófica (ALS), miositis con cuerpos de inclusión (IBM) y degeneración macular, en particular degeneración macular relacionada con la edad (AMD).

El deterioro cognitivo leve (MCI) es un término general definido más comúnmente como un trastorno de la memoria sutil pero medible. Una persona con MCI experimenta más problemas de memoria que los que normalmente esperados en el envejecimiento, pero no muestra otros síntomas de demencia, tal como juicio o razonamiento deteriorado. El MCI es una afección que con frecuencia refleja un estadio preclínico de la AD.

Se considera que el depósito de β -amiloide en la corteza entorhinal (EC) cumple un papel clave en el desarrollo del deterioro cognitivo leve (MCI) en las personas de edad avanzada. Esto está en línea con la observación de que los niveles de CSF-A- $A\beta(1-42)$ de declinan significativamente una vez que la AD se vuelve clínicamente manifiesta. En contraste con lo niveles de CSF-A $\beta(1-42)$, los de CSF-tau están significativamente aumentados en el estadio MCI y estos valores continúan elevados a partir de ese momento, lo que indica que los niveles de CSF-tau aumentados pueden ayudar a detectar sujetos con MCI a los que se pronostica el desarrollo de la AD.

La demencia de los cuerpos de Lewy (LBD) es un trastorno neurodegenerativo que se puede producir en personas mayores de 65 años, que generalmente causa síntomas de deterioro cognitivo (pensamiento) y cambios conductuales anormales. Los síntomas pueden incluir deterioro cognitivo, signos neurológicos, trastornos del sueño y falla autonómica. El

deterioro cognitivo es el rasgo característico de la LBD en la mayoría de los casos. Los pacientes tienen episodios recurrentes de confusión que empeoran progresivamente. La fluctuación de la capacidad cognitiva con frecuencia se asocia con cambios en el grado de atención y estado de alerta. El deterioro cognitivo y las fluctuaciones del pensamiento pueden variar durante minutos, horas o días.

Los cuerpos de Lewy se forman a partir de las proteínas fosforiladas y no fosforiladas de los neurofilamentos; estos contienen la proteína sináptica alfa-sinucleína además de ubiquitina, la cual está involucrada en la eliminación de las proteínas dañadas o anormales. Además de los cuerpos de Lewy, las neuritas de Lewy, que son cuerpos de inclusión en los procesos celulares de las células nerviosas, también pueden estar presentes. Las placas amiloides se pueden formar en los cerebros de los pacientes afectados con DLB, sin embargo tienden a ser menores en número que los que se observan en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Los ovillos neurofibrilares, la otra marca distintiva micropatológica de la AD, no son una característica principal de la DLB pero con frecuencia están presentes además de las placas amiloides.

La esclerosis lateral amiotrófica (ALS) se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras superiores o inferiores. En algunos pacientes con ALS, puede estar presente la demencia o afasia (ALS-D). La demencia es más comúnmente una demencia frontotemporal (FTD), y muchos de estos casos tienen inclusiones ubiquitina-positivas, tau-negativas en neuronas del giro dentado y capas superficiales de los lóbulos frontal y temporal.

La miositis con cuerpos de inclusión (IBM) es una enfermedad invalidante que se halla usualmente en gente de más 50 años, en la cual as

fibras musculares desarrollan inflamación y comienzan atrofiarse —pero en la cual el cerebro está conservado y los pacientes mantienen su intelecto completo. Se hallaron dos enzimas comprometidas en la producción de la proteína β -amiloide aumentadas en el interior de las células musculares de los pacientes con esta enfermedad muscular progresiva más común en personas de edad avanzada, en la cual la β -amiloide también está aumentada.

Otra enfermedad que se basa o está asociada con la acumulación y depósito de la proteína de tipo amiloide es la degeneración macular.

La degeneración macular es una enfermedad ocular común que causa deterioro de la mácula, que es el área central de la retina (el tejido delgado como un papel en la parte posterior del ojo donde las células sensibles a la luz envían señales visuales al cerebro). La visión 'frontal' clara, aguda está procesada por la mácula. El daño en la mácula produce el desarrollo de puntos ciegos y visión distorsionada o borrosa. La degeneración macular relacionada con la edad (AMD) es una causa principal de deterioro visual en los Estados Unidos y para gente de mayor de 65 años es la causa principal de ceguera legal entre los caucásicos. Aproximadamente 1,8 millones de americanos de 40 años y mayores tienen AMD avanzada, y otros 7,3 millones de personas con AMD intermedia tienen riesgo sustancial de pérdida de visión. El gobierno estima que para 2020 habrá 2,9 millones de personas con AMD avanzado. Las víctimas de AMD con frecuencia se sorprenden y frustran al descubrir cuan poco se sabe acerca de las causas y tratamiento de esta afección cegadora.

Existen dos formas de degeneración macular: degeneración macular seca y degeneración macular húmeda. La forma seca, en la cual las células de la mácula comienzan a alterarse lentamente se diagnostica en el 85 por

ciento de los casos de degeneración macular. Usualmente ambos ojos están afectados por la AMD seca, si bien un ojo puede perder visión mientras que el otro ojo permanece sin afectar. Los drusen, que son depósitos amarillos bajo la retina, son signos comunes tempranos de la AMD seca. El riesgo de desarrollar AMD seca avanzada o AMD húmeda aumenta a medida que aumenta el número o tamaño de los drusen. Es posible que la AMD seca avance y cause pérdida de visión sin transformarse en la forma húmeda de la enfermedad, también es posible que la AMD seca en estadio temprano cambie de repente a la forma húmeda.

La forma húmeda, aunque solo representa el 15 por ciento de los casos causa el 90 por ciento de las cegueras y se la considera AMD avanzada (no hay estadio temprano ni intermedio de la AMD húmeda). La AMD húmeda es siempre precedida por la forma seca de la enfermedad. A medida que la forma seca empeora, algunas personas comienzan a tener un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos detrás de la mácula. Estos vasos son muy frágiles y filtrarán líquido y sangre (de aquí degeneración macular 'húmeda'), lo que provoca un daño rápido a la mácula.

La forma seca de la AMD con frecuencia causará inicialmente visión ligeramente borrosa. El centro de la visión en particular luego se convierte en borrosa y esta región crece más a medida que la enfermedad avanza. Solo se pueden advertir síntomas si solo un ojo está afectado. En la AMD húmeda, las líneas rectas pueden parecer onduladas y se puede producir rápidamente la pérdida de visión central.

El diagnóstico de la degeneración macular generalmente incluye un examen de ojo dilatado, prueba de agudeza visual y un examen de la parte posterior del fondo de ojo mediante un procedimiento llamado examen de fondo de ojo para ayudar a diagnosticar la AMD, y —si se sospecha AMD húmeda—

también se puede realizar angiografía con fluoresceína. Si la AMD seca llega a los estadios avanzados, actualmente no existe un tratamiento para impedir la pérdida de visión. Sin embargo, una fórmula de dosis altas de antioxidantes específicos y zinc puede retrasar o impedir que la AMD intermedia evolucione al estado avanzado. El Macugen® (inyección de pegaptanib sódica), fotocoagulación láser y la terapia fotodinámica pueden controlar el crecimiento de los vasos sanguíneos y el sangrado en la mácula, lo cual es útil para algunas de las personas que tienen AMD húmeda; sin embargo, la visión que ya se ha perdido no se recuperará con estas técnicas. Si la visión ya está perdida, existen auxiliares de la visión baja que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida.

Uno de los signos más tempranos de la degeneración macular relacionado con la edad (AMD) es la acumulación de depósitos extracelulares conocidos como drusen entre la lámina basal del epitelio pigmentado retiniano (RPE) y la membrana de Bruch (BM). Estudios recientes realizados por Anderson et al. A han confirmado que el drusen contiene beta amiloide. (Experimental Eye Research 78 (2004) 243-256).

La investigación en curso continúa con los estudios que exploran los factores ambientales, genéticos y dietarios que pueden contribuir a la AMD. También se están explorando nuevas estrategias de tratamiento, que incluyen trasplantes de células de la retina, fármacos que evitarán o disminuirán el avance de la enfermedad, terapia con radiación, terapias génicas, Un chip de computadora implantado en la retina que puede ayudar a estimular la visión y agentes que evitarán el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos bajo la mácula.

Un factor importante para considerar cuando se desarrollan nuevos fármacos es la facilidad de uso para los pacientes seleccionados. La

administración oral, -específicamente comprimidos, cápsulas y geles blandos -, representa el 70% de todas las formas de dosificación consumidas debido a conveniencia del paciente. Los desarrolladores de fármacos concuerdan en que los pacientes prefieren la administración oral más que someterse a inyecciones u otras formas más invasivas de administración medicinal. Las formulaciones que dan como resultado intervalos de dosificación menores (es decir, una vez al día o liberación sostenida) son también preferibles. La facilidad de administrar antibióticos en formas de dosificación orales produce un aumento del cumplimiento del paciente durante el tratamiento.

Se necesitan métodos y composiciones efectivas para la generación de anticuerpos altamente específicos y altamente efectivos, este es un prerrequisito si los anticuerpos son para ser proporcionados en una forma de dosis oral. Con preferencia tales anticuerpos deberán reconocer epitopes específicos en diversos antígenos tal como proteína amiloide.

También se requieren en consecuencia, composiciones y métodos efectivos para referirse a las complicaciones asociadas con enfermedades y trastornos causados o asociados con la proteína amiloide o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear

progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeld Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos que incluyen degeneración macular. En particular se necesitan anticuerpos especializados y altamente efectivos capaces de contrarrestar las manifestaciones fisiológicas de la enfermedad tales como la formación de placas asociadas con la agregación de fibras del péptido amiloide o de tipo amiloide.

Se ha demostrado que los anticuerpos antiamiloides estimulados por la inoculación de A β ₁₋₄₂ mezclado con adyuvante de Freund completo o incompleto son capaces de reducir la sobrecarga en ratones transgénicos para la enfermedad de Alzheimer (Schenk et al., 1999).

La inoculación intraperitoneal de A β ₁₋₁₆ tetrapalmitoilado reconstituido en liposomas en ratones transgénicos NORBA estimuló títulos significativos de anticuerpos anti-amiloides, que también demostró poder solubilizar fibras y placas amiloides *in vitro* e *in vivo*. (Nicolau et al., 2002).

Un mecanismo posible por el cual se produce la disolución de las placas amiloides fue sugerida primero por Bard et al., (2000), quien propuso la conclusión, sobre la base de sus datos, de que los anticuerpos opsonizaron las placas, que posteriormente fueron destruidas por los macrófagos de la microglia. De Mattos et al., (2001) indicaron que un MAb dirigido contra el dominio central del β -amiloide fue capaz de unir y secuestrar completamente el plasma amiloide. Estos sostuvieron que la presencia de estos mAb en circulación modificó el equilibrio de A β entre cerebro y plasma, lo cual favorece la depuración periférica y el catabolismo en vez del depósito dentro del cerebro.

La presente invención proporciona nuevos métodos y composiciones que comprenden anticuerpos altamente específicos y altamente efectivos que tienen la capacidad de reconocer y unirse específicamente a los epitopes específicos a partir de una variedad de antígenos β -amiloides. Los anticuerpos permitidos por las descripciones de la presente invención son particularmente útiles para el tratamiento de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con la proteína amiloide o de tipo amiloide que incluyen la amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeldt Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionada con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos que incluyen degeneración macular, por nombrar solo unos pocos.

Además, la presente invención proporciona nuevos métodos y composiciones para retener o aumentar la capacidad de memoria cognitiva en un mamífero que presenta una enfermedad o afección asociada con el amiloide que comprende la administración a un animal, particularmente un mamífero, más particularmente a un ser humano que requiere tal tratamiento,

una cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo monoclonal de acuerdo con la invención.

BREVE DESCRIPCIÓN DE FIGURAS Y SECUENCIAS

Figura 1: Péptidos derivados de las secuencias 1-15, 1-16 y 1-16(Δ 14), 22-35 y 29-40 de A β

Figura 2: Unión del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 a las especies amiloides en una transferencia Western y transferencia en mancha

Figura 3: Unión del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 a las fibras amiloides por microscopía electrónica de transmisión.

Figura 4: Resultados de un experimento comparativo entre el ensayo de Th-T fluorescente y RMN en estado sólido del péptido 1-42 β -amiloide marcado con U- ^{13}C Tyr10 y Val12.

SEC ID NO: 1: Péptido antigénico A β ₁₋₁₅

SEC ID NO: 2: Péptido antigénico A β ₁₋₁₆

SEC ID NO: 3: Péptido antigénico A β _{1-16(Δ 14)}

SEC ID NO: 4: Péptido antigénico A β ₂₂₋₃₅

SEC ID NO: 5: Péptido antigénico A β ₂₉₋₄₀

SEC ID NO: 6: Péptido antigénico A β ₁₋₁₇

SEC ID NO: 7: Secuencia de aminoácidos de la región variable de la cadena liviana C2 de ratón

SEC ID NO: 8: Secuencia de aminoácidos de la región variable de la cadena pesada C2 de ratón

SEC ID NO: 9: Secuencia de nucléotidos de la región variable de la cadena liviana C2 de ratón

SEC ID NO: 10: Secuencia de nucléotidos de la región variable de cadena liviana C2 de ratón que incluye las secuencias señal

SEC ID NO: 11: Secuencia de nucleótidos de la región variable de la cadena pesada C2 de ratón

SEC ID NO: 12: Secuencia de nucleótidos de la región variable de cadena pesada de ratón que incluye las secuencias señal

SEC ID NO: 13-20: Variantes de secuencia de aminoácidos de la región epitópica del péptido A β

SEC ID NO: 21: Secuencia de aminoácidos de la cadena liviana C2 de ratón

SEC ID NO: 22: Secuencia de aminoácidos de la cadena pesada C2 de ratón

La presente invención hace uso de las presentaciones de antígenos que producen la exposición y estabilización aumentada de una conformación antigénica preferida, que finalmente origina anticuerpos con propiedades únicas.

En una realización de la invención se proporciona un anticuerpo que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo o más particularmente, un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, que ha sido originado contra una construcción antigénica supramolecular que comprende un péptido antigénico correspondiente a la secuencia de aminoácidos del péptido β -amiloide, particularmente del péptido β amiloide A β_{1-15} , A β_{1-16} y A $\beta_{1-16(\Delta 14)}$, modificado con un residuo hidrofóbico tal como, por ejemplo, ácido palmítico o un residuo hidrofílico tal como, por ejemplo, polietilenglicol (PEG) o una combinación de ambos donde dicho residuo hidrofóbico e hidrofílico, respectivamente, está unido en forma covalente con cada uno de estos términos del péptido antigénico mediante por lo menos uno, particularmente uno o dos

aminoácidos tal como, por ejemplo, lisina, ácido glutámico y cisterna o cualquier otro aminoácido o análogo de aminoácido adecuado capaz de actuar como dispositivo conector para acoplar los residuos hidrofóbico e hidrofílico al fragmento del péptido. Cuando se usa PEG como residuo hidrofílico, los términos de PEG libres están unidos en forma covalente con fosfatidiletanolamina o cualquier otro compuesto adecuado para funcionar como elemento de anclaje, por ejemplo, para insertar la construcción antigénica en la bicapa del liposoma.

En otra realización de la invención, se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, el cual reconoció la conformación nativa del amiloide ya que se une en forma específica a oligómeros y fibras amiloides, pero no a las especies de amiloide lineal.

En una realización adicional de la invención, se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo de acuerdo con la presente invención y como se describió antes en la presente memoria, tal anticuerpo o fragmento se une a un monómero A β con afinidad de unión de por lo menos aproximadamente 1×10^{-6} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-8} , particularmente de por lo menos aproximadamente 1×10^{-6} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-7} , más particularmente de por lo menos aproximadamente 1×10^{-7} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-8} , aún más particularmente de por lo menos aproximadamente 1×10^{-7} a por lo menos aproximadamente 4×10^{-7} pero, con preferencia no muestra ninguna reactividad cruzada con la proteína precursora del amiloide (APP).

En otra realización de la invención, se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo

funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo de acuerdo con la presente invención y como se describió antes en la presente memoria, tal anticuerpo o fragmento se une a una fibra, fibrilla o filamento de A β con una afinidad de por lo menos aproximadamente 1×10^{-7} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-9} , particularmente de por lo menos aproximadamente 1×10^{-7} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-8} , más particularmente de por lo menos aproximadamente 1×10^{-8} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-9} , aún más particularmente de por lo menos aproximadamente 1×10^{-8} a por lo menos aproximadamente 5×10^{-8} , pero, con preferencia no muestra ninguna reactividad cruzada significativa con la proteína precursora del amiloide (APP).

En otra realización, el anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo de acuerdo con la presente invención y como se describió antes en la presente memoria exhibe una afinidad de unión con una fibra, fibrilla o filamento de A β que es por lo menos 5 veces, particularmente por lo menos 10 veces, más particularmente por lo menos 15 veces, superior a la afinidad de unión con un monómero de A β .

Los anticuerpos de acuerdo con la invención son capaces de inhibir, *in vitro* e *in vivo*, la agregación de péptidos monoméricos amiloidogénios, específicamente péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos A β monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente péptidos monoméricos A β_{1-42} en fibrillas o filamentos amiloides poliméricos de alto peso molecular.

En una realización específica de la invención un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo

después de la co-incubación con péptidos amiloides monoméricos, particularmente péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, inhibe la agregación de los monómeros de $A\beta$ en fibrillas poliméricas de alto peso molecular.

En una realización adicional de la invención se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación, particularmente la co-incubación en una relación de concentraciones molares de hasta 1:100, más particularmente en una relación de concentraciones molares entre 1:30 y 1:100, pero especialmente en una relación de concentraciones molares de 1:100, con los péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42 o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, inhibe la agregación de los monómeros de $A\beta$ en fibrillas poliméricas de alto peso molecular. En particular, dicha inhibición llega a por lo menos 50%, particularmente a por lo menos 65%, más particularmente a por lo menos 75%, aun más particularmente a por lo menos 80%, pero especialmente a por lo menos 85%-90%, o más en comparación con los monómeros del péptido amiloide respectivo incubado en buffer (control).

En particular, la co-incubación del anticuerpo de acuerdo con la invención con los péptidos amiloides monoméricos se lleva a cabo durante 24 horas a 60 horas, particularmente durante 30 horas a 50 horas, más particularmente durante 48 horas a una temperatura entre 28°C y 40°C, particularmente entre 32°C y 38°C, más particularmente a 37°C.

En otra realización la presente invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación durante 48 horas a 37°C con una relación de concentraciones molares de 1:100 con un péptido amiloide monomérico, específicamente un péptido β -amiloide monomérico tal como, por ejemplo, el péptido $A\beta$ monomérico 1-39; 1-40, 1-41, 1-42 o 1-43, pero especialmente un péptido $A\beta_{1-42}$ monomérico, es capaz de inhibir la agregación de los monómeros amiloides, particularmente la agregación de los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42 o 1-43, pero especialmente del péptido $A\beta_{1-42}$ monomérico en fibrillas o filamentos poliméricas de alto peso molecular en por lo menos 85%, particularmente en por lo menos 89% y más particularmente en por lo menos 95% en comparación con los monómeros del péptido amiloide incubado en buffer (control).

En una realización específica, la invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, que exhibe alta especificidad con los péptidos monoméricos $A\beta_{1-42}$ pero muestra esencialmente ninguna o sólo mínima reactividad cruzada con los péptidos monoméricos $A\beta_{1-38}$, $A\beta_{1-39}$, $A\beta_{1-40}$, y/o $A\beta_{1-41}$, particularmente un anticuerpo, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es hasta 100 veces, particularmente 50 a 100 veces, más particularmente 80 a 100 veces, pero especialmente 100 veces más sensible con el péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ en comparación con $A\beta_{1-38}$, $A\beta_{1-39}$, $A\beta_{1-40}$, $A\beta_{1-41}$ y hasta 1000 veces, particularmente 500 a 1000 veces, más particularmente

800 a 1000 veces, pero especialmente 1000 veces más sensible al péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ en comparación con $A\beta_{1-38}$, y de este modo capaz de inhibir, *in vitro* e *in vivo*, la agregación de péptidos monoméricos amiloidogénicos, pero especialmente del péptido amiloide $A\beta_{1-42}$.

En otra realización específica de la invención un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, que tiene una alta sensibilidad de unión al péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ y es capaz de detectar fibras de $A\beta_{1-42}$ en una concentración de debajo de por lo menos 0,001 μg , pero particularmente en un rango de concentración de entre 0,5 μg y 0,001 μg , más particularmente entre 0,1 μg y 0,001 μg , pero especialmente en una concentración de 0,001 μg .

En una realización muy específica de la invención se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es capaz de detectar una cantidad de fibras de $A\beta_{1-42}$ por debajo de una concentración mínima de 0,001 μg y fibras de $A\beta_{1-40}$ por debajo de una concentración mínima de 0,1 μg y fibras de $A\beta_{1-38}$ por debajo de una concentración mínima de 1 μg de fibras.

La unión de los anticuerpos de acuerdo con la invención y como se describió antes en la presente memoria a los péptidos monoméricos amiloidogénicos pero, particularmente, a la forma amiloide (1-42) conduce a la inhibición de la agregación de los péptidos monoméricos amiloidogénicos a las fibrillas o filamentos de alto peso molecular. Mediante la inhibición de la agregación de los péptidos monoméricos amiloidogénicos los anticuerpos de acuerdo con la presente invención son capaces de impedir o disminuir la formación de placas amiloides, particularmente la forma amiloide (1-42), la

cual se sabe que se torna insoluble por el cambio de la conformación secundaria y constituye la mayor parte de las placas amiloides en los cerebros de los animales o seres humanos enfermos.

La potencial inhibición de la agregación del anticuerpo de acuerdo con la invención se puede determinar por cualquier método adecuado conocido en el arte, particularmente por ultracentrifugación por gradiente de densidad seguida por el análisis por sedimentación SDS-PAGE con un gradiente preestablecido y/o por un ensayo de tioflavina T (Th-T) fluorescente.

La presente invención además proporciona anticuerpos, que después de la co-incubación con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular por la agregación de los péptidos amiloides monoméricos, específicamente péptidos β amiloides monoméricos tales como, por ejemplo, péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42 o 1-43, pero especialmente los péptidos monoméricos $A\beta_{1-42}$ es capaz de desagregar dichas fibrillas o filamentos amiloides poliméricos de alto peso molecular.

En otra realización de la invención se proporciona un anticuerpo, pero especialmente un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación con una relación de concentraciones molares de hasta 1:100, más particularmente con una relación de concentraciones molares entre 1:30 y 1:100, pero especialmente con una relación de concentraciones molares de 1:100, con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42 o 1-43, pero especialmente los péptidos monoméricos $A\beta_{1-42}$ es capaz de desagregar las fibrillas o filamentos poliméricos preformados en por lo menos

35%, particularmente en por lo menos 40%, más particularmente en por lo menos 50%, aún más particularmente en por lo menos 60%, pero especialmente en por lo menos 70% o más.

En particular, el anticuerpo de acuerdo con la invención se co-incuba con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular durante 12 horas a 36 horas, particularmente durante 18 horas a 30 horas, más particularmente durante 24 horas a una temperatura entre 28°C y 40°C, particularmente entre 32°C y 38°C, más particularmente a 37°C.

En una realización específica, la invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación durante 24 horas a 37°C con una relación de concentraciones molares de 1:100 con las fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, péptidos A β monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos monoméricos A β ₁₋₄₂ es capaz de desagregar dichas fibrillas o filamentos poliméricos de alto peso molecular preformados en por lo menos 35%, particularmente en por lo menos 40%, más particularmente en por lo menos 50%, aún más particularmente en por lo menos 60%, pero especialmente en por lo menos 70% o más en comparación con las respectivas fibrillas o filamentos amiloides poliméricos preformados incubados con un vehículo control (amiloide sola) (control).

La desagregación potencial del anticuerpo de acuerdo con la invención se puede determinar por cualquier método adecuado conocido en el arte, particularmente por ultracentrifugación con gradiente de densidad seguida del

análisis por sedimentación SDS-PAGE con un gradiente preestablecido y/o por un ensayo de tioflavina T (Th-T) fluorescente.

La presente invención además proporciona anticuerpos o partes funcionales del mismo que son sensibles desde el punto de vista de la conformación.

En una realización adicional de la invención se proporciona un anticuerpo, pero especialmente un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos A β monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42 o 1-43, pero especialmente los péptidos monoméricos A β_{1-42} , es capaz de inducir una transición de la conformación de la lámina β hacia una conformación α -hélice y/o de arrollamiento al azar, pero particularmente una conformación de arrollamiento al azar, aún más particularmente una conformación de arrollamiento al azar en una localización dada en la molécula, especialmente en el ambiente de Val12 de la proteína A β , que conduce a un aumento de la conformación de arrollamiento al azar a expensas de la conformación β -hoja y una solubilización mejorada de las fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular. En particular la disminución de la conformación de la lámina β llega a por lo menos 30%, particularmente a por lo menos 35%, y más particularmente a por lo menos 40% y más en comparación con las respectivas fibrillas o filamentos amiloides poliméricos preformados incubados en buffer (control).

En particular, el anticuerpo de acuerdo con la invención está co-incubado con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso

molecular durante 12 horas a 36 horas, particularmente durante 18 horas a 30 horas, más particularmente durante 24 horas a una temperatura entre 28°C y 40°C, particularmente entre 32°C y 38°C, más particularmente a 37°C.

En particular, la presente invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación durante 24 horas a 37°C con una relación de concentraciones molares de 1:100 con las fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos A β monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos monoméricos A β ₁₋₄₂, es capaz de inducir una transición de la conformación de la lámina β hacia una conformación α -hélice y/o de arrollamiento al azar, pero particularmente una conformación de arrollamiento al azar, aún más particularmente una conformación de arrollamiento al azar a una azar en una localización dada en la molécula, especialmente en el ambiente de Val12 de la proteína A β , que conduce a un aumento de la conformación de arrollamiento al azar a expensas de la conformación β -hoja, con la última reducida en por lo menos 30%, particularmente en por lo menos 35%, y más particularmente en por lo menos 40% y más en comparación con las respectivas fibrillas o filamentos amiloides poliméricos preformados incubados en buffer (control).

El potencial del anticuerpo para inducir una transición de conformación se puede determinar por cualquier método adecuado conocido en el arte, particularmente por espectroscopía RMN ¹³C de estado sólido pero en particular, por la medición de las intensidades integrales de las

conformaciones de Val 12 C β en el péptido A β , particularmente los péptidos A β 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente en el péptido monomérico A β ₁₋₄₂.

Mediante la desagregación de las fibrillas o filamentos poliméricos amiloidogénicos los anticuerpos de acuerdo con la presente invención son capaces de impedir o disminuir la formación de placas amiloides que conducen a un alivio de los síntomas asociados con la enfermedad y un retraso o reversión de su avance.

Por consiguiente, esta es una realización adicional de la invención para proporcionar un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo como se describió anteriormente en la presente memoria, tal anticuerpo es capaz de disminuir la cantidad total de A β en el cerebro de un animal, particularmente un mamífero, pero especialmente un ser humano que padece de una enfermedad o afección que conduce a una concentración aumentada de A β en el cerebro.

En otra realización de la invención se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo como se describió anteriormente en la presente memoria, tal anticuerpo es capaz de alterar las placas de este modo disminuye la carga de placas en el cerebro de un animal, particularmente un mamífero, pero especialmente un ser humano que sufre de una enfermedad o afección que conduce a una carga de placas aumentada en el cerebro. El anticuerpo de acuerdo con la invención que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo disminuye la carga de placa en el cerebro en por lo

menos 20 %, particularmente en por lo menos 25%, más particularmente en por lo menos 30%, aún más particularmente más de 30%.

En aún otra realización de la invención se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo como se describió anteriormente en la presente memoria, tal anticuerpo es capaz de solubilizar placas que conducen a una reducción de la proporción de placas el cerebro de un animal, particularmente un mamífero, pero especialmente un ser humano que sufre de una enfermedad o afección que conduce a una carga de placas aumentada en el cerebro. El anticuerpo de acuerdo con la invención que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo reduce la proporción de placas en el cerebro en por lo menos 10%, particularmente en por lo menos 15%, más particularmente en por lo menos 20%.

Se considera que el anticuerpo de acuerdo con la invención puede exhibir uno, dos o más de las propiedades específicas descritas anteriormente en la presente memoria en diversas combinaciones.

Por ejemplo, en una realización la presente invención proporciona anticuerpos, pero especialmente anticuerpos monoclonales que incluyen a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tales anticuerpos son bifuncionales o sea que ellos exhiben una propiedad de inhibición de la agregación además de la propiedad de desagregación como se definió anteriormente en la presente memoria, particularmente apareado con un alto grado de sensibilidad conformacional.

En otra realización aún de la invención se proporciona un anticuerpo bifuncional que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, pero especialmente un anticuerpo bifuncional

monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación con péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos, tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, inhibe la agregación de los monómeros de $A\beta$ en fibrillas o filamentos poliméricos de alto peso molecular y además, después de la co-incubación con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, es capaz de desagregar las fibrillas o filamentos amiloides poliméricos preformados.

En una realización específica de la invención la co-incubación del anticuerpo bifuncional de acuerdo con la invención, pero especialmente del anticuerpo monoclonal bifuncional de acuerdo con la invención con péptidos amiloides monoméricos y fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular, respectivamente, tiene lugar con una relación de concentraciones molares de hasta 1:100, particularmente en una relación entre 1:30 y 1:100, y más particularmente en una relación de 1:100.

En particular, la co-incubación del anticuerpo de acuerdo con la invención con péptidos amiloides monoméricos se lleva a cabo durante 24 horas a 60 horas, particularmente durante 30 horas a 50 horas, más particularmente durante 48 horas a una temperatura entre 28°C y 40°C, particularmente entre 32°C y 38°C, más particularmente a 37°C, mientras que la co-incubación con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular se lleva a cabo durante 12 horas a 36 horas, particularmente

durante 18 horas a 30 horas, más particularmente durante 24 horas a una temperatura entre 28°C y 40°C, particularmente entre 32°C y 38°C, más particularmente a 37°C.

En otra realización específica aún de la invención, el anticuerpo bifuncional de acuerdo con la invención, particularmente el anticuerpo monoclonal bifuncional de acuerdo con la invención, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, es capaz de desagregar las fibrillas o filamentos poliméricos preformados en por lo menos 10%, particularmente en por lo menos 25%, más particularmente en por lo menos 35%, aún más particularmente en por lo menos 50%, pero especialmente en por lo menos 60 - 70% o más.

En otra realización específica aún de la invención, el anticuerpo bifuncional de acuerdo con la invención, particularmente el anticuerpo monoclonal bifuncional de acuerdo con la invención, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, inhibe la agregación de los péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, péptidos A β monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42 o 1-43, pero especialmente los péptidos A β ₁₋₄₂ monoméricos, en por lo menos 50%, particularmente en por lo menos 65%, más particularmente en por lo menos 75%, aún más particularmente en por lo menos 80%, pero especialmente en por lo menos 85-90%, o más en comparación con los respectivos monómeros del péptido amiloide incubado en buffer (control).

En particular, la presente invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo monoclonal bifuncional, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes

funcionales del mismo, tal anticuerpo media la inhibición de la polimerización de los péptidos amiloides monoméricos, específicamente los péptidos β amiloides monoméricos tales como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, y/o induce la solubilización de las fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de los péptidos amiloides monoméricos, particularmente péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos mediante la unión específica y directa del anticuerpo a las fibras de $A\beta$, que conduce a una transición de la conformación secundaria.

La presente invención además proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo monoclonal bifuncional, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo se une en forma directa y específica a las fibras β -amiloide tal como, por ejemplo, fibras que comprende péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente a fibra que comprende los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos y/o induce la solubilización de las fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de los péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, por la localización y específicamente la unión de un epítopo en una región epitópica de la proteína β -amiloide, particularmente una región epitópica del polipéptido de $A\beta$ limitado por los residuos de aminoácidos aa_n - aa_m con n como un número entero entre

2 y 16, particularmente entre 5 y 16, más particularmente entre 8 y 16, aún más particularmente entre 10 y 16 y m es un número entero entre 3 y 25, particularmente entre 3 y 23, particularmente entre 3 y 20, particularmente entre 3 y 17, particularmente entre 6 y 17, más particularmente entre 9 y 17, aún más particularmente entre 11 y 17, donde n y m no pueden ser números idénticos y n siempre debe ser un número más pequeño que m , con la diferencia entre n y $m \geq 2$.

En una realización específica de la invención, n es un número entero entre 13 y 15, pero especialmente 14 y m es un número entero entre 22 y 24, pero especialmente 23.

La unión del anticuerpo de acuerdo con la invención puede inducir una transición conformacional de dicha proteína, particularmente una transición de la conformación de la lámina β hacia una conformación α -hélice y/o de arrollamiento al azar, pero particularmente una conformación de arrollamiento al azar, aún más particularmente una conformación de arrollamiento al azar en una localización dada en la molécula, particularmente en el ambiente de Val12 de la proteína A β .

En una realización adicional, la invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo incorpora por lo menos una de las propiedades mencionadas anteriormente en la presente memoria y seleccionadas del grupo que consiste en inhibición de la agregación, desagregación, inducción de la transición conformacional, reconocimiento de y unión directa a un epítopo, particularmente un epítopo discontinuo conformacional en la región 14-23, particularmente en 14-20, que impide o disminuye la formación de placas amiloides, disminuye la proporción total de A β soluble en el cerebro, disminuye la carga de placa en el cerebro,

reduce la proporción de las placas en el cerebro, retiene o aumenta la capacidad de la memoria cognitiva, pero especialmente una combinación de dos o más de dichas propiedades.

En una realización específica, la invención se refiere a un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo incorpora por lo menos 2, particularmente por lo menos 3, más particularmente por lo menos 4, aún más particularmente por lo menos 5, 6, 7 u 8, pero especialmente todas las propiedades anteriormente mencionadas.

En una realización específica, la invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, que exhibe alta especificidad con los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos pero muestra esencialmente ninguna o solo mínima reactividad cruzada con los péptidos monoméricos $A\beta_{1-38}$, $A\beta_{1-39}$, $A\beta_{1-40}$, y/o $A\beta_{1-41}$, particularmente un anticuerpo, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es hasta 100 veces, particularmente 50 a 100 veces, más particularmente 80 a 100 veces, pero especialmente 100 veces más sensible al péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ en comparación con $A\beta_{1-38}$, $A\beta_{1-39}$, $A\beta_{1-40}$, $A\beta_{1-41}$ y hasta 1000 veces, particularmente 500 a 1000 veces, más particularmente 800 a 1000 veces, pero especialmente 1000 veces más sensible al péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ en comparación con $A\beta_{1-38}$, y de este modo capaz de inhibir, *in vitro* e *in vivo*, la agregación de péptidos monoméricos amiloidogénicos, pero especialmente del péptido amiloide $A\beta_{1-42}$.

En otra realización específica de la invención un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, que tiene una alta afinidad de unión con el péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ y es capaz de detectar fibras de $A\beta_{1-42}$ en una concentración por debajo de por lo menos 0,001 μg , pero particularmente en un rango de concentración entre 0,5 μg y 0,001 μg , más particularmente entre 0,1 μg y 0,001 μg , pero especialmente en una concentración de 0,001 μg .

En una realización muy específica de la invención se proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es capaz de detectar las fibras de $A\beta_{1-42}$ por debajo de una concentración mínima de 0,001 μg y fibras de $A\beta_{1-40}$ por debajo de una concentración mínima de 0,1 μg y fibras $A\beta_{1-38}$ por debajo de una concentración mínima de 1 μg de fibras.

En un aspecto específico, la invención se refiere a un anticuerpo o fragmento del mismo, que reconoce y se une por lo menos a un sitio de unión distinto, particularmente a por lo menos dos sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide.

En una realización específica, la invención se refiere a un anticuerpo que incluye cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo reconoce y une a por lo menos un sitio de unión distinto, particularmente a por lo menos dos sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide donde dicho por lo menos uno o dichos por lo menos dos sitios de unión distintos comprenden por lo menos un residuo de

aminoácido y por lo menos dos residuos de aminoácidos, respectivamente predominantemente involucrado en la unión del anticuerpo, donde en una realización específica de la invención, el por lo menos un residuo que comprende el primer sitio de unión distinto es Leu y los por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos, que comprenden el segundo sitio de unión distinto, son –Phe-Phe- incluidos en el centro de la siguiente secuencia nuclear :

– Xaa₁ – Xaa₂ – Xaa₃ – Leu -Xaa₄ – Phe – Phe – Xaa₅ – Xaa₆ – Xaa₇ –,

donde

Xaa₁ es un residuo de aminoácidos seleccionado del grupo que comprende His, Asn, Gln Lys, y Arg;

Xaa₂ es un residuo de aminoácidos seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln;

Xaa₃ es un residuo de aminoácidos seleccionado del grupo que comprende Lys, His, Asn, Gln y Arg

Xaa₄ es un residuo de aminoácidos seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₅ es un residuo de aminoácidos seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácidos seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp,

Xaa₇ es un residuo de aminoácidos seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp.

En particular, se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo, que reconoce y se une por lo menos un sitio de unión distinto, particularmente a por lo menos dos sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide donde el dicho por lo menos uno o dichos por lo menos dos sitios de unión distintos

comprenden por lo menos un residuo de aminoácido y por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos, respectivamente, predominantemente involucrado en la unión del anticuerpo donde, en una realización específica de la invención, el por lo menos un residuo que constituye el primer sitio de unión distinto es Leu y los por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos, que constituyen el segundo sitio de unión distinto, son –Phe-Phe- incluidos en la siguiente secuencia nuclear :

– Xaa₁ – Xaa₂ – Xaa₃ – Leu -Xaa₄ – Phe – Phe – Xaa₅ – Xaa₆ – Xaa₇ –

donde

Xaa₁ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende His, Asn, Gln Lys, y Arg;

Xaa₂ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln;

Xaa₃ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Lys, His, Asn, Gln y Arg

Xaa₄ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₅ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp,

Xaa₇ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp.

En otra realización de la invención, se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo, donde

Xaa₁ is His o Arg, pero particularmente His;

Xaa₂ is Gln o Asn, pero particularmente Gln;

Xaa₃ is Lys o Arg, pero particularmente Lys

Xaa₄ is Val o Leu, pero particularmente Val;

Xaa₅ is Ala o Val, pero particularmente Ala;

Xaa₆ is Glu o Asp, pero particularmente Glu; y

Xaa₇ is Asp o Glu, pero particularmente Asp.

En otro aspecto la invención se refiere a un anticuerpo o un fragmento del mismo, que reconoce y se une a por lo menos un sitio de unión distinto, particularmente a por lo menos dos sitios de unión distintos, más particularmente a por lo menos tres sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide, donde dicho uno o por lo menos dos o por lo menos tres sitios de unión distintos, cada uno comprende por lo menos uno, particularmente por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos predominantemente involucrados en la unión del anticuerpo.

En particular, el anticuerpo o fragmento del mismo de acuerdo con la invención se une a por lo menos dos sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide, donde dichos por lo menos dos sitios de unión distintos comprenden cada uno por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo, donde dichos por lo menos dos sitios de unión distintos están localizados en estrecha proximidad entre sí en el antígeno, separados por lo menos por un residuo de aminoácido no involucrado en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente menor en comparación con dichos por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos, de este modo se forma un epítopo discontinuo conformacional.

En otra realización de la invención, se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo de acuerdo con la invención, que reconoce y se une a por lo menos un sitio de unión distinto, particularmente a por lo menos dos

sitios de unión distintos, más particularmente a por lo menos tres sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide donde dicho sitio de unión comprende por lo menos uno y por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos respectivamente, involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo, donde por lo menos uno y por lo menos los dos aminoácidos consecutivos, que están separados por lo menos por un residuo de aminoácido no involucrado en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente menor en comparación con los residuos de aminoácidos involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo son -His- y -Lys-Leu-, respectivamente, incluidos dentro de la siguiente secuencia del núcleo:

– His – Xaa₂ – Lys – Leu – Xaa₃– Xaa₄– Xaa₅–Xaa₆– – Xaa₇ – Xaa₈ –

wen la presente memoria

Xaa₂ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln;

Xaa₃ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₄ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₅ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₇ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp,

Xaa₈ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp

menor en comparación con el sitio de unión de unión de –His- y –Lys-Leu-.

En otra realización, se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo, que reconoce y se une a por lo menos un sitio de unión distinto, particularmente a por lo menos dos sitios de unión distintos, más particularmente a por lo menos tres sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide donde dichos sitios de unión distintos comprenden por lo menos uno y por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos respectivamente, involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo, donde por lo menos los dos residuos de aminoácidos consecutivos que representan un primer sitio de unión son –Phe-Phe- y por lo menos un residuo de aminoácido está –His- incluido dentro de la secuencia nuclear :

– Xaa₁ – His – Xaa₃ – Xaa₄ – Xaa₅ – Xaa₆ – Phe – Phe – Xaa₇ – Xaa₈ – Xaa₉ –,

donde

Xaa₁ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende His, Asn, Gln, Lys y Arg

Xaa₃ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln

Xaa₄ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende His, Asn, Gln, Lys y Arg

Xaa₅ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu e Ile;

Xaa₇ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu e Ile;

Xaa₈ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp,

Xaa₉ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp, y donde dichos residuos de aminoácidos Xaa₁, Xaa₃, Xaa₆, Xaa₇, Xaa₈ y Xaa₉, no están involucrados en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente menor en comparación con el sitio de unión de His y –Phe-Phe-.

En una realización específica de la invención, el primero de por lo menos los dos residuos de aminoácidos consecutivos involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo incluyen a –Lys- y –Leu-, y el segundo de por lo menos los dos residuos de aminoácidos consecutivos involucra a –Phe-Phe- incluidos dentro de la secuencia nuclear ::

– Xaa₁ – Xaa₂ – Lys – Leu – Xaa₄ – Phe – Phe – Xaa₅ – Xaa₆ – Xaa₇ –,
donde

Xaa₁ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende His, Asn, Gln Lys, y Arg;

Xaa₂ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln;

Xaa₄ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₅ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp,

Xaa₇ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp, y donde dichos residuos de aminoácidos Xaa₂, Xaa₃, Xaa₄, Xaa₅, Xaa₆, Xaa₇ no están involucrados en la unión del anticuerpo o en

una medida significativamente menor en comparación con el sitio de –Lys-Leu y –Phe-Phe-.

En otra realización de la invención, se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo, donde

Xaa₁ es His o Arg, pero particularmente His;

Xaa₂ es Gln o Asn, pero particularmente Gln;

Xaa₄ es Val o Leu, pero particularmente Val;

Xaa₅ es Ala o Val, pero particularmente Ala;

Xaa₆ es Glu o Asp, pero particularmente Glu; y

Xaa₇ es Asp o Glu, pero particularmente Asp.

En una realización adicional de la invención, el anticuerpo o fragmento del mismo de acuerdo con la invención se une a por lo menos tres sitios de unión distintos en la proteína β -amiloide donde dichos por lo menos tres sitios de unión distintos comprende por lo menos un residuo de aminoácido y por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos, respectivamente tales residuos están involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo, donde dichos por lo menos tres sitios de unión distintos están localizados en estrecha proximidad entre sí en el antígeno, separado en por lo menos un residuo de aminoácido no involucrados en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente menor en comparación con dicho por lo menos un residuo de aminoácido y dicho por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos respectivamente, de este modo se forma un epítopo discontinuo conformacional.

En una realización específica de la invención, el primero de por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo incluye –Lys-Leu- y el segundo de por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos incluye –Phe-

Phe-, y el tercer por lo menos un residuo de aminoácido incluye -His- incluido dentro de la secuencia nuclear :

–His – Xaa₂ – Lys – Leu –Xaa₄ – Phe – Phe – Xaa₅ – Xaa₆– Xaa₇. –,

donde

Xaa₂ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln;

Xaa₄ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₅ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp,

Xaa₇ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp, y donde dichos residuos de aminoácidos Xaa₂, Xaa₃, Xaa₄, Xaa₅, Xaa₆, Xaa₇ no están involucrados en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente menor en comparación con el sitio de unión de –His-, the -Lys-Leu, y –Phe-Phe-.

En otra realización de la invención, se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo, donde

Xaa₂ es Gln o Asn, pero particularmente Gln;

Xaa₄ es Val o Leu, pero particularmente Val;

Xaa₅ es Ala o Val, pero particularmente Ala;

Xaa₆ es Glu o Asp, pero particularmente Glu; y

Xaa₇ es Glu o Asp, pero particularmente Asp;

En una realización específica de la invención, el primero de por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo incluyen –Lys-Leu-, y el

segundo de por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos incluyen –Phe-Phe-, y el tercer por lo menos un residuo de aminoácido -Asp- incluido dentro de la secuencia nuclear:

– Xaa₁ – Xaa₂ – Lys – Leu – Xaa₄ – Phe – Phe – Xaa₅ – Xaa₆ – Asp –,
donde

Xaa₁ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende His, Asn, Gln Lys y Arg;

Xaa₂ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln;

Xaa₄ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₅ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp, y donde dichos residuos de aminoácidos Xaa₂, Xaa₃, Xaa₄, Xaa₅, Xaa₆, Xaa₇ no están involucrados en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente menor en comparación con el sitio de unión – Asp-, -Lys-Leu, y –Phe-Phe-.

En otra realización de la invención se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo, donde

Xaa₁ es His o Arg, pero particularmente His;

Xaa₂ es Gln o Asn, pero particularmente Gln;

Xaa₄ es Val o Leu, pero particularmente Val;

Xaa₅ es Ala o Val, pero particularmente Ala; y

Xaa₆ es Glu o Asp, pero particularmente Glu.

En una realización específica adicional de la invención, se proporciona un anticuerpo o un fragmento del mismo de acuerdo con la invención, que se

une a 4 sitios de unión distintos de la proteína β -amiloide donde dichos 4 sitios de unión distintos comprende un residuo de aminoácido y dos residuos de aminoácidos consecutivos respectivamente, tales residuos están involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo, donde dichos 4 sitios de unión distintos están localizados en estrecha proximidad entre sí en el antígeno, separado en por lo menos un residuo de aminoácido no involucrado en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente menor en comparación con dicho residuo de aminoácido y dichos dos residuos de aminoácidos consecutivos de los 4 sitios de unión distintos de este modo se forma un epítopo discontinuo conformacional.

En particular, el primero de los dos residuos de aminoácidos consecutivos involucrados predominantemente en la unión del anticuerpo es –Lys-Leu-, y el segundo de los por lo menos dos residuos de aminoácidos consecutivos son –Phe-Phe-, el primero de los residuos de aminoácido único es -His- y el segundo de los residuos de aminoácido único es -Asp- incluido dentro de la secuencia nuclear:

– His – Xaa₂ – Lys – Leu -Xaa₄ – Phe – Phe – Xaa₅ – Xaa₆ – Asp –,

donde

Xaa₂ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Asn y Gln;

Xaa₄ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, norleucina, Met, Phe e Ile;

Xaa₅ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Ala, Val, Leu, Ser e Ile;

Xaa₆ es un residuo de aminoácido seleccionado del grupo que comprende Glu y Asp, y donde dichos residuos de aminoácidos Xaa₂, Xaa₃, Xaa₄, Xaa₅, Xaa₆, Xaa₇ no están involucrados en la unión del anticuerpo o en

una medida significativamente menor en comparación con el sitio de unión –His-, –Asp-, -Lys-Leu, y –Phe-Phe-.

En una realización específica de la invención, los sitios de reconocimiento y unión como se definió anteriormente en la presente memoria están formando un epítopo discontinuo conformacional localizado en una región de la proteína β -amiloide entre el residuo de aminoácido 12 a 24, particularmente entre los residuos 14 a 23, más particularmente entre los residuos de aminoácidos 14 y 20, donde los tres sitios de reconocimiento y unión que comprenden 1 y 2 residuos de aminoácidos, respectivamente están localizados en la posición 16, 17, y en la posición 19 y 20, y en la posición 14, respectivamente, tales residuos están are predominantemente involucrados en la unión de la proteína β -amiloide y donde dichos tres sitios de reconocimiento y unión están separados por un residuo de aminoácido localizado en la posición 15 y 18, respectivamente, tales aminoácidos no están involucrados en la unión del antígeno o por lo menos en un grado sustancialmente menor.

En una realización específica, dichos residuos de aminoácidos consecutivos, particularmente –Lys-Leu- en la posición 16 y 17 y –Phe- Phe- en las posiciones 19 y 20, los cuales están predominantemente involucrados en la unión de la proteína β -amiloide, están incluidos en la siguiente región del núcleo:

Val–	His–	His–	Gln–	Lys–	Leu–	Val–	Phe–	Phe–	Ala–	Glu–	Asp
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

En una realización específica, dichos residuos de aminoácidos consecutivos, particularmente –Lys- en la posición 16, -Leu- en la posición 17 y –Phe-Phe- en las posiciones 19 y 20, e –His- en la posición 14, los cuales

están predominantemente involucrados en la unión de la proteína β -amiloide, están incluidos en la siguiente región del núcleo:

Val–	His–	His–	Gln–	Lys–	Leu–	Val–	Phe–	Phe–	Ala–	Glu–	Asp–
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

En una realización específica de la invención, el anticuerpo de acuerdo con la invención se origina contra un fragmento del antígeno que no contiene dicho sitio de unión distinto.

Este cambio en la región epitópica puede haber sido causado por lo menos parcialmente por el uso de una construcción antigénica supramolecular que comprende un péptido antigénico correspondiente a la secuencia de aminoácidos del péptido β -amiloide, particularmente del péptido β amiloide $A\beta_{1-16}$, modificado con un residuo hidrofílico tal como, por ejemplo, polietilenglicol (PEG), donde dicho residuo hidrofílico está unido en forma covalente a cada uno de los términos del péptido antigénico mediante por lo menos uno, particularmente uno o dos aminoácidos tal como, por ejemplo, lisina, ácido glutámico y cisteína o cualquier otro aminoácido o análogo del aminoácido capaz de servir como un dispositivo conector para acoplar el residuo hidrofílico al fragmento del péptido como se describe en la presente memoria a continuación en el proceso de inmunización. Cuando se usa PEG como residuo hidrofílico, los términos de PEG libres están unidos en forma covalente a fosfatidiletanolamina o cualquier otro compuesto adecuado para funcionar como elemento de anclaje, por ejemplo, para incluir la construcción antigénica en la bicapa de un liposoma como se describe en la presente memoria.

Asimismo el uso del lípido A como parte del protocolo de inmunización puede haber contribuido al cambio en la región epitópica.

En una realización específica de la invención se proporciona un anticuerpo que comprende la región variable de cadena liviana (LCVR) de la SEC ID NO: 7.

En otra realización específica, la invención se refiere a la región variable de cadena liviana (LCVR) de la SEC ID NO: 7.

En otra realización específica aun de la invención, se proporciona un anticuerpo que comprende la región variable de cadena pesada (HCVR) de la SEC ID NO: 8.

En una realización específica adicional, la invención se refiere a la región variable de cadena pesada (HCVR) de la SEC ID NO: 8.

En una realización, la invención se refiere a un anticuerpo que comprende tanto la región variable de la cadena pesada de la SEC ID NO: 8 y la región variable de la cadena liviana de la SEC ID NO: 7.

Asimismo parte de la invención es un anticuerpo que comprende una región variable de cadena liviana (LCVR) o región variable de cadena pesada (HCVR) o ambas, una región variable de cadena liviana (LCVR) y una región variable de cadena pesada (HCVR) que es homóloga a cualquier uno de los péptidos proporcionados en las SEC ID NO: 7 y 8, respectivamente.

En particular, la invención se refiere a un anticuerpo o un fragmento del mismo de acuerdo con la presente invención y como se describió antes en la presente memoria, donde la región variable de cadena liviana (LCVR) tiene una secuencia de aminoácido que es 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% idéntica a la secuencia dada en la SEC ID NO: 7.

Además, la invención se refiere a un anticuerpo o un fragmento del mismo, de acuerdo con la presente invención y como se describió antes en la presente memoria donde la región variable de cadena pesada (HCVR) tiene

una secuencia de aminoácidos que es 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% idéntica a la secuencia dada en la SEC ID NO: 8.

Además, la invención se refiere a un anticuerpo o un fragmento del mismo, de acuerdo con la presente invención y como se describió antes en la presente memoria donde la región variable de cadena liviana (LCVR) y la región variable de cadena pesada (HCVR) juntas tienen una secuencia de aminoácidos que es 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% idéntica a la secuencia dada en las SEC ID NOs: 7 y 8.

En otra realización específica la invención se refiere a región variable de cadena liviana que tiene una secuencia de aminoácidos que es 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% idéntica a la secuencia dada en la SEC ID NO: 7.

En una realización específica adicional, la invención se refiere a la región variable de cadena pesada que tiene una secuencia de aminoácidos que es 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% idéntica a la secuencia dada en la SEC ID NO: 8.

En otra realización de la invención, se proporciona un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica el anticuerpo de acuerdo con la invención como se describió anteriormente en la presente memoria.

In particular, la invención se refiere a un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica un anticuerpo de acuerdo con la invención que comprende

a) por lo menos la secuencia de nucleótidos de la región variable de cadena liviana de la SEC ID NO: 9

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

En otra realización, la invención se refiere a un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica un anticuerpo de acuerdo con la invención que comprende

a) por lo menos la secuencia de nucleótidos de la cadena liviana de la SEC ID NO: 10

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos of (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos .

En otra realización aún, la invención se refiere a un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica un anticuerpo de acuerdo con la invención que comprende

a) por lo menos la secuencia de nucleótidos de la región variable de la cadena pesada de la SEC ID NO: 11.

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos de la (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

En otra realización aún, la invención se refiere a un polinucleótido que comprende secuencia de nucleótidos que codifica un anticuerpo de acuerdo con la invención que comprende

a) por lo menos la secuencia de nucleótidos de la cadena pesada de la SEC ID NO: 12 o la secuencia complementaria

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos de la (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos

25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

También está comprendido por la invención un polinucleótido que comprende

a) la secuencia de nucleótidos de la SEC ID NO: 9 que codifica la región variable de la cadena liviana

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos de la (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

También está comprendido por la invención un polinucleótido que comprende

a) la secuencia de nucleótidos de la SEC ID NO: 10 que codifica la cadena liviana.

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos de la (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del

grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

También está comprendido por la invención un polinucleótido que comprende

a) la secuencia de nucleótidos de la SEC ID NO: 11 que codifica la región variable de cadena pesada

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos de la (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

También está comprendido por la invención un polinucleótido que comprende

a) la secuencia de nucleótidos de la SEC ID NO: 12 que codifica la cadena pesada

b) una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos de la (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c) la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d) un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

En una realización adicional, la invención se refiere a cualquier secuencia de nucleótidos que hibridiza a

a. una secuencia de nucleótidos de acuerdo con la invención y como la dada en las SEC ID NOs: 9, 10, 11 y 12, respectivamente ,

b. una secuencia de nucleótidos que difiere de la secuencia de nucleótidos de la (a) en la secuencia de codones debido a la degeneración del código genético

c. la secuencia complementaria con (a) y (b) o

d. un fragmento de una secuencia de nucleótidos de (a), (b) o (c) que comprende una extensión contigua de nucleótidos seleccionados del grupo que consiste en por lo menos 20 nucleótidos contiguos, por lo menos 25 nucleótidos contiguos, por lo menos 30 nucleótidos contiguos, por lo menos 35 nucleótidos contiguos, por lo menos 40 nucleótidos contiguos, por lo menos 45 nucleótidos contiguos y por lo menos 50 nucleótidos contiguos.

En particular, la invención se refiere a cualquier secuencia de nucleótidos que hibridiza en condiciones de hibridación convencional, particularmente en condiciones de hibridación rigurosas, a una secuencia de nucleótidos de acuerdo con la invención y como la dada en las SEC ID NOs: 9, 10, 11 y 12, respectivamente, particularmente a la cadena complementaria de la misma.

En una realización adicional, la invención se refiere a cualquier secuencia de nucleótidos que hibridiza a una secuencia de nucleótidos de acuerdo con la presente invención y como la dada en las SEC ID NOs: 9, 10, 11 y 12, respectivamente, particularmente a la cadena complementaria de la misma, en condiciones de hibridación convencional en las cuales se usa SSPE 5x, SDS 1% , solución de Denhardt 1x como solución y/o temperaturas de hibridación entre 35°C y 70°C, con preferencia 65°C. Después de la hibridación, el lavado se realiza con preferencia primero con SSC 2x, SDS 1% y posteriormente con SSC 0,2x a temperaturas entre 35°C y 70°C, con preferencia a 65°C (con respecto a la definición de SSPE, SSC y solución de Denhardts (ver Sambrook et al. loc. cit.).

En particular, la invención se refiere a cualquier secuencia de nucleótidos que hibridiza a una secuencia de nucleótidos de acuerdo con la presente invención y como la dada en SEC ID NOs: 9, 10, 11 y 12, respectivamente, particularmente a la cadena complementaria de la misma, en condiciones de hibridación rigurosas como por ejemplo se describen en Sambrook et al, supra, más particularmente en condiciones de hibridación rigurosas donde la hibridación y lavado se producen a 65°C como se indicó anteriormente.

En una realización específica la presente invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo tiene las propiedades características de un anticuerpo producido por una línea celular del hibridoma seleccionada del grupo que consiste en FP 12H3, FP 12H3-C2, y FP 12H3-G2 depositadas el 1

de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005, respectivamente, como DSM ACC2752, DSM ACC 2750 y DSM ACC2751, respectivamente .

Más particularmente, la invención se refiere a un anticuerpo que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma FP 12H3, depositados el 1 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005, respectivamente como DSM ACC2752.

Más particularmente, la invención se refiere a un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma FP 12H3-C2, depositados el 1 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005, respectivamente como DSM ACC2750.

Más particularmente, la invención se refiere a un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma FP 12H3-G2, depositados el 1 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005, respectivamente como DSM ACC2751.

En otra realización específica la presente invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente a anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo tiene las propiedades características de un anticuerpo producido por la línea celular del hibridoma ET 7E3 depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2755.

Más particularmente, la invención se refiere a un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o

partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma ET 7E3, depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2755.

En otra realización específica, la presente invención proporciona un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo tiene las propiedades características de un anticuerpo producido por la línea celular del hibridoma EJ 7H3 depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2756.

Más particularmente, la invención se refiere a un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma EJ 7H3, depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2756.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar métodos y composiciones que comprenden un anticuerpo de acuerdo con la invención y como se describió antes en la presente memoria para la prevención y/o tratamiento terapéutico y/o alivio de los efectos de enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tales como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan

o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeld Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos que incluyen degeneración macular, por ejemplo, por inmunización pasiva de un ser humano o animal con un anticuerpo de acuerdo con la invención y como se describió anteriormente en la presente memoria .

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un método de usar un anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo de acuerdo con la invención y composiciones que comprenden un anticuerpo de acuerdo con la invención y tal como se describió antes en la presente memoria para la intervención en el diagnóstico y terapéutica de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tales como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeld Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo

adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular,

En particular, un objeto de la presente invención es proporcionar un método de uso de un anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo de acuerdo con la invención y composiciones que comprenden un anticuerpo, particularmente un anticuerpo biespecífico y bi-efectivo pero especialmente un anticuerpo monoclonal biespecífico y bi-efectivo de acuerdo con la invención y como se describió antes en la presente memoria para reducir y prevenir la aparición de trastornos neurológicos, que incluyen pero sin limitación la enfermedad de Alzheimer.

Las composiciones de acuerdo con la presente invención comprenden un anticuerpo, particularmente un anticuerpo biespecífico y bi-efectivo de acuerdo con la invención y como se describió antes en la presente memoria que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, particularmente en una cantidad terapéuticamente efectiva o, más particularmente, un anticuerpo monoclonal, especialmente un anticuerpo monoclonal biespecífico y bi-efectivo, de acuerdo con la invención y como se describió antes en la presente memoria, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, particularmente en una cantidad terapéuticamente efectiva y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

Particularmente, la composición de acuerdo con la presente invención comprende un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es capaz de inhibir la agregación de los péptidos amiloides monoméricos, específicamente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos A β monoméricos 1-39; 1-

40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos A β ₁₋₄₂ monoméricos, en fibrillas o filamentos amiloides poliméricos de alto peso molecular y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En una realización adicional de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo, después de la co-incubación, particularmente después de la co-incubación con una relación de concentraciones molares de hasta 1:100, más particularmente con una relación de concentraciones molares de entre 1:30 y 1:100, pero especialmente con una relación de concentraciones molares de 1:100, con péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos A β monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos A β ₁₋₄₂ monoméricos, inhibe la agregación de los monómeros de A β en fibrillas o filamentos poliméricos de alto peso molecular. En particular, dicha inhibición llega a por lo menos 50%, particularmente a por lo menos 65%, más particularmente a por lo menos 75%, aún más particularmente a por lo menos 80%, pero especialmente a por lo menos 85%-90%, o más en comparación con los monómeros del péptido amiloide respectivo incubado en buffer (control) y, opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En particular, la co-incubación del anticuerpo de acuerdo con la invención con los péptidos amiloides monoméricos se lleva a cabo durante 48 horas a una temperatura de 37°C.

La inhibición de la agregación potencial del anticuerpo de acuerdo con la invención se puede determinar por ultracentrifugación por gradiente de densidad seguida por el análisis por sedimentación SDS-PAGE con un gradiente preestablecido y/o por un ensayo de tioflavina T (Th-T) fluorescente.

La presente invención además proporciona una composición que comprende un anticuerpo que es capaz de desagregar fibrillas o filamentos amiloides poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de los péptidos amiloides monoméricos, específicamente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos y, opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

Mediante la desagregación de las fibrillas o filamentos poliméricos amiloidogénicos, los anticuerpos de acuerdo con la presente invención son capaces de prevenir o disminuir la formación de placas amiloides que conducen a un alivio de los síntomas asociados con la enfermedad y un retraso o reversión de su avance.

En otra realización de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación con una relación de concentraciones molares de entre 1:30 y 1:100, particularmente con una relación de 1:100, con las h fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos,

particularmente después de la co-incubación durante 24 horas a una temperatura de 37°C, es capaz de desagregar las fibrillas o filamentos poliméricos preformados en por lo menos 35%, particularmente en por lo menos 40%, más particularmente en por lo menos 50%, aún más particularmente en por lo menos 60%, pero especialmente en por lo menos 70% o más y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

La desagregación potencial del anticuerpo de acuerdo con la invención se puede determinar por ultracentrifugación por gradiente de densidad seguida por el análisis por sedimentación SDS-PAGE con un gradiente preestablecido y/o por un ensayo de tioflavina T (Th-T) fluorescente.

La presente invención además proporciona una composición que comprende un anticuerpo o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es sensible desde el punto de vista de la conformación, particularmente en una cantidad efectiva, más particularmente en una cantidad terapéuticamente efectiva.

En una realización adicional de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formados por la agregación de los péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, particularmente después de la co-incubación durante 24 horas a una temperatura de 37°C, es capaz de inducir una transición de la conformación lámina β hacia una conformación de

α -hélice y/o de arrollamiento al azar , pero particularmente una conformación de arrollamiento al azar , aún más particularmente una conformación de arrollamiento al azar en una localización dada en la molécula, especialmente en el ambiente de Val12 de la proteína A β , que conduce a un aumento de la conformación de arrollamiento al azar a expensas de la conformación lámina β y una solubilización mejorada de las fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico. En particular, la disminución de la conformación lámina β llega a por lo menos 30%, particularmente a por lo menos 35%, y más particularmente a por lo menos 40% y más en comparación con las fibrillas o filamentos amiloides poliméricos preformados respectivos incubados en buffer (control).

El potencial del anticuerpo para inducir una transición de la estructura secundaria se determina por espectroscopia RMN ^{13}C en estado sólido pero, en particular, por la medición de las intensidades integrales de las conformaciones de Val 12 C β del péptido A β_{1-42} .

La presente invención además proporciona una composición que comprende un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, particularmente en una cantidad terapéuticamente efectiva, tal anticuerpo es bifuncional o sea que exhibe tanto una propiedad de inhibición de la agregación además de una propiedad de desagregación como se definió anteriormente en la presente memoria, con preferencia apareado con un alto grado de sensibilidad conformacional y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En otra realización aún de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo bifuncional, pero especialmente

un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo después de la co-incubación con péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, inhibe la agregación de los monómeros de $A\beta$ en fibrillas poliméricas de alto peso molecular y ,además, después de la co-incubación con fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formado por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, es capaz de desagregar las fibrillas o filamentos poliméricos preformados y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En una realización específica de la invención la co-incubación del anticuerpo del anticuerpo bifuncional de acuerdo con la invención, pero especialmente del anticuerpo bifuncional monoclonal de acuerdo con la invención con péptidos amiloides monoméricos y fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular , respectivamente se produce con una relación de concentraciones molares de hasta 1:100, particularmente con una relación entre 1:30 y 1:100, y más particularmente con una relación de 1:100.

En una realización específica adicional de la invención la co-incubación con péptidos amiloides monoméricos y fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular se realiza durante 48 horas y 24 horas, respectivamente a una temperatura de 37°C.

En otra realización específica aún de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo bifuncional de acuerdo con la invención, pero especialmente un anticuerpo bifuncional monoclonal de acuerdo con la invención que es capaz de desagregar las fibrillas o filamentos poliméricos preformados en por lo menos 10%, particularmente en por lo menos 25%, más particularmente en por lo menos 35%, aún más particularmente en por lo menos 50%, pero especialmente en por lo menos 60-70% o más y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En otra realización específica aún de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo bifuncional de acuerdo con la invención, pero especialmente un anticuerpo bifuncional monoclonal de acuerdo con la invención, inhibe la agregación de péptidos amiloides monoméricos particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos en por lo menos 50%, particularmente en por lo menos 65%, más particularmente en por lo menos 75%, aún más particularmente en por lo menos 80%, pero especialmente en por lo menos 85-90%, o más en comparación con los monómeros del péptido amiloide respectivo incubado en buffer (control) y opcionalmente un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En particular, la presente invención proporciona una composición que comprende un anticuerpo particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo media la inhibición de la polimerización de los péptidos amiloides monoméricos, específicamente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos

1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos y/o induce la solubilización de fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular formado por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos, mediante la unión específica y directa del anticuerpo a las fibras $A\beta$, que conduce a una transición de la conformación secundaria y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

La presente invención además proporciona una composición que comprende un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo se une directa y específicamente a las fibras β -amiloides tal como, por ejemplo, fibras que comprenden péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente a fibras que comprenden los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos y/o induce la solubilización de las fibrillas o filamentos preformados poliméricos de alto peso molecular que se forman por la agregación de péptidos amiloides monoméricos, particularmente los péptidos β amiloides monoméricos tal como, por ejemplo, los péptidos $A\beta$ monoméricos 1-39; 1-40, 1-41, 1-42, o 1-43, pero especialmente los péptidos $A\beta_{1-42}$ monoméricos por la localización y específicamente la unión a una región epitópica de la proteína β -amiloide, particularmente una región epitópica del polipéptido $A\beta$ limitado por los residuos de aminoácidos aa_n - aa_m con n como un número entero entre 2 y 15, particularmente entre 5 y 15, más particularmente entre 8 y 1, aún más particularmente entre 10 y 15 y m como un número entero entre 3 y 17, particularmente entre 6 y 17, más particularmente entre 9 y 17, aún más

particularmente entre 11 y 17, donde n y m no pueden ser números idénticos y n siempre debe ser un número más pequeño que m, con la diferencia entre n y m ≥ 2 y , opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

La unión del anticuerpo de acuerdo con la invención puede inducir una transición de conformación en dicha proteína, particularmente una transición de la conformación lámina β hacia una conformación α -hélice y/o de arrollamiento al azar, pero particularmente una conformación de arrollamiento al azar, aún más particularmente una conformación de arrollamiento al azar en una localización dada en la molécula, especialmente en el ambiente de la Val12 de la proteína A β .

En una realización adicional, la invención proporciona una composición que comprende un anticuerpo particularmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo incorpora por lo menos una de las propiedades mencionadas anteriormente en la presente memoria, o sea inhibición de la agregación, desagregación, inducción de la transición de conformación, reconocimiento de y unión directa a la región epitópica 4-16 y/o la 14 a 23, pero particularmente la 14 a 20, pero especialmente una combinación de dos o más de dichas propiedades , un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En una realización específica, la invención proporciona una composición que comprende un anticuerpo particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, que exhibe alta especificidad a los péptidos A β ₁₋₄₂ monoméricos pero muestra esencialmente

ninguno o solo una mínima reactividad cruzada con péptidos monoméricos $A\beta_{1-38}$, $A\beta_{1-39}$, $A\beta_{1-40}$, y/o $A\beta_{1-41}$, particularmente un anticuerpo, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es hasta 100 veces, particularmente 50 a 100 veces, más particularmente 80 a 100 veces, pero especialmente 100 veces más sensible al péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ en comparación con $A\beta_{1-38}$, $A\beta_{1-39}$, $A\beta_{1-40}$, $A\beta_{1-41}$ y hasta 1000 veces, particularmente 500 a 1000 veces, más particularmente 800 a 1000 veces, pero especialmente 1000 veces más sensible al péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ en comparación con $A\beta_{1-38}$, y de este modo capaz de inhibir, *in vitro* e *in vivo*, la agregación de péptidos monoméricos amiloidogénicos, pero especialmente del péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En otra realización específica de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, que tiene una alta sensibilidad de unión al péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ y es capaz de detectar fibras de $A\beta_{1-42}$ en una concentración por debajo de por lo menos 0,001 μg , pero particularmente en una rango de concentración de 0,5 μg y 0,001 μg , más particularmente entre 0,1 μg y 0,001 μg , pero especialmente en una concentración de 0,001 μg y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En una realización muy específica de la invención se proporciona una composición que comprende un anticuerpo, particularmente un anticuerpo bifuncional, pero especialmente un anticuerpo monoclonal, particularmente un

anticuerpo bifuncional monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo es capaz de detectar fibras de $A\beta_{1-42}$ en una cantidad de fibras por debajo de una concentración mínima de 0,001 μg y fibras de $A\beta_{1-40}$ por debajo de una concentración mínima de 0,1 μg y fibras de $A\beta_{1-38}$ por debajo de una concentración mínima de 1 μg y, opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico, y donde dichos residuos de aminoácidos Xaa₂, Xaa₃, Xaa₆, Xaa₇, Xaa₈, no están involucrados en la unión del anticuerpo o en una medida significativamente

En una realización específica la presente invención se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo tal anticuerpo tiene las propiedades características de un anticuerpo producido por una línea celular del hibridoma seleccionada del grupo que consiste en FP 12H3, FP 12H3-C2, y FP 12H3-G2 depositados el 1 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005 respectivamente, como DSM ACC2752, DSM ACC2750 y DSM ACC2751, y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

Más particularmente, la invención se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma FP 12H3, depositado el 1 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005 respectivamente como DSM ACC2752 y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

Más particularmente, la invención se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo

funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 1 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005 respectivamente como DSM ACC2750 y , opcionalmente un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

La invención además se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma FP 12H3-G2, depositado el 1 de diciembre de 2005 y el 9 de diciembre de 2005 respectivamente como DSM ACC2751 y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En otra realización específica, la presente invención se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, tal anticuerpo tiene las propiedades características de un anticuerpo producido por la línea celular del hibridoma ET 7E3 depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2755 y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

La invención además se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma ET 7E3, depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2755 y , opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En otra realización específica, la presente invención se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del

mismo, tal anticuerpo tiene las propiedades características de un anticuerpo producido por la línea celular del hibridoma EJ 7H3 depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2756 y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

La invención además se refiere a una composición que comprende un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo producido por la línea celular del hibridoma EJ 7H3, depositado el 8 de diciembre de 2005 como DSM ACC2756 y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

El anticuerpo, particularmente el anticuerpo monoclonal de acuerdo con la invención que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo se puede administrar en combinación con otras sustancias biológicamente activas y procedimientos para el tratamiento de las enfermedades. Las otras sustancias biológicamente activas pueden ser parte de la misma composición que ya comprende el anticuerpo de acuerdo con la invención, en forma de una mezcla, donde el anticuerpo y la otra sustancia biológicamente activa se entremezclan o con el mismo solvente y/o vehículo aceptable para uso farmacéutico o se puede proporcionar en forma, separada como parte de una composición separada, que se puede ofrecer en forma separada o conjunta en forma de partes de un kit.

El anticuerpo, particularmente el anticuerpo monoclonal de acuerdo con la invención que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo se puede administrar al mismo tiempo con la otra sustancia o sustancias biológicamente activas, en forma intermitente o secuencial. Por ejemplo, el anticuerpo monoclonal de acuerdo

con la invención que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo se puede administrar simultáneamente con una primer sustancia biológicamente activa o en forma secuencial después o antes de la administración del anticuerpo. Si se elige un esquema de aplicación en el que se administra más de sustancia biológicamente activa adicional junto con por lo menos un anticuerpo de acuerdo con la invención, se pueden administrar parcialmente los compuestos o sustancias en forma simultánea, parcialmente en forma secuencial en diversas combinaciones.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar mezclas de anticuerpos que comprenden por lo menos un anticuerpo de acuerdo con la presente invención y opcionalmente, uno o más sustancias biológicamente activas adicionales, además de los métodos de usar anticuerpos individuales, o mezclas de los mismos que incluyen composiciones que comprenden dichos anticuerpos o mezclas de anticuerpos para la prevención y/o tratamiento terapéutico y/o alivio de los efectos de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tales como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear

progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeld Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular.

Las mezclas de acuerdo con la invención pueden comprender, además a un anticuerpo de acuerdo con la invención, una sustancia biológicamente activa tal como, por ejemplo, compuestos conocidos usados en la medicación de enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluye amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con proteína amiloide o de tipo amiloide tal como la proteína A β involucrada en la enfermedad de Alzheimer.

En otra realización de la invención, la otra sustancia o compuesto biológicamente activo también puede ser un agente terapéutico que se puede usar en el tratamiento de las enfermedades y y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o de tipo amiloide que incluye amiloidosis causada por β -amiloide se puede usar en la medicación de otros trastornos neurológicos.

La otra sustancia o compuesto biológicamente activo puede ejercer su efecto biológico por un mecanismo igual o similar al del anticuerpo de acuerdo con la invención o por un mecanismo de acción no relacionado o por una multiplicidad de mecanismos de acción relacionados y/o no relacionados.

Generalmente, el otro compuesto biológicamente activo puede incluir potenciadores de la transmisión neuromuscular, fármacos psicoterapéuticos, inhibidores de acetilcolina esterasa, bloqueantes de los canales de calcio, aminas biogénicas, tranquilizantes benzodiazepinas, potenciadores de la síntesis, conservación o liberación de acetilcolina, agonistas del receptor post-

sináptica de acetilcolina, inhibidores de monoamina oxidasa A o B, antagonistas del receptor de N-metil-D-aspartato glutamato, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, antioxidantes y antagonistas del receptor serotoninérgico.

En particular, la mezcla de acuerdo con la invención pueden comprender por lo menos un compuesto biológicamente activo diferente seleccionado del grupo que consiste en los compuestos contra el estrés oxidativo, compuestos anti-apoptóticos, quelantes de metales, inhibidores de la reparación de ADN tal como pirenzepina y metabolitos, ácido 3-amino-1-propansulfónico (3APS), 1,3-propandisulfonato (1,3PDS), activadores de secretasa, β - y γ -inhibidores de secretasa, proteínas tau, neurotransmisores, agentes anti-cholesterol, moléculas antiinflamatorias o inhibidores de colinesterasa (ChEI) tal como tacrina, rivastigmina, donepezil, y/o galantamina y otros fármacos y suplementos nutritivos, junto con un anticuerpo de acuerdo con la presente invención y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o un excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En una realización adicional, la mezclas de acuerdo con la invención pueden comprender niacina o memantina junto con un anticuerpo de acuerdo con la presente invención y, opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En otra realización aún de la invención se proporcionan las mezclas que comprenden “antipsicóticos atípicos” tal como, por ejemplo clozapina, ziprasidona, risperidona, aripiprazol u olanzapina para el tratamiento de los síntomas psicóticos positivos y negativos que incluyen alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento (manifestado por incoherencia marcada, descarrilamiento, tangencialidad), y conducta extraña o desorganizada, además de anhedonia, bloqueo afectivo, apatía y aislamiento social junto con

un anticuerpo de acuerdo con la invención y, opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o excipiente aceptable para uso farmacéutico.

En una realización específica de la invención, las composiciones y mezclas de acuerdo con la invención y como se describió antes en la presente memoria comprenden el anticuerpo y la sustancia biológicamente activa, respectivamente, en una cantidad terapéuticamente efectiva.

Otros compuestos que se pueden usar en forma adecuada en mezclas en combinación con el anticuerpo de acuerdo con la presente invención están, por ejemplo, descritas en WO 2004/058258 (ver especialmente las páginas 16 y 17) que incluyen blancos de fármacos terapéuticos (página 36-39), ácidos alcanosulfónicos y ácido alcanosulfúrico (páginas 39-51), inhibidores de colinesterasa (páginas 51-56), antagonistas del receptor de NMDA (páginas 56-58), estrógenos (páginas 58-59), fármacos anti-inflamatorios no esteroides (páginas 60-61), antioxidantes (páginas 61-62), agonistas del receptor activado por los proliferadores de peroxisoma (PPAR) (páginas 63-67), agentes reductores de colesterol (páginas 68-75); inhibidores de amiloide (páginas 75-77), inhibidores de la formación de amiloide (páginas 77-78), quelantes de metal (páginas 78-79), anti-psicóticos y anti-depresivos (páginas 80-82), suplementos nutricionales (páginas 83-89) y compuestos que aumentan la disponibilidad de las sustancias biológicamente activas del cerebro (ver páginas 89-93) y profármacos (páginas 93 y 94), tales documentos están incorporados en la presente memoria como referencias.

Además se proporciona un método para producir un anticuerpo, particularmente un método para producir un anticuerpo monoclonal, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo de acuerdo con la invención, tal método comprende originar compuestos pero particularmente anticuerpos monoclonales contra

una construcción antigénica supramolecular que comprende un péptido antigénico correspondiente a la secuencia de aminoácidos del péptido β -amiloide, particularmente del péptido β amiloide $A\beta_{1-15}$, $A\beta_{1-16}$ y $A\beta_{1-16(\Delta 14)}$, modificado con residuos hidrofóbicos tal como, por ejemplo, ácido palmítico o un residuo hidrofílico tal como, por ejemplo, polietilenglicol (PEG) o una combinación de ambos, donde dicho residuo hidrofóbico e hidrofílico, respectivamente, está unido en forma covalente a cada término mediante por lo menos uno, particularmente uno o dos aminoácidos tal como, por ejemplo, lisina o cualquier otro aminoácido o análogo de aminoácido adecuado capaz de actuar como dispositivo de acoplamiento o molécula ligadora para el acoplamiento de dicho residuo hidrofóbico e hidrofílico tal como, por ejemplo, ácido glutámico o cisterna,

También es parte de la invención el uso de un anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo de acuerdo con la invención y como se describió antes en la presente memoria y/o una composición farmacéutica o una mezcla que comprende dicho anticuerpo, para la preparación de un medicamento para tratar o aliviar los efectos de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan

o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeld Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular.

En otra realización de la presente invención se proporciona un método para la preparación de una composición farmacéutica que emplea un anticuerpo de acuerdo con la invención y/o una parte funcional del mismo pero especialmente un anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo o un anticuerpos funcionalmente equivalente para usar para tratar o aliviar los efectos de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeld Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular que

comprende la formulación de un anticuerpo de acuerdo con la invención en una forma aceptable para uso farmacéutico.

Los anticuerpos y/o las partes funcionales de los mismos pero especialmente los anticuerpos monoclonales y/o partes funcionales de los mismos o un anticuerpos funcionalmente equivalente y las composiciones y mezclas que comprenden dicho anticuerpo de acuerdo con la presente invención se puede usar para la preparación de un medicamento para prevenir, tratar o aliviar los efectos los efectos de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeld Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular.

En una realización adicional de la invención se proporciona un método para reducir la carga de placa en el cerebro de un animal, particularmente un mamífero, pero especialmente un ser humano que sufre de una enfermedad o

afección que conduce a una carga de placa aumentada en el cerebro que comprende la administración a un animal, particularmente un mamífero, más particularmente un ser humano que requiere tal tratamiento, una cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo y/o una parte funcional del mismo pero especialmente del anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo o de un anticuerpo de acuerdo con la invención funcionalmente equivalente y como se describió anteriormente en la presente memoria o una composición o una mezcla que comprende dicho anticuerpo.

En particular, la carga de placa se reduce en por lo menos 20 %, particularmente en por lo menos 25%, más particularmente en por lo menos 30%, aún más particularmente en más del 30%.

En una realización adicional de la invención un método para reducir la proporción de placas en el cerebro de un animal, particularmente un mamífero, pero especialmente un ser humano que sufre de una enfermedad o afección que conduce a una carga de placa aumentada en el cerebro que comprende administrar a un animal, particularmente un mamífero, más particularmente un ser humano que requiere tal tratamiento, una cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo y/o una parte funcional del mismo pero especialmente del anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo o de un anticuerpo funcionalmente equivalente de acuerdo con la invención y como se describió anteriormente en la presente memoria o una composición o una mezcla que comprende dicho anticuerpo.

En particular, la proporción de placas del cerebro se reduce en por lo menos 10 %, particularmente en por lo menos 15%, más particularmente en más del 15%..

En otra realización aún de la invención un método para disminuir la proporción total de A β soluble en el cerebro de un animal, particularmente un

mamífero, pero especialmente un ser humano que sufre de una enfermedad o afección que conduce a las concentraciones aumentadas de A β soluble en el cerebro que comprende administrar a un animal, particularmente un mamífero, más particularmente un ser humano que requiere tal tratamiento, una cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo y/o una parte funcional del mismo pero especialmente del anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo o de un anticuerpo funcionalmente equivalente de acuerdo con la invención y como se describió anteriormente en la presente memoria o una composición o una mezcla que comprende dicho anticuerpo.

Es objeto de la presente invención proporcionar un método para prevenir, tratar o aliviar los efectos de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeldt Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular, por la administración de un anticuerpo, pero

particularmente un anticuerpo monoclonal o una composición o mezcla que comprende tal anticuerpo de acuerdo con la invención a un animal o a ser humano afectado por tal trastorno que comprende la administración a un animal, particularmente un mamífero, más particularmente un ser humano que requiere tal tratamiento, una cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo y/o una parte funcional del mismo pero especialmente del anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo o de un anticuerpo funcionalmente equivalente de acuerdo con la invención y como se describió anteriormente en la presente memoria o una composición o una mezcla que comprende dicho anticuerpo

En una realización específica la invención proporciona un método de para retener o aumentar la capacidad de memoria cognitiva de un animal, particularmente un mamífero o un ser humano que padece de deterioro de la memoria por la administración a un animal, particularmente un mamífero o un ser humano que requiere tal tratamiento, un anticuerpo, pero particularmente un anticuerpo monoclonal de acuerdo con la invención o una composición o mezcla que comprende tal anticuerpo de acuerdo con la invención tal como se describió anteriormente en la presente memoria.

En otra realización de la presente invención se proporciona un método para la preparación de una composición farmacéutica que usa un anticuerpo de acuerdo con la invención y/o una parte funcional del mismo pero especialmente un anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo o un anticuerpo funcionalmente equivalente para prevenir, tratar o aliviar los efectos de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con

la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeldt Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionado con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular.

En una realización específica la invención proporciona un método para la preparación de una composición farmacéutica que usa un anticuerpo de acuerdo con la invención y/o una parte funcional del mismo pero especialmente un anticuerpo monoclonal y/o una parte funcional del mismo o un anticuerpo funcionalmente equivalente para retener o aumentar la capacidad cognitiva de un animal, particularmente un mamífero o un ser humano que padece de deterioro de la memoria por la administración a un animal, particularmente un mamífero o un ser humano un anticuerpo, pero particularmente un anticuerpo monoclonal o una composición o mezcla que comprende tal anticuerpo de acuerdo con la invención, tal como se describió anteriormente en la presente memoria .

Estos y otros objetos, características y ventajas de la presente invención serán evidentes después de una revisión de la siguiente descripción detallada de la realización descripta y las reivindicaciones anexas.

Los términos “polipéptido”, “péptido”, y “proteína”, como se usan en la presente memoria, son indistintos y se definen como una biomolécula compuestas de aminoácidos unidos por un enlace peptídico.

Los términos "un", "una" y "el" como se usan en la presente memoria se definen como "uno o más " e incluyen el plural a menos que el contexto fuera inapropiado.

Los términos "detección" o "detectado" como se usan en la presente memoria significan el uso de técnicas conocidas para la detección de moléculas biológicas tal como métodos inmunoquímicos o histológicos y se refieren a la determinación en forma cualitativa o cuantitativa de la presencia o concentración de la biomolécula en investigación.

“ β amiloide, $A\beta$ o β -amiloide” es un término reconocido en el arte y se refiere a las proteínas y péptidos β amiloides, a la proteína precursora de la β amiloide (APP), además de las modificaciones, fragmentos y cualquiera de los equivalentes funcionales de los mismos. En particular, por β amiloide, como se usa en la presente memoria, se entiende cualquier fragmento producido por la escisión proteolítica de APP pero especialmente los fragmentos que están involucrados o asociados con las patologías amiloides, que incluyen, pero sin limitación, $A\beta_{1-38}$, $A\beta_{1-39}$, $A\beta_{1-40}$, $A\beta_{1-41}$, $A\beta_{1-42}$ y $A\beta_{1-43}$.

La estructura y secuencias de los péptidos β amiloides como se mencionó anteriormente son bien conocidas por los expertos en el arte y los métodos para producir dichos péptidos o extraerlos del cerebro y otros tejidos se describen, por ejemplo, en Glenner y Wong, Biochem Biophys Res Comm129, 885-890 (1984). Además, los péptidos β amiloides están disponibles en el comercio en varias formas.

“Fibrilla $A\beta$ ” o “filamento $A\beta$ ” o “fibrillas amiloides” son formas poliméricas de proteínas monoméricas que forman fibras en manojos o

individuales con un diámetro de fibra constante que son insolubles en medio acuoso y contienen grandes cantidades de una estructura β cruzada en su núcleo; en su mayor parte con cadenas beta perpendiculares al eje 1,2,3 de la fibrilla)

“A β monomérica” o “monómero A β ” son proteína β amiloide completamente solubilizada sin complejos agregados en medio acuoso.

“Amiloide soluble polimérico” y “A β oligomérico” y “oligómero A β ” se refieren a monómeros agregados múltiples de péptidos amiloides o de péptidos tipo amiloide, o de péptidos amiloides truncados o modificados o de otros derivados de los péptidos amiloides, que forman estructuras oligoméricas o poliméricas que son solubles tanto *in vitro* en medio acuoso como *in vivo* en el cuerpo de mamíferos o seres humanos, más particularmente en el cerebro, pero particularmente monómeros agregados múltiples de β amiloide (A β) o de péptidos β amiloide modificados o truncados (A β) o de derivados de los mismos, que son solubles en el cuerpo de mamíferos o seres humanos, más particularmente en el cerebro, respectivamente.

Por “aislada” se entiende una molécula biológica libre de por lo menos alguno de los compuestos con que se produce en forma natural.

Los términos “anticuerpo” o “anticuerpos” como se usan en la presente memoria son términos reconocidos en el arte y se entiende que se refieren a las moléculas o fragmentos activos de moléculas que se unen a antígenos conocidos, particularmente a moléculas de inmunoglobulinas y a porciones inmunológicamente activas de las moléculas de inmunoglobulinas, es decir moléculas que contienen un sitio de unión que se une inmunoespecíficamente a un antígeno. La inmunoglobulina de acuerdo con la invención puede ser de cualquier tipo (IgG, IgM, IgD, IgE, IgA y IgY) o

clase (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1 y IgA2) o subclases de molécula de inmunoglobulina.

Se entiende que "anticuerpos" dentro del alcance de la presente invención incluye anticuerpos monoclonales, policlonales, quiméricos, de cadena única, biespecíficos o bi-efectivos, simianizados, humanos y humanizados además de los fragmentos activos del mismo. Los ejemplos de fragmentos activos de las moléculas que se unen a antígenos conocidos incluye los fragmentos Fab y $F(ab')_2$ que incluyen los productos de una genoteca de expresión de inmunoglobulina Fab y los fragmentos de unión con el epítopo de cualquiera de los anticuerpos y fragmentos mencionados anteriormente.

Estos fragmentos activos se pueden derivar de un anticuerpo de la presente invención por varias técnicas. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales purificados se pueden escindir con una enzima, tal como pepsina, y someter a filtración con gel de HPLC. La fracción apropiada que contiene los fragmentos Fab luego se pueden recoger y concentrar por filtración de membranas y similares. Para la descripción adicional de las técnicas generales para aislamiento de los fragmentos activos de los anticuerpos, ver por ejemplo, Khaw, B. A. et al. J. Nucl. Med. 23:1011-1019 (1982); Rousseaux et al. Methods Enzymology, 121:663-69, Academic Press, 1986.

Un "anticuerpos humanizado" se refiere a un tipo de anticuerpo manipulado genéticamente que tiene sus CDR derivados de una inmunoglobulina dadora no humana, las partes de la molécula derivadas de la inmunoglobulina restante deriva de una (o más) inmunoglobulina(s) humana(s). Además, los residuos del soporte de la estructura se pueden alterar para conservar la afinidad de unión. Los métodos de obtener

“anticuerpos humanizados” son bien conocidos por los expertos en el arte. (ver, por ej., Queen et al., Proc. Natl Acad Sci USA, 86:10029-10032 (1989), Hodgson et al., Bio/Technology, 9:421 (1991)).

Un "anticuerpos humanizado" también se puede obtener por un nuevo método de ingeniería genética que permite la producción de anticuerpos policlonales similares a los humanos de afinidad madura en animales grandes tales como, por ejemplo, conejos (<http://www.rctech.com/bioventures/therapeutic.php>).

El término “anticuerpo monoclonal” también es bien conocido en el arte y se refiere a un anticuerpo producido en masa en el laboratorio a partir de un clon único y que reconoce solo un antígeno. Los anticuerpos monoclonales se preparan típicamente por fusión de una célula B productora de anticuerpos, normalmente de vida corta, a un célula de crecimiento rápido, tal como una célula cancerosa (algunas veces denominada célula “inmortal”). La célula híbrida resultante, o hibridoma, se multiplica rápidamente, crea un clon que produce grandes cantidades del anticuerpo.

Para el propósito de la presente invención, se entiende también que “anticuerpo monoclonal” comprenden a los anticuerpos producidos por un clon madre que no ha alcanzado la monoclonalidad completa.

Se entiende dentro del alcance de la presente invención que “anticuerpo funcionalmente equivalente” se refiere a un anticuerpo que comparte sustancialmente por lo menos una propiedad funcional principal con un anticuerpo mencionado anteriormente y descrito en la presente memoria que comprende: la especificidad de unión con la proteína β -amiloide, particularmente con la proteína $A\beta_{1-42}$ y más particularmente con la región epitópica 4-16 de la proteína $A\beta_{1-42}$, inmunorreactividad *in vitro*, inhibición de la agregación de los monómeros de $A\beta_{1-42}$ en fibrillas poliméricas de alto peso

molecular y/o desagregación de fibrillas poliméricas $A\beta_{1-42}$ preformadas y/o una propiedad anti-lámina β y aliviar los efectos de las enfermedades y trastornos causados por o asociados con proteínas amiloides o proteínas de tipo amiloide que incluyen amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con la formación de la placa amiloide que incluye la amiloidosis secundaria y amiloidosis relacionada con la edad tal como enfermedades que incluyen, pero sin limitación, trastornos neurológicos tal como enfermedad de Alzheimer (AD) que incluyen enfermedades o afecciones caracterizadas por la pérdida de la capacidad de memoria cognitiva tal como, por ejemplo, deterioro cognitivo leve), demencia de cuerpos de Lewy, síndrome de Down, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis (de tipo holandesa); complejo Parkinson-demencia de Guam; además de otras enfermedades que se basan o asocian con proteínas de tipo amiloide tal como parálisis supranuclear progresiva, esclerosis múltiple; enfermedad de Creutzfeldt Jacob, enfermedad de Parkinson, demencia relacionada con VIH, ALS (esclerosis lateral amiotrófica), miositis con cuerpos de inclusión (IBM), diabetes de comienzo adulto; amiloidosis cardíaca senil, tumores endocrinos y otros que incluyen degeneración macular, cuando se administra en forma profiláctica o terapéutica. Los anticuerpos pueden ser de cualquier clase tal como IgG, IgM, o IgA, etc o cualquier subclase tal como IgG1, IgG2a, etc y otras subclases mencionadas anteriormente en la presente memoria o conocidas en el arte pero particularmente de la clase IgG2. Además, los anticuerpos se pueden producir por cualquier método tal como despliegue en fagos, o producido en cualquier organismo o línea celular, que incluye bacterias, insecto, mamífero u otro tipo de células o línea celular que produce anticuerpos con características deseadas, tal como los anticuerpos

humanizados. Los anticuerpos también se pueden formar por la combinación de una porción Fab y una región Fc de diferentes especies.

El término “biespecífico” o “bifuncional” y “bi-efectivo” se usan como sinónimos dentro del alcance de esta solicitud para caracterizar un anticuerpo que exhibe tanto una propiedad de inhibición de formación de la fibra amiloide o de tipo amiloide además de la propiedad de desagregación la fibra amiloide o de tipo amiloide.

El término “antígeno” se refiere a una entidad o fragmento del mismo que puede inducir una respuesta inmune en un organismo, particularmente un animal, más particularmente un mamífero que incluye un ser humano. El término incluye a los inmunógenos y regiones responsables para antigenicidad o determinantes antigénicos.

Como se usa en la presente memoria, el término “soluble” significa parcialmente o completamente disuelto en una solución acuosa.

También como se usa en la presente memoria, el término “inmunogénico” se refiere a las sustancias que estimulan o aumentan la producción de anticuerpos, células T y otras células inmunes reactivas dirigidas contra un agente inmunogénico y contribuye a una respuesta inmune en seres humanos y animales.

Una respuesta inmune se produce cuando un individuo produce suficientes anticuerpos, células T y otras células inmunes reactivas contra composiciones inmunogénicas administradas en la presente invención para moderar o aliviar el trastorno tratado.

“Amiloide polimérico soluble” se refiere a monómeros de péptidos amiloide agregados múltiples o de péptidos de tipo amiloide o de péptidos amiloide modificados o truncados o de otros derivados de péptidos amiloides que forman estructuras oligoméricas o poliméricas que son solubles en

cuerpos de mamíferos o humanos más particularmente en el cerebro, pero particularmente a monómeros de β amiloide ($A\beta$) agregados múltiples o péptidos β amiloides modificados o truncados ($A\beta$) o de derivados del mismo, que son solubles en cuerpo de mamíferos o humanos más particularmente en el cerebro .

El término "hibridoma" está reconocido en el arte y es considerado por los expertos en el arte que se refiere a una célula producida por la fusión de una célula productora de anticuerpo y una célula inmortal, por ej., una células de mieloma múltiple. Esta célula híbrida es capaz de producir un suministro continuo de anticuerpo. Ver la definición de "anticuerpo monoclonal" anterior y los siguientes Ejemplos para una más detallada descripción del método de fusión.

El término "vehículo" como se usa en la presente memoria significa una estructura en la que el péptido antigénico o construcción supramolecular se puede incorporar o se puede asociar, de este modo se presenta o expone los péptidos antigénicos o parte del péptido al sistema inmune de un ser humano o animal. Cualquier partícula que se pueda usar en forma adecuada en terapia animal o humana tal como, por ejemplo, se puede usar una vesícula o partícula o un cuerpo particulado como un vehículo dentro del contexto de la presente invención.

El término "vehículo" además comprende los métodos de administración donde las composiciones de la construcción antigénica supramolecular que comprende el péptido antigénico se pueden transportar a sitios deseados por los mecanismos de administración. Un ejemplo de tal sistema de administración usa metales coloidales tal como oro coloidal.

Además, el término "vehículo" además comprende mecanismos de administración conocidos por los expertos en el arte que incluyen pero sin

limitación, hemocianina de lapa californiana (KLH), albúmina sérica bovina (BSA) y otros adyuvantes.

En la construcción antigénica supramolecular de acuerdo con la presente invención, el liposoma puede tener función dual o sea que se puede usar como un vehículo que comprende la construcción supramolecular, como se describió anteriormente en la presente memoria y al mismo tiempo, funcionar como un adyuvante para amentar o estimular la respuesta inmune en el animal blanco o ser humano tratado con la vacuna terapéutica de acuerdo con la invención. Se considera también que las composiciones de la construcción antigénica supramolecular de la presente invención pueden comprender también adyuvantes adicionales tal como, por ejemplo, lípido A, alumbre, fosfato de calcio, interleuquina 1, y/o microcápsulas de polisacáridos y proteínas, pero particularmente un lípido destoxificado A, tal como monofosforil o difosforil lípido A, o alumbre, conservantes adicionales, diluyentes, emulsificantes, estabilizantes y otros componentes que son conocidos y se usan en vacunas en el arte previo. Además, se puede usar cualquier sistema adyuvante conocido en el arte en la composición de la presente invención. Tales adyuvantes incluyen, pero sin limitación, adyuvante de Freund incompleto, adyuvante de Freund completo, manano acetilado unido β -(1,4) polidisperso ("Acemannan"), TITERMAX[®] (adyuvantes copolímeros de polioxietileno-polioxipropileno de CytRx Corporation), adyuvantes de lípidos modificados de Chiron Corporation, adyuvantes derivados de saponina de Cambridge Biotech, *Bordetella pertussis* muertas, lipopolisacáridos (LPS) de bacterias gram-negativas, aniones poliméricos grandes tal como dextran sulfato y geles inorgánicos tales como alumbre, hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio.

Las proteínas transportadoras que se pueden usar en las composiciones de la construcción antigénica supramolecular de la presente invención incluyen pero sin limitación la proteína de unión de maltosa "MBP"; albúmina sérica bovina "BSA"; hemocianina de lapa californiana "KLH"; ovalbúmina; flagelina; tiroglobulina; albúmina sérica de cualquier especie; gamma globulina de cualquier especie; células singeneicas; células singeneicas portadoras de antígenos la y polímeros de D- y/o L-aminoácidos.

Además el término "cantidad terapéuticamente efectiva" se refiere a la cantidad de anticuerpo, que cuando se administra a ser humano o animal, estimula una respuesta inmune que es suficiente para producir un efecto terapéutico en dicho ser humano o animal. La cantidad efectiva es determinada fácilmente por los expertos en el arte siguiendo procedimientos de rutina.

La "homología" entre dos secuencias redetermina por identidad de secuencia. Si dos secuencias que se comparan entre sí difieren en longitud, la identidad de secuencia con preferencia se refiere al porcentaje de los residuos de nucleótidos de la secuencia más corta que son idénticos con los residuos de la secuencia más larga. La identidad de secuencia se puede determinar convencionalmente con el uso de programas de computación tal como programa Bestfit (Wisconsin Sequence Analysis Package, Versión 8 para Unix, Genetics Computer Group, University Research Park, 575 Science Drive Madison, WI 53711). El Bestfit usa el algoritmo de homología local de Smith y Waterman, *Advances in Applied Mathematics* 2 (1981), 482-489, con el fin de hallar el segmento que tiene la mayor identidad de secuencia entre dos secuencias. Cuando se usa Bestfit u otro programa de alineamiento de secuencias para determinar si una secuencia particular tiene por ejemplo 95% de identidad con una secuencia de referencia de la presente invención, los

parámetros con preferencia se ajustan de modo que el porcentaje de identidad se calcula sobre la longitud completa de la secuencia de referencia y que se permitan las brechas de homología de hasta 5% del número total de nucleótidos con la secuencia de referencia. Cuando se usa Bestfit, los llamados parámetros opcionales se dejan con preferencia en los valores preestablecidos ("defecto"). Las desviaciones que aparecen en la comparación entre una secuencia dada y las secuencias anteriormente descritas de la invención se pueden originar por ejemplo por adición, supresión, sustitución, inserción o recombinación. Tal comparación de secuencia se puede realizar con preferencia también con el programa *fastx* (versión 2.0, septiembre 1998 por William R. Pearson y la University of Virginia; ver también W.R. Pearson (1990), *Methods in Enzymology* 183, 63-98, ejemplos anexos y <http://workbench.sdsc.edu/>). Para este propósito se pueden usar los ajustes parámetros en "defecto".

El término "hibridizar" se usa para referirse a condiciones de hibridación convencionales, con preferencia a condiciones de hibridación en las que se usa SSPE 5x, SDS 1%, solución de Denhardt 1x se usa como solución y/o las temperaturas de hibridación están entre 35°C y 70°C, con preferencia 65°C. Después de la hibridación, el lavado con preferencia se realiza primero con SSC 2x, SDS 1% y posteriormente con SSC 0,2x a temperaturas entre 35°C y 70°C, con preferencia a 65°C (con respecto a la definición de SSPE, SSC y solución de Denhardt ver Sambrook et al. loc. cit.). Las condiciones de hibridación rigurosas como por ejemplo describió en Sambrook et al, supra, son particularmente preferidas. Las condiciones de hibridación rigurosas particularmente preferidas están presentes por ejemplo si la hibridación y lavado se producen a 65°C como se indicó anteriormente). Las condiciones de hibridación no rigurosas, por ejemplo con hibridación y

lavado realizado a 45°C son menos preferidas y 35°C aun menos.

La presente invenciones se puede entender más fácilmente con referencia a la siguiente descripción detallada de las realizaciones específicas, incluidas en la presente memoria. Si bien la presente invención se ha descrito con referencia a detalles específicos de ciertas realizaciones de las misma no se pretende que tales detalles sean considerados como limitaciones al alcance de la invención.

La presente invención proporciona anticuerpos y partes funcionales de los mismos que son anticuerpos sensibles desde el punto de vista de la conformación. Estos anticuerpos reconocen epitopes específicos en una amplia variedad de antígenos proteínicos amiloideos. Los anticuerpos son útiles para la intervención diagnóstica y terapéutica en enfermedades y las enfermedades y trastornos causados por o asociados con la proteína amiloide o de tipo amiloide que incluye amiloidosis, un grupo de enfermedades y trastornos asociados con proteína amiloide o de tipo amiloide tal como la proteína A β involucrada en la enfermedad de Alzheimer.

Los anticuerpos se administran a individuos para inmunizarlos en forma pasiva contra una variedad de enfermedades o trastornos, que diluyen pero sin limitación enfermedades asociadas con la proteína amiloide tal como la enfermedad de Alzheimer.

Los anticuerpos proporcionados en la presente memoria son anticuerpos monoclonales o policlonales que tienen especificidad de unión para los péptidos antigénicos representativos de diversas enfermedades asociadas con la proteína amiloide tales como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer .

Los anticuerpos de acuerdo con la invención se prepara por la inmunización de un animal, tal como un ratón, rata, conejo u otra especie

animal que puede producir anticuerpos nativos o humanos, con una composición de una construcción antigénica supramolecular.

Las construcciones antigénicas supramoleculares como se describen en la presente memoria generalmente comprenden péptidos modificados para aumentar el efecto antigénico donde tales péptidos remodifican por medio de la pegilación (usando polietilenglicol o polietilenglicol modificado), o modificado por otros métodos tal como por ácido palmítico, poliaminoácidos (por ej. poli-glicina, poli-histidina), polisacáridos (por ej., ácido poligalacturónico, ácido poliláctico, poliglicólido, quitina, quitosano), polímeros sintéticos (poliamidas, poliuretanos, poliésteres) o co-polímeros (por ej., poli(ácido metacrílico) y N-(2-hidroxi)propil metacrilamida) y similares.

La modificación por ácido palmítico (palmitoilación), mientras que proporciona un anclaje para el péptido en la bicapa del liposoma, debido a la longitud reducida relativa del residuo de ácido graso C_{16:0} conduce al péptido que prácticamente se extiende en la superficie de liposoma. Por consiguiente, las células que procesan el antígeno deberán tomar el liposoma entero con el péptido, en el cual la mayoría de los casos, produce una respuesta inmune más lenta en términos relativos.

En una realización de la invención, se usa un péptido amiloide 1-15 modificado en la preparación de un anticuerpo, particularmente un anticuerpo monoclonal de acuerdo con la invención. El péptido amiloide 1-15 modificado se puede sintetizar siguiendo el método informado en Nicolau et. al. 2002. El método informado en Nicolau et al implica modificar al péptido antigénico por un trasplante en la resina de un residuo lipofílico o hidrofóbico, a los residuos de aminoácidos terminales de un péptido preformado que origina un producto de pureza considerablemente alta. En particular, un aminoácido protegido, particularmente un aminoácido Fmoc-protégido, se une a una resina mediante

reacciones químicas de acoplamiento conocidas. El grupo protector se elimina y se acopla un segundo residuo de aminoácido protegido. La síntesis de péptidos automatizada estándar que usa reacciones químicas de protección conocidas y, particularmente reacciones químicas de Fmoc/tBu, y luego se usan grupos protectores de cadena lateral estándar para sintetizar el péptido antigénico A β ₁₋₁₅ por acoplamiento de los aminoácidos 1 a 15 de la proteína amiloide A β ₁₋₄₂ para producir el fragmento del péptido con una secuencia dada en la SEC ID NO: 1. En un paso final se acoplan dos aminoácidos protegidos adicionales al fragmento del péptido en crecimiento. Los grupos Mtt luego se pueden escindir selectivamente y acoplar al ácido palmítico. Después del lavado de la resina, se elimina el grupo protector y se retira la resina simultáneamente seguido por las desprotecciones de la cadena lateral mediante metodología estándar. El producto final luego se puede obtener con alta pureza y se confirma su identidad por métodos conocidos en el arte tal como, por ejemplo, espectrometría de masa por electroaspersión.

El residuo lipofílico o hidrofóbico de acuerdo con la presente invención puede ser un ácido graso, un triglicérido o un fosfolípido donde el esqueleto carbonado de los ácidos grasos tiene por lo menos 10 átomos de carbono. Particularmente, el residuo lipofílico o hidrofóbico es un ácido graso con un carbonado de por lo menos aproximadamente 14 átomos de carbono y hasta aproximadamente 24 átomos de carbono, con cada número individual de átomos de carbono que se incluye en este rango también como parte de la presente invención. Más particularmente, el residuo lipofílico o hidrofóbico tiene esqueleto carbonado de por lo menos 14 átomos de carbono. Los ejemplos de residuos hidrofóbicos incluyen pero sin limitación ácido palmítico, ácido esteárico, ácido mirístico, ácido láurico, ácido oleico, ácido linoleico,

ácido linolénico y colesterol o DSPE. En una realización específica de la presente invención el residuo lipofílico o hidrofóbico es ácido palmítico.

Para mejorar la respuesta inmune, otro anclaje/espaciador se puede aplicar adecuadamente para reconstituir el péptido en el liposoma, por ej., polietilenglicol (PEG).

El PEG está unido en forma covalente al residuo de aminoácido unido a ambos extremos del péptido, en particular los residuos de aminoácidos Glu, Cys o Lys o cualquier otro residuo de aminoácido que se puede usar adecuadamente para unir PEG en forma covalente al péptido. En el otro extremo de la cadena se puede unir en forma covalente un residuo hidrofóbico para actuar como elemento de anclaje en la bicapa del liposoma tal como, por ejemplo, fosfatidiletanolamina (PEA). De este modo, el liposoma todavía funciona como adyuvante y el péptido está suficientemente alejado de la bicapa que se puede procesar solo y de este modo aumenta su inmunogenicidad en comparación con el antígeno palmitoilado.

En ciertas realizaciones, las construcciones antigénicas supramoleculares usadas dentro del alcance de la presente invención comprenden una secuencia del péptido, unida en forma covalente a la lisina pegilada- en uno de cada extremo. La longitud de la cadena de PEG (polietilenglicol) puede variar de $n = 8$ a $n = 150.000$ o más, particularmente de $n = 10$ a $n = 80.000$, más particularmente de $n = 20$ a $n = 10.000$. En una realización específica de la invención la longitud de la cadena de PEG es no más de $n = 45$, particularmente entre $n = 5$ y $n = 40$, más particularmente entre $n = 10$ y $n = 30$, y aún más particularmente $n = 10$.

Las construcciones antigénicas supramoleculares de la presente memoria se pueden sintetizar mediante la síntesis automatizada de péptidos y las reacciones químicas de protección conocidas, particularmente

reacciones químicas Fmoc/tBu y grupos protectores de cadena lateral estándares. Típicamente, la pegilación de los péptidos produce mezclas de regioisómeros.

Para lograr una unión específica de sitio de un conjugado PEG-lípido a ambos C- y N- terminal de A β se puede usar péptidos parcialmente protegidos. Para estas secuencias de péptidos que contienen residuos de Lys o His internos se agrega Lys(ivDde) protegido en forma ortogonal a cada término. Una Gly adicional se puede agregar al extremo C-terminal para facilitar la síntesis. El grupo protector se elimina y se N-acetila mediante anhídrido acético seguido por la escisión selectiva de los grupos ivDde.

Una resina, particularmente una resina 2-clorotritilo, es la más favorecida, la cual es sensible al ácido y de este modo permite el aislamiento de los péptidos protegidos.

En una realización específica de la invención, la reacción de acoplamiento se realiza en fase de solución. La ruptura selectiva de la resina en condiciones moderadas luego libera los péptidos internamente protegidos.

Los acoplamientos en fase de solución se realizaron con éxito con los péptidos derivados de una secuencia de la proteína β -amiloidetal como, por ejemplo, una A β_{1-16} (SEC ID NO: 2) a una molécula de PEG modificada por un ácido graso – fosfatidilcolina tal como, por ejemplo, DSPE. La separación de los productos mono- y di-acoplados antes de las desprotecciones de la cadena lateral se pueden lograr por medio de una cromatografía de intercambio catiónico. Las desprotecciones posteriores de la cadena lateral del péptido conducen al aislamiento de los conjugados deseados con una pureza aceptable. La purificación se puede lograr por métodos bien conocidos en el arte tales como, por ejemplo, HPLC. etc.

Este método para la síntesis de los antígenos β -amiloides lípido-PEG N- y C-terminales que usan péptidos protegidos es aplicable a una amplia variedad de secuencias de péptidos.

Los antígenos liposomales de acuerdo con la invención luego se pueden preparar como se describe en Nicolau et al., 2002. El péptido antigénico $A\beta$ amiloide modificado, particularmente el péptido antigénico $A\beta_{1-15}$, $-A\beta_{1-16}$, $A\beta_{1-16(\Delta 14)}$, $A\beta_{22-35}$ y $A\beta_{29-40}$ palmitoilado y modificado con PEG se puede reconstituir en una construcción que consiste en liposomas, particularmente liposomas hechos de dimiristoil fosfatidilcolina (DMPC), dimiristoil fosfatidil etanolamina (DMPEA), dimiristoil fosfatidilglicerol (DMPG) y colesterol, opcionalmente que contiene monofosforil lípido A.

En una realización específica de la invención los liposomas con lípido A se usan como adyuvantes para preparar la vacuna anti-amiloide. Se mezclan dimiristoil fosfatidil-colina, -glicerol y colesterol, particularmente en una relación de concentración molar de 0.9:1.0:0.7. Un inumodulador potente tal como, por ejemplo, monofosforil lípido A luego se agrega en una concentración adecuada, particularmente en una concentración entre 30 y 50 mg por mmol, más particularmente 40 mg por mmol de fosfolípidos. El péptido antigénico $A\beta$ modificado luego se agrega en una relación molar de péptido a fosfolípidos entre 1:30 y 1:200, particularmente en una relación molar entre 1:50 y 1:120, más particularmente de 1:100. Los solventes se eliminan, por ejemplo mediante la evaporación y la película hidratada resultante con solución de buffer estéril tal como, por ejemplo PBS.

Los liposomas también se pueden preparar por la técnica de inyección de flujo cruzado como se describe, por ejemplo, en Wagner et al (2002) Journal of Liposome Research Vol 12(3), pp 259 – 270. Durante la inyección de soluciones de lípidos en un sistema de buffer acuoso, los lípidos tienden a

formar “precipitados”, seguidos por disposición propia en vesículas. El tamaño de la vesícula obtenida depende de factores tales como concentración de lípidos, velocidad de agitación, velocidad de inyección y la elección de los lípidos. El sistema de preparación puede consistir en un módulo de inyección de flujo cruzado, recipientes para la fase polar (por ej., una solución buffer de PBS), un recipiente de solución de etanol/lípido y un dispositivo de presión, pero particularmente un dispositivo de presión de nitrógeno. Si bien la solución acuosa o polar se bombea a través del módulo de inyección de flujo cruzado, la solución de etanol/lípido se inyecta en la fase polar con aplicación de presiones variadas.

El liposoma aún funciona como adyuvante y el péptido que está suficientemente alejado de la bicapa se puede procesar solo y de este modo aumenta la inmunogenicidad en comparación con el antígeno palmitoilado.

El extremo libre de PEG está unido en forma covalente a una molécula de fosfatidil-etanolamina (donde el ácido puede ser: mirístico, palmítico, esteárico, oleico etc. o una combinación de los mismos) para funcionar como elemento de anclaje. Esta estructura supramolecular se puede anclar por la reconstitución de los liposomas que consisten en fosfolípidos y colesterol (fosfatidiletanolamina, fosfatidilglicerol, colesterol en relaciones molares variadas. Se pueden usar otros fosfolípidos. El lípido A se usa en una concentración de aproximadamente 40 μ g/pmol de fosfolípidos.

En ciertas realizaciones, las construcciones antigénicas supramoleculares pegiladas o palmitoilada comprenden un péptido que tiene la secuencia de aminoácido del β -amiloide. Los péptidos también pueden comprender o corresponder al péptido beta amiloide completo y los fragmentos activos del mismo. Adicionalmente, los péptidos útiles para la

presente invención además comprenden $A\beta_{1-16}$ (SEC ID NO: 2); $A\beta_{1-16(\Delta 14)}$; (SEC ID NO: 3); $A\beta_{1-15}$ (SEC ID NO: 1); y fragmentos activos del mismo.

Para estimular y preparar anticuerpos y para determinar la inmunogenicidad de la construcción antigénica $A\beta$ modificada, se selecciona un animal del grupo que consiste en ratones, ratas, conejos, cerdos, pájaros, etc, pero particularmente ratones, especialmente los ratones C57BL/6 se inmunizan con el péptido antigénico. La inmunogenicidad de la construcción antigénica se determina por la prueba de muestras Sera en intervalos de tiempo adecuados después de la inmunización mediante un inmunoensayo tal como, por ejemplo, un ensayo ELISA.

Los anticuerpos monoclonales de la presente invención se pueden preparar mediante técnicas de clonación clásica y fusión celular bien conocidas en el arte. El inmunógeno (antígeno) de interés, típicamente se administra (por ej., inyección intraperitoneal) a ratón de tipo salvaje o endogámico (por ej., ratones BALB/c o especialmente C57BL/6), ratas, conejos u otras especies de animales o ratones transgénicos que pueden producir anticuerpos nativos o humanos. El inmunógeno se puede administrar solo o mezclado con adyuvante, o expresado a partir de un vector (vector del replicón VEE, vaccinia), o como ADN o como proteína de fusión para inducir una respuesta inmune. Las proteínas de fusión comprenden el péptido contra el cual se desea una respuesta inmune acoplado a proteínas transportadoras, tal como, por ejemplo, beta.-galactosidasa, glutathion S-transferasa, hemocianina de lapa californiana (KLH), y albúmina sérica bovina. En estos casos, los péptidos actúan como haptenos con las proteínas transportadoras. Después de que el animal se reforzó, por ejemplo, dos o más veces, se recogen las células del bazo de los animales inmunizados e hibridomas generados por la fusión de las células del bazo sensibilizado con una línea de

células de mieloma, tal como células de mieloma SP2/O murinas (ATCC, Manassas, VA) que usan los procesos bien conocidos de Kohler y Milstein (Nature 256: 495-497 (1975)) y Harlow y Lane (Antibodies: A Laboratory Manual (Cold Spring Harbor Laboratory, New York 1988)).

En una realización específica de la invención la construcción antigénica de acuerdo con la invención, particularmente una composición de vacuna que comprende dicha construcción antigénica en una forma aceptable para uso farmacéutico, se administra en dosis repetidas, en particular en 1 a 15 dosis , más particularmente en 2 a 10 dosis , aún más particularmente en 3 a 7 dosis pero especialmente en 4 a 6 dosis, en intervalos de tiempo entre 1 y 10 semanas, particularmente en intervalos de tiempo entre 1 y 6 semanas, más particularmente en intervalos de tiempo entre 1 y 4 semanas y aún más particularmente en intervalos de tiempo entre 2 y 3 semanas. La respuesta inmune se controla por la toma de muestras Sera en un tiempo adecuado después de del refuerzo, particularmente 3 a 10 días después del refuerzo, más particularmente 4 a 8 días después del refuerzo y más particularmente 5 a 6 días después del refuerzo y se determina la inmunogenicidad de la construcción antigénica mediante metodología conocida, particularmente uno de los inmunoensayos comúnmente usados tal como, por ejemplo, un ensayo ELISA.

La inmunización con la construcción antigénica de acuerdo con la invención, pero particularmente con una composición de vacuna que comprende dicha construcción antigénica de acuerdo con la invención en una forma aceptable para uso farmacéutico conduce a una respuesta inmune significativa en el animal tratado. Los animales, pero especialmente los ratones con títulos terapéuticos se seleccionan para la fusión de las células productoras de anticuerpos, particularmente linfocitos B con un crecimiento

continuo o línea celular inmortal, tal como una línea celular de mieloma. Las células se inducen a fusionar por la adición de polietilenglicol. Los títulos terapéuticos son los que brindan un resultado positivo en un ensayo ELISA en una dilución entre 1:4000 y 1:6000, particularmente entre 1:4500 y 1:5500, más particularmente de 1:5000.

Las células híbridas resultantes luego se clonan en forma convencional, por ej., usando una dilución limitante, y los clones resultantes, que producen los anticuerpos monoclonales deseados se cultivan.

Los hibridomas así obtenidos se seleccionan en forma química por la incubación de las células en un medio de selección que contiene hipoxantina, aminopterina y timidina (HAT).

Los hibridomas se seleccionaron posteriormente por la capacidad de producir anticuerpos monoclonales contra las enfermedades o trastornos asociados con amiloide específicas. Los hibridomas que producen anticuerpos de interés se clonan, expanden y conservan congelados para la producción futura. El hibridoma preferido produce un anticuerpo monoclonal que tiene un isotipo IgG, con más preferencia el isotipo IgG2.

El anticuerpo policlonal se prepara para inmunizar a los animales, tal como ratones o conejos, o cualquier otro animal con composiciones de la construcción antigénica supramolecular de la presente invención descrita anteriormente. Posteriormente se recoge suero de sangre de los animales y los anticuerpos e l suero se selecciona de acuerdo con su reactividad cruzada contra el antígeno amiloide.

Los anticuerpos de acuerdo con la invención se pueden preparar en una formulación aceptable para uso fisiológico y pueden comprender un vehículo, diluyente y/o excipiente aceptables para uso farmacéutico empleando técnicas conocidas. Por ejemplo, el anticuerpo de acuerdo con la

invención y como se describió antes en la presente memoria, que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo, en particular, el anticuerpo monoclonal que incluye a cualquier anticuerpo funcionalmente equivalente o partes funcionales del mismo se combina con un vehículo, diluyente y/o excipiente aceptables para uso farmacéutico para formar una composición terapéutica. Los vehículos, diluyentes y/o excipientes para usos farmacéuticos adecuados son bien conocidos en el arte e incluyen, por ejemplo, soluciones salinas de buffer de fosfato, agua, emulsiones tal como emulsiones aceite/agua, diversos tipos de agentes humectantes, soluciones estériles, etc.

La formulación de la composición farmacéutica de acuerdo con la invención se puede obtener mediante la metodología estándar conocida por los expertos en el arte.

Las composiciones de la presente invención se pueden administrar al sujeto en forma de un sólido, líquido o aerosol en una dosis efectiva para uso farmacéutico adecuada. Los ejemplos de composiciones sólidas incluyen píldoras, cremas, y unidades de dosis implantables. Las píldoras se pueden administrar en forma oral. Las cremas terapéuticas se pueden administrar en forma tópica. Las unidades de dosis implantables se pueden administrar en forma local, por ejemplo, en un sitio del tumor, o se pueden implantar para la liberación sistemática de la composición terapéutica, por ejemplo, en forma subcutánea. Los ejemplos de composiciones líquidas incluyen formulaciones adaptadas para la inyección intramuscular, subcutánea, intravenosa, intraarterial y las formulaciones para administración tópica e intraocular. Los ejemplos de formulaciones en aerosol incluyen formulaciones inhalatorias para la administración en los pulmones.

Las composiciones se pueden administrar por vías estándares de administración. En general, la composición se puede administrar por vías tópica, oral, rectal, nasal, interdérmica, intraperitoneal, o parenteral (por ejemplo, intravenosa, subcutánea o intramuscular). Además, la composición se puede incorporar en matrices de liberación sostenida tal como polímeros biodegradables, los polímeros se implantan en la vecindad de donde se desea la administración, por ejemplo, en el sitio del tumor. El método incluye la administración de una dosis única, administración de dosis repetidas en intervalos de tiempo predeterminados, y la administración sostenida para un período de tiempo determinado.

Una matriz de liberación sostenida, como se usa en la presente memoria, es una matriz realizada de materiales, usualmente polímeros que son degradables por hidrólisis enzimática o ácido/base o por disolución. Una vez insertada en el cuerpo, la matriz actúa sobre las enzimas y líquidos corporales. La matriz de liberación sostenida se elige en forma deseable por materiales biocompatibles tal como liposomas, poliláctidos (ácido poliláctico), poliglicólido (polímero de ácido glicólico), poliláctico co-glicólido (copolímeros de ácido láctico y ácido glicólico), polianhidridos, poli(orto)ésteres, polipéptidos, ácido hialurónico, colágeno, condroitin sulfato, ácidos carboxílicos, ácidos grasos, fosfolípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos, ácidos poliamino, aminoácidos tales como fenilalanina, tirosina, isoleucina, polinucleótidos, polivinil propileno, polivinilpirrolidona y silicona. Una matriz biodegradable preferida es una matriz de uno de cualquier poliláctido, poliglicólido o poliláctico co-glicólido (co-polímeros de ácido láctico y ácido glicólico).

Es bien sabido por los expertos en el arte pertinente que la dosis de la composición dependerá de diversos factores tal como, por ejemplo, la

afección tratada, la composición particular usada y otros factores clínicos tal como peso, tamaño, sexo y condiciones de salud general del paciente, área de superficie corporal, el compuesto o composición particular administrado, otros fármacos administrado en forma concurrente y la vía de administración.

La composición se puede administrar en combinación con otras composiciones que comprende una sustancia o compuesto biológicamente activo, particularmente por lo menos un compuesto seleccionado del grupo que consiste en compuestos contra el estrés oxidativo, compuestos anti-apoptóticos, quelantes de metales, inhibidores de la reparación de ADN tal como pirenzepina y metabolitos, ácido 3-amino-1-propansulfónico (3APS), 1,3-propandisulfonato (1,3PDS), activadores de secretasa, β - y γ -inhibidores de secretasa, proteínas tau, neurotransmisores, agentes anti-lámina β , moléculas antiinflamatorias o “antipsicóticos atípicos” tal como, por ejemplo clozapina, ziprasidona, risperidona, aripiprazol o olanzapina o inhibidores de colinesterasa (ChEI) tal como tacrina, rivastigmina, donepezil, y/o galantamina y otros fármacos y suplementos nutritivos, tal como, por ejemplo, vitamina B12, cisteína, un precursor de acetilcolina, lecitina, colina, Ginkgo biloba, acietil-L-carnitina, idebenona, propentofilina o un derivado de xantina, junto con un anticuerpo de acuerdo con la presente invención y opcionalmente, un vehículo y/o diluyente y/o un excipiente aceptable para uso farmacéutico y procedimientos del tratamiento de las enfermedades.

La materia proteinácea activa para uso farmacéutico puede estar presente en cantidades 1 ng y 10 mg por dosis. Generalmente, el régimen de administración deberá ser del rango entre 0,1 μ g y 10 mg del anticuerpo de acuerdo con la invención, particularmente del rango 1,0 μ g a 1,0 mg, y más particularmente en un rango entre 1,0 μ g y 100 μ g, con todos los números individuales incluidos en estos rangos son parte de la invención. Si la

administración se produce mediante la infusión continua en una dosis más adecuada puede estar en el rango entre 0,01 μg y 10 mg unidades por kilogramo de peso corporal por hora con todos los números individuales incluidos en estos rangos también son parte de la invención.

La administración generalmente será por vía parenteral, por ej., intravenosa. Las preparaciones para administración parenteral incluyen soluciones acuosa o no acuosas no estériles, suspensiones y emulsiones. Los solventes no acuosos incluyen sin limitación a propilenglicol, polietilenglicol, aceite vegetal tal como aceite de oliva, y ésteres orgánicos inyectables tal como oleato de etilo. Los solventes acuosos se pueden elegir del grupo que consiste en agua, soluciones alcohol/acuosa, emulsiones o suspensiones que incluyen medio salino y bufferizado. Los vehículos parenterales incluyen solución de cloruro de sodio, dextrosa de Ringer, dextrosa y cloruro de sodio, solución de Ringer lactado o aceites fijos. Los vehículos intravenosos incluyen repositorios de líquido y nutrientes, repositorios de electrolitos (tal como los basados en dextrosa de Ringer) y otros. Los conservantes también pueden estar presentes tal como, por ejemplo, antimicrobianos, anti-oxidantes, agentes quelantes, gases inertes, etc.

La composición farmacéutica puede comprender también vehículos proteináceos tal como, por ejemplo, albúmina sérica o inmunoglobulina particularmente de origen humano. Otros agentes biológicamente activos pueden estar presentes en la composición farmacéutica de la invención que dependen del uso a que está destinada.

En una realización adicional la presente invención proporciona métodos y kits para la detección y diagnóstico de enfermedades o afecciones asociadas con amiloide para diagnosticar una predisposición a una

enfermedad o afección asociada con amiloide o para controlar la enfermedad residual mínima de un paciente o para predecir la respuesta de un paciente a un tratamiento con un anticuerpo o una composición de vacuna de acuerdo con la invención y como se describió anteriormente en la presente memoria. Estos métodos incluyen métodos inmunológicos conocidos comúnmente usados para la detección o cuantificación de sustancias en muestras biológicas o en una condición *in situ*.

El diagnóstico de una enfermedades o afecciones asociadas con amiloide o de una predisposición a una enfermedad o afección asociada con amiloide de un paciente se puede lograr por la detección de la unión inmuno-específica de un anticuerpo monoclonal o de un fragmento activo del mismo con un epítopo de la proteína amiloide en una muestra o *in situ*, que incluye poner en contacto la muestra o parte corporal específica o área corporal sospechada de contener el antígeno amiloide con un anticuerpo que se une a un epítopo de la proteína amiloide, lo cual permite al anticuerpo unirse al antígeno amiloide para formar un complejo inmunológico, detectar la formación del complejo inmunológico y correlacionar la presencia o ausencia del complejo inmunológico con la presencia o ausencia del antígeno amiloide en la muestra o parte corporal específica o área corporal, que opcionalmente compara la cantidad de dicho complejo inmunológico a un valor control normal, donde un aumento de la proporción de dicho agregado en comparación con un valor normal que dicho paciente padece o está en riesgo de desarrollar la enfermedad o afección asociada con amiloide .

Controlar la enfermedad residual mínima de un paciente después del tratamiento con un anticuerpo o una composición de vacuna de acuerdo con la invención se puede lograr por la detección de la unión inmuno-específica de un anticuerpo monoclonal o un fragmento activo del mismo de un epítopo de

la proteína amiloide en una muestra o *in situ*, que incluye poner en contacto la muestra o parte corporal específica o área corporal sospechada de contener el antígeno amiloide con un anticuerpo que se une a un epítopo de la proteína amiloide, lo cual permite al anticuerpo unirse al antígeno amiloide para formar un complejo inmunológico, detectar la formación del complejo inmunológico y correlacionar la presencia o ausencia del complejo inmunológico con la presencia o ausencia del antígeno amiloide en la muestra o parte corporal específica o área corporal, opcionalmente comparar la cantidad de dicho complejo inmunológico a un valor control normal, donde un aumento de la proporción de dicho agregado en comparación con un valor normal indica que dicho paciente aún puede sufrir una enfermedad residual mínima.

La predicción de la respuesta de un paciente a un tratamiento con una composición de vacuna de acuerdo con la invención se puede obtener por la detección de la unión inmuno-específica de un anticuerpo monoclonal o un fragmento activo del mismo de un epítopo de la proteína amiloide en una muestra o *in situ*, que incluye poner en contacto la muestra o parte corporal específica o área corporal sospechada de contener el antígeno amiloide con un anticuerpo que se une a un epítopo de la proteína amiloide, lo cual permite al anticuerpo unirse al antígeno amiloide para formar un complejo inmunológico, detectar la formación del complejo inmunológico y correlacionar la presencia o ausencia del complejo inmunológico con la presencia o ausencia del antígeno amiloide en la muestra o parte corporal específica o área corporal, opcionalmente comparar la cantidad de dicho complejo inmunológico antes y después del comienzo del tratamiento, donde una disminución de la proporción de dicho agregado indica que dicho paciente tienen un alto potencial para responder al tratamiento .

Las muestras biológicas que se pueden usar para el diagnóstico de una enfermedad o afección asociada con amiloide, para diagnosticar una predisposición a una enfermedad o afección asociada con amiloide o para controlar la enfermedad residual mínima de un paciente o para predecir la respuesta de un paciente a un tratamiento con un anticuerpo o una composición de vacuna de acuerdo con la invención y como se describió anteriormente en la presente memoria son, por ejemplo, fluidos tal como suero, plasma, saliva, secreciones gástricas, mucus, líquido cefalorraquídeo, líquido linfático y similares o tejido o muestras de células obtenidas de un organismo tal como tejido neural, cerebral, cardíaco o vascular. Para determinar la presencia o ausencia del antígeno amiloide en una muestra se puede usar cualquier inmunoensayo conocido por los expertos en el arte. (Ver Harlow y Lane, *Antibodies: A Laboratory Manual* (Cold Spring Harbor Laboratory, New York 1988 555-612) tal como, por ejemplo, ensayos que utilizan métodos de detección indirecta que emplean reactivos secundarios para la detección, ELISA y ensayos de inmunoprecipitación y aglutinación. Una descripción detallada de estos ensayos se brinda, por ejemplo, en WO96/13590 en Maertens y Stuyver, Zrein et al. (1998) y WO96/29605.

Para el diagnóstico *in situ*, el anticuerpo o cualquier parte activa y funcional del mismo se puede administrar al organismo para su diagnóstico por métodos conocidos en el arte, tal como, por ejemplo, inyección intravenosa, intranasal, intraperitoneal, intracerebral, intraarterial de modo que se pueda producir una unión específica entre el anticuerpo de acuerdo con la invención con una región epitópica de la región amiloide. El complejo anticuerpo/antígeno se puede detectar mediante una marca unida al anticuerpo o fragmento funcional del mismo.

Los inmunoensayos usados en aplicaciones diagnósticas o en aplicaciones para diagnosticar una predisposición a una enfermedad o afección asociada con amiloide o para controlar la enfermedad residual mínima de un paciente o para predecir la respuesta de un paciente al tratamiento con un anticuerpo o una composición de vacuna de acuerdo con la invención y como se describió anteriormente en la presente memoria típicamente dependen de antígenos marcados, anticuerpos o reactivos secundarios para detección. Estas proteínas o reactivos se pueden marcar con compuestos generalmente conocidos por los expertos en el arte que incluyen enzimas, radioisótopos y sustancias fluorescentes, luminescentes y cromogénicas que incluyen partículas coloreadas, tal como oro coloidal y microesferas de látex. De estos, se puede usar el marcado radiactivo en casi todos los tipos de ensayos y con las mayores variaciones. Las marcas conjugadas con la enzima son particularmente útiles cuando se puede evitar la radiactividad o cuando se necesitan resultados rápidos. Los fluorocromos si bien requieren equipamiento costoso para uso, proporcionan un método de detección muy sensible. Los anticuerpos útiles en estos ensayos incluyen anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales y anticuerpos monoclonales de afinidad purificados.

Alternativamente, el anticuerpo se puede marcar en forma indirecta por medio de la reacción con sustancias marcadas que tienen una afinidad por la inmunoglobulina, tal como la proteína A o G o segundos anticuerpos. El anticuerpo se puede conjugar con una segunda sustancia y detectar con una tercera sustancia marcada que tiene afinidad por la segunda sustancia conjugada al anticuerpo. Por ejemplo, el anticuerpo se puede conjugar con biotina y el conjugado anticuerpo-biotina detectado mediante avidina o estreptavidina. De modo similar, el anticuerpo se puede conjugar a un hapteno

y el conjugado anticuerpo-hapteno se detecta mediante un anticuerpo anti-hapteno marcado.

Los expertos en el arte sabrán que estas y otras marcas adecuadas se pueden emplear de acuerdo con la presente invención. La unión de estas marcas a los anticuerpos o fragmentos del mismo se pueden lograr empleando técnicas estándares comúnmente usadas por los expertos en el arte. Las técnicas típicas están descritas por Kennedy, J. H., et al., 1976 (Clin. Chim. Acta 70:1-31), y Schurs, A. H. W. M., et al. 1977 (Clin. Chim Acta 81:1-40). Las técnicas de acoplamiento en esta última son el método de glutaraldehído, el método de peryodato el método de dimaleimida y otros que están incorporados como referencia en la presente memoria.

Los inmunoensayos actuales utilizan un método de doble anticuerpo para detectar la presencia de un analito, donde el anticuerpo se marca en forma indirecta por reactividad con un segundo anticuerpo que ha sido marcado con una marca detectable. El segundo anticuerpo es con preferencia uno que se une a los anticuerpos del animal del cual se deriva el anticuerpo monoclonal. En otras palabras, si el anticuerpo monoclonal es un anticuerpo de ratón, luego el segundo anticuerpo marcado es un anticuerpo anti-ratón. Para el anticuerpo monoclonal que se usa en el ensayo que se describe a continuación, esta marca es con preferencia una microesfera recubierta con anticuerpo, particularmente una microesfera magnética. Para el anticuerpo policlonal que se emplea en el inmunoensayo descrito en la presente memoria, la marca es con preferencia una molécula detectable tal como una sustancia radioactiva, fluorescente o electroquimioluminiscente.

Un sistema de doble anticuerpo alternativo, con frecuencia mencionado como sistemas de formato rápido ya que se adaptan a determinaciones rápidas de la presencia de un analito, también se puede emplear dentro del

alcance de la invención. El sistema requiere alta afinidad entre el anticuerpo y el analito. De acuerdo con una realización de la presente invención, se determina la presencia del antígeno amiloide mediante un par de anticuerpos, cada uno específico para el antígeno amiloide. Uno de dichos pares de anticuerpos se menciona en la presente memoria como un "anticuerpo detector" y el otro de dicho par de anticuerpos se menciona en la presente memoria como un "anticuerpo de captura". El anticuerpo monoclonal de la presente invención se puede usar tanto como anticuerpo de captura como anticuerpo detector. El anticuerpo monoclonal de la presente invención se puede usar también como anticuerpo de captura y anticuerpo detector, juntos en un ensayo único. Una realización de la presente invención de este modo usa el método sándwich del doble anticuerpo para detectar antígeno amiloide en una muestra de un fluido biológico. En este método, el analito (antígeno amiloide) se coloca a modo de sándwich entre el anticuerpo detector y el anticuerpo de captura, el anticuerpo de captura se inmoviliza en forma irreversible en un soporte sólido. El anticuerpo detector deberá contener una marca detectable, con el fin de identificar la presencia del sándwich anticuerpo-analito y de este modo la presencia del analito.

Los ejemplos de sustancias en fase sólida incluyen pero sin limitación placas de microtitulación, tubos de ensayo de poliestireno, microesferas magnéticas, plásticas o de vidrio y extendidos que son bien conocidos en el campo de radioinmunoensayo e inmunoensayo de enzima. Los métodos para acoplar anticuerpos en fases sólidas también son bien conocidos por los expertos en el arte. Más recientemente, se ha empleado varios materiales porosos tal como nylon, nitrocelulosa, acetato de celulosa, fibras de vidrio y otros polímeros porosos como soportes sólidos.

La presente invención también se refiere un kit diagnóstico para detectar antígeno amiloide en una muestra biológica que comprende una composición como se definió anteriormente. Además, la presente invención se refiere a este último kit diagnóstico el que, además de una composición como se definió anteriormente, también comprende un reactivo de detección como se definió anteriormente. El término "kit diagnóstico" se refiere en general a cualquiera de los kit diagnósticos conocidos en el arte. Más específicamente, el último término se refiere a un kit diagnóstico como se describe en Zrein et al. (1998).

Es otro objeto de la presente invención proporcionar nuevas pruebas inmunológicas y ensayos para detección y diagnóstico enfermedades y afecciones asociadas con amiloide que comprenden anticuerpos de acuerdo con la presente invención. Para las pruebas inmunológicas, los anticuerpos se unen en forma directa o indirecta a una molécula indicadora adecuada, por ej , una enzima o radionucleido. El kit de ensayo incluye un recipiente que contiene uno o más anticuerpos de acuerdo con la presente invención e instrucciones para uso de los anticuerpos con el propósito de unirse al antígeno amiloide para formar una complejo inmunológico y detectar la formación del complejo inmunológico de modo que la presencia o ausencia del complejo inmunológico se correlacione con la presencia o ausencia del antígeno amiloide.

EJEMPLOS

Antígenos usados para originar anticuerpos monoclonales de ratón

mAb de ratón	Antígeno/Secuencia	Ligador	Anclaje	Adjuvante
mACI-01-Ab7	A β ₁₋₁₆	PEG	DSPE	Lípido A
mACI-02-Ab6	A β ₁₋₁₆ (Δ 14)	PEG	DSPE	Lípido A
mACI-11-Ab9	A β ₂₂₋₃₅	PEG	DSPE	Lípido A

mACI-12-Ab11	A β ₂₉₋₄₀	PEG	DSPE	Lípido A
mACI-24-Ab4	A β ₁₋₁₅	-	Palm	Lípido A

Tabla 1. Anticuerpo y construcciones antigénicas usadas para originar dichos anticuerpos

EJEMPLO 1: Métodos para preparar construcciones antigénicas supramoleculares A β ₁₋₁₅ palmitoiladas

Síntesis del antígeno péptido tetra(palmitoil-lisina)-A β ₁₋₁₅

El péptido amiloide 1-15 palmitoilado se sintetizó siguiendo un método previamente informado mejorado (Nicolau et. al. 2002). Este nuevo método incluye el injerto sobre la resina de ácido palmítico a los residuo de Lys terminales del péptido pre-formado más que la síntesis en fase sólida escalonada que incorpora el aminoácido modificado 9-fluorenilmetoxycarbonil (Fmoc)-Lys(Pal)-OH. Este nuevo método mejora la eficacia del acoplamiento y brinda un producto de pureza considerablemente mayor. De este modo, el aminoácido protegido en forma ortogonal Fmoc-Lys(Mtt)-OH se unió a una resina Wang mediante la reacción de acoplamiento con [hexafluorofosfato de 2-(1 H-benzotriazol-1-il)-1,1,3,3-tetrametiluronio] (HBTU). El grupo Fmoc se retiro mediante piperidina DMF y se acopló un segundo residuo de Fmoc-Lys(Mtt)-OH. La síntesis automatizada estándar del péptido que emplea reacciones químicas de Fmoc/tBu grupos protectores de la cadena lateral estándares luego se usaron para acoplar los próximos 15 aminoácidos para producir una secuencia del péptido como la dada en SEC ID NOs: 1. Finalmente los dos últimos aminoácidos acoplados fueron Fmoc-Lys(Mtt)-OH. Los grupos Mtt luego se escindirán selectivamente mediante ácido trifluoroacético 1% (TFA) en diclorometano para liberar un fragmento del péptido y luego acoplarse a ácido palmítico mediante HBTU. Después del lavado de resina, el grupo Fmoc se eliminó con piperidina 20% en

dimetilformamida (DMF) y finalmente la escisión de resina simultánea y las desprotecciones de la cadena lateral se realizaron mediante TFA en condiciones estándares. El triturado en éter dietílico frío dio el producto como un sólido blanco. La espectrometría de masa por electroaspersión confirmó la identidad de producto (m/z esperado: 1097.9 ($[M]3+$); experimental 1096.8 ($[M-3H]3+$), sin otros péptidos tri-, di- o mono-palmitoilados detectados

EJEMPLO 2: Métodos para preparar construcciones antigénicas supramoleculares

Síntesis del antígeno péptido β -amiloide pegilado

Para aumentar la respuesta inmune, se ha aplicado otro anclaje/espaciador para reconstituir el péptido en el liposoma, por ej polietilenglicol (PEG). El PEG se unió en forma covalente al residuo de lisina unido a ambos extremos del péptido. En el otro extremo de la cadena (PEG_n=70) el fosfatidiletanolamina (PEA) se unió en forma covalente para actuar como elemento de anclaje de la bicapa del liposoma. De este modo, el liposoma actúa aun como un adyuvante y el péptido que está suficientemente alejado de la bicapa se puede procesar solo y de este modo aumenta la inmunogenicidad en comparación con el antígeno palmitoilado.

Las construcciones supramoleculares descritas en la presente memoria se sintetizan únicamente mediante protecciones estándares de la cadena lateral de aminoácidos Fmoc/tBu. Típicamente la pegilación de los péptidos produce mezclas de regioisómeros. En la presente memoria se demuestra que un método es conveniente para la unión específica de sitio de un conjugado PEG-Lípido en ambos extremos C- y N- de A β mediante péptidos parcialmente protegidos.

Para las secuencias de péptidos que contienen residuos internos de Lys o His (1-16, 1-16 Δ 14, 22-35), se agregó Lys(ivDde) protegido en forma

ortogonal a cada extremo. Se agregó Gly adicional al C-terminal para facilitar la síntesis. El grupo Fmoc se retiró con piperidina 20 % en DMF y se N-acetiló mediante anhídrido acético. La ruptura selectiva de los grupos ivDde se obtuvo con hidrato de hidracina 3 % en DMF durante una hora. La resina 2-clorotritilo es más favorable que la más ampliamente usada resina Wang ya que la primera demostró ser mucho más resistente a la hidracinólisis. Además, la resina 2-clorotritilo es extremadamente sensible y de este modo, a diferencia de la resina Wang, permite el aislamiento de los péptidos protegidos. En realidad, fue necesario realizar la reacción de acoplamiento en la fase de solución como acoplamiento del péptido unido a resina al reactivo pre-activado de lípido pegilado DSPE-PEG-SPA no originó ningún producto de acoplamiento. De este modo la ruptura selectiva de la resina en condiciones moderadas (ácido acético/ trifluoroetanol/diclorometano, 1:1:8, 1h, ta) produjo los péptidos protegidos internamente.

Los acoplamientos en fase de solución se lograron con éxito con los péptidos derivados de la secuencia A β ₁₋₁₆ (SEC ID NO: 2) a DSPE-PEG-SPA en DMSO y exceso de base. Las reacciones luego se inactivaron por la adición de exceso de etanolamina durante 2 h y la solución se liofilizó.

Para la secuencia 29-40, no se requiere una estrategia de protección especial.

La purificación por HPLC (semi-preparativa columna C₄ fase reversa) produjo entre 50-70% pureza de los conjugados lípido-PEG N- y C- terminal cuyas identidades se confirmaron por MAALDI (ionización por desorción por láser asistida con matriz). Cada secuencia mostró una considerable variación en la facilidad de la reacción de acoplamiento y las condiciones se ajustaron en consecuencia (temperatura, número de equivalentes molares de DSPE-PEG-SPA, tiempo). Para la separación de exceso de DSPE-PEG-SPA se

aplica la purificación por HPLC del producto deseado. La separación de los productos mono- y di-acoplados antes de las desprotecciones de la cadena lateral se pueden lograr por cromatografía de intercambio catiónico. Las desprotecciones posteriores de la cadena lateral del péptido y la separación del exceso de DSPE-PEG-SPA inactivado condujeron al asilamiento de los conjugados deseados con una pureza aceptable.

Este método para la síntesis de antígenos β -amiloides de lípido-PEG N- y C-terminal mediante péptidos protegidos es aplicable a una amplia variedad de secuencias peptídicas.

EJEMPLO 3: Anticuerpos estimulados por las construcciones antigénicas supramoleculares

Fabricación de mAb originados contra la construcción antigénica supramolecular $A\beta_{1-15}$ palmitoilada:

El antígeno palmitoilado (ACI-24, $A\beta_{1-15}$) se usó para la inmunización de ratones C57BL/6 en intervalos de 2 semanas. Se inmunizaron 10-12 animales con cada antígeno (volumen de inyección: 200 μ l que contienen 8 nmoles del péptido). La última inyección se realizó 4 días antes del sacrificio de los animales. Después de 5 refuerzos, se seleccionaron ratones con títulos terapéuticos (cuando una dilución 1:5.000 de los sueros fueron positivos en el ELISA) para una fusión. Se recogieron las células del bazo de los animales inmunizados y los hibridomas generados por células del bazo sensibilizadas por fusión con una línea celular de mieloma. La fusión de los linfocitos B de los ratones de los bazos se realizó con células de la línea celular de mieloma SP2-0. (ATCC, Manassas, VA) empleando los bien conocidos procesos de Kohler y Milstein (Nature 256: 495-497 (1975)) y Harlow y Lane (Antibodies: A Laboratory Manual (Cold Spring Harbor Laboratory, New York 1988)).

Las células se inducen a fusionarse por la adición de polietilenglicol. Las células híbridas resultantes luego se cultivan durante 10 ± 14 días en forma convencional para permitir el crecimiento clónico. La selección clónica inicial se realizó mediante una dilución límite. Los clones del hibridoma que producen IgG se seleccionaron y ensayaron para determinar su unión específica al péptido $A\beta_{1-42}$ por ELISA y los clones resultantes, que producen los anticuerpos monoclonales deseados se cultivan.

Los hibridomas así obtenidos se seleccionan en forma química por la incubación de las células en un medio de selección que contiene hipoxantina, aminopterina y timidina (HAT).

Los hibridomas se seleccionaron posteriormente por la capacidad de producir anticuerpos monoclonales contra las enfermedades o trastornos asociados con amiloide específicas. Una vez que se identificó el clon madre, se subclonó cuatro veces para garantizar la monoclonalidad y permitir al híbrido estabilizarse.

Los hibridomas que producen anticuerpos de interés se clonan, expanden y conservan congelados para la producción futura.

El anticuerpo se isotipificó con un kit de isotipificación monoclonal de ratón disponible en el comercio y el clon estable se adaptó al medio libre de suero y se colocó en un biorreactor para la producción de anticuerpos.

El hibridoma preferido produce un anticuerpo monoclonal que tiene un isotipo IgG, con más preferencia el isotipo IgG1.

Fabricación de mAbs originados contra construcciones antigénicas supramoleculares PEG- $A\beta_{1-16}$, $A\beta_{4-11}$, $A\beta_{22-35}$ y $A\beta_{29-40}$ pegiladas :

Se prepararon antígenos liposomales como se describen en (Nicolau et al., 2002, PNAS, 99, 2332-37). Las secuencias de PEG- $A\beta_{1-16}$, $A\beta_{4-11}$, $A\beta_{22-35}$ y

$A\beta_{29-40}$ (Figure 1) se reconstituyeron en una construcción que comprende liposomas hechos de dimiristoil fosfatidilcolina (DMPC), dimiristoil fosfatidiletanolamina (DMPEA), dimiristoil fosfatidilglicerol (DMPG) y colesterol (relaciones molares 0.9: 0.1: 0.1: 0.7) que contienen monofosforil lípido A (fosfolípidos 40mg/mM). Estos antígenos y $A\beta_{1-16}$ pegilados se usaron para la inmunización de ratones C57BL/6 en intervalos de 2 semanas. Se inmunizaron 10-12 con cada antígeno. Después de 3 a 6 se seleccionaron ratones con títulos terapéuticos (cuando una dilución 1:5.000 de los sueros fueron positivos en el ELISA) para una fusión. Se recogieron las células del bazo de los animales inmunizados y los hibridomas generados por células del bazo sensibilizadas por fusión con una línea celular de mieloma. La fusión de los linfocitos B de los ratones de los bazos se realizó con células de la línea celular de mieloma SP2-0. (ATCC, Manassas, VA) empleando los bien conocidos procesos de Kohler y Milstein (Nature 256: 495-497 (1975)) y Harlow y Lane (Antibodies: A Laboratory Manual (Cold Spring Harbor Laboratory, New York 1988)).

Las células se inducen a fusionarse por la adición de polietilenglicol. Las células híbridas resultantes luego se clonan en forma convencional, por ej., mediante una dilución límite. Los clones del hibridoma que producen IgG se seleccionaron y ensayaron para determinar su unión específica al péptido $A\beta_{1-42}$ por ELISA y los clones resultantes, que producen los anticuerpos monoclonales deseados se cultivan.

Los hibridomas así obtenidos se seleccionan en forma química por la incubación de las células en un medio de selección que contiene hipoxantina, aminopterina y timidina (HAT).

Los hibridomas se seleccionaron posteriormente por la capacidad de producir anticuerpos monoclonales contra las enfermedades o trastornos

asociados con amiloide específicas. Los hibridomas que producen anticuerpos de interés se clonan, expanden y conservan congelados para la producción futura. El hibridoma preferido produce un anticuerpo monoclonal que tiene un isotipo IgG, con más preferencia el isotipo IgG1.

EJEMPLO 4: Determinación de especificidad para el anticuerpo mACI-24-Ab4

Para analizar la especificidad del anticuerpo mACI-24-Ab4, se transfirieron concentraciones diferentes de fibrillas de amiloide preformadas 1-42, 1-40 y 1-38 en una membrana de nitrocelulosa Hybond ECL (Amersham Biosciences). Después del bloqueo con 10% de leche en polvo y Tween 20 0,7 %, las membranas se incubaron con el anticuerpo principal a 20 µg/ml durante 2h a TA. Después del lavado, las membranas se incubaron con anticuerpo de IgG anti-ratón de oveja conjugada con peroxidasa de rábano picante (Amersham Biosciences) durante 1 h a TA, se lavó e incubó con solución quimioluminiscente seguida por la exposición de la membrana a la película de rayos X.

Para medir la unión del mAb mACI-24-Ab4 a las fibras β amiloide 1-42, A β 1-42, 1-40 y fibras de 1-38 se pre-formaron durante siete días a 37°C y se transfirieron en la membrana. Se usaron 20 µg/ml de anticuerpo para medir la capacidad de unión y se detectó el anticuerpo unido por con anticuerpo de IgG anti-ratón de oveja conjugada con peroxidasa de rábano picante durante 20 minutos de exposición.

Como se puede demostrar por análisis de transferencia de punto, el anticuerpo mACI-24-Ab4 se une a fibras diferentes de A β preformadas con sensibilidad diferente. El anticuerpo exhibe mayor sensibilidad de unión a las fibras de A β ₁₋₄₂ que A β ₁₋₄₀ o A β ₁₋₃₈. Es capaz de detectar por lo menos 0,001 µg de fibras de A β ₁₋₄₂ mientras que el límite de detección del anticuerpo para

las fibras de $A\beta_{1-40}$ es por lo menos 0,1 μg y para las fibras de $A\beta_{1-38}$ 1 μg , lo que significa que la sensibilidad es 100 veces a 1000 veces menor para estos tipos de fibras amiloides. Los datos demuestran que el anticuerpo ACI-24-Ab4 es por lo menos 100 veces más sensible que la forma amiloidea (1-42), la cual se sabe que es insoluble por cambio de la conformación secundaria y es la mayor parte de las placas amiloides en los cerebros de los pacientes de AD.

Ejemplo 5: Unión del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 del of AC Immune a especies amiloides en transferencia Western y transferencia de punto

Para determinar si la unión del anticuerpo de ratón mACI-01-Ab7 C2 es dependiente de la conformación nativa de A, se realizó una comparación de la unión al amiloide lineal por transferencia Western o amiloide nativo por transferencia de punto (Figuras 2a y 2b)

Se generaron monómeros de amiloide por disolución del péptido $A\beta_{1-42}$ en HFIP y el solvente evaporado en argón. La película del péptido seco se conservó a -80°C hasta el uso. Para la preparación de los monómeros, la película del péptido se resuspendió en DMSO a una concentración de 2,75 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ y se diluyó en PBS a 1 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$. Para la preparación de oligómeros, la película del péptido seco se resuspendió en DMSO a 5mM, se sonicó y se agregó PBS para alcanzar 400 μM de amiloide seguido por la adición de SDS a una concentración final de 0,2%. Después de 6 horas de incubación a 37°C , el amiloide se diluyó en agua a una concentración final de 100 μM y se incubó otras 18h a 37°C . Los oligómeros amiloides se precipitaron con metanol 33% frío en hielo, solución de ácido acético 4% durante 1h a 4°C , se centrifugó a 16200g durante 10 minutos y el sedimento se resuspendió en $\text{Na}_2\text{H}_2\text{PO}_4$ 5mM, NaCl 35mM pH 7,4 a una concentración final de 1 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$.

Para la preparación de fibras, se diluyó la película del péptido en buffer Tris-HCl 50mM para obtener una concentración de 1mg/ml de amiloide e incubó a 37°C durante 5 días. Los tubos se centrifugaron a 10000g durante 5 minutos y el sedimento se resuspendió en buffer de carbonato 0,1M pH 9,6 para alcanzar 1µg/µl.

Se diluyeron 1 o 5 µg de monómeros, oligómeros o fibras en PBS y en buffer de carga y se aplicaron a un SDS-PAGE 12% y el gel se transfirió a las membranas de nitrocelulosa. Alternativamente, se diluyeron 3 o 1µg o 100 y 10ng de especies amiloideas en PBS y se sembraron directamente en la membrana de nitrocelulosa y las membranas se secaron a TA durante 1 hora. Después del bloqueo durante 30 minutos con solución de caseína (Vector), las membranas se incubaron durante 30 minutos con los anticuerpos mACI-01-Ab7 C2 o 6E10 (Chemicon) diluidos a 1µg/ml en solución de caseína. Después de 3 lavados en solución de caseína, las membranas se incubaron a TA durante 30 minutos con IgG anti-ratón de cabra marcado con HRP (Dako Cytomation) diluida en solución de caseína, se lavaron 3 veces y se desarrollo con sustrato DAB (Dako Cytomation).

El anticuerpo monoclonal de ratón mACI-01-Ab7 C2 se unió específicamente a monómeros, oligómeros y fibras en un ensayo de transferencia de punto tal como lo hizo el anticuerpo de control positivo 6E10. En contraste, el anticuerpo mACI-01-Ab7C2 no detectó especies amiloides lineales por transferencia Western en contraste con el anticuerpo 6E10 que reconoce con claridad todos los péptidos lineales. Este resultado demuestra que la unión del mACI-01-Ab7 C2 al amiloide es dependiente de la conformación nativa del amiloide.

EJEMPLO 6: Interacciones de ACI-01Ab7 C2 –Aβ₁₋₄₂

Las interacciones entre el anticuerpo líder mACI-01-Ab7 C2 (mC2) con el péptido amiloide $A\beta_{1-42}$ se estudiaron mediante la resonancia del plasmón superficial. Se determinó la unión del anticuerpo de ratón mACI-01-Ab7 C2 r a cada uno de los monómeros o fibras de $A\beta_{1-42}$.

Todos los experimentos de SPR se realizaron en un Biacore X instrument (Biacore AB). Los reactivos para la inmovilización (EDC, NHS y etanolamina), los chips de los sensores CM5 y SA además de l buffer de corrida y de muestra HBS-EP se compraron en Biacore AB. Se usó acetato de sodio (10 mM, pH 5.0) como buffer de acoplamiento para aumentar el rendimiento del acoplamiento. Las fibrillas $A\beta_{1-42}$ (BAchem) se prepararon por la adición de buffer de PBS a $A\beta_{1-42}$ hasta una concertación final de 3 mg/ml y se dejan los viales a 37 °C durante 7 días. Las fibrillas de $A\beta_{1-42}$ se acoplaron a un chip del sensor CM5 que contiene una matriz de carboximetil dextrano unido a superficie. El $A\beta_{1-42}$ monomérico biotinilado (Bachem) se acopló a un chip Sensor SA que consiste en una matriz de carboximetil dextrano con estreptavidina unida en forma covalente. Típicamente se ensayaron cuatro o cinco concentraciones de mAb por diluciones seriadas empleando el buffer de corrida. Las inyecciones se realizaron a partir de la concentración más baja y se pasaron ambos fc 1 y 2 con un caudal de flujo de 30 μ l/min durante 3 min. La célula de flujo 2 no se derivatizó y se sustrajeron las respuestas del fc 1 para corregir el ruido del instrumento y los cambios de nasa refractarios. Después de que la inyección finalizó, se lavaron las superficies inmediatamente con buffer de corrida durante 5 minutos. Para eliminar el anticuerpo unido restante de las fibrillas de $A\beta_{1-42}$, la regeneración de superficie se realizó por inyección por pulsos de NaOH 10 mM . El análisis de la cinética se realizó mediante algoritmos para integración numérica y análisis global mediante BIAevaluation 3.0. Las curvas obtenidas para las inyecciones

del analito a concentraciones diferentes se superpusieron y se ajustaron las líneas basales a cero. Para el ajuste de la curva, todos los datos se ajustaron simultáneamente a un complejo homogéneo 1:1.

La unión del anticuerpo de ratón mACI-01-Ab7 C2 al amiloide se determinó que era relativamente potente. Como se demostró en la Tabla 2, el anticuerpo de ratón mACI-01-Ab7 C2 se unió específicamente a las fibras de A β ₁₋₄₂ inmovilizadas con una constante de asociación promedio (k_a) de $3,8 \times 10^{-4}$ M/s, una constante de disociación (k_d) de $1,1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ y en consecuencia con la KD promedio resultante de $3,5 \times 10^{-8}$ M. La asociación de los mACI-01-Ab7 C2 a los monómeros de A β fue similar o ligeramente más rápida con una k_a promedio de $1,6 \times 10^{-4}$ M/s pero la disociación fue más rápida que dio una KD de $2,5 \times 10^{-7}$ M.

	Monómeros			Fibras		
	$k_a(1/\text{Ms})$	$k_d(1/\text{s})$	KD (M)	$k_a(1/\text{Ms})$	$k_d(1/\text{s})$	KD (M)
mACI-01-Ab7 C2 exp. 1	1,8E+04	2,7E-03	1,5E-07	2,4E+04	9,9E-04	4,1E-08
mACI-01-Ab7 C2 exp. 2	1,5E+04	5,3E-03	3,5E-07	5,60E+04	9,66E-04	1,73E-08
mACI-01-Ab7 C2 exp. 3				3,26E+04	1,49E-03	4,58E-08
promedio mACI-01-Ab7 C2	1,6E+04 $\pm 0,21$	4,0E-03 1,84	2,5E-07 1,41	3,8E+04 1,66	1,1E-03 0,3	3,5E-08 1,53

EJEMPLO 7: Unión del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 monoclonal a las fibras amiloideas

Para analizar el sitio de unión molecular del anticuerpo en las fibras preformadas se realizó microscopía electrónica de transmisión con contraste negativo (TEM) (Figuras 3a y 3b).

El anticuerpo, mACI-01-Ab7 C2, se acopló con oro coloidal de 8 nm de acuerdo con ^{4,5}. Para la co-incubación de las fibras amiloides 1-42 (A β 1-42)

6,65uM se incubaron durante 24h a TA con el anticuerpo marcado con oro con una relación molar de 1:100. Posteriormente se incubaron 5 μ l de muestra en una grilla de Cu descargada del brillo fresca (200 mesh) cubierta con una película parlodio/C durante 45 segundos, se lavaron 3 veces con agua y 1 vez con acetato de uranilo 2% fresco diluido y filtrado. Las muestras se tiñeron en acetato de uranilo 2% durante 15-20 segundos. El exceso de tñido en las grillas se absorbió y por consiguiente se secó al aire. Se prepararon tres grillas de cada muestra. As grillas se analizaron en microscopía electrónica de transmisión Hitachi 7000.

El anticuerpo monoclonal, mACI-01-Ab7 C2, se une directamente a las fibras $A\beta_{1-42}$. De modo interesante, el anticuerpo exhibe una unión no simétrica al eje de las fibras únicas pero se une en particular y no a todas las áreas de las ramas laterales de la red de fibras. Parece ser que el anticuerpo se dirige a regiones específicas de las ramas laterales. La explicación potencial es una estructura secundaria específica que produce solo en sus ramas laterales específicas. Esta hipótesis está avalada por los datos de RMN que demuestran que el anticuerpo indujo la transición de conformación y en consecuencia es probable que su unión es dependiente de una conformación de la fibra amiloide que comprende una estructura de lámina β .

EJEMPLO 8: Fraccionamiento de la ultracentrifugación por gradiente de densidad

Las propiedades de los anticuerpos monoclonales de inhibir la polimerización de fibras $A\beta_{1-42}$ y la desagregación de las fibras de $A\beta_{1-42}$ se estudiaron por ultracentrifugación por gradiente de densidad (Rzepecki et al., 2004) que se basa en el principio de distribuir entre fibras de péptidos resultantes de tamaño diferente tamaño después de la incubación con y sin

anticuerpos seguidos por el análisis de sedimentación SDS-PAGE en un gradiente preformado (OptiPrep™). El análisis simultáneo de poblaciones de las fibras preformadas de A β , desagregación e inhibición de las propiedades de agregación de los anticuerpos co-incubados, y la unión de los anticuerpos a las fibras son ventajas obvias de estos métodos.

Los anticuerpos monoclonal originados contra A β_{1-16} (mACI-01-Ab7 C2), A $\beta_{1-16(\Delta 14)}$ (mACI-02-Ab6), A β_{1-15} (mACI-24-Ab4), A β_{22-35} (mACI-11-Ab9), y A β_{29-40} (mACI-12-Ab11) se analizaron en ensayos de desagregación mientras que la inhibición de las propiedades de agregación se estudiaron solo para el anticuerpo monoclonal mACI-02-Ab6, mACI-24-Ab4, y mACI-01-Ab7 C2.

Para la inhibición de la agregación de A β_{1-42} , los monómeros de A β_{1-42} se incubaron con los mAb con dos relaciones molares diferentes (relación molar del monómero A β_{1-42} treinta - o cuarenta veces mayor que mAb) con la concentración final de A β de 50 μ M. Después de la 24 horas de incubación a 37°C, las muestras se recubrieron sobre un gradiente discontinuo de Optiprep™ y los tubo se centrifugaron a 259.000 g durante 3 horas a 4°C. Se recogieron 15 fracciones (cada una 140 μ l), la fracción 1 fue la fracción menos densa del extremo superior del gradiente y la fracción 15 es la fracción más densa del extremo inferior del gradiente. También se tomó el sedimento. Las fracciones recogidas se analizaron por SDS-PAGE con tinción de plata. La concentración de A β_{1-42} para los ensayos de inhibición fue cinco veces menor que para los ensayos de desagregación que disminuyen la cinética de la agregación de amiloide y asegura la medición dentro de la fase lineal.

Para la desagregación de fibrillas preformadas de A β_{1-42} por co-incubación con los mAb (a dos relaciones molares diferentes 1:30 y 1:100, mAb + Monómero A β_{1-42} con la concentración final de A β de 246 μ M), las

muestras se incubaron durante 24 horas a 37°C. Después de 24 horas las muestras se fraccionaron por ultracentrifugación y se separaron por SDS-PAGE como se describió anteriormente (Rzepecki et al., 2004).

Ensayo de inhibición de agregación de $A\beta_{1-42}$

Se pudo demostrar que sin la adición del mAb, el péptido $A\beta$ se agregó después de 24 horas del tiempo de incubación y la mayoría de la proteína se halló en las fracciones 13-15, lo cual demuestra la polimerización completa de los monómeros del péptido $A\beta$. La inhibición significativa y exitosa de la agregación deberá originar fibras mas pequeñas o proteína β amiloide ($A\beta$) polimérica soluble, la cual se debe hallar en las fracciones con menor densidad (10-13). En forma exacta este cambio de bandas se pudo demostrar en el ensayo de agregación que contiene mACI-01-Ab7 C2 que mostró una distribución del péptido $A\beta$ sobre las fracciones 11, 12 y 13.

Esto se confirmó en un 2^{do} experimento donde mACI-01-Ab7 C2 originó otra vez un cambio de bandas para la mayoría (banda mas intensa) de 14 a 13 y una solubilización significativa de las bandas que corren de la fracción 14 al sedimento. Esto significa que mACI-01-Ab7 C2 exhibe una capacidad importante para inhibir la polimerización de los monómeros del péptido $A\beta$ en fibras y revelaron una unión específica a las fibras $A\beta$ (en la fracción 13)

Se realizaron observaciones similares cuando se usan los anticuerpos mACI-24-Ab4 y mACI-02-Ab6. Sin la adición del mAb, el péptido $A\beta$ se agregó después de 24 horas del tiempo de incubación y la mayoría de la proteína se halló en las fracciones 13 al sedimento (sedimento, muy poco en 12), lo cual demuestra la polimerización completa de los monómeros del péptido $A\beta$. La inhibición significativa y exitosa de la agregación deberá originar fibras mas pequeñas o proteína β amiloide ($A\beta$) polimérica soluble, la cual se debe hallar en las fracciones con menor densidad. En el ensayo de inhibición de

agregación, el mACI-24-Ab4 causó un cambio de las bandas para la mayoría (banda mas intensa) de 13 a 11 y 12 y una solubilización significativa de las bandas que corren de la fracción 13 al sedimento mientras que mACI-02-Ab6 causó un cambio de las bandas de 13 a 10 pero adicionalmente una inhibición completa de las fibras más largas (fraccionadas en 13 al sedimento). Estos datos indican que tanto mACI-24-Ab4 como mACI-02-Ab6 exhiben una capacidad importante para inhibir la polimerización de los monómeros del péptido A β en fibras y revelaron una unión específica a las fibras A β (en las fracciones 11 y 12).

En contraste, el ensayo de agregación que contiene mACI-11-Ab9, en una relación molar de 1:30, mostró agregados más grandes dispersos entre las fracciones 12-15 y el sedimento. En presencia de mACI-12-Ab11, en una relación molar 1:30, los agregados se hallaron en las fracciones 11-15 y el sedimento, pero con la señal más intensa en las fracciones 11 y 12. esto significa que los mACI-01-Ab7 C2 y mACI-24-Ab4 exhiben una capacidad importante para inhibir la polimerización de los monómeros del péptido A β en fibras. El mACI-12-Ab11 tiene propiedades de inhibición significativamente menores que mACI-01-Ab7 C2, para obtener esta actividad inhibitoria débil se requiere una relación molar tres veces superior. Se puede observar una inhibición aún menor cuando se compara a mACI-11-Ab9 que no pudo inhibir la agregación de fibras del péptido A β . Todos los mAb revelaron una unión específica a las fibras de A β (para mACI-01-Ab7 C2 en la fracción 11 + 12; para mACI-11-Ab9 en la fracción 12 y débil en 13; para mACI-12-Ab11 en la fracción 11 y 12).

En todos los ensayos de inhibición, el péptido se detectó en las fracciones del extremo inferior. El mAb no unido (37 kDa, 95 kDa y mayor de

120 kDa) aparecieron en la parte media superior del gradiente (fracciones 3-9 y 4-8, respectivamente).

Ensayo de desagregación de fibras $A\beta_{1-42}$

Debido a la polimerización incompleta de fibras la distribución de las fibrillas de $A\beta_{1-42}$ solas de muestra un rango más amplio de fracciones (11-15). En consecuencia la demostración de las propiedades de desagregación exitosa y significativa de los anticuerpos cuando se co-incuba con las fibras pre-formadas es más difícil que en el análisis de la agregación. Sólo un cambio de la mayoría de las fibras hacia las fracciones de menor densidad pero aun dentro del rango de la fracción amiloidea sola indicaría la actividad de desagregación; para el amiloide solo la banda principal es la fracción 12. La adición de mACI-01-Ab7 C2 en una relación molar 1:100 no mostró cambios de fibras amilideas hacia las fracciones de menor densidad (aun entre fracciones 11-15), pero con un cambio de la señal más intensa en el rango de la fracción de 12 a 11, cuando se compara con el amiloide solo. A pesar de las circunstancias no óptimas de la formación de fibra incompleta, el mACI-01-Ab7 C2 indica actividades de desagregación bajas pero detectables.

En contraste, la co-incubación de las fibrillas preformadas $A\beta_{1-42}$ con mACI-02-Ab6 no demostraron cambios de las bandas en la fracción de menor densidad cuando se incuba con la misma relación molar de amiloide:anticuerpo como mACI-01-Ab7 C2. Solo cuando se usó una relación molar tres veces superior de 1:30 las fibras amiloides cambiaron de las fracciones 12-15 (amiloide solo sin co-incubación del anticuerpo) a las de 11-15. En consecuencia pareció que mACI-01-Ab7 C2 tiene propiedades de degradación ligeramente superiores que mACI-02-Ab6.

La detección de bandas que corresponden a mAb a la mitad inferior de la fracción del gradiente demuestra la unión de mACI-02-Ab6 y mACI-01-Ab7 C2 a las fibrillas de $A\beta_{1-42}$ (fracción 11 a 15 para ambos mAb).

La propiedad de desagregación del mACI-01-Ab7 C2 se puede confirmar en un experimento adicional, donde la polimerización de fibras completas se pudo de mostrar por la distribución de las fibrillas de $A\beta_{1-42}$ en ausencia de un anticuerpo en las fracciones 13 a P (sedimento). Aquí los cambios de las fibras hacia las fracciones de menor densidad indican la actividad de desagregación del anticuerpo, cuando se co-incuba a las fibras pre-formadas. La adición de mACI-01-Ab7 C2 con una relación molar 1:100 mostró un cambio de la mayoría de las fibras amiloideas de 13 a 12 y adicionalmente un cambio de la banda con la menor densidad de 13 hacia 11. En consecuencia el mACI-01-Ab7 C2 también indica una fuerte actividad de desagregación.

La detección de bandas que corresponden a mAb en la mitad inferior de las fracciones del gradiente de muestra la unión de mACI-01-Ab7 C2 a las fibrillas $A\beta_{1-42}$ (fracción 11 a P) mientras que las bandas correspondientes a mAb en las fracciones 4a 7 indican anticuerpo no unido.

Para sintetizar estos resultados, se pudo demostrar con éxito que el anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 que se dirige al péptido amiloide $A\beta$ se une a las fibras pre-formadas y es capaz de inhibir *in vitro* la agregación de los péptidos monoméricos de $A\beta$ a las fibras y se desagregan las fibras pre-formadas.

Se realizaron observaciones similares cuando se usa el mACI-24-Ab4. En modo similar al ensayo de agregación, se pudo demostrar la polimerización e fibras completa por la distribución de las fibrillas de $A\beta_{1-42}$ solas en las fracciones 12 a P (sedimento). Aquí los cambios de las fibras

hacia las fracciones de menor densidad indican la actividad de desagregación del anticuerpo, cuando se co-incuba a las fibras pre-formadas. La adición de mACI-24-Ab4 con una relación molar 1:100 mostró un cambio de la mayoría de las fibra amiloideas de 12 a 11. En consecuencia el mACI-24-Ab4 indica también indica una fuerte actividad de desagregación.

EJEMPLO 9: Ensayo fluorescente para medir la inhibición de la agregación del filamento de $A\beta_{1-42}$ y la desagregación de los filamentos preformados de $A\beta_{1-42}$ por co-incubación con mAb

Ensayo fluorescente BIS-ANS

Para evaluar las propiedades de inhibición del mAb, se usó el ensayo fluorescente BIS-ANS (LeVine, 2002) que detecta específicamente la población del monómero o no fibrillas de los filamentos $A\beta_{1-42}$. Antes de la medición de fluorescencia, los monómeros de $A\beta_{1-42}$ se pre-incubaron con cualquier buffer, actuaron como control, o mAb (relación molar 1:100, mAb vs. péptido $A\beta_{1-42}$) durante 14 horas a 37°C. Las unidades de fluorescencia relativa se registraron en forma automática y los resultados se expresaron como en el porcentaje del control.

El mACI-02-Ab6 mostró una habilidad de inhibición leve cuando se compara con el control ($125,8 \pm 28,5\%$ vs $100 \pm 29,5\%$). El mACI-01-Ab7 C2 pareció tener actividad débil ($108,0 \pm 30,0\%$) y ninguna mejora en comparación con el control se puede observar con los mAb mACI-11-Ab9 y mACI-12-Ab11 ($93,5 \pm 21,9\%$ y $73,2 \pm 47,7\%$). Este resultado confirma los datos ultracentrifugación en el cual el mACI-01-Ab7 C2 exhibe una capacidad de inhibición mayor que mACI-11-Ab9 y mACI-12-Ab11.

EJEMPLO 10: Ensayo fluorescente de tioflavina T (Th-T)

Para medir tanto las propiedades de inhibición de la agregación además de la desagregación del mAb, se usó el ensayo fluorescente de

tioflavina T (Th-T) que se une específicamente a las moléculas de las fibrillas de $A\beta_{1-42}$ y posteriormente la intensidad de emisión fluorescente se correlaciona con la cantidad de filamentos de $A\beta_{1-42}$ presentes en solución.

Antes de la medición de fluorescencia, los monómeros de $A\beta_{1-42}$ se pre-incubaron con cualquier buffer, actuaron como control, o mAb (relación molar 1:100, mAb vs. péptido $A\beta_{1-42}$) durante 48 horas a 37°C. Las unidades de fluorescencia relativa se registraron en forma automática y los resultados se expresaron como porcentaje respecto del control.

El mACI-01-Ab7 C2 mostró una habilidad de inhibición significativa cuando se compara con el control ($11,03 \pm 20,7\%$ vs $100 \pm 40,5\%$). Estos resultados confirman los datos de ultracentrifugación, en el cual ACI-01-Ab7 C2 exhibe la capacidad de inhibición.

Para medir las propiedades de desagregación del mAb, se usó el ensayo fluorescente de tioflavina T (Th-T) que se une específicamente a las moléculas de las fibrillas de $A\beta_{1-42}$ y posteriormente la intensidad de emisión fluorescente se correlaciona con la cantidad de filamentos de $A\beta_{1-42}$ presentes en solución. Antes de la medición, las fibras de $A\beta$ se preformaron durante 7 días (a 37°C en PBS, pH 7,1) y luego posteriormente se co-incubaron con mAb o buffer (control negativo), durante 24 horas a 37°C en una relación molar de 1 : 100 (mAb vs. $A\beta_{1-42}$). Las unidades de fluorescencia relativa se registraron en forma automática por un lector de placa de microtitulación de ELISA y los resultados se expresaron como cambios en el porcentaje del control.

De acuerdo con los datos de ultracentrifugación de mACI-01-Ab7 C2 , también mostraron en el ensayo de desagregación de Th-T en dos experimentos independientes las mejores propiedades con $35 \pm 11\%$ y $64,57$

$\pm 13,58\%$ (vs $100,0 \pm 15,37\%$), respectivamente, poder de desagregación sobre el control.

El mACI-24-Ab4 también mostró propiedades de desagregación significativas ($62,99 \pm 10,34\%$ vs $100,0 \pm 10,03\%$; $p < 0,0001$) en el ensayo Th-T.

El mACI-11-Ab9 fue algo menos activo con $28 \pm 14\%$, mientras que ACI-02-Ab6 y ACI-12-Ab11 no exhiben propiedades de desagregación significativas ($17 \pm 12\%$ y $13 \pm 11\%$ respectivamente).

Cuando se resumen los ensayos de ultracentrifugación y fluorescente los mACI-01-Ab7 C2, mACI-01-Ab6 y mACI-24-Ab4 mostraron capacidades de bifuncionalidad para inhibir la agregación de fibras y acortar los filamentos $A\beta_{1-42}$ -en experimentos de centrifugación que se podrían confirmar por un ensayo fluorescente. Adicionalmente, el experimento de centrifugación demostró unión específica del mAb a las fibras amiloideas.

El mACI-11-Ab9 mostró una habilidad de inhibición significativa menor en al ultracentrifugación, cuando se compara con mACI-01-Ab7 C2 aun si estuviera tres veces más concentrado, lo cual se pudo confirmar por un ensayo BIS-ANS. Para el análisis de desagregación el mACI-01-Ab7 C2 demostró en el análisis por centrifugación y el ensayo de ThT propiedades para acortar los filamentos preformados de $A\beta_{1-42}$. El mACI-02-Ab6, tres veces más concentrado en el experimento de centrifugación, también fue positivo en ambos ensayos pero mucho más intenso en el experimento de centrifugación.

A partir de los resultados anteriores es evidente que mACI-01-Ab7 C2 y mACI-02-Ab6 son los únicos anticuerpos que muestran actividad en términos de bi-funcionalidad para interactuar con los filamentos $A\beta_{1-42}$, inhibición de agregación y desagregación de las fibras preformadas.

EJEMPLO 11: RMN y caracterización de fluorescencia de la interacción del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 con el péptido β -amiloide 1-42 marcado con ^{13}C

Para evaluar el mecanismo potencial por el cual el mAb solubiliza las fibras pre-formadas o inhibe la formación de fibras, se realizó un experimento de comparación entre el ensayo fluorescente Th-T y RMN en estado sólido de U- ^{13}C Tyr10 y péptido β -amiloide 1-42 marcado con ^{13}C en Val12 (Figura 4). En consecuencia el propósito de esta investigación fue seguir la transición de la lámina β por espectroscopía RMN en estado sólido en el péptido β amiloide y en presencia del anticuerpo monoclonal y compara directamente este con la capacidad de desagregación mediada por un ensayo fluorescente Th-T.

La espectroscopía RMN en estado sólido no solo detecta una transición de la estructura secundaria pero también permite localizar los dominios del péptido $\text{A}\beta_{1-42}$ -que domina la transición estructural. El RMN en estado sólido ha demostrado su aplicabilidad en el problema a medida que ha contribuido a la determinación de la estructura de las fibras $\text{A}\beta_{1-42}$ (Petkova et al., 2004, Petkova et al., 2002). En particular la correlación del cambio químico $^{13}\text{C}_\alpha$ y $^{13}\text{C}_\beta$ con la estructura secundaria (Cornilescu et al., 1999, Luca et al., 2001, Iwadata et al, 1999) es una herramienta valiosa para examinar cambios de la estructura secundaria de un péptido.

La síntesis del péptido marcado que incluye una valina pre-marcada ^{13}C en la posición 12 (^{12}Val) y una tirosina pre-marcada con ^{13}C en la posición 10 (^{10}Tyr) se realizó por un protocolo de síntesis Fmoc. Se confirmaron la identidad y pureza del péptido por espectroscopía de masas MALDI. El péptido β amiloide (1-42) marcado se usó para generar fibras por la incubación de la solución del péptido en el buffer de PBS durante 1 semana a 37°C . El problema mayor, la mal solubilidad de péptido β -amiloide en el buffer

de PBS, se puede resolver de la siguiente manera: El valor del pH del buffer PBS aumentó temporariamente en cantidades diminutas de amoníaco para disolver el péptido β -amiloide. El valor original del pH del buffer PBS se obtuvo otra vez por incubación de la muestra en presencia de un baño mayor de PBS que usa el carácter volátil del amoníaco.

Para medir el efecto de los anticuerpos que rompen la lámina β , una solución de fibras se incubó con el anticuerpo durante 24 horas a 37°C para ambos ensayos de RMN y Th-T. Para la comparación en tiempo real se usó una alícuota de la misma solución para el ensayo fluorescente Th-T y la solución restante se liofilizó para las mediciones de RMN.

Después de analizar primero las capacidades de desagregación del mACI-01-Ab7 C2 por la co-incubación con fibras preformados β -amiloides marcadas con ^{13}C mediante el ensayo fluorescente Th-T, se pudo demostrar que el mAb desagregó las fibras en 38%. Luego se realizó el espectro RMN.

Para investigar las diferencias entre PBS (control) y la incubación con mAbm, cada espectro descifra mediante PeakFit (<http://www.systat.com/products/PeakFit>). Las líneas se aparearon bien por el empleo de un procedimiento de ajuste Lorentzian/Gaussian mixto, cuyos resultados se muestran en la Figura 4. Los resultados se sintetizan en la Tabla 3 pero la diferencia más obvia es la intensidad integral de las dos poblaciones que se necesitan para ajustar el pico doble alrededor 30-33 ppm. El pico de 33 ppm corresponde a la conformación de la lámina beta de las fibras mientras que 30 ppm es un resultado de una conformación de arrollamiento al azar. La muestra incubada en PBS mostró la mayoría de la muestra en una conformación de la lámina beta (81,7%) (Fig. 2 parte superior) que se reduce cuando la muestra se incubó con mACI-01-Ab7 C2 (53,5%) (Fig. 4 parte inferior). La reducción de la población de la conformación de lámina beta con

respecto a la conformación de arrollamiento al azar como lo determina por estudio de la Val 12 C β es del orden de 35% y está en consecuencia en estrecho acuerdo con esta medición usando fluorescencia.

Resonancia	PBS			mACI-01-Ab7-C2		
	δ ISO (ppm)	FWHH (Hz)	% de Intensidad integral	δ ISO (ppm)	FWHH (Hz)	% de Intensidad integral
lámina Val C β	32,60	479	81,7	33,09	366	53,5
Val C β –al azar	30,27	200	18,3	30,27	340	46,5

Tabla 3. Comparación de los parámetros ajustados para las dos conformaciones de Val 12 C β . Los desplazamientos químicos ajustados para las dos conformaciones son bastante similares pero las intensidades integrales son muy diferentes, lo cual refleja una reducción de la conformación de lámina beta original en aproximadamente un 35% ($1 - (53,5/81,7)$). Esto está en estrecho acuerdo con el valor obtenido de la medición de fluorescencia.

Para resumir estos resultados se pudo demostrar con éxito que el anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 que se dirige a la región 1-16 N-terminal del péptido A β amiloide se une a las fibras pre-formadas y es capaz de inhibir *in vitro* la agregación de los péptidos A β monoméricos a fibras y fibras preformadas desagregadas, como lo demostró el experimento de ultracentrifugación por gradiente de densidad además del ensayo fluorescente Th-T. Además por unión de este anticuerpo a las fibras pre-formadas, se pudo inducir una transición de la mayoría de la lámina beta al ambiente de la conformación secundaria arrollada al azar de Val12. Este podría ser el potencial mecanismo por el cual las fibras se podrían solubilizar por la unión del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2, también porque el detallado

análisis del pico de Val 12 C β revela la reducción del componente de lámina beta en un 35%, lo cual está en estrecha concordancia con los datos de fluorescencia (38%).

Ejemplo 12: Funcionalidad del mACI-01-Ab7 C2 en las fibras amiloideas

12.1 Modificación de la conformación de las fibras A β 1-42 e iniciación da la desagregación después de la unión del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2

Con el fin de evaluar el mecanismo por el cual el anticuerpo es capaz de desagregar fibras preformadas beta-amiloides (A β ₁₋₄₂) en un ensayo de comparación punto a punto, el ensayo de Tioflavina-T (Th-T) fluorescente se realizó midiendo la desagregación y el de Resonancia magnética nuclear RMN en estado sólido (NMR) de U-¹³C Tirosina10 y péptido A β 1-42 marcado en la Valina12 analizando la conformación secundaria. El anticuerpo se solubilizó en 35,4 % de las fibras preformadas A β 1-42 y simultáneamente indujo un cambio en la conformación secundaria de la lámina beta a enrollada al azar. La reducción de la población de la conformación lámina beta con respecto a la enrollada al azar es de l orden del 35% y en consecuencia está en estrecha concordancia con la que se mide usando el ensayo de fluorescencia Th-T. Estos datos indican que la unión del anticuerpo inicia una transición de la estructura secundaria, la cual potencialmente causa la desestabilización de la disposición intermolecular paralela de las laminas beta que afectan la ruptura de de las fibras elongadas en fragmentos más pequeños.

12.2 Afinidad de unión dependiente de la conformación del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2

Ya que es bien conocido en la bibliografía científica que una proporción de la energía de unión del anticuerpo-antígeno se puede usar para una

modificación de dependiente de energía de la conformación de un antígeno⁶, se realizó un experimento de comparación de la afinidad de unión del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 a la proteína $A\beta_{1-42}$ total y aun péptido más pequeño de nueve aminoácidos de largo que comprende el epítopo del anticuerpo. Para esta comparación se analizaron las afinidades del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 por ELISA usando péptidos biotinilados que cubren la secuencia completa de aminoácidos de los epítopos de mACI-01-Ab7 C2 (aminoácidos 13-21 de la secuencia de $A\beta_{1-42}$, producida por Mimotopes y comprada en ANAWA Trading SA) y un péptido $A\beta_{1-42}$ completo biotinilado (Bachem). El análisis se realizó de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Mimotopes). El anticuerpo se une con un 38,40% de mayor afinidad al péptido que comprende su epítopo específico (aminoácidos 13-21 de la secuencia de $A\beta_{1-42}$) que a la proteína $A\beta_{1-42}$ completa. En consecuencia, se sugiere que la diferencia de energía de la afinidad de unión se usó para la transición con consumo de energía de la conformación secundaria de la proteína amiloide para presentar el antígeno en una posición más aceptable para la interacción del anticuerpo. Esto puede explicar por qué la afinidad del anticuerpo es menor para la proteína nativa (la proteína amiloide completa) que para la subunidad aislada.

Ejemplo 13: Unión específica de la conformación del mACI-01-Ab7 C2 a diferentes clases de proteína amiloide

Con el fin de evaluar la especificidad del mACI-01-Ab7 C2 en diferentes estadios de la proteína amiloide polimerizada, amiloide monomérica y polimérica soluble, particularmente, proteína β amiloide ($A\beta$) y amiloide fibrillar, se realizó un ELISA recubierto con estos diferentes estadios del beta-amiloide polimérico. Los monómeros se prepararon de acuerdo con un método modificado publicado por ⁷, amiloide polimérico soluble,

particularmente, amiloide β ($A\beta$) de acuerdo con ⁸, mientras que las fibras se realizaron por incubación del amiloide (Bachem, Switzerland) con una concentración final de $1\mu\text{g}/\mu\text{l}$ en Tris/HCl pH 7,4 a 37°C durante 5 días seguido por un paso de centrifugación (10.000 rpm durante 5 minutos). Luego los polímeros de amiloide se recubrieron en las placas de ELISA con una concentración final de $55\mu\text{g}/\text{ml}$ y se realizó una prueba de afinidad de unión ELISA por medio de un anticuerpo monoclonal IgG anti-ratón (Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc.) marcado con fosfatasa alcalina. El anticuerpo se une con mayor afinidad a la proteína β amiloide polimérica soluble ($A\beta$) ($\text{IC}_{50} = 2,53\text{nM}$) que a las fibras ($\text{IC}_{50} = 5,27\text{nM}$) y con la menor afinidad a los monómeros ($\text{IC}_{50} = 8,3\text{nM}$). Estos datos indican que la unión del anticuerpo está influenciada además de por su epítopo por la conformación de los diferentes agregados amiloideos.

Ejemplo 14: Mapeo del epítopo del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2

El mapeo del epítopo del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 se realizó por ELISA usando tres genotecas de péptidos diferentes. Una genoteca comprende un total de 33 péptidos biotinilados que cubren la secuencia de aminoácidos completa (aa) de $A\beta_{1-42}$ (producida por Mimotopes y comprada en ANAWA Trading SA), la segunda genoteca contiene péptidos biotinilados que usan el péptido 12 (aa12-20 de $A\beta$) proveniente de la primera genoteca de péptidos y sustituyendo cada aminoácido de la secuencia por una alanina (ver siguiente Tabla 41), y la tercera genoteca contiene los péptidos biotinilados 13, 14, o 15 (aa 13-21, 14-22 o 15-23 de $A\beta$) y sustituyendo en cada caso el último aminoácido con una alanina o una glicina para el aa 21 que ya es una alanina (ver tabla 5 siguiente). Un péptido $A\beta_{1-42}$ completo biotinilado se usó como control

(Bachem). El mapeo del epítopo se realizó de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Mimotopes). Brevemente, las placas recubiertas con estreptavidina (NUNC) se bloquearon con BSA 0,1% en PBS toda la noche a 4°C. Después del lavado con PBS-0,05% Tween 20, las placas se incubaron durante 1 hora a TA con los diferentes péptidos de la genoteca, se diluyó en BSA 0,1% , azida sódica 0,1% en PBS a una concentración final de 10 µM. Después del lavado, las placas se incubaron durante 1 hora a TA con el anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 o un anticuerpo IgG2b de ratón isotipo control diluido a 10 µg/ml en BSA 2%, azida sódica 0,1% en PBS. Las placas se lavaron otra vez y se incubaron con IgG de anti-ratón de cabra conjugado con fosfatasa alcalina durante 1h a TA. Después del lavado final, las placas se incubaron con el sustrato de fosfatasa (pNPP) y se leyeron a 405 nm con un lector de placa de ELISA.

Se demostró que el anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 se unió específicamente a los péptidos 12, 13, 14 y 15 de la primer genoteca de péptidos. Estos 4 péptidos comprenden los aa 12-20 (VHHQKLVFF), 13-21 (HHQKLVFFA), 14-22 (HQKLVFFAE) y 15-23 (QKLVFFAED) de Aβ₁₋₄₂ lo cual sugiere que el epítopo se halla en la región de 12-23 de Aβ. Una segunda genoteca con sustituciones de alanina se usó para determinar los aa críticos para la unión al péptido 12-20 (VHHQKLVFF). La unión del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 se perdió completamente cuando los aa 16, 17, 19 o 20 están sustituidos por una alanina, lo que indica a estos aa son absolutamente críticos para la unión del anticuerpo a Aβ. La unión del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 se perdió en forma parcial cuando se sustituyeron los aa 15 y 18.

La unión también se perdió casi por completo cuando el aa 14 se sustituyó con una alanina, lo que indica que el aa 14 es también muy importante para la unión.

Finalmente, se usó una tercera genoteca para determinar si los aa 21, 22 o 23 son críticos para la unión del epítopo. La unión del anticuerpo al aa 15-23 se redujo cuando el aa 23 se sustituyó con una alanina, lo cual indica que el aa 23 es también importante para la unión. La unión se perdió en forma parcial cuando el aa 21 se sustituyó con glicina y se perdió en forma leve cuando el aa 22 se sustituyó con una alanina.

Tabla 4. Resumen de péptidos usados de la segunda genoteca.

Los aa importantes para la unión están marcados en *itálica* y subrayados y los aa absolutamente críticos importantes para la unión están marcados en *itálica*, en **negrita** y subrayados

p12-20	V	H	H	Q	K	L	V	F	F
A12	A	H	H	Q	K	L	V	F	F
A13	V	A	H	Q	K	L	V	F	F
A14	V	H	A	Q	K	L	V	F	F
A15	V	H	H	A	K	L	V	F	F
A16	V	H	H	Q	A	L	V	F	F
A17	V	H	H	Q	K	A	V	F	F
A18	V	H	H	Q	K	L	A	F	F
A19	V	H	H	Q	K	L	V	A	F
A20	V	H	H	Q	K	L	V	F	A
aa no.	12	13	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>

Tabla 5. Resumen de péptidos usados de la tercer genoteca .

Los aa importantes para la unión están marcados en *itálica* y subrayados y los aa absolutamente críticos importantes para la unión están marcados en *itálica*, **negrita** y subrayados

p13-21		H	H	Q	K	L	V	F	F	A		
p13-21	G21	H	H	Q	K	L	V	F	F	G		
p14-22			H	Q	K	L	V	F	F	A	E	
p14-22	A22		H	Q	K	L	V	F	F	A	A	
p15-23				Q	K	L	V	F	F	A	E	D
p15-23	A23			Q	K	L	V	F	F	A	E	A
aa no.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Ejemplo 15: Influencia de la vacunación pasiva con mACI-01-Ab7 C2 en la carga amiloidea del cerebro en ratones transgénicos hAPP único

Para evaluar la capacidad *in vivo* del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 para unirse y depurar el amiloide soluble fuera del cerebro, se usaron ratones hAPP únicos de 6 meses⁹, apareados en género y sexo para un estudio de inmunización pasiva con diferentes dosis. La carga de amiloide soluble se analizó en el final del estudio por la recolección del cerebro de los animales y por la realización de un ELISA específico de A β 1-40 y A β 1-42 (TGC, Germany).

8-13 animales por grupo recibieron en un intervalo de una semana dos inyecciones de 100, 300 y 1000 μ g de anticuerpo monoclonal en 200 μ l de PBS mientras que la inyección de PBS solo sirvió como control. Un día después de la segunda inyección los animales se sacrificaron para la realización del análisis bioquímico de la fracción amiloidea soluble. Para cuantificar la cantidad de A β 1-40 humano y A β 1-42 humano de la fracción soluble de los homogenizados cerebros y/o en líquido cefalorraquídeo (CSF), se usaron kits de ensayo de inmunoabsorbancia ligado a enzima (ELISA) disponibles en el comercio (h Amyloid β 40 o β 42 ELISA de alta sensibilidad, TGC, Switzerland). El ELISA se realizó de acuerdo con el protocolo de los fabricantes. Brevemente, se prepararon estándares (una dilución de A β 1-40 o A β 1-42 sintético) y muestras en una placa de propileno 96 pocillos sin capacidad de unir proteínas (Greiner, Germany). Las diluciones estándares con concertaciones finales de 1000, 500, 250, 125, 62,5, 31,3 y 15,6 pg/ml y las muestras se prepararon en el diluyente de muestra, provisto con el kit de ELISA, a un volumen final de 60 μ l. Ya que los niveles de amiloide aumentan

con la edad del ratón y ya que la evaluación real requiere que las lecturas de las muestras están dentro de la parte lineal de la curva del estándar, las muestras para el análisis de A β 40 se diluyeron 2:3, las muestras para el análisis de A β 42 no se diluyeron.

Las muestras, estándares y blancos (50 μ l) se agregaron a la placa de polistireno recubierta con anti- A β (el anticuerpo de captura reconoce selectivamente el extremo C-terminal del antígeno) además de un conjugado de anticuerpo anti-A β selectivo (anticuerpo de detección biotinilado) y se incubó toda la noche a 4°C para permitir la formación del complejo anticuerpo-amiloide-anticuerpo. El día siguiente, se agregó el conjugado estreptavidina-peroxidasa, después de 30 min se agregó la mezcla de TMB/peróxido, lo cual produjo la conversión del sustrato en un producto coloreado y se midió la intensidad del color por medio de la fotometría con un lector de ELISA con un filtro de 450 nm. La cuantificación del contenido A β de las muestras se obtuvo por comparación de la absorbancia de la curva estándar realizada con A β 1-40 o A β 1-42 sintético. Los datos se expresaron como cambios individuales del valor control medio (en porcentaje del control).

La cantidad total de A β 40 en los homogenizados de cerebro se podría reducir en forma significativa y aproximadamente en forma no significativa para A β 42 cuando los ratones hAPP solos se inmunizaron pasivamente con dos inyecciones i.p. del anticuerpo monoclonal ACI-01-Ab7 C2 en una dosis de 300 μ g (A β 40: $-27,3 \pm 13,9\%$ con $p < 0,05$; A β 42: $-8,6 \pm 22,4$ con $p = 0,56$; prueba T de Student no apareada), mientras que 100 y 1.000 μ g no tuvieron significación. La inmunización con 100 μ g condujo a un aumento de A β 40 y A β 42 de los homogenizados de cerebro (A β 40: $32,3 \pm 36,8\%$; A β 42: $38,3 \pm 51,4\%$) mientras que el tratamiento con 1.000 μ g estimuló la tendencia correcta de reducción de la carga de amiloide y podría ser potencialmente

efectiva con un número aumentado de animales por grupo ($A\beta$ 40: $-2,2 \pm 26,0\%$; $A\beta$ 42: $-9,3 \pm 15,9\%$). Estos datos demuestran que en el protocolo de inmunización aguda un anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 es capaz de disminuir la cantidad total de $A\beta$ soluble en el cerebro de este modelo AD murino. De modo interesante, parece ser que la relación con la dosis es transitoria pero se deben realizar más estudios con grupos más grande para obtener datos significantes.

Ejemplo 16: Influencia de la administración pasiva crónica del mACI-01-Ab7 C2 en la carga de placa en ratones transgénicos hAPPxPS1 dobles

Para evaluar la capacidad *in vivo* del anticuerpo monoclonal mACI-01-Ab7 C2 para unirse y reducir las placas amiloides del cerebro, se usaron ratones transgénicos dobles hAPPxPS1¹⁰ de 3,5 meses, apareados en género y sexo para un estudio de inmunización pasiva prolongado crónico. Las placas amiloideas se analizaron en el final del estudio por la histoquímica del cerebro de los animales por unión con Tioflavina S.

15 animales transgénicos recibieron 16 inyecciones semanales de 500 μ g de anticuerpo monoclonal en PBS. 15 animales se inyectaron con PBS solo, actuando como controles. Todas las inyecciones se dieron por vía intraperitoneal. En el momento del sacrificio, los ratones se anestesiaron y se purgó en forma trans-cardíaca con suero fisiológico a 4°C para eliminar la sangre de los vasos cerebrales. Posteriormente, se retiró el cerebro del cráneo y se separaron el cerebro anterior y posterior con un corte en el plano coronal/frontal. El cerebro anterior se dividió finalmente en el hemisferio izquierdo y derecho por medio de un corte sagital de la línea media. Un hemisferio se fijó posteriormente toda la noche en paraformaldehído 4% para el estudio histológico. Las secciones del micrótopo Sagittal (40 μ m) se

cortaron para las incubaciones flotantes libres y se conservaron a 4°C hasta la tinción en PBS con azida sódica 0,1%. Se tiñeron cinco secciones de diferentes niveles de placas densas con Tioflavina S. Las secciones de todos los animales usados se aleatorizaron para la tinción y cuantificación ciega. Las imágenes se obtuvieron con un microscopio Leica DMR equipado con una cámara Sony DXC-9100P y señalizaron con una computadora que emplea un programa de computación Leica Q-Win. La intensidad de luz y los ajustes del condensador del microscopio se mantuvieron constantes durante todo el proceso de adquisición de imágenes. Todas las imágenes obtenidas se sometieron a las mismas subrutinas de computador para minimizar el sesgo del investigador. El umbral de densidad del extendido se aplicó en forma uniforme a lo largo del análisis. El área del subiculum se seleccionó para la cuantificación automática de la carga amiloidea en la tinción con Tioflavina S.

La carga total de placa y el número de placas del área del subiculum se pudo reducir en forma significativa cuando los ratones hAPP/PS1 dobles se inmunizaron pasivamente durante 4 meses como se describió anteriormente. Se pudo lograr una disminución significativa de la carga de placa del 31% (mACI-01-Ab7 C2: $1,11 \pm 0,21\%$ y control: $1,61 \pm 0,35\%$; $p=0,003$, Mann-Whitney U-Test) mientras que la inmunización pasiva crónica redujo en forma significativa la cantidad de placas en 19% (mACI-01-Ab7 C2: $8,73 \pm 1,36$ y control: $10,78 \pm 1,36$; $p=0,006$, Mann-Whitney U-Test), lo que indica que la solubilización de las placas se produjo en una medida ligeramente menor que la ruptura de placa.

Ejemplo 17: Influencia de la vacunación pasiva con mACI-01-Ab7 C2 sobre la capacidad de memoria de los ratones transgénicos hAPP simples

Para analizar la capacidad *in vivo* del anticuerpo mACI-01-Ab7 C2 para modificar o aumentar la funcionalidad cognitiva, se usaron ratones hAPP simples de 9 meses, aparados en género y edad, para un estudio de inmunización pasiva. Se midió la cognición no espacial en el fin del periodo de inmunización evaluado por el nueva técnica de reconocimiento de objetos (ORT).

12 animales por grupo recibieron dos inyecciones intraperitoneales de 400 μ g de anticuerpo monoclonal en 200 μ l de PBS mientras que la inyección de f PBS solo sirvió como control. Un día después de la segunda inyección reestudio la capacidad cognitiva con la nueva técnica de reconocimiento de objetos (ORT)^{12, 13}. Para el enrolamiento ORT, los ratones se colocaron durante 10 minutos en una pista de comportamiento y se los enfrentó con un objeto nuevo desconocido. Se registró el tiempo de exploración. Tres horas después los mismos animales se re-colocaron en la misma pista para una 2^{da} sesión pero enfrentado al objeto viejo previamente explorado, y a un objeto nuevo adicional. De nuevo, se registraron los tiempos de exploración para ambos objetos y se calcularon los índices de cognición resultante como la relación del tiempo de exploración del nuevo objeto con respecto al tiempo de exploración total y se expresaron como cambios proporcionales con el control.

La vacunación pasiva con mACI-01-Ab7 C2 v condujo a un aumento significativo de las capacidades de memoria cognitiva en ratones transgénicos simples AD (mACI-01-Ab7 C2: 131,6 $\pm$ 9,1% y control:100,0 $\pm$ 9,2% con $p < 0,05$; prueba T de Student no apareada y $n=12$ por cada grupo).

Depósitos:

Las siguientes líneas celulares de hibridoma redepusitaron con el “Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) en Braunschweig, Mascheroder Weg 1 B, 38124 Braunschweig, bajo las disposiciones del Tratado de Budapest:

Designación de la línea del hibridoma	Designación del anticuerpo	Fecha de depósito	No de acceso
FP 12H3	mACI-01-Ab7	01 de diciembre de 2005;	DSM ACC2752
FP 12H3-C2	mACI-01-Ab7C2	01 de diciembre de 2005	DSM ACC2750
FP 12H3-G2	mACI-01-Ab7G2	01 de diciembre de 2005	DSM ACC2751
ET 7E3	mACI-02-Ab6	8 de diciembre de 2005	DSM ACC2755
EJ 7H3	mACI-24-Ab4	8 de diciembre de 2005	DSM ACC2756

Referencias

- Bard F, Cannon C, Barbour R, Burke RL, Games D, Grajeda H, Guido T, Hu K, Huang J, Johnson-Wood K, Khan K, Kholodenko D, Lee M, Lieberburg I, Motter R, Nguyen M, Soriano F, Vasquez N, Weiss K, Welch B, Seubert P, Schenk D, Yednock T. (2000). *Nature Med.* 6, 916-919.
- Barghorn S, Nimmrich V, Striebinger A, Krantz C, Keller P, Janson B, Bahr M, Schmidt M, Bitner RS, Harlan J, Barlow E, Ebert U, Hillen H (2005) Globular amyloid beta-peptide oligomer - a homogenous and stable neuropathological protein in Alzheimer's disease. *J Neurochem* 95:834-847.
- Baschong W, Wrigley NG (1990) Small colloidal gold conjugated to Fab fragments of immunoglobulin G as high-resolution labels for electron microscopy: a technical overview. *J Electron Microsc Tech* 14:313-323.
- Blond y Goldberg, 1987, PNAS March 1, 1987 Vol. 84 | no. 5 | 1147-1151
- Cornilescu G, Delaglio F, Bax A. (1999) *J.Biomol.NMR*; 13: 289-302.
- Burdick,D. et al. Assembly and aggregation properties of synthetic Alzheimer's A4/beta amyloid peptide analogs. *J. Biol. Chem.* 267, 546-554 (1992).
- DeMattos, Bales, KR, Cummins, DJ, Dodart, JC, Paul, SM, Holtzman, D.M (2001). *Proc Natl Acad Sci U S A* 98, 8850-8855.
- Dewachter I, Van DJ, Smeijers L, Gilis M, Kuiperi C, Laenen I, Caluwaerts N, Moechars D, Checler F, Vanderstichele H, Van LF (2000) Aging increased amyloid peptide and caused amyloid plaques in brain of old APP/V717I transgenic mice by a different mechanism than mutant presenilin1. *J Neurosci* 20:6452-6458.
- Dewachter I, Reverse D, Caluwaerts N, Ris L, Kuiperi C, Van den HC, Spittaels K, Umans L, Serneels L, Thiry E, Moechars D, Mercken M, Godaux E, Van Leuven F (2002) Neuronal deficiency of presenilin 1 inhibits amyloid plaque formation and corrects hippocampal long-term potentiation but not a cognitive defect of amyloid precursor protein [V717I] transgenic mice. *J Neurosci* 22:3445-3453.
- Glenner y Wong, *Biochem Biophys Res Comm*129, 885-890 (1984)
- Harlow y Lane (Antibodies: A Laboratory Manual (Cold Spring Harbor Laboratory, New York 1988))

- Heneka MT, Sastre M, Dumitrescu-Ozimek L, Dewachter I, Walter J, Klockgether T, Van LF (2005) Focal glial activation coincides with increased BACE1 activation and precedes amyloid plaque deposition in APP[V717I] transgenic mice. *J Neuroinflammation* 2:22.
- Hodgson et al., *Bio/Technology*, 9:421 (1991)
- Iwade M, Asakura T, Williamson MP. (1999) *J.Biomol.NMR*; 13: 199-211.
- Kirschner,D.A., Abraham,C., & Selkoe,D.J. X-ray diffraction from intraneuronal paired helical filaments and extraneuronal amyloid fibers in Alzheimer disease indicates cross-beta conformation. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A* 83, 503-507 (1986).
- Khaw, B. A. et al. *J. Nucl. Med.* 23:1011-1019 (1982)
- Kennedy, J. H., et al.,1976 (*Clin. Chim. Acta* 70:1-31)
- Klein WL (2002) Abeta toxicity in Alzheimer's disease: globular oligomers (ADDLs) as new vaccine and drug targets. *Neurochem Int* 41(5):345-352.
- Kohler y Milstein (*Nature* 256: 495-497 (1975))
- LeVine, H. III, (2002). *Arch Biochem Biophys* 404, 106-115.
- Luca et al., 2001
- McGeer et al., 1994
- Moechars D, Dewachter I, Lorent K, Reverse D, Baekelandt V, Naidu A, Tesseur I, Spittaels K, Haute CV, Checler F, Godaux E, Cordell B, Van LF (1999) Early phenotypic changes in transgenic mice that overexpress different mutants of amyloid precursor protein in brain. *J Biol Chem* 274:6483-6492.
- Nelson,R. & Eisenberg,D. Recent atomic models of amyloid fibril structure. *Curr. Opin. Struct. Biol.*(2006).
- Nicolau, C., Greferath, R., Balaban, T. S., Lazarte, J. E., y Hopkins, R. J. (2002). *Proc Natl Acad Sci U S A* 99, 2332-2337.
- Queen et al., *Proc. Natl Acad Sci USA*, 86:10029-10032 (1989)
- Pearson W.R. (1990), *Methods in Enzymology* 183, 63-98
- Petkova AT, Buntkowsky G, Dyda F, Leapman RD, Yau WM, Tycko R. *J.Mol.Biol.* 2004; 335: 247-260.
- Petkova AT, Ishii Y, Balbach JJ, Antzutkin ON, Leapman RD, Delaglio F, Tycko R. (2002) *Proc.Nat..Acad.Sci.U.S.A*; 99: 16742-16747.

- Rousseaux et al. *Methods Enzymology*, 121:663-69, Academic Press, 1986
- Rzepecki, P., Nagel-Steger, L., Feuerstein, S., Linne, U., Molt, O., Zadnavor, R., Aschermann, K., Wehner, M., Schrader, T. y Riesner, D. (2004). *J Biol Chem* 279, 47497-47505.
- Sambrook et al. loc. cit.
- Schenk D, Barbour R, Dunn W, Gordon G, Grajeda H, Guido T, Hu K, Huang J, Smith, S. O., y Bormann, B. J. (1995). *Proc Natl Acad Sci U S A* 92, 488-491.
- Schenk et al., 1999
- Schurs, A. H. W. M., et al. 1977 (*Clin. Chim Acta* 81:1-40)
- Slot JW, Geuze HJ (1985) A new method of preparing gold probes for multiple-labeling cytochemistry. *Eur J Cell Biol* 38:87-93.
- Smith y Waterman, *Advances in Applied Mathematics* 2 (1981), 482-489
- Van dA, I, Wera S, Van LF, Henderson ST (2005) A ketogenic diet reduces amyloid beta 40 and 42 in a mouse model of Alzheimer's disease. *Nutr Metab (Lond)* 2:28.
- Wagner et al (2002) *Journal of Liposome Research* Vol 12(3), pp 259 – 270
- Ye, J., Dave, U. P., Grishin, N. V., Goldstein, J. L., y Brown, M. S. (2000). *Proc Natl Acad Sci U S A* 97, 5123-5128.
- Zrein et al. (1998), *Clinical y Diagnostic Laboratory Immunology*, 5(1): 45-49.
- Experimental Eye Research* 78 (2004) 243-256
- WO 2004/058258
- WO96/1359
- WO96/29605

REIVINDICACIONES

1. Un anticuerpo IgG que se une a β -amiloide ($A\beta$) y comprende las regiones determinantes de la complementariedad (CDRs) de la región variable de cadena ligera de SEC ID NO: 7 y la región variable de cadena pesada de SEC ID NO: 8 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

2. Un anticuerpo IgG que se une a β -amiloide ($A\beta$) y comprende la región variable de cadena ligera de SEC ID NO: 7 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750

3. Un anticuerpo IgG que se une a β -amiloide ($A\beta$) y comprende la región variable de cadena pesada de SEC ID NO: 8 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750

4. Un anticuerpo IgG que se une a β -amiloide ($A\beta$) y comprende la región variable de cadena pesada de SEC ID NO: 8 y la región de cadena ligera SEQ ID NO: 7 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

5. Un anticuerpo IgG que se une a β -amiloide ($A\beta$) y comprende los fragmentos epítipo-enlazante de la región variable de cadena ligera de la SEC ID NO: 7 y de la región variable de cadena pesada de la SEC ID NO:8 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

6. Un anticuerpo IgG que se une a β -amiloide ($A\beta$) y comprende las regiones determinantes de la complementariedad (CDRs) de la región variable de cadena

ligera (LCVR) y la región variable de cadena pesada (HCVR) de un anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre de como DSM ACC2750, en donde: (i) la LCVR comprende una CDR1 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No: 23; una CDR2 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:24, y una CDR3 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:25; y (ii) la HCVR comprende una CDR1 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No: 26; una CDR2 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:27, y una CDR3 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:28.

7. El anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de la reivindicaciones 1 a 6, en donde dicho anticuerpo se une específicamente a los oligómeros y fibras de β -amiloide pero no a las especies β -amiloide no linealizadas.

8. El anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde dicho anticuerpo se une a un monómero A β con una afinidad de unión de por lo menos aproximadamente 1×10^{-6} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-8} pero, no muestra ninguna reactividad cruzada significativa con la proteína precursora amiloide (APP).

9. El anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde dicho anticuerpo se une a fibra, fibrilla o filamento de A β con una afinidad de unión de por lo menos aproximadamente 1×10^{-7} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-9} pero, no muestra ninguna reactividad cruzada significativa con la proteína precursora amiloide (APP).

10. El anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde dicho anticuerpo se une a fibra, fibrilla o filamento de A β que es por lo menos 5 veces, particularmente por lo menos 10 veces, más

particularmente por lo menos 15 veces, superior a la afinidad de unión de un monómero de A β .

11. El anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde dicho anticuerpo exhibe alta especificidad con los péptidos monoméricos A β ₁₋₄₂.

12. El anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 5 a 11, en donde dicho anticuerpo es un anticuerpo humanizado.

13. El anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde dicho anticuerpo es un anticuerpo quimérico.

14. Una composición que comprende el anticuerpo IgG de acuerdo con cualquier de las reivindicaciones 1 a 13.

15. La composición de acuerdo con la reivindicación 14, que además comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable.

16. La composición de acuerdo con la reivindicación 15, que comprende el anticuerpo o fragmento activo del mismo en una cantidad terapéuticamente efectiva.

17. Una mezcla que comprende el anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 y un compuesto seleccionado del grupo que consiste en compuestos contra el estrés oxidativo, compuestos anti-apoptóticos, quelantes de metales, inhibidores de la reparación de ADN tales como pirenzepina y metabolitos, ácido 3-amino-1-propansulfónico (3APS), 1,3-propandisulfonato (1,3PDS), activadores de secretasas, inhibidores de β - y γ -secretasas, proteínas tau, neurotransmisores, agentes anti-lámina β , moléculas

antiinflamatorias o inhibidores de colinesterasa (ChEI) tales como tacrina, rivastigmina, donepezil y/o galantamina y otros fármacos y suplementos nutritivos.

18. La mezcla de acuerdo con las reivindicaciones 17, en donde el compuesto es un inhibidor de colinesterasa (ChEI).

19. La mezcla de acuerdo con las reivindicaciones 17, en donde el compuesto es seleccionado de tacrina, rivastigmina, donepezil, galantamina, niacina y memantina.

20. La mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 19, en donde la mezcla comprende un vehículo y/o un diluyente y/o un excipiente aceptables para uso farmacéutico.

21. La mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 20, en donde el anticuerpo y/o compuesto está en una cantidad terapéuticamente efectiva.

22. Un ensayo *in vitro* para detectar la inmunoespecificidad de unión de un anticuerpo a un beta-amiloide en una muestra, que comprende los pasos de:

- (a) Traer la muestra que se sospecha contiene el beta-amiloide y ponerla en contacto con un anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13;
- (b) Permitir que el anticuerpo se una al beta-amiloide para formar un complejo inmunológico; y
- (c) Detectar la formación del complejo inmunológico y de ese modo detectar la unión inmunoespecífica del anticuerpo al beta-amiloide.

23. Un método para producir un anticuerpo IgG, que comprende cultivar la línea celular que expresa en anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 y aislar en anticuerpo.

24. Un kit para la detección de beta-amiloide que comprende el anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.

25. El kit según la reivindicación 24, que comprende además un recipiente que contiene el anticuerpo e instrucciones para usar el anticuerpo para la detección del beta-amiloide.

26. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de un anticuerpo IgG, en donde el fragmento Fab y $F(ab')_2$ se une al beta-amiloide y comprende las regiones determinantes de la complementariedad (CDRs) de la región variable de cadena ligera de SEC ID NO: 7 y las la región variable de cadena pesada de SEC ID NO: 8 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

27. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de un anticuerpo IgG, en donde el fragmento Fab y $F(ab')_2$ se une al beta-amiloide y comprende la región variable de cadena ligera de SEC ID NO: 7 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

28. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de un anticuerpo IgG, en donde el fragmento Fab y $F(ab')_2$ se une al beta-amiloide y comprende la región variable de cadena pesada de SEC ID NO: 8 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

29. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de un anticuerpo IgG, en donde el fragmento Fab y $F(ab')_2$ se une al beta-amiloide y comprende la región variable de cadena pesada de SEC ID NO: 8 y la región de cadena ligera SEQ ID NO: 7 del

anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

30. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de un anticuerpo IgG, en donde el fragmento Fab y $F(ab')_2$ se une al beta-amiloide y comprende y comprende los fragmentos epítotope-enlazante de la región variable de cadena ligera de la SEC ID NO: 7 y de la región variable de cadena pesada de la SEC ID NO:8 del anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre como DSM ACC2750.

31. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de un anticuerpo IgG, en donde el fragmento Fab y $F(ab')_2$ se une al beta-amiloide y comprende las regiones determinantes de la complementariedad (CDRs) de la región variable de cadena ligera (LCVR) y la región variable de cadena pesada (HCVR) de un anticuerpo producido por la línea celular de hibridoma FP 12H3-C2, depositado el 01 de diciembre de como DSM ACC2750, en donde: (i) la LCVR comprende una CDR1 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No: 23; una CDR2 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:24, y una CDR3 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:25; y (ii) la HCVR comprende una CDR1 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No: 26; una CDR2 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:27, y una CDR3 que comprende la secuencia de amino ácidos de la SEC ID No:28.

32. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 31, en donde dicho fragmento se une específicamente a los oligómeros y fibras de β -amiloide pero no a las especies β -amiloide no linealizadas.

33. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 32, en donde dicho fragmento se une a un monómero $A\beta$

con una afinidad de unión de por lo menos aproximadamente 1×10^{-6} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-8} pero, no muestra ninguna reactividad cruzada significativa con la proteína precursora amiloide (APP).

34. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 32, en donde dicho fragmento se une a fibra, fibrilla o filamento de $A\beta$ con una afinidad de unión de por lo menos aproximadamente 1×10^{-7} a por lo menos aproximadamente 1×10^{-9} pero, no muestra ninguna reactividad cruzada significativa con la proteína precursora amiloide (APP).

35. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 34, en donde dicho fragmento se une a fibra, fibrilla o filamento de $A\beta$ que es por lo menos 5 veces, particularmente por lo menos 10 veces, más particularmente por lo menos 15 veces, superior a la afinidad de unión de un monómero de $A\beta$.

36. Un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 35, en donde dicho fragmento exhibe alta especificidad con los péptidos monoméricos $A\beta_{1-42}$.

37. Una composición que comprende el fragmento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36.

38. La composición de acuerdo con la reivindicación 37, que además comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable.

39. La composición de acuerdo con la reivindicación 38, que además comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable.

40. Una mezcla que comprende el fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36 y un compuesto

seleccionado del grupo que consiste en compuestos contra el estrés oxidativo, compuestos anti-apoptóticos, quelantes de metales, inhibidores de la reparación de ADN tales como pirenzepina y metabolitos, ácido 3-amino-1-propansulfónico (3APS), 1,3-propandisulfonato (1,3PDS), activadores de secretasas, inhibidores de β - y γ -secretasas, proteínas tau, neurotransmisores, agentes anti-lámina β , moléculas antiinflamatorias o inhibidores de colinesterasa (ChEI) tales como tacrina, rivastigmina, donepezil y/o galantamina y otros fármacos y suplementos nutritivos.

41. La mezcla de acuerdo con las reivindicaciones 40, en donde el compuesto es un inhibidor de colinesterasa (ChEI).

42. La mezcla de acuerdo con las reivindicaciones 40, en donde el compuesto es seleccionado de tacrina, rivastigmina, donepezil, galantamina, niacina y memantina.

43. La mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 40 a 42, en donde la mezcla comprende un vehículo y/o un diluyente y/o un excipiente farmacéuticamente aceptables.

44. La mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 40 a 43, en donde el fragmento y/o compuesto está en una cantidad terapéuticamente efectiva.

45. Un ensayo *in vitro* para detectar la inmunoespecificidad de unión de un fragmento Fab o un fragmento F(ab')₂ a un beta-amiloide en una muestra, que comprende los pasos de:

- (a) Traer la muestra que se sospecha contiene el beta-amiloide y ponerla en contacto con un anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36;

- (b) Permitir que el anticuerpo se una al beta-amiloide para formar un complejo inmunológico; y
- (c) Detectar la formación del complejo inmunológico y de ese modo detectar la unión inmuno-específica del anticuerpo al beta-amiloide.

46. Un método para producir un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ de un anticuerpo IgG, que comprende cultivar la línea celular que expresa el anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36, aislar en anticuerpo, y producir un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$ del anticuerpo.

47. Un método para producir un fragmento Fab o un fragmento $F(ab')_2$, que comprende cultivar la línea celular que expresa el anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36 y aislar en anticuerpo.

48. Un kit para la detección de beta-amiloide que comprende el anticuerpo IgG de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36.

49. El kit según la reivindicación 48, que comprende además un recipiente que contiene el anticuerpo e instrucciones para usar el anticuerpo para la detección del beta-amiloide.