
De: stecientificodfvo1@hotmail.com
Enviado el: 2015-01-27 15:04:24
Para: contactenos@sic.gov.co <contactenos@sic.gov.co>
Copia:
Asunto: instrucciones para realizar el exámen de patentabilidad.

Radicación: 13-259020- -00008-0000
Fecha: 2015-01-27 15:46:21 **Dependencia:** 2020
Trámite: 2 PATENTES **Evento:** DIR.NUEVASCREACIONES
Actuación: 329 CTOINFORMACION **Folios:** 1 REGDEPOSITO
1

BARRANQUILLA COLOMBIA 27 DE ENERO DE 2.015

Radicación de solicitud de patente de invención No 13-259020

Radicación de solicitud de exámen de patentabilidad No14-123546

SEÑORES:

DELEGATURA DE PATENTES Y NUEVAS CREACIONES

BOGOTÁ D. C.

ESTIMADOS SEÑORES - CORDIAL SALUDO.

El motivo del presente mensaje es para enviarle las instrucciones a los señores expertos que van a realizar el exámen de patentabilidad de mi unguento antitetánico; abase del analgésico mejoral en pastilla pulverizado mezclado con jugo de limón.

Y las instrucciones son las siguientes:

1. Las cantidades de los 2 ingredientes o componentes de dicho unguento antitetánico: "de 1 pastilla de mejoral pulverizada y 9 gotas de jugo de limón,dan la cosistencia ideal de dicho unguento";"dichas gotas que sean medidas con un gotero pequeño", osea que dicha consistencia es similar ala consistencia de la plastilina o de un chicle bien masticado; asi es que dicha consistencia de dicho unguento es la especial para que este mismo se pegue sobre la herida o parte infectada del cuerpo,por esto es que dicha consistencia de dicho unguentoés, una de las técnicas para que este mismo sea efectivo; y la cantidad de dicho unguento preparado con 1 pastilla de mejoral y 9 gotas de jugo de limón,alcanza para cubrir una herida o parte del cuerpo infectada, que no sea profunda de 2 centímetros de extensión en forma sircular.
2. La cosistencia del pulverizado de la pastilla de mejoral,debe ser arenosa la mayor parte,osea que no sea el 100% como harina de trigo,que sea como el 80% arenoso, el pulverizado de la pastilla de mejoral,pué así en esta forma este mismo pulverizado bien humedecido con el jugo de limón,le dá la capacidad a dicho unguento para absorver los residuos liquidos infectados, y las células dañadas de la determinada herida o parte infectada del cuerpo,que puede ser una quemadura o una llaga etc..
3. Para pulverizar 1 pastilla de mejoral,se machaca esta con un martillo pequeño, en su mismo empaque original,luego se hecha esta sobre un recipiente pequeño y adecuado y se termina de pulverizar con el martillo brevemente,seguidamente se le agregan las 9 gotas de jugo de limón y se remueve con una pala medicinal,hasta mezclar bien los 2 dichos componentes,para obtener el unguento antitetánico.
4. Si la herida o parte infectada del cuerpo ala que se le va a aplicar,el dicho unguento antitetánico,está en una parte movable:como en un codo,rodilla o una mano etc.,el paciente hay que someterlo a incapacidad,durante el tiempo que dure el

tratamiento, con la determinada parte en la que se está haciendo el tratamiento vendada, con 1 banda medicinal, para evitar que dicha parte se mueva, y para evitar también que dicho unguento se mueva y que esté fijo pegado e inmóvil sobre la herida o determinada parte infectada, en la que se le ha aplicado este mismo.

5. El tiempo que debe durar cada dosis de dicho unguento, sobre la herida o parte infectada es de 24 horas y este mismo tiene que permanecer, totalmente sellado sobre la herida o parte infectada, con el plástico especial con el que se tapa primero y el esparadrapo antialérgico, con el que se sella el dicho plástico pegado con el dicho unguento sobre la herida o parte infectada; y las dosis para heridas o partes infectadas que sean leves, que no sean profundas, deben ser 2 dosis; 1 que dure 24 horas y y la segunda que dure 36 horas; y para heridas o partes infectadas graves y profundas hasta 4 dosis, las 3 primeras dosis que duren 24 horas cada una y la última que dure 36 horas.

El plástico especial con el que se tapa primero el dicho unguento sobre la herida o parte infectada, es del que se utiliza para fabricar las bolsas plásticas para empacar, los productos que se compran en los supermercados y que sea transparente.

6. Cuando se retiran, el esparadrapo y el plástico especial, que han cubierto el unguento antitetánico, sobre la herida o parte infectada, durante 24 horas, dicho unguento está negro en una parte en el centro de la herida o parte infectada y el resto de este mismo está blanco y el total de dicho unguento está con consistencia 100% seca, o sea que el color negro son: el líquido infectado y las células dañadas que han sido absorbidas de la herida o parte infectada y carbonizadas después.

Para obtener más información sobre las técnicas para realizar un tratamiento, para curar una herida o parte del cuerpo infectada, con el dicho unguento antitetánico; por favor ver el "RESUMEN" 1 con fecha Diciembre 19 de 2013 de la solicitud de mi patente de invención, fecha Diciembre 23 de 2013.

ATENTAMENTE:

Alirio Martinez Diaz

C.C.8661483 de barranquilla

Científico Empírico