



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA



Delegatura de Propiedad Industrial

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE INVENCION

09-63561

21. EXPEDIENTE No.

54. TÍTULO

MEJORADOR DE PENETRACION PARA HERBICIDAS Y ASEGURADORES

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

71. SOLICITANTE

BAYER CROPS SCIENCE AG

DOMICILIO

MONHEIM, ALEMANIA

74. APODERADO

EMILIO FERRERO

C.C. 438.019 de Usaquén

22. BOGOTÁ, D. C.,

40/



PETITORIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-063561- -00000-0000

Fecha: 2009-06-18 17:10:46 Dep. 2020 NUECREACIONE

Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 411 PRESENTACION Folios: 144

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL

SOLICITUD DE: 1 ☒ Patente de Invención. ☐ Capítulo I. ☐ Patente de Modelo de Utilidad. ☒ Capítulo II.			
2 SOLICITANTE (71)	Nombre: BAYER CROPSCIENCE AG sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Alemania Domicilio: Monheim, Alemania	IDENTIFICACIÓN C.C.☐ C.E.☐ NIT☐ Otro☐ Cual Número	
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: EMILIO FERRERO Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: clientes@cavelier.com Domicilio: Bogotá, Colombia.	IDENTIFICACIÓN C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ Otro☐ Cual Número 438.019 T.P 31.929	
4 INVENTOR (ES) (72)	1. Peter BAUR Schulstrasse 5, 56938 Schondorf, Alemania 2. Ronald VERMEER Eulenkamp 1, 51371 Leverkusen, Alemania 3. Rainer SÜSSMANN An der Landstrasse 1, 65549 Limburg, Alemania		
5 PCT (86) Solicitud Internacional No. <u>PCT/EP2007/010643</u> Fecha: <u>7 de diciembre de 2007</u> Publicación Internacional No. <u>WO 2008/074406 A4</u> Fecha: <u>26 de junio de 2008</u>			
6 Título (54) <u>MEJORADOR DE PENETRACIÓN PARA HERBICIDAS Y ASEGURADORES</u>			
7 Clasificación Internacional (51) <u>A01N 057/012</u>			
8 Prioridad SI☒ NO☐	(33) País de Origen <u>EP</u>	(32) Fecha <u>18 de diciembre de 2006</u>	(31) Número de Solicitud <u>06026145.0</u>
9 Comprobante de pago No.: <u>09-39,962</u> Fecha: <u>1º de junio de 2009</u>			


10

Anexos:

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud por \$ 540.000.oo.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la decimoquinta reivindicación por.
- ☒ Documento que acredita la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.
- ☒ Poderes, si fuere el caso.
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☐ Declaraciones.
- ☒ Copia de la solicitud internacional. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)
- ☒ Traducción de la solicitud internacional al castellano. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)
- ☐ Copia del examen preliminar efectuado por la IPEA.
- ☐ Traducción del examen preliminar efectuado por la IPEA.
- ☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico.
- ☐ Arte final 12x12
- ☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.
- ☒ Otros: VER HOJA DE DOCUMENTOS ANEXOS

11


FIGURA CARACTERÍSTICA



12

Solicito la concesión de la patente,

NOMBRE: EMILIO FERRERO

FIRMA : 
C.C. 438.019 de Usaqué T.P. 31.929

DOCUMENTOS ANEXOS

1. ☒ Publicación Internacional WO 2008/074406 A4

Descripción:

Páginas 50 en el idioma original

Páginas 63 en español

Reivindicaciones: Número (s) 3

Figuras: Número (s)

2. ☒ **Forma PCT/ISA/210.** Informe de Búsqueda Internacional.

3. ☒ Modificaciones de acuerdo con el Artículo 19 del PCT, correspondiente a un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.

4. ☒ Extracto de publicación.

**SE REALIZARON MODIFICACIONES EN LA
FASE INTERNACIONAL**

4



Representación y Poder con autenticación notarial y Apostille para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales, enseñanzas, nombres de dominio, lemas comerciales, licencias.

Representation and Power-of- Attorney with notarial authentication and Apostille for patents, utility models, industrial designs, trademarks, commercial names, trade emblems, domain names, slogans, licenses.

REPRESENTACION Y PODER

REPRESENTATION AND POWER- OF- ATTORNEY

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/I (we), the undersigned
Bayer CropScience AG

domiciliado (s) en/of Alfred-Nobel-Str. 50,
40789 Monheim, Germany, hereby ratify the patent application

No. 03.005.574 filed by Emilio FERRERO on January 28, 2003 and

por el presente nombramos a EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 y GERMAN CAVELIER, tpa. 832, domiciliados en la Carrera 4ª N° 72 35, Bogotá, Colombia, en obediencia a lo dispuesto en el parágrafo 1o del Artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. El primer representante suplente reemplazará al principal en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquél. La misma regla se aplicará cuando el segundo representante suplente haya de reemplazar al primero, o el tercero al segundo. En tales casos, el representante principal, o el primero, o segundo suplente, en su caso, o ambos, declararán su intención de no ejercer la representación mediante declaración autenticada por Notario Público en Colombia, o por Notario u otro Funcionario Público, o Cónsul de Colombia, en el extranjero; y si se tratare de impedimento, con el certificado respectivo. Si alguno de los nombrados faltare definitivamente, el siguiente tomará su lugar. Cuando cesare la ausencia o impedimento del representante principal, o de su primero o segundo suplentes, en su caso, podrán ejercer la representación, en su orden, uno u otros según el caso, asumiéndola por el solo hecho de ejercerla, cesando en ese momento el ejercicio de la representación por el primero, segundo o tercer suplente en su caso.

Además, confiero (conferimos) poder a los abogados arriba nombrados, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden

in due compliance with the terms of paragraph 1st. of article 543 of the Commercial Code, do hereby appoint EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 and GERMAN CAVELIER, tpa. 832, domiciled at Carrera 4ª N° 72 35, Bogotá, Colombia, the first as principal and the others as alternates, in the order of their appointment, as our representatives for all industrial property matters with faculty to receive notifications and to appoint attorneys in and out of Court. The first alternate shall replace the principal in case of his absence or of temporal or definitive impediment. The same rule will apply when the second alternate representative is to replace the first one, or when the third is to replace the first or second alternates in their turn, or both of them, second. In such cases, the principal representative, or the first or second alternates in their turn, or both of them, shall state their intention not to act as representatives through a declaration given before a Notary Public in Colombia, or before a Notary or another Public Official or a Colombian Consul abroad; and in case of impediment, the appropriate certificate shall suffice. If any of the above named persons, without being absent, the following shall be the original that he has seen to the effect that the absence or impediment of the principal representative, or of the first or second alternate in their turn does not prevent the representation from being taken again in their sequence by the principal, the first or second alternate in their turn, or both of them, and the mere fact or its exercise will suffice. The exercise of the representation by the first, second or third alternates in their turn shall end at such time.

In addition, we grant a Power of Attorney in favor of the above named attorneys at law so that they may obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I (we) authorize the said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons.

COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA
BOGOTA, D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
10 JUN 2009
ANDRÉS QUINTERO ARTURO
NOTARIA

S

administrativo, contencioso administrativo y judicial, así como los
bunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes
suntos: a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, y
diseños industriales; el registro de marcas de fábrica, colectivas,
defensivas, de servicio, lemas comerciales, nombres comerciales,
enseñas, nombres de dominio, variedades vegetales y denominaciones de
origen; su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio,
cancelación voluntaria; y el registro de licencias de uso de esos derechos;
b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor,
oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial,
nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, la tutela, la
protección de secretos industriales, y en general los juicios civiles,
penales, administrativos o contencioso administrativos relacionados con
estos derechos; acciones y procesos que promovamos o se nos
promuevan. Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan
sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del
proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de
agentes oficiosos.



with or without jurisdiction, specially those administrative,
administrative contentious and judicial, as well as before
Arbitration Court, in all matters concerning the following: a)
Obtainment of patents, utility models and industrial designs;
the registration of trademarks, collective, defensive and service
marks, slogans, commercial names, trade emblems, domain
names, vegetal varieties and denominations of origin; its
renewal, assignment, change of name or domicile, voluntary
cancellation; and the registration of licenses of use of the above
rights; b) Actions of unfair competition, protection to the
consumer, oppositions or observations, administrative or Court
cancellation, nullity, infringement, granting of licenses, the
action for writ mandamus, the protection of trade secrets, and
in general the civil, penal, and administrative suits relating to
those rights; actions and suits instituted by me (us) or against
me (us). And that in all the above matters they may substitute
this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts
of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done
by representatives without a power of attorney.

Dado y firmado hoy/Given and signed this 12th of February, 2003
en/in Leverkusen
por/by Dr. Axel Bader, Dr. Ralf-Rüdiger Jesse

Firma

Signature

Bayer CropScience AG



COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA,
D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA

10 JUN. 2009
AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

6

AUTENTICACION NOTARIAL (SOCIEDAD)

El Notario Certifica: Que la firma que antecede de
Dr. Axel Bader y Dr. Ralf-Rüdiger Jesse

, auténtica; que el signatario desempeña actualmente el cargo
de Secretarios
de la compañía Bayer CropScience AG

sociedad que actualmente existe y está organizada de acuerdo a
las leyes de Alemania

que la dirección de dicha compañía es Alfred Nobel-Str.
50, 40789 Monheim, Alemania

y que el signatario tiene facultad para otorgar este documento.

Todos los hechos anteriores le constan por haber examinado los
documentos respectivos y de todo ello da fe.

Dado y firmado en Leverkusen

El 12 de febrero, 2003

NOTARIAL AUTHENTICATION (COMPANY)

The undersigned Notary certifies: That the preceding signature
of

Dr. Axel Bader and Dr. Ralf-Rüdiger Jesse
is authentic, that the signatory currently acts in the position of
secretaries

of the company Bayer CropScience AG

a company currently existing and organized under the laws of
Germany

that the address is Alfred-Nobel-Str. 50,
40789 Monheim, Germany

and that the signatory has the power to grant this document.


The Notary Public is aware and attests to the above facts upon
examination of the corresponding documents.

Given and signed in Leverkusen

On 12th of February, 2003

El Notario Público
(Firma-sello)

The Notary Public
(Signature-seal)



7

URNr. 242/2003


Ich beglaube die vor mir vollzogenen Unterschriften :


1. des Herrn Dr. Ralf-Rüdiger Jesse, geschäftsansässig
in D 51368 Leverkusen, Bayerwerk, Germany,
2. des Herrn Dr. Axel Bader, geschäftsansässig
in D 51368 Leverkusen, Bayerwerk, Germany,

- persönlich bekannt -.

Ich bescheinige aufgrund Einsicht in das Handelsregister des
Amtsgerichts Langenfeld - HRB 3990 -, daß die genannten Herren
berechtigt sind, die Bayer CropScience Aktiengesellschaft in
Monheim am Rhein als Prokuristen einzeln zu vertreten.

Leverkusen, den 12. Februar 2003


Notar



(Convention de L. N° 97 / 15 octobre 1981)

Diese ist eine Urkunde

Dirk Heiderhoff

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain on *Arabidopsis thaliana* cells. The cells were transformed with the *Agrobacterium* strain at concentrations of 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹, and 10¹⁰ cells/ml. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 10⁶ cells. The data are the mean ± SD of three independent experiments.

Notars Dirk Heiderhoff

in Leverkusen

17. FEB 2003

C. 10.1

482103

Stempel/Post

10. Unterschrift:

Leuco Caliche



COMO NOTAR
D.C. HAGO CONSTAR
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA

10 JUN. 2009

AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

Feb 1950

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

333

• • • • •

A

TRADUCCION OFICIAL No. 9450

de un documento escrito en Alemán, efectuada por Luz Arriaga de Herber, resolución del Ministerio de Justicia 599 del 6 de marzo 1978.-

Traducción de los sellos y autenticaciones que aparecen en el documento de representación y poder, escrito en español e inglés, por medio del cual la firma Bayer CropScience AG, domiciliada en Alfred-Nobel-Str. 50, D 40789 Monheim, Alemania, otorga poder a EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa 23555 y GERMAN CAVELIER, tpa. 832, domiciliados en la Carrera 4 No. 72-35, Bogotá, Colombia. Dado y firmado el 12 de febrero 2003 en Leverkusen, Alemania, por los señores Dr. Axel Bader y Dr. Ralf-Rüdiger Jesse.

Autenticación en español e inglés de las firmas antecedentes y certificación de existencia de la sociedad notario de Leverkusen, Dirk Heiderhoff.

Fdo.: firma ilegible

Sello redondo en tinta:

Dirk Heiderhoff, notario de Leverkusen



COPIA AUTÉNTICA DEL ORIGINAL
Fotocopia de la firma de Dirk Heiderhoff
Firma de Dirk Heiderhoff

9

Protocolo notarial 242/2003


Certifico la autenticidad de la firma antecedentes puestas
ante mí por los señores

1. Dr. Ralf-Rüdiger Jesse, con domicilio comercial en D-
51368, Bayerwerk, Alemania,
2. Dr. Axel Bader, con domicilio comercial en D-51368,
Bayerwerk, Alemania,

a quienes conozco en persona.

Certifico, por haber tenido la lista el registro de comercio
del Juzgado Municipal de Langenfeld -HRB 3990- que los
mencionados señores están facultados, en su calidad de
apoderados, para representar individualmente a la firma Bayer
CropScience Aktiengesellschaft, domiciliada en Monheim am
Rhein.

Leverkusen, 12 de febrero 2003
(Hilo y oblea notarial)
Fdo.: firma ilegible, Notario



Costas

Art. 141, 154 Kost0

Valor EUROS 3.000,-

Derechos Art. 32,45 EUROS 10,-

AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA

19

| | |
|-------------------|-------------------|
| Derechos Art. 58 | EUROS 10,- |
| Derechos Art. 150 | Euros 13,- |
| IVA | <u>EUROS 5,28</u> |
| Total | EUROS 38,28 |

Fdo.: Heiderhoff, notario

APOSTILLA

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. Ha sido firmado por Dirk Heiderhoff

3. Actuando en calidad de notario

4. Lleva el sello del notario Dirk Heiderhoff, notario en
Leverkusen

Certificado

5. en Colonia

6. El 17 de febrero 2003

7 por el Vicepresidente del Tribunal Regional de Colonia


8. bajo el No 482/03

9. Sello

El Presidente del

Tribunal Regional de Colonia

10. Firma




ES TRADUCCIÓN FIEL COMPLETA, de la cual se deja copia en los
archivos de estas oficinas para su confrontación.

Bogotá, 14 de marzo 2003.

[Handwritten signature]
FELIX ALBERTO GARCIA DE JESUS
Tribunal Regional de Colonia
Notario

COMO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTA FE DE BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE LAS ANTERIORES FIR-
 MAS PUESTAS POR Georgio de Tejada
 IDENTIFICADOS CON C.C. No.(s) _____
 ES(SON) AUTENTICAS
 SANTA FE DE BOGOTA, 18 MAR 2003



NO SE ASUME
 RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

NO ME DIERON P 12:24

COMO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE BOGOTA,
 HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
 CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
 BOGOTA D.C., REPUBLICA DE COLOMBIA

10 JUN. 2009

AMPARO QUINTERO ARTURO
 NOTARIA

MINISTERIO DE
 RELACIONES EXTERIORES

208993

208993 de
 CUYA FIRMA APARECE EN EL
 DOCUMENTO DESEMPEÑA
 LAS FUNCIONES INDICADAS

11
TRADUCCIÓN OFICIAL No. 10.09/02 realizada por Diego Vargas, Traductor
Oficial, Resolución No. 0001 de 1999 del Ministerio de Justicia y
registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

A continuación se traducen los sellos y legalizaciones de un
documento escrito en inglés y español por medio del cual Bayer
CropScience AG, domiciliado en Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim,
Alemania, por el presente ratifica la solicitud de patente No.
03.005.574, presentada por EMILIO FERRERO el 28 de enero de 2003 y
otorga derechos de representación y poder a los Doctores EMILIO
FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE
PÁEZ, tpa. 23555 y GERMÁN CAVELIER, tpa. 832, domiciliados en la
Carrera 4° No. 72-35.

Dado y firmado hoy 12 de febrero de 2003


en Leverkusen

por Dr. Axel Brader, Dr. Ralf-Rüdiger Jesse

Bayer CropScience AG

Firma Ilegible

Firma Ilegible



(ANEXO)

AUTENTICACIÓN NOTARIAL (SOCIEDAD) en donde se certifican la firma
anterior del Doctor Axel Bader y del Doctor Ralf-Rüdiger Jesse como

Diego F. Vargas
DIEGO F. VARGAS Z.

TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
ESPAÑOL - INGLES - INGLES - ESPAÑOL
RES. 0001 DE ENERO 4 DE 19991

12

Secretarios de Bayer CropScience AG, una sociedad actualmente existente y organizada de acuerdo a las leyes de Alemania y con dirección en Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Alemania. Dado y firmado en Leverkusen el 12 de febrero del 2003.

Firma Ilegible
Notario Público

Sello

Se anexa autenticación notarial en alemán de las firmas anteriores.


Respaldo:

Apostilla expedida por Alemania y certificado el 17 de febrero de 2003 bajo el número **482/03**.

Es traducción fiel y completa de la cual se deja copia en esta oficina para su confrontación.

DVZ/ID-4268/WPCL002G/COLO 13549-841-002-0

Diego F. Vargas
DIEGO F. VARGAS Z.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
ESPAÑOL - INGLES - INGLES - ESPAÑOL
RES. 0001 DE ENERO 4 DE 1999
MINISTERIO DE JUSTICIA



NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2003 MAR 18 P 12:24

JEFE DE LEYALIZACIONES
BOGOTA D.C.

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES


208992

D.F. Jorjese
CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FUNCIONES INDICADAS

COMO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTAFE DE BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE LA(S) ANTERIORES FIRMA(S) PUESTA(S) POR D. Jorjese

IDENTIFICADOS CON C.E. No.(s) _____

SANTAFE DE BOGOTA, 18 MAR 2003 ES(SON) AUTENTICA(S)



COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA

10 JUN. 2009

AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Juni 2008 (26.06.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/074406 A4

(51) Internationale Patentklassifikation:

A01N 57/12 (2006.01) A01N 43/56 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01) A01N 25/32 (2006.01)
A01N 43/76 (2006.01) A01P 13/00 (2006.01)

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,
EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID,
IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN,
MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV,
SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
ZA, ZM, ZW.

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/010643

(22) Internationales Anmeldedatum:
7. Dezember 2007 (07.12.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
06026145.0 18. Dezember 2006 (18.12.2006) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): BAYER CROPSCIENCE AG [DE/DE]; Alfred-No-
bel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUR, Peter [DE/DE];
Schulstrasse 5, 56938 Schondorf (DE). VERMEER,
Ronald [NL/DE]; Eulenkamp 1, 51371 Leverkusen (DE).
SÜSSMANN, Rainer [DE/DE]; An der Landstrasse 1,
65549 Limburg (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht
— mit geänderten Ansprüchen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 9. April 2009

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
Veröffentlichungsdatum der geänderten Ansprüche: 4. Juni 2009

(54) Title: PENETRATION ENHANCER FOR HERBICIDES AND SAFENERS

(54) Bezeichnung: PENETRATIONSFÖRDERER FÜR HERBIZIDE UND SAFENER

(57) Abstract: The invention relates to the field of chemical plant protection, especially the use of a specific compound as a penetration enhancer for agrochemical active ingredients from the group of herbicides and safeners. The compound used is tributoxyethyl phosphate (TBEP).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das Gebiet des chemischen Pflanzenschutzes, insbesondere die Verwendung einer speziellen Verbindung als Penetrationsförderer für agrochemische Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und Safener. Bei der Verbindung handelt es sich um Tributoxyethylphosphat (TBEP).

WO 2008/074406 A4

14

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Juni 2008 (26.06.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/074406 A3

(51) Internationale Patentklassifikation:

A01N 57/12 (2006.01) A01N 43/56 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01) A01N 25/32 (2006.01)
A01N 43/76 (2006.01) A01P 13/00 (2006.01)

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/010643

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. Dezember 2007 (07.12.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

06026145.0 18. Dezember 2006 (18.12.2006) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER CROPSCIENCE AG [DE/DE]; Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUR, Peter [DE/DE]; Schulstrasse 5, 56938 Schondorf (DE). VERMEER, Ronald [NL/DE]; Eulenkamp 1, 51371 Leverkusen (DE). SÜSSMANN, Rainer [DE/DE]; An der Landstrasse 1, 65549 Limburg (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts:

9. April 2009



WO 2008/074406 A3

(54) Title: PENETRATION ENHANCER FOR HERBICIDES AND SAFENERS

(54) Bezeichnung: PENETRATIONSFÖRDERER FÜR HERBIZIDE UND SAFENER

(57) Abstract: The invention relates to the field of chemical plant protection, especially the use of a specific compound as a penetration enhancer for agrochemical active ingredients from the group of herbicides and safeners. The compound used is tributoxyethyl phosphate (TBEP).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das Gebiet des chemischen Pflanzenschutzes, insbesondere die Verwendung einer speziellen Verbindung als Penetrationsförderer für agrochemische Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und Safener. Bei der Verbindung handelt es sich um Tributoxyethylphosphat (TBEP).

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Juni 2008 (26.06.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/074406 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:

A01N 25/32 (2006.01) A01P 13/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/010643

(22) Internationales Anmeldedatum:

7. Dezember 2007 (07.12.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

06026145.0 18. Dezember 2006 (18.12.2006) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): BAYER CROPSCIENCE AG [DE/DE]; Alfred-No-
bel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUR, Peter [DE/DE];
Schulstrasse 5, 56938 Schondorf (DE). VERMEER,
Ronald [NL/DE]; Eulenkamp 1, 51371 Leverkusen (DE).
SÜSSMANN, Rainer [DE/DE]; An der Landstrasse 1,
65549 Limburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart):

AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,
EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID,
IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN,
MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV,
SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart):

ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

WO 2008/074406 A2

(54) Title: PENETRATION ENHANCER FOR HERBICIDES AND SAFENERS

(54) Bezeichnung: PENETRATIONSFÖRDERER FÜR HERBIZIDE UND SAFENER

(57) Abstract: The invention relates to the field of chemical plant protection, especially the use of a specific compound as a penetration enhancer for agrochemical active ingredients from the group of herbicides and safeners. The compound used is tributoxyethyl phosphate (TBEP).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das Gebiet des chemischen Pflanzenschutzes, insbesondere die Verwendung einer speziellen Verbindung als Penetrationsförderer für agrochemische Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und Safener. Bei der Verbindung handelt es sich um Tributoxyethylphosphat (TBEP).

Beschreibung

5

Penetrationsförderer für Herbizide und Safener

10

Die Erfindung betrifft das Gebiet des chemischen Pflanzenschutzes, insbesondere die Verwendung einer speziellen Verbindung als Penetrationsförderer für agrochemische Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und Safener sowie Pflanzenschutzmittel enthaltend diese Verbindung. Bei der Verbindung handelt es sich um Tributoxyethylphosphat (CAS Regno: 78-51-3; im folgenden als TBEP bezeichnet).

15

Die Förderung der Penetration von Herbiziden und Safenern in Pflanzen wird durch 'Penetrationsförderer' bewirkt. Unter dem Begriff Penetrationsförderer werden Verbindungen verstanden, welche die Aufnahme von Herbiziden und Safenern, allein oder in Mischung, durch die Kutikula einer Pflanze in die Pflanze fördern, d.h. die Aufnahmegeschwindigkeit beschleunigen und/oder die aufgenommene Menge des Wirkstoffs in die Pflanze erhöhen.

20

25

Stoffe, welche die Penetration von Herbiziden und/oder Safenern durch die Kutikula der Pflanze erhöhen sind wertvolle Hilfsstoffe im chemischen Pflanzenschutz. Verschiedene Stoffklassen sind als Penetrationsförderer bereits bekannt (siehe z.B. WO 2005/104844 A). DE 3513889 A1 behandelt allgemein Penetrationsförderer als "Aktivator" für Biozide und in EP 579052 A2 werden als Penetrationsförderer Verbindungen aus der Gruppe Alkylphosphate, wie Tributylphosphat und Tripropylphosphat, beschrieben. Trotzdem besteht unter verschiedenen Gesichtspunkten immer noch ein Bedarf an weiteren Verbindungen mit vorteilhafteren Eigenschaften.

30

Aufgabe der Erfindung ist es daher, weitere vorteilhafte Stoffe mit penetrationsfördernden Eigenschaften für agrochemische Wirkstoffe bereitzustellen.

Es wurde nun überraschend gefunden, dass sich das Lösungsmittel TBEP im Gegensatz zu vielen anderen Lösungsmitteln in bestimmten niedrigeren Aufwandmengen und bestimmten Mischungsverhältnissen zum Wirkstoff zur Erhöhung der Penetration von Herbiziden und Safenern, allein oder in Mischung, durch die Kutikula der Pflanze und damit zur biologischen Wirkungssteigerung von Pflanzenschutzmitteln eignet.

TBEP ist schon als Lösungsmittel in entsprechend hohen Aufwandmengen im Pflanzenschutz bekannt, wie in Herbiziden (siehe z.B. WO 01/47356 A1, EP 1251736 B1, WO 00/56146 A1, EP 1164842-B1) und Insektiziden (siehe z.B. JP 08291004 A, US 5674517 A). Aus GB 2022070 A ist TBEP bekannt zur Entblätterung, wobei es in Verhältnissen von (TBEP : Wirkstoff) 2 : 1 bis 4 : 1 den zu herbiziden Wirkstoffen zugesetzt wurde. Auf dem Gebiet der Fungizide scheint die Verwendung von TBEP als Penetrationsförderer noch unbekannt zu sein.

15

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Förderung der Penetration, wobei man die Komponenten

- (A) einen oder mehrere Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und/oder Safener,
- 20 (B) Tributoxyethylphosphat (TBEP) in Dosierungen von 2,5 bis 150,0 g/ha und
- (C) gegebenenfalls einen oder mehrere Emulgatoren, vorzugsweise aus der Gruppe der ionischen und nicht-ionischen Emulgatoren und deren Gemische mit HLB-Werten von 10 bis 17,

gleichzeitig oder sequentiell auf die Schadpflanzen appliziert.

25

Ebenso Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung des hier beschriebenen Verfahrens, wobei man die Komponenten gleichzeitig oder sequentiell auf die Schadpflanzen appliziert.

- 30 Da der Wirkmechanismus von TBEP als Penetrationsförderer grundsätzlich unabhängig von der Art des eingesetzten agrochemischen Wirkstoffs ist, kommen alle Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide in Frage, deren biologische

Wirksamkeit gegen Unkuter im weiteren Sinne, im folgenden als Schadpflanzen bezeichnet, durch erhhtes Eindringen in die Schadpflanze gesteigert werden kann. In Falle der Wirkstoffe aus der Gruppe der Safener wird ein erhhtes Eindringen in die Kulturpflanze gewnscht, damit die Schutzwirkung gesteigert werden kann.

5

Vorzugsweise genannt seien Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide, umfassend auch Pflanzenwuchsregulatoren, und aus der Gruppe der Safener, sowie Pflanzennhrstoffe, die ber systemische Eigenschaften verfgen, sowie als Kombinationspartner in Frage kommende Kontaktmittel. Im folgenden beinhaltet der Begriff Herbizide sowohl Herbizide wie auch Pflanzenwuchsregulatoren soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht.

10

Weiterhin bevorzugt innerhalb der oben genannten Gruppen sind systemische Wirkstoffe, d.h. solche die von der Pflanze durch die Bltter oder ber die Wurzeln aufgenommen und im Saftstrom, dem Transportsystem oder Pflanze, weitergeleitet werden. Besonders bevorzugt sind solche Wirkstoffe, die einen Log P Wert von ≤ 4 aufweisen (bestimmt gem EEC-Directive 79/831 Annex V. A8 durch HPLC, Gradientenmethode, Acetonitril / 0,1 % wssrige Phosphorsure), insbesondere solche mit einem Log P Wert von ≤ 4 und $\geq 0,1$.

15

Beispiele fr einzelne Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide, umfassend auch Pflanzenwuchsregulatoren, und aus der Gruppe der Safener sind:

20

Herbizide

25

Beispiele fr Herbizide sind z.B. ALS-Inhibitoren (Acetolactat-Synthetase-Inhibitoren) oder Herbizide aus der Gruppe der Carbamate, Thiocarbamate, Halogenacetanilide, substituierte Phenoxy-, Naphthoxy- und Phenoxyphenoxycarbonsure-Derivate sowie Heteroaryloxy-phenoxyalkancarbonsure-Derivate, wie Chinolyloxy-, Chinoxalyloxy-, Pyridyloxy-, Benzoxazyloxy- und Benzthiazolyloxyphenoxyalkancarbonsureester, Cyclo-hexandionabkmmlinge, Imidazolinone, Phosphor-haltige Herbizide, z.B. vom Glufosinate-Typ oder vom Glyphosate-Typ, Pyrimidinyloxy-

30

pyridincarbonsäure-Derivate, Pyrimidyloxy-benzoesäure-Derivate, Triazolo-pyrimidin-sulfonamid-Derivate sowie S-(N-Aryl-N-alkylcarbamoylmethyl)-dithiophosphorsäureester, Harnstoffe sowie Hydroxybenzonitrile.

- 5 Bei den herbiziden Wirkstoffen aus der Gruppe der ALS-Inhibitoren wie Sulfonylharnstoffe sind im Sinne der vorliegenden Erfindung neben den neutralen Verbindungen stets auch deren Salze mit anorganischen und/oder organischen Gegenionen zu verstehen. So können z.B. Sulfonylharnstoffe z.B. Salze bilden, bei denen der Wasserstoff der -SO₂-NH-Gruppe durch ein für die Landwirtschaft
- 10 geeignetes Kation ersetzt ist. Diese Salze sind beispielsweise Metallsalze, insbesondere Alkalimetallsalze oder Erdalkalimetallsalze, insbesondere Natrium- und Kaliumsalze, oder auch Ammoniumsalze oder Salze mit organischen Aminen. Ebenso kann Salzbildung durch Anlagerung einer Säure an basischen Gruppen, wie z.B. Amino und Alkylamino, erfolgen. Geeignete Säuren hierfür sind starke
- 15 anorganische und organische Säuren, beispielsweise HCl, HBr, H₂SO₄ oder HNO₃.

A) Bevorzugte ALS-Inhibitoren entstammen aus der Reihe der Sulfonylharnstoffe und/oder ihrer Salze, z.B. Pyrimidin- oder Triazinylaminocarbonyl-[benzol-, pyridin-, pyrazol-, thiophen- und (alkylsulfonyl)-alkylamino-]-sulfamide.

- 20 Solche geeigneten Sulfonylharnstoffe sind beispielsweise

A1) Phenyl- und Benzylsulfonylharnstoffe und verwandte Verbindungen, z.B.

1-(2-Chlorphenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff
(Chlorsulfuron),

- 25 1-(2-Ethoxycarbonylphenylsulfonyl)-3-(4-chlor-6-methoxypyrimidin-2-yl)-harnstoff
(Chlorimuron-ethyl),

1-(2-Methoxyphenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff
(Metsulfuron-methyl),

- 30 1-(2-Chlorethoxyphenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff
(Triasulfuron),

1-(2-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)-3-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-harnstoff
(Sulfumeturon-methyl),

- 1-(2-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-methylhamstoff (Tribenuron-methyl),
 1-(2-Methoxycarbonylbenzylsulfonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-hamstoff (Bensulfuron-methyl),
 5 1-(2-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)-3-(4,6-bis-(difluormethoxy)pyrimidin-2-yl)-hamstoff, (Primisulfuron-methyl),
 3-(4-Ethyl-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-1-(2,3-dihydro-1,1-dioxo-2-methylbenzo[b]thiophen-7-sulfonyl)-hamstoff (EP-A 0 079 683),
 3-(4-Ethoxy-6-ethyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-(2,3-dihydro-1,1-dioxo-2-methylbenzo[b]-
 10 thiophen-7-sulfonyl)hamstoff (EP-A 0 079 683),
 3-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-(2-methoxycarbonyl-5-jod-phenylsulfonyl)-hamstoff (Iodosulfuron-methyl und dessen Natriumsalz, WO 92/13845), DPX-66037, Triflusulfuron-methyl (s. Brighton Crop Prot. Conf. - Weeds - 1995, S. 853),
 15 CGA-277476, (s. Brighton Crop Prot. Conf. - Weeds - 1995, S. 79),
 Methyl-2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl]-4-methansulfon-amido-methyl-benzoat (Mesosulfuron-methyl, WO 95/10507),
 N,N-Dimethyl-2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl]-4-formylamino-benzamid (Foramsulfuron, WO 95/01344);
 20
 A2) Thienylsulfonylhamstoffe, z.B.
 1-(2-Methoxycarbonylthiophen-3-yl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)hamstoff (Thifensulfuron-methyl);
 25 A3) Pyrazolylsulfonylhamstoffe, z.B.
 1-(4-Ethoxycarbonyl-1-methylpyrazol-5-yl-sulfonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)hamstoff (Pyrazosulfuron-methyl);
 Methyl-3-chlor-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoysulfamoyl)-1-methyl-pyrazol-4-carboxylat (EP-A 0 282 613);
 30 5-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl-carbamoysulfamoyl)-1-(2-pyridyl)-pyrazol-4-carbonsäuremethylester (NC-330, s. Brighton Crop Prot. Conference 'Weeds' 1991, Vol. 1, S. 45 ff.),

DPX-A8947, Azimsulfuron, (s. Brighton Crop Prot. Conf. 'Weeds' 1995, S. 65);

A4) Sulfondiamid-Derivate, z.B.

3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonylaminosulfonyl)-

harnstoff (Amidosulfuron) und dessen Strukturanaloge (EP-A 0 131 258 und Z. Pfl. Krankh. Pfl. Schutz, Sonderheft XII, 489-497 (1990));


A5) Pyridylsulfonylharnstoffe, z.B.

1-(3-N,N-Dimethylaminocarbonylpyridin-2-ylsulfonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-harnstoff (Nicosulfuron),

1-(3-Ethylsulfonylpyridin-2-ylsulfonyl)-3-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-harnstoff (Rimsulfuron),

2-[3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-ureidosulfonyl]-6-trifluormethyl-3-pyridin-carbonsäuremethylester, Natriumsalz (DPX-KE 459, Flupyrsulfuron, s. Brighton Crop Prot. Conf. Weeds, 1995, S. 49),

Pyridylsulfonylharnstoffe, wie sie z.B. in DE-A 40 00 503 und DE-A 40 30 577 beschrieben sind, vorzugsweise solche der Formel



worin

E CH oder N, vorzugsweise CH,

R²⁰ Iod oder NR²⁵R²⁶,

R²¹ Wasserstoff, Halogen, Cyano, (C₁-C₃)-Alkyl, (C₁-C₃)-Alkoxy, (C₁-C₃)-

Halogenalkyl, (C₁-C₃)-Halogenalkoxy, (C₁-C₃)-Alkylthio, (C₁-C₃)-Alkoxy-(C₁-C₃)-alkyl, (C₁-C₃)-Alkoxy-carbonyl, Mono- oder Di-((C₁-C₃)-alkyl)-amino, (C₁-C₃)-Alkylsulfinyl oder -sulfonyl, SO₂-NR^xR^y oder CO-NR^xR^y, insbesondere Wasserstoff,

R^x, R^y unabhängig voneinander Wasserstoff, (C_1-C_3) -Alkyl, (C_1-C_3) -Alkenyl, (C_1-C_3) -Alkynyl oder zusammen $-(CH_2)_4-$, $-(CH_2)_5-$ oder $-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-$,

n 0, 1, 2 oder 3, vorzugsweise 0 oder 1 ist,

R^{22} Wasserstoff oder CH_3 ,

5 R^{23} Halogen, (C_1-C_2) -Alkyl, (C_1-C_2) -Alkoxy, (C_1-C_2) -Halogenalkyl, insbesondere CF_3 , (C_1-C_2) -Halogenalkoxy, vorzugsweise $OCHF_2$ oder OCH_2CF_3 ,


R^{24} (C_1-C_2) -Alkyl, (C_1-C_2) -Halogenalkoxy, vorzugsweise $OCHF_2$, oder (C_1-C_2) -Alkoxy,

R^{25} (C_1-C_4) -Alkyl,

10 R^{26} (C_1-C_4) -Alkylsulfonyl oder

R^{25} und R^{26} gemeinsam eine Kette der Formel $-(CH_2)_3SO_2-$ oder $-(CH_2)_4SO_2-$ bedeuten, z.B. 3-(4,6-Dimethoxypyrimiden-2-yl)-1-(3-N-methylsulfonyl-N-methylaminopyridin-2-yl)-sulfonylharnstoff, oder deren Salze;

15 A6) Alkoxyphenoxysulfonylharnstoffe, wie sie z.B. in EP-A 0 342 569 beschrieben sind, vorzugsweise solche der Formel



worin

20 E CH oder N, vorzugsweise CH,

R^{27} Ethoxy, Propoxy oder Isopropoxy,

R^{28} Halogen, NO_2 , CF_3 , CN , (C_1-C_4) -Alkyl, (C_1-C_4) -Alkoxy, (C_1-C_4) -Alkylthio oder (C_1-C_3) -Alkoxy-carbonyl, vorzugsweise in 6-Position am Phenylring,

n 0, 1, 2 oder 3, vorzugsweise 0 oder 1,

25 R^{29} Wasserstoff, (C_1-C_4) -Alkyl oder (C_3-C_4) -Alkenyl,

R^{30}, R^{31} unabhängig voneinander Halogen, (C_1-C_2) -Alkyl, (C_1-C_2) -Alkoxy, (C_1-C_2) -Halogenalkyl, (C_1-C_2) -Halogenalkoxy oder (C_1-C_2) -Alkoxy- (C_1-C_2) -alkyl,

vorzugsweise OCH₃ oder CH₃, bedeuten, z.B. 3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy)-sulfonylharnstoff, oder deren Salze;

A7) Imidazolylsulfonylharnstoffe, z.B.

- 5 MON 37500, Sulfosulfuron (s. Brighton Crop Prot. Conf. 'Weeds', 1995, S: 57), und andere verwandte Sulfonylharnstoff-Derivate und Mischungen daraus;

Typische Vertreter dieser Wirkstoffe sind unter anderem die nachfolgend aufgeführten Verbindungen: Amidosulfuron, Azimsulfuron, Bensulfuron-Methyl,

- 10 Chlorimuron-Ethyl, Chlorsulfuron, Cinosulfuron, Cyclosulfamuron, Ethametsulfuron-Methyl, Ethoxysulfuron, Flazasulfuron, Flupyrsulfuron-Methyl-Natrium, Halosulfuron-Methyl, Imazosulfuron, Metsulfuron-Methyl, Nicosulfuron, Oxasulfuron, Primisulfuron-Methyl, Prosulfuron, Pyrazosulfuron-Ethyl, Rimsulfuron, Sulfometuron-Methyl, Sulfosulfuron, Thifensulfuron-Methyl, Triasulfuron, Tribenuron-Methyl,
- 15 Triflusulfuron-Methyl, Iodosulfuron-Methyl und dessen Natriumsalz (WO 92/13845), Mesosulfuron-Methyl und dessen Natriumsalz (Agrow Nr. 347, 3. März 2000, Seite 22 (PJB Publications Ltd. 2000)) und Foramsulfuron und dessen Natriumsalz (Agrow Nr. 338, 15. Oktober 1999, Seite 26 (PJB Publications Ltd..2000)).

- 20 B) Herbizide vom Typ der Phenoxyphenoxy- und Heteroaryloxyphenoxy-carbonsäure-Derivate, wie

- B1) Phenoxyphenoxy- und Benzyloxyphenoxy-carbonsäure-Derivate, z.B. 2-(4-(2,4-Dichlorphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester (Diclofop-methyl),
- 25 2-(4-(4-Brom-2-chlorphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester (DE-A 26 01 548), 2-(4-(4-Brom-2-fluorphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester (US-A 4,808,750), 2-(4-(2-Chlor-4-trifluormethylphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester (DE-A 24 33 067),
- 2-(4-(2-Fluor-4-trifluormethylphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester (US-A 4,808,750),
- 30 2-(4-(2,4-Dichlorbenzyl)-phenoxy)-propionsäuremethylester (DE-A 24 17 487), 4-(4-(4-Trifluormethylphenoxy)-phenoxy)-pent-2-en-säureethylester,

2-(4-(4-Trifluormethylphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester (DE-A 24 33 067);

B2) "Einkernige" Heteroaryloxyphenoxy-alkancarbonsäure-Derivate, z.B.

5 2-(4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester (EP-A 0 002 925),

2-(4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy)-propionsäurepropargylester
(EP-A 0 003 114),

2-(4-(3-Chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyloxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester
(EP-A 0 003 890),

10 2-(4-(3-Chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyloxy)-phenoxy)-propionsäureethylester
(EP-A 0 003 890),

2-(4-(5-Chlor-3-fluor-2-pyridyloxy)-phenoxy)-propionsäurepropargylester
(EP-A 0 191 736),

2-(4-(5-Trifluormethyl-2-pyridyloxy)-phenoxy)-propionsäurebutylester
15 (Fluazifop-butyl);

B3) "Zweikernige" Heteroaryloxyphenoxy-alkancarbonsäure-Derivate, z.B.

2-(4-(6-Chlor-2-chinoxalyloxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester und -ethylester
(Quizalofopmethyl und Quizalofopethyl),

20 2-(4-(6-Fluor-2-chinoxalyloxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester (s. J. Pest. Sci.
Vol. 10, 61 (1985)),

2-(4-(6-Chlor-2-chinoxalyloxy)-phenoxy)-propionsäure-2-isopropylidenaminoxy-
ethylester (Propaquizafop),

2-(4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester (Fenoxaprop-
25 ethyl), dessen D(+) Isomer (Fenoxaprop-P-ethyl) und 2-(4-(6-Chlorbenzthiazol-2-
yloxy)-phenoxy)-propionsäureethylester (DE-A 26 40 730),

2-(4-(6-Chlorchinoxalyloxy)-phenoxy)-propionsäure-tetrahydro-2-furylmethylester
(EP-A 0 323 727);

30 C) Chloracetanilide, z.B.

N-Methoxymethyl-2,6-diethyl-chloracetanilid (Alachlor),

N-(3-Methoxyprop-2-yl)-2-methyl-6-ethyl-chloracetanilid (Metolachlor),

N-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-methyl)-chloroessigsäure-2,6-dimethylanilid,
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(1-pyrazolylmethyl)-chloroessigsäureamid (Metazachlor);

D) Thiocarbamate, z.B.

- 5 S-Ethyl-N,N-dipropylthiocarbamat (EPTC),
S-Ethyl-N,N-diisobutylthiocarbamat (Butylate);

E) Cyclohexandionoxime, z.B.

- 10 3-(1-Allyloxyiminobutyl)-4-hydroxy-6,6-dimethyl-2-oxocyclohex-3-encarbon-
säuremethylester, (Alloxydim),
2-(1-Ethoxyiminobutyl)-5-(2-ethylthiopropyl)-3-hydroxy-cyclohex-2-en-1-on
(Sethoxydim),
2-(1-Ethoxyiminobutyl)-5-(2-phenylthiopropyl)-3-hydroxy-cyclohex-2-en-1-on
(Cloproxydim),
15 2-(1-(3-Chlorallyloxy)-iminobutyl)-5-(2-ethylthiopropyl)-3-hydroxy-cyclohex-2-en-1-
on,
2-(1-(3-Chlorallyloxy)-iminopropyl)-5-(2-ethylthiopropyl)-3-hydroxy-cyclohex-2-en-1-
on (Clethodim),
2-(1-Ethoxyiminobutyl)-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)-cyclohex-2-en-on (Cycloxydim),
20 2-(1-Ethoxyiminopropyl)-5-(2,4,6-trimethylphenyl)-3-hydroxy-cyclohex-2-en-1-on
(Tralkoxydim);

F) Imidazolinone, z.B.

- 25 2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methylbenzoesäure-methylester
und 2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-4-methylbenzoesäure
(Imazamethabenz),
5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-pyridin-3-carbonsäure
(Imazethapyr),
2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-chinolin-3-carbonsäure (Imazaquin),
30 2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-pyridin-3-carbonsäure (Imazapyr),
5-Methyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-pyridin-3-carbonsäure
(Imazethamethapyr);

G) Triazolopyrimidinsulfonamid-Derivate, z.B.

N-(2,6-Difluorphenyl)-7-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonamid
(Flumetsulam),

5 N-(2,6-Dichlor-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonamid,

N-(2,6-Difluorphenyl)-7-fluor-5-methoxy-1,2,4-triazolo[1,5-c]-pyrimidin-2-sulfonamid,
N-(2,6-Dichlor-3-methylphenyl)-7-chlor-5-methoxy-1,2,4-triazolo[1,5-c]-pyrimidin-2-sulfonamid,

10 N-(2-Chlor-6-methoxycarbonyl)-5,7-dimethyl-1,2,4-triazolo[1,5-c]-pyrimidin-2-sulfonamid (EP-A 0 343 752, US-A 4,988,812);

H) Benzoylcyclohexandione, z.B.

2-(2-Chlor-4-methylsulfonylbenzoyl)-cyclohexan-1,3-dion (SC-0051, EP-A 0 137

15 963), 2-(2-Nitrobenzoyl)-4,4-dimethyl-cyclohexan-1,3-dion (EP-A 0 274 634),
2-(2-Nitro-3-methylsulfonylbenzoyl)-4,4-dimethylcyclohexan-1,3-dion (WO
91/13548);

I) Pyrimidinyloxy-pyridincarbonsäure- bzw. Pyrimidinyloxybenzoesäure-Derivate, z.B.


3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-oxy-pyridin-2-carbonsäurebenzylester (EP-A 0 249
707),

3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-oxy-pyridin-2-carbonsäuremethylester (EP-A 0 249
707),

25 2,6-Bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-oxy]-benzoesäure (EP-A 0 321 846),
2,6-Bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-oxy]-benzoesäure-1-(ethoxycarbonyl-oxyethyl)-
ester (EP-A 0 472 113);

J) S-(N-Aryl-N-alkyl-carbamoylmethyl)-dithiophosphonsäureester, wie S-[N-(4-
30 Chlorphenyl)-N-isopropyl-carbamoylmethyl]-O,O-dimethyl-dithiophosphat
(Anilophos).

- K) Alkylazine, z.B. wie beschrieben in WO-A 97/08156, WO-A-97/31904, DE-A-19826670, WO-A-98/15536, WO-A-98/15537, WO-A-98/15538, WO-A-98/15539 sowie auch DE-A-19828519, WO-A-98/34925, WO-A-98/42684, WO-A-99/18100, WO-A-99/19309, WO-A-99/37627 und WO-A-99/65882, vorzugsweise solche der
- 5 Formel (K)





worin

R¹ (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl;





10 R² (C₁-C₄)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl oder (C₃-C₆)-Cycloalkyl-(C₁-C₄)-Alkyl und

A -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-CH₂-, -O-, -CH₂-CH₂-O-, -CH₂-CH₂-CH₂-O-
bedeuten, besonders bevorzugt solche der Formel K1-K7




28


13



14




- L) phosphorhaltige Herbizide, z.B. eine oder mehrere Verbindungen der Formel
5 (IV) oder deren Derivate wie Salze,



worin

- Z¹ einen Rest der Formel -OM, -NHCH(CH₃)CONHCH(CH₃)CO₂M oder
10 -NHCH(CH₃)CONHCH[CH₂CH(CH₃)₂]CO₂M und
M = H oder ein Salz bildendes Kation bedeuten,
und/oder eine oder mehrere Verbindungen der Formel (V) oder deren Derivate wie
Salze,



15

worin

- Z² einen Rest der Formel CN oder CO₂R¹ bedeutet, in dem R¹ = Q oder ein Salz
bildendes Kation ist und dabei Q = H, Alkyl, Alkenyl, Alkoxyalkyl oder C₆-C₁₀-Aryl,
das unsubstituiert oder substituiert ist und vorzugsweise unsubstituiert oder durch
20 einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Alkyl, Alkoxy, Halogen, CF₃, NO₂ und CN
substituiert ist, und

R^2, R^3 jeweils unabhängig voneinander H, Alkyl, C_6-C_{10} -Aryl, das unsubstituiert oder substituiert ist und vorzugsweise unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Alkyl, Alkoxy, Halogen, CF_3 , NO_2 und CN substituiert ist, oder Biphenyl oder ein Salz bildendes Kation bedeuten.

5

Beispiele für Wirkstoffe der Formel (IV) und (V) sind folgende:

- Glufosinate und dessen Ammoniumsalz in racemischer Form, d.h. 2-Amino-4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-butansäure bzw. dessen Ammoniumsalz,
- das L-Enantiomer von Glufosinate und dessen Ammoniumsalz,
- 10 – Bilanafos/Bialaphos, d.h. L-2-Amino-4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-butanoyl-L-alaninyl-L-alanin und dessen Natriumsalz
- Glyphosate.

15

M) Carbamate, z.B. Asulam, Carbetamide, Chloropham und Propham;

N) Benzofurane, z.B. Benfuresate und Ethofumesate;

O) Phytohormone;

20

P) Auxine und Auxinanaloga, z.B. 4-Indol-3-buttersäure, Indol-3-essigsäure, 1-Naphthylessigsäure, 2-(1-Naphthyl)acetamid und 2-Naphthyloxyessigsäure;

Q) Zytokinine, z.B. Cythokinin, Kinetin und 6-Benzylaminopurin;

25

R) Gibberelline, z.B. Gibberillinsäure, Gibberillin A4 und A7;

S) Absissinsäure- und deren Derivate;

T) Ethylenvorläufer, z.B. Ethephon;

30

U) Herbizide aus der Gruppe der Fettsäuresynthetase-Inhibitoren;

V) Harnstoffe, z.B. Chlorotoluron, Dimefuron, Diuron, Fluometuron, Isoproturon, Isouron, Karbutilate, Linuron, Methabenzthiazuron, Metobenzuron, Metoxuron, Monolinuron, Neburon, Siduron und Tebuthiuron und

5 W) Metamitron.

X) Hydroxybenzonitrile, z.B. wie Bromoxynil und Ioxynil und deren Salze und Ester, wie Bromoxynil-octanoat und Ioxynil-octanoat.

10 Die agrochemischen Wirkstoffe können auch Wachstumsregulatoren sein. Beispiele hierfür sind Ethephon, Tribufos, Cycilanilide und Thidiazuron.


Die Herbizide (Pflanzenwuchsregulatoren) der Gruppen A bis X sind beispielsweise aus den oben jeweils genannten Schriften und/oder aus "The Pesticide Manual", 12.

15 Auflage (2000) bis 14. Auflage (2006), The British Crop Protection Council, "Agricultural Chemicals Book II - Herbicides -", by W.T. Thompson, Thompson Publications, Fresno CA, USA 1990 und "Farm Chemicals Handbook '90", Meister Publishing Company, Willoughby OH, USA, 1990, bekannt.


20 Safener

Beispiele für Safener sind unter anderem:


a) Verbindungen der Formeln (S-II) bis (S-IV),



(S-II)



(S-III)



(S-IV)


25

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutungen haben:

n' ist eine natürliche Zahl von 0 bis 5, vorzugsweise 0 bis 3;
T ist eine (C₁ oder C₂)-Alkandiyolkette, die unsubstituiert oder mit einem oder zwei (C₁-C₄)Alkylresten oder mit [(C₁-C₃)-Alkoxy]-carbonyl substituiert ist;

5 W ist ein unsubstituierter oder substituierter divalenter heterocyclischer Rest aus der Gruppe der teilungesättigten oder aromatischen Fünfring-Heterocyclen mit 1 bis 3 Heteroringatomen des Typs N oder O, wobei mindestens ein N-Atom und höchstens ein O-Atom im Ring enthalten ist, vorzugsweise ein Rest aus der Gruppe (W1) bis (W4),

10



m' ist 0 oder 1;

R¹⁷, R¹⁹ sind gleich oder verschieden Halogen,

15 (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, Nitro oder (C₁-C₄)Haloalkyl;

R¹⁸, R²⁰ sind gleich oder verschieden OR²⁴, SR²⁴ oder NR²⁴R²⁵ oder ein gesättigter oder ungesättigter 3- bis 7-gliedriger Heterocyclus mit mindestens einem N-Atom und bis zu 3 Heteroatomen, vorzugsweise aus der Gruppe O und S, der über das N-Atom mit der Carbonylgruppe in (S-II) bzw. (S-III) verbunden ist und unsubstituiert oder durch Reste aus der Gruppe (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist, vorzugsweise ein Rest der Formel OR²⁴, NHR²⁵ oder N(CH₃)₂, insbesondere der Formel OR²⁴;

20

R²⁴ ist Wasserstoff oder ein unsubstituierter oder substituierter aliphatischer Kohlenwasserstoffrest, vorzugsweise mit insgesamt 1 bis 18 C-Atomen;

25

R²⁵ ist Wasserstoff, (C₁-C₆)Alkyl, (C₁-C₆)Alkoxy oder substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl;

R^X ist H, (C₁-C₈)Alkyl, C₁-C₈(Haloalkyl), (C₁-C₄)Alkoxy(C₁-C₈)Alkyl, Cyano oder COOR²⁶, worin R²⁶ Wasserstoff, (C₁-C₈)Alkyl, (C₁-C₈)Haloalkyl, (C₁-C₄)Alkoxy-

(C₁-C₄)alkyl, (C₁-C₆)Hydroxyalkyl, (C₃-C₁₂)Cycloalkyl oder Tri-(C₁-C₄)-alkylsilyl ist;

R²⁷, R²⁸, R²⁹ sind gleich oder verschieden Wasserstoff, (C₁-C₈)Alkyl, (C₁-C₈)Haloalkyl, (C₃-C₁₂)Cycloalkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl;

R²¹ ist (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Haloalkenyl, (C₃-C₇)Cycloalkyl, vorzugsweise Dichlormethyl;

R²², R²³ ist gleich oder verschieden Wasserstoff, (C₁-C₄)Alkyl, (C₂-C₄)Alkenyl, (C₂-C₄)Alkynyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₂-C₄)Haloalkenyl, (C₁-C₄)Alkylcarbamoyl-(C₁-C₄)alkyl, (C₂-C₄)Alkenylcarbamoyl-(C₁-C₄)alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy-(C₁-C₄)alkyl, Dioxolanyl-(C₁-C₄)alkyl, Thiazolyl, Furyl, Furylalkyl, Thienyl, Piperidyl, substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, oder R²² und R²³ bilden zusammen einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Ring, vorzugsweise einen Oxazolidin-, Thiazolidin-, Piperidin-, Morpholin-, Hexahydropyrimidin- oder Benzoxazinring;

vorzugsweise Safener folgender Untergruppen von Verbindungen der Formeln (S-II) bis (S-IV):

– Verbindungen vom Typ der Dichlorphenylpyrazolin-3-carbonsäure (d.h. der Formel (S-II), worin W = (W1) und (R¹⁷)_n = 2,4-Cl₂), vorzugsweise Verbindungen wie 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-5-methyl-2-pyrazolin-3-carbonsäureethylester (II-1, Mefenpyr-diethyl), Mefenpyr-dimethyl und Mefenpyr (II-0), und verwandte Verbindungen, wie sie in der WO-A-91/07874 beschrieben sind;

– Derivate der Dichlorphenylpyrazolcarbonsäure (d.h. der Formel (S-II), worin W = (W2) und (R¹⁷)_n = 2,4-Cl₂ ist), vorzugsweise Verbindungen wie 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-methyl-pyrazol-3-carbonsäureethylester (II-2), 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-isopropyl-pyrazol-3-carbonsäureethylester (II-3), 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(1,1-dimethyl-ethyl)pyrazol-3-carbonsäureethylester (II-4), 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-phenyl-pyrazol-3-carbonsäureethylester (II-5) und verwandte Verbindungen, wie sie in EP-A-0333131 und EP-A-0269806 beschrieben sind;

- Verbindungen vom Typ der Triazolcarbonsäuren (d.h. der Formel (S-II), worin $W = (W3)$ und $(R^{17})_n = 2,4-Cl_2$ ist), vorzugsweise Verbindungen wie Fenchlorazol-ethyl, d.h. 1-(2,4-Dichlorphenyl)-5-trichlormethyl-(1H)-1,2,4-triazol-3-carbonsäureethylester (II-6), und verwandte Verbindungen (siehe EP-A-0174562 und EP-A-0346620);
- Verbindungen vom Typ der 5-Benzyl- oder 5-Phenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäure oder der 5,5-Diphenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäure wie Isoxadifen (II-12), (worin $W = (W4)$ ist), vorzugsweise Verbindungen wie 5-(2,4-Dichlorbenzyl)-2-isoxazolin-3-carbonsäureethylester (II-7) oder 5-Phenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäureethylester (II-8) und verwandte Verbindungen, wie sie in WO-A- 91/08202 beschrieben sind, oder der 5,5-Diphenyl-2-isoxazolin-carbonsäureethylester (II-9, Isoxadifen-ethyl) oder -n-propylester (II-10) oder der 5-(4-Fluorphenyl)-5-phenyl-2-isoxazolin-3-carbonsäureethylester (II-11), wie sie in der WO-A-95/07897 beschrieben sind.
- Verbindungen vom Typ der 8-Chinolinoxinessigsäure, z.B. solche der Formel (S-III), worin $(R^{19})_n = 5-Cl$, $R^{20} = OR^{24}$ und $T = CH_2$ ist, vorzugsweise die Verbindungen (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-(1-methylhexyl)-ester (III-1, Cloquintocet-mexyl), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-(1,3-dimethyl-but-1-yl)-ester (III-2), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-4-allyl-oxy-butylester (III-3), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-1-allyloxy-prop-2-ylester (III-4), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäureethylester (III-5), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäuremethylester (III-6), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäureallyylester (III-7), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-2-(2-propyliden-iminoxy)-1-ethylester (III-8), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure-2-oxo-prop-1-ylester (III-9), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure (III-10) und dessen Salze wie sie z.B. in der WO-A-02/34048 beschrieben sind, und verwandte Verbindungen, wie sie in EP-A-0860750, EP-A-0094349 und EP-A-0191736 oder EP-A-0492366 beschrieben sind.
- Verbindungen vom Typ der (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)-malonsäure, d.h. der Formel (S-III), worin $(R^{19})_n = 5-Cl$, $R^{20} = OR^{24}$, $T = -CH(COO-Alkyl)-$ ist, vorzugsweise die Verbindungen (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)-malonsäure-diethylester (III-11), (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)-malonsäure-diäthylester, (5-Chlor-8-chinolinoxinessigsäure)-malonsäure-

methyl-ethylester und verwandte Verbindungen, wie sie in EP-A-0582198 beschrieben sind.


- Verbindungen vom Typ der Dichloracetamide, d.h. der Formel (S-IV),
vorzugsweise: N,N-Diallyl-2,2-dichloracetamid (Dichlormid (IV-1), aus US
5 4,137,070), 4-Dichloracetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazin (IV-2,
Benoxacor, aus EP 0149974), N1,N2-Diallyl-N2-dichloracetylglycinamid (DKA-24
(IV-3), aus HU 2143821), 4-Dichloracetyl-1-oxa-4-aza-spiro[4,5]decan (AD-67),
2,2-Dichlor-N-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-N-(2-propenyl)acetamid (PPG-1292), 3-
Dichloracetyl-2,2,5-trimethyloxazolidin (R-29148, IV-4), 3-Dichloracetyl-2,2-
10 dimethyl-5-phenyloxazolidin, 3-Dichloracetyl-2,2-dimethyl-5-(2-thienyl)oxazolidin,
3-Dichloracetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyloxazolidin (Furilazole (IV-5), MON
13900), 1-Dichloracetyl-hexahydro-3,3,8a-trimethylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-6(2H)-
on (Dicyclonon, BAS 145138),

b) eine oder mehreren Verbindungen aus Gruppe:

- 15 1,8-Naphthalsäureanhydrid, Methyl-diphenylmethoxyacetat, 1-(2-Chlorbenzyl)-3-(1-
methyl-1-phenylethyl)harnstoff (Cumyluron), O,O-Diethyl S-2-ethylthioethyl
phosphordithioat (Disulfoton), 4-Chlorphenyl-methylcarbamate (Mephenate), O,O-
Diethyl-O-phenylphosphorothioat (Dietholate), 4-Carboxy-3,4-dihydro-2H-1-
benzopyran-4-essigsäure (CL-304415, CAS-Regno: 31541-57-8),
20 Cyanomethoxyimino(phenyl)acetonitril (Cyometrinil), 1,3-Dioxolan-2-
ylmethoxyimino(phenyl)acetonitril (Oxabetrinil), 4'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon-O-
1,3-dioxolan-2-ylmethyloxim (Fluxofenim), 4,6-Dichlor-2-phenylpyrimidin (Fenclozim),
Benzyl-2-chlor-4-trifluormethyl-1,3-thiazol-5-carboxylat (Flurazole), 2-Dichlormethyl-
2-methyl-1,3-dioxolan (MG-191), N-(4-Methylphenyl)-N'-(1-methyl-1-
25 phenylethyl)harnstoff (Dymron), (2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure (2,4-D), (4-
Chlorphenoxy)essigsäure, (R,S)-2-(4-Chlor-o-tolyloxy)propionsäure (Mecoprop), 4-
(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB), (4-Chlor-o-tolyloxy)essigsäure (MCPA), 4-
(4-Chlor-o-tolyloxy)buttersäure, 4-(4-Chlorphenoxy)buttersäure, 3,6-Dichlor-2-
methoxybenzoesäure (Dicamba), 1-(Ethoxycarbonyl)ethyl 3,6-dichlor-2-
30 methoxybenzoat (Lactidichlor) sowie deren Salze und Ester, vorzugsweise (C₁-C₈);
- c) N-Acylsulfonamide der Formel (S-V) und ihre Salze,

36

21



worin

R^{30} Wasserstoff, einen Kohlenwasserstoffrest, einen Kohlenwasserstoffoxyrest, einen Kohlenwasserstoffthioest oder einen Heterocyclylrest, der vorzugsweise über ein C-Atom gebunden ist, wobei jeder der letztgenannten 4 Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Carboxy, Formyl, Carbonamid, Sulfonamid und Reste der Formel $-Z^a-R^a$ substituiert ist,

wobei jeder Kohlenwasserstoffteil vorzugsweise 1 bis 20 C-Atome aufweist und ein C-haltiger Rest R^{30} inklusive Substituenten vorzugsweise 1 bis 30 C-Atome aufweist;

R^{31} Wasserstoff oder (C_1-C_4) -Alkyl, vorzugsweise Wasserstoff, oder

R^{30} und R^{31} zusammen mit der Gruppe der Formel $-CO-N-$ den Rest eines 3- bis 8-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Rings;

R^{32} gleich oder verschieden Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Carboxy, Formyl, $CONH_2$, SO_2NH_2 oder einen Rest der Formel $-Z^b-R^b$;


R^{33} Wasserstoff oder (C_1-C_4) -Alkyl, vorzugsweise H;

R^{34} gleich oder verschieden Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Carboxy, CHO , $CONH_2$, SO_2NH_2 oder einen Rest der Formel $-Z^c-R^c$;

R^a einen Kohlenwasserstoffrest oder einen Heterocyclylrest, wobei jeder der beiden letztgenannten Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Mono- und Di- $[(C_1-C_4)$ -alkyl]-amino substituiert ist, oder einen Alkylrest, in dem mehrere, vorzugsweise 2 oder 3, nicht benachbarte CH_2 -Gruppen jeweils durch ein Sauerstoffatom ersetzt sind;

R^b, R^c gleich oder verschieden einen Kohlenwasserstoffrest oder einen Heterocyclylrest, wobei jeder der beiden letztgenannten Reste unsubstituiert

- oder durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Phosphoryl, Halogen-(C₁-C₄)-alkoxy, Mono- und Di-[(C₁-C₄)-alkyl]-amino substituiert ist, oder einen Alkylrest, in dem mehrere, vorzugsweise 2 oder 3, nicht benachbarte
- 5 CH₂-Gruppen jeweils durch ein Sauerstoffatom ersetzt sind;
- Z^a eine divalente Gruppe der Formel -O-, -S-, -CO-, -CS-, -CO-O-, -CO-S-, -O-CO-, -S-CO-, -SO-, -SO₂-, -NR^{*}-, -CO-NR^{*}-, -NR^{*}-CO-, -SO₂-NR^{*}- oder -NR^{*}-SO₂-, wobei die rechts angegebene Bindung der jeweiligen divalenten Gruppe die Bindung zum Rest R^a ist und wobei die R^{*} in den letztgenannten 5
- 10 Resten unabhängig voneinander jeweils H, (C₁-C₄)-Alkyl oder Halo-(C₁-C₄)-alkyl bedeuten;
- Z^b, Z^c unabhängig voneinander eine direkte Bindung oder eine divalente Gruppe der Formel -O-, -S-, -CO-, -CS-, -CO-O-, -CO-S-, -O-CO-, -S-CO-, -SO-, -SO₂-, -NR^{*}-, -SO₂-NR^{*}-, -NR^{*}-SO₂-, -CO-NR^{*}-
- 15 oder -NR^{*}-CO-, wobei die rechts angegebene Bindung der jeweiligen divalenten Gruppe die Bindung zum Rest R^b bzw. R^c ist und wobei die R^{*} in den letztgenannten 5 Resten unabhängig voneinander jeweils H, (C₁-C₄)-Alkyl oder Halo-(C₁-C₄)-alkyl bedeuten;
- n eine ganze Zahl von 0 bis 4, vorzugsweise 0, 1 oder 2, insbesondere 0 oder
- 20 1, und
- m eine ganze Zahl von 0 bis 5, vorzugsweise 0, 1, 2 oder 3, insbesondere 0, 1 oder 2; bedeuten;
- vorzugsweise Safener von Verbindungen der Formel (S-V), worin
- R³⁰ = H₃C-O-CH₂-, R³¹ = R³³ = H, R³⁴ = 2-OMe ist (V-1),
 - 25 - R³⁰ = H₃C-O-CH₂-, R³¹ = R³³ = H, R³⁴ = 2-OMe-5-Cl ist (V-2),
 - R³⁰ = Cyclopropyl, R³¹ = R³³ = H, R³⁴ = 2-OMe ist (V-3),
 - R³⁰ = Cyclopropyl, R³¹ = R³³ = H, R³⁴ = 2-OMe-5-Cl ist (V-4),
 - R³⁰ = Cyclopropyl, R³¹ = R³³ = H, R³⁴ = 2-Me ist (V-5),
 - R³⁰ = tert. Butyl, R³¹ = R³³ = H, R³⁴ = 2-OMe ist (V-6).
- 30 d) Acylsulfamoylbenzoesäureamide der allgemeinen Formel (S-VI), gegebenenfalls auch in Salzform,



worin

X^3 CH oder N;

R^{35} Wasserstoff, Heterocyclyl oder einen Kohlenwasserstoffrest, wobei die beiden
5 letztgenannten Reste gegebenenfalls durch einen oder mehrere, gleiche oder
verschiedene Reste aus der Gruppe Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy,
Carboxy, CHO, CONH₂, SO₂NH₂ und Z^a-R^a substituiert sind;

R^{36} Wasserstoff, Hydroxy, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₂-C₆)-Alkynyl, (C₁-C₆)-
10 Alkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy, wobei die fünf letztgenannten Reste
gegebenenfalls durch einen oder mehrere, gleiche oder verschiedene Reste
aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy und (C₁-C₄)-
Alkylthio substituiert sind, oder

R^{35} und R^{36} zusammen mit dem sie tragenden Stickstoffatom einen 3- bis 8-
gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Ring;

R^{37} Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Carboxy, CHO, CONH₂, SO₂NH₂
15 oder Z^b-R^b;

R^{38} Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkynyl;

R^{39} Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Carboxy, Phosphoryl, CHO, CONH₂,
20 SO₂NH₂ oder Z^c-R^c;

R^a einen (C₂-C₂₀)-Alkylrest, dessen Kohlenstoffkette ein- oder mehrfach durch
25 Sauerstoffatome unterbrochen ist, Heterocyclyl oder einen
Kohlenwasserstoffrest, wobei die zwei letztgenannten Reste gegebenenfalls
durch einen oder mehrere, gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe
Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Mono- und Di-[(C₁-C₄)-alkyl]-amino
substituiert sind;

R^b , R^c gleich oder verschieden einen (C₂-C₂₀)-Alkylrest, dessen Kohlenstoffkette
ein- oder mehrfach durch Sauerstoffatome unterbrochen ist, Heterocyclyl oder
einen Kohlenwasserstoffrest, wobei die zwei letztgenannten Reste
gegebenenfalls durch einen oder mehrere, gleiche oder verschiedene Reste

aus der Gruppe Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Hydroxy, Phosphoryl, (C₁-C₄)-Haloalkoxy, Mono- und Di-[(C₁-C₄)-alkyl]-amino substituiert sind;

Z^a eine divalente Einheit aus der Gruppe O, S, CO, CS, C(O)O, C(O)S, SO, SO₂, NR^d, C(O)NR^d oder SO₂NR^d;

5 Z^b, Z^c gleich oder verschieden eine direkte Bindung oder eine divalente Einheit aus der Gruppe O, S, CO, CS, C(O)O, C(O)S, SO, SO₂, NR^d, SO₂NR^d oder C(O)NR^d;

R^d Wasserstoff, (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Haloalkyl;

n eine ganze Zahl von 0 bis 4, und

10 m für den Fall, dass X für CH steht, eine ganze Zahl von 0 bis 5, und für den Fall, dass X für N steht, eine ganze Zahl von 0 bis 4 bedeuten;

vorzugsweise Safener von Verbindungen der Formel (S-VI), in der

X³ CH;

15 R³⁵ Wasserstoff, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₅-C₆)-Cycloalkenyl, Phenyl oder 3- bis 6-gliedriges Heterocyclyl mit bis zu drei Heteroatomen aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, wobei die sechs letztgenannten Reste gegebenenfalls durch einen oder mehrere, gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Gruppe Halogen, (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₁-C₆)-Haloalkoxy, (C₁-C₂)-Alkylsulfinyl, (C₁-C₂)-Alkylsulfonyl, 20 (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₁-C₄)-Alkoxycarbonyl, (C₁-C₄)-Alkylcarbonyl und Phenyl und im Falle cyclischer Reste auch (C₁-C₄)-Alkyl und (C₁-C₄)-Haloalkyl substituiert sind;

25 R³⁶ Wasserstoff, (C₁-C₆)-Alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₂-C₆)-Alkinyl, wobei die drei letztgenannten Reste gegebenenfalls durch einen oder mehrere, gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Gruppe Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy und (C₁-C₄)-Alkylthio substituiert sind;

R³⁷ Halogen, (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₁-C₄)-Haloalkoxy, Nitro, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, (C₁-C₄)-Alkylsulfonyl, (C₁-C₄)-Alkoxycarbonyl oder (C₁-C₄)-Alkylcarbonyl;

30 R³⁸ Wasserstoff;

R³⁹ Halogen, Nitro, (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₁-C₄)-Haloalkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, Phenyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, Cyano, (C₁-C₄)-Alkylthio, (C₁-C₄)-


Alkylsulfinyl, (C₁-C₄)-Alkylsulfonyl, (C₁-C₄)-Alkoxy-carbonyl oder (C₁-C₄)-Alkylcarbonyl;

n 0, 1 oder 2 und

m 1 oder 2 bedeuten.

5

Insbesondere Verbindungen vom Typ der Acylsulfamoylbenzoesäureamide der nachfolgenden Formel (S-VII), die z.B. bekannt sind aus WO-A-99/16744,



worin

- 10 R²¹ = Cyclo-Propyl und R²² = H ist (S3-1 =
4-Cyclopropylaminocarbonyl-N-(2-methoxybenzoyl)benzolsulfonamid;
Cyprosulfamide);

R²¹ = Cyclo-Propyl und R²² = 5-Cl ist (S3-2),


R²¹ = Ethyl und R²² = H ist (S3-3),

- 15 R²¹ = iso-Propyl und R²² = 5-Cl ist (S3-4) und

R²¹ = iso-Propyl und R²² = H ist (S3-5 =


4-iso-propylaminocarbonyl-N-(2-methoxybenzoyl)benzolsulfonamid);

- e) Verbindungen vom Typ der N-Acylsulfamoylphenylharnstoffe der Formel
20 (S-VIII), die z.B. bekannt sind aus der EP-A-365484,




worin


A für einen Rest aus der Gruppe



R^a und R^b unabhängig voneinander für Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkynyl,



oder durch C_1 - C_4 -Alkoxy oder



substituiertes C_1 - C_4 -Alkoxy, oder

- 5 R^a und R^b gemeinsam für eine C_4 - C_6 -Alkylenbrücke oder eine durch Sauerstoff, Schwefel, SO, SO₂, NH oder -N(C_1 - C_4 -Alkyl)- unterbrochene C_4 - C_6 -Alkylenbrücke,

R^Y für Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl,

R^a und R^b unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Cyan, Nitro,

- 10 Trifluormethyl, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkylthio, C_1 - C_4 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkylsulfonyl, -COORⁱ, -CONR^kR^m, -CORⁿ, -SO₂NR^kR^m oder -OSO₂- C_1 - C_4 -Alkyl, oder R^a und R^b gemeinsam für eine C_3 - C_4 -Alkylenbrücke, die durch Halogen oder C_1 - C_4 -Alkyl substituiert sein kann, oder eine C_3 - C_4 -Alkenylenbrücke, die durch Halogen oder C_1 - C_4 -Alkyl substituiert sein kann,
- 15 oder eine C_4 -Alkadienylenbrücke, die durch Halogen oder C_1 - C_4 -Alkyl substituiert sein kann, und

R^g und R^h unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, Trifluormethyl, Methoxy, Methylthio oder -COOR^j stehen, wobei

R^c Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl oder Methoxy,

R^d Wasserstoff, Halogen, Nitro, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkylthio, C_1 - C_4 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkylsulfonyl, $-COOR^j$ oder $-CONR^kR^m$,

R^e Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, $-COOR^j$, Trifluormethyl oder Methoxy, oder R^d und R^e gemeinsam für eine C_3 - C_4 -Alkylenbrücke,

5 R^f Wasserstoff, Halogen oder C_1 - C_4 -Alkyl,

R^x und R^y unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkylthio, $-COOR^4$, Trifluormethyl, Nitro oder Cyan,

R^j , R^k und R^m unabhängig voneinander Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl,

R^k und R^m gemeinsam eine C_4 - C_6 -Alkylenbrücke oder eine durch Sauerstoff, NH
10 oder $-N(C_1-C_4\text{-Alkyl})$ - unterbrochene C_4 - C_6 -Alkylenbrücke, und

R^n C_1 - C_4 -Alkyl, Phenyl oder durch Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, Methoxy, Nitro oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl bedeuten;

vorzugsweise Safener der Formel (S-VIII) sind

1-[4-(N-2-Methoxybenzoylsulfamoyl)phenyl]-3-methylharnstoff,

15 1-[4-(N-2-Methoxybenzoylsulfamoyl)phenyl]-3,3-dimethylharnstoff,

1-[4-(N-4,5-Dimethylbenzoylsulfamoyl)phenyl]-3-methylharnstoff,

1-[4-(N-Naphthoylsulfamoyl)phenyl]-3,3-dimethylharnstoff,

einschließlich der Stereoisomeren und der in der Landwirtschaft gebräuchlichen Salze.

20

Sofern es im Einzelnen nicht anders definiert wird, gelten für die Reste in den Formeln zu (S-II) bis (S-VIII) im Allgemeinen die folgenden Definitionen.

Die Reste Alkyl, Alkoxy, Haloalkyl, Haloalkoxy, Alkylamino und Alkylthio sowie die entsprechenden ungesättigten und/oder substituierten Reste können im

25 Kohlenstoffgerüst jeweils geradkettig oder verzweigt sein.

Alkylreste, auch in den zusammengesetzten Bedeutungen wie Alkoxy, Haloalkyl usw. haben vorzugsweise 1 bis 4 C-Atome und, bedeuten z.B. Methyl, Ethyl, n- oder i-Propyl, n-, i-, t- oder 2-Butyl. Alkenyl- und Alkynylreste haben die Bedeutung der den Alkylresten entsprechenden möglichen ungesättigten Reste; Alkenyl bedeutet
30 z.B. Allyl, 1-Methylprop-2-en-1-yl, 2-Methyl-prop-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-1-yl, 1-Methyl-but-3-en-1-yl und 1-Methyl-but-2-en-1-yl. Alkynyl bedeutet z.B. Propargyl, But-2-in-1-yl, But-3-in-1-yl, 1-Methyl-but-3-in-1-yl. " (C_1-C_4) -Alkyl" ist die

Kurzschreibweise für Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen; entsprechendes gilt für andere allgemeine Restedefinitionen mit in Klammern angegebenen Bereichen für die mögliche Anzahl von C-Atomen.

Cycloalkyl bedeutet bevorzugt einen cyclischen Alkylrest mit 3 bis 8, vorzugsweise 3 bis 7, besonders bevorzugt 3 bis 6 C-Atomen, beispielsweise Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl. Cycloalkenyl und Cycloalkinyl bezeichnen entsprechende ungesättigte Verbindungen.

Halogen bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Iod. Haloalkyl, Haloalkenyl und Haloalkinyl bedeuten durch Halogen, vorzugsweise durch Fluor, Chlor und/oder

10 Brom, insbesondere durch Fluor oder Chlor, teilweise oder vollständig substituiertes Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl, z.B. CF_3 , CHF_2 , CH_2F , CF_2CF_3 , CH_2CHFCl , CCl_3 , CHCl_2 , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$. Haloalkoxy ist z.B. OCF_3 , OCHF_2 , OCH_2F , OCF_2CF_3 , OCH_2CF_3 und $\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$. Entsprechendes gilt für sonstige Halogen substituierte Reste.

Ein Kohlenwasserstoffrest kann ein aromatischer oder ein aliphatischer

15 Kohlenwasserstoffrest sein, wobei ein aliphatischer Kohlenwasserstoffrest im allgemeinen ein geradkettiger oder verzweigter gesättigter oder ungesättigter Kohlenwasserstoffrest ist, vorzugsweise mit 1 bis 18, besonders bevorzugt 1 bis 12 C-Atomen, z.B. Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl.

Vorzugsweise bedeutet aliphatischer Kohlenwasserstoffrest Alkyl, Alkenyl oder

20 Alkinyl mit bis zu 12 C-Atomen; entsprechendes gilt für einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest in einem Kohlenwasserstoffoxyrest.

Aryl ist im allgemeinen ein mono-, bi- oder polycyclisches aromatisches System mit vorzugsweise 6-20 C-Atomen, bevorzugt 6 bis 14 C-Atomen, besonders bevorzugt 6 bis 10 C-Atomen, z.B. Phenyl, Naphthyl, Tetrahydronaphthyl, Indenyl, Indanyl,

25 Pentalenyl und Fluorenyl, besonders bevorzugt Phenyl.

Heterocyclischer Ring, heterocyclischer Rest oder Heterocyclyl bedeutet ein mono-, bi- oder polycyclisches Ringsystem, das gesättigt, ungesättigt und/oder aromatisch ist und eine oder mehrere, vorzugsweise 1 bis 4, Heteroatome, vorzugsweise aus der Gruppe N, S und O, enthält.

30 Bevorzugt sind gesättigte Heterocyclen mit 3 bis 7 Ringatomen und einem oder zwei Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S, wobei die Chalcogene nicht benachbart sind. Besonders bevorzugt sind monocyclische Ringe mit 3 bis 7 Ringatomen und

44

einem Heteroatom aus der Gruppe N, O und S, sowie Morpholin, Dioxolan, Piperazin, Imidazolin und Oxazolidin. Ganz besonders bevorzugte gesättigte Heterocyclen sind Oxiran, Pyrrolidon, Morpholin und Tetrahydrofuran.

Bevorzugt sind auch teilweise ungesättigte Heterocyclen mit 5 bis 7 Ringatomen und

- 5 einem oder zwei Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S. Besonders bevorzugt sind teilweise ungesättigte Heterocyclen mit 5 bis 6 Ringatomen und einem Heteroatom aus der Gruppe N, O und S. Ganz besonders bevorzugte teilweise ungesättigte Heterocyclen sind Pyrazolin, Imidazolin und Isoxazolin.

Ebenso bevorzugt ist Heteroaryl, z.B. mono- oder bicyclische aromatische

- 10 Heterocyclen mit 5 bis 6 Ringatomen, die ein bis vier Heteroatome aus der Gruppe N, O, S enthalten, wobei die Chalcogene nicht benachbart sind. Besonders bevorzugt sind monocyclische aromatische Heterocyclen mit 5 bis 6 Ringatomen, die ein Heteroatom aus der Gruppe, N, O und S enthalten, sowie Pyrimidin, Pyrazin, Pyridazin, Oxazol, Thiazol, Thiadiazol, Oxadiazol, Pyrazol, Triazol und Isoxazol.

- 15 Ganz besonders bevorzugt sind Pyrazol, Thiazol, Triazol und Furan.

Substituierte Reste, wie substituierte Kohlenwasserstoffreste, z.B. substituiertes Alkyl, Alkenyl, Alkynyl, Aryl wie Phenyl und Arylalkyl wie Benzyl, oder substituiertes Heterocyclyl, bedeuten einen vom unsubstituierten Grundkörper abgeleiteten substituierten Rest, wobei die Substituenten vorzugsweise einen oder mehrere,

- 20 vorzugsweise 1, 2 oder 3, im Falle von Cl und F auch bis zur maximal möglichen Anzahl, Substituenten aus der Gruppe Halogen, Alkoxy, Haloalkoxy, Alkylthio, Hydroxy, Amino, Nitro, Carboxy, Cyano, Azido, Alkoxycarbonyl, Alkylcarbonyl, Formyl, Carbamoyl, Mono- und Dialkylaminocarbonyl, substituiertes Amino wie Acylamino, Mono- und Dialkylamino und Alkylsulfinyl, Haloalkylsulfinyl, Alkylsulfonyl, Haloalkylsulfonyl und, im Falle cyclischer Reste, auch Alkyl und Haloalkyl sowie den genannten gesättigten kohlenwasserstoffhaltigen Substituenten entsprechende ungesättigte aliphatische Substituenten, vorzugsweise Alkenyl, Alkynyl, Alkenyloxy, Alkynyloxy, bedeuten. Bei Resten mit C-Atomen sind solche mit 1 bis 4 C-Atomen, insbesondere 1 oder 2 C-Atomen, bevorzugt. Bevorzugt sind in der Regel

- 30 Substituenten aus der Gruppe Halogen, z.B. Fluor oder Chlor, (C₁-C₄)Alkyl, vorzugsweise Methyl oder Ethyl, (C₁-C₄)Haloalkyl, vorzugsweise Trifluormethyl, (C₁-C₄)Alkoxy, vorzugsweise Methoxy oder Ethoxy, (C₁-C₄)Haloalkoxy, Nitro und

Cyano. Besonders bevorzugt sind dabei die Substituenten Methyl, Methoxy und Chlor.

Mono- oder disubstituiertes Amino bedeutet einen chemisch stabilen Rest aus der Gruppe der substituierten Aminoreste, welche beispielsweise durch einen oder zwei gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe Alkyl, Alkoxy, Acyl und Aryl N-substituiert sind; vorzugsweise Monoalkylamino, Dialkylamino, Acylamino, Arylamino, N-Alkyl-N-Arylamino sowie N-Heterocyclen. Dabei sind Alkylreste mit 1 bis 4 C-Atomen bevorzugt. Aryl ist dabei vorzugsweise Phenyl. Substituiertes Aryl ist dabei vorzugsweise substituiertes Phenyl. Für Acyl gilt dabei die weiter unten genannte Definition, vorzugsweise (C₁-C₄)Alkanoyl. Entsprechendes gilt für substituiertes Hydroxylamino oder Hydrazino.

Gegebenenfalls substituiertes Phenyl ist vorzugsweise Phenyl, das unsubstituiert oder ein- oder mehrfach, vorzugsweise bis zu dreifach, bei Halogen wie Cl und F auch bis zu fünffach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe Halogen, (C₁-C₄)Alkyl, (C₁-C₄)Alkoxy, (C₁-C₄)Haloalkyl, (C₁-C₄)Haloalkoxy und Nitro substituiert ist, z.B. o-, m- und p-Tolyl, Dimethylphenyle, 2-, 3- und 4-Chlorphenyl, 2-, 3- und 4-Trifluor- und -Trichlorphenyl, 2,4-, 3,5-, 2,5- und 2,3-Dichlorphenyl, o-, m- und p-Methoxyphenyl.

Ein Acylrest bedeutet den Rest einer organischen Säure mit vorzugsweise bis zu 6 C-Atomen, z.B. den Rest einer Carbonsäure und Reste davon abgeleiteter Säuren wie der Thiocarbonsäure, gegebenenfalls N-substituierter Iminocarbonsäuren, oder der Rest von Kohlensäuremonoestern, gegebenenfalls N-substituierter Carbaminsäuren, Sulfonsäuren, Sulfinsäuren, Phosphonsäuren, Phosphinsäuren.

Acyl bedeutet beispielsweise Formyl, Alkylcarbonyl, wie (C₁-C₄-Alkyl)-carbonyl, Phenylcarbonyl, wobei der Phenylring substituiert sein kann, z.B. wie oben für Phenyl angegeben, oder Alkyloxycarbonyl, Phenyloxycarbonyl, Benzyloxycarbonyl, Alkylsulfonyl, Alkylsulfinyl oder N-Alkyl-1-iminoalkyl.

Von den Formeln (S-II) bis (S-VIII) umfasst sind auch alle Stereoisomeren, welche die gleiche topologische Verknüpfung der Atome aufweisen, und deren Gemische.

Solche Verbindungen enthalten ein oder mehrere asymmetrische C-Atome oder auch Doppelbindungen, die in den allgemeinen Formeln nicht gesondert angegeben sind. Die durch ihre spezifische Raumform definierten möglichen Stereoisomeren,

wie Enantiomere, Diastereomere, Z- und E-Isomere, können nach üblichen Methoden aus Gemischen der Stereoisomeren erhalten oder auch durch stereoselektive Reaktionen in Kombination mit dem Einsatz von stereochemisch reinen Ausgangsstoffen hergestellt werden.

5

Die Verbindungen der Formel (S-II) sind z.B. aus EP-A-0333131 (ZA-89/1960), EP-A-0269806 (US 4,891,057), EP-A-0346620 (AU-A-89/34951), EP-A-0174562, EP-A-0346620 (WO-A-91/08202), WO-A-91/07874 oder WO-A-95/07897 (ZA 94/7120) und der dort zitierten Literatur bekannt oder können nach oder analog den dort beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Die Verbindungen der Formel (S-III) sind aus EP-A-0086750, EP-A-094349 (US 4,902,340), EP-A-0191736 (US 4,881,966) und EP-A-0492366 und dort zitierter Literatur bekannt oder können nach oder analog den dort beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Einige Verbindungen sind ferner in EP-A-0582198 und WO-A-02/34048 beschrieben. Die Verbindungen der Formel (S-IV) sind aus zahlreichen Patentanmeldungen bekannt, beispielsweise US 4,021,224 und US 4,021,229. Verbindungen der Untergruppe b) sind weiterhin aus CN-A-87/102789, EP-A-365484 sowie aus "The Pesticide Manual", 11. bis 13. Auflage, British Crop Protection Council and the Royal Society of Chemistry (1997), bekannt. Die Verbindungen der Untergruppe c) sind in der WO-A-97/45016, die der Untergruppe d) in der WO-A-99/16744 (insbesondere in EP-A-365484) beschrieben. Die zitierten Schriften enthalten ausführliche Angaben zu Herstellungsverfahren und Ausgangsmaterialien und nennen bevorzugte Verbindungen. Auf diese Schriften wird ausdrücklich Bezug genommen, sie gelten durch Zitat als Bestandteil dieser Beschreibung.

25

Die Safener der vorstehenden Gruppen a) bis e) reduzieren oder unterbinden phytotoxische Effekte, die beim Einsatz der herbiziden Mittel gemäß der Erfindung in Nutzpflanzenkulturen auftreten können, ohne die Wirksamkeit der Herbizide gegen Schadpflanzen zu beeinträchtigen. Hierdurch kann das Einsatzgebiet der Herbizide erheblich erweitert werden und insbesondere ist durch die Verwendung von Safenern der Einsatz von Herbiziden, die bislang nur beschränkt oder mit nicht ausreichendem Erfolg eingesetzt werden konnten, d.h. von Kombinationen, die ohne

30

Safener in niedrigen Dosierungen mit wenig Breitenwirkung zu nicht ausreichender Kontrolle der Schadpflanzen führten.

Besonders bevorzugt kommen sind als Safener in den erfindungsgemäßen

- 5 Formulierungen unter anderem: 4-Dichloracetyl-1-oxa-4-aza-spiro[4.5]-decan (AD-67), 1-Dichloracetyl-hexahydro-3,3,8a-trimethylpyrrolo[1,2-a]-pyrimidin-6(2H)-on (Dicyclonon, BAS-145138), 4-Dichloracetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazin (Benoxacor), Cloquintocet, 5-Chlor-chinolin-8-oxy-essigsäure-(1-methyl-hexylester) (Cloquintocet-mexyl), α -(Cyanomethoxyimino)-phenylacetonitril (Cyometrinil), 2,2-
- 10 Dichlor-N-(2-oxo-2-(2-propenylamino)-ethyl)-N-(2-propenyl)-acetamid (DKA-24), 2,2-Dichlor-N,N-di-2-propenyl-acetamid (Dichlormid), N-(4-Methyl-phenyl)-N'-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-harnstoff (Dymron), 4,6-Dichlor-2-phenyl-pyrimidin (Fenclorim), 1-(2,4-Dichlor-phenyl)-5-trichlormethyl-1H-1,2,4-triazol-3-carbonsäure-ethylester (Fenchlorazol-ethyl), 2-Chlor-4-trifluormethyl-thiazol-5-carbonsäure-
- 15 phenylmethylester (Flurazole), 4-Chlor-N-(1,3-dioxolan-2-yl-methoxy)- α -trifluoracetophenonoxim (Fluxofenim), 3-Dichloracetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin (Furilazole, MON-13900), Ethyl-4,5-dihydro-5,5-diphenyl-3-isoxazolcarboxylat (Isoxadifen-ethyl), Diethyl-1-(2,4-dichlorphenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazol-3,5-dicarboxylat (Mefenpyr-diethyl), 2-Dichlormethyl-2-methyl-1,3-dioxolan (MG-191),
- 20 1,8-Naphthalsäureanhydrid, α -(1,3-Dioxolan-2-yl-methoximino)-phenylacetonitril (Oxabetrinil), 2,2-Dichlor-N-(1,3-dioxolan-2-yl-methyl)-N-(2-propenyl)-acetamid (PPG-1292), 3-Dichloracetyl-2,2-dimethyl-oxazolidin (R-28725), 3-Dichloracetyl-2,2,5-trimethyl-oxazolidin (R-29148), 1-(2-Chlor-phenyl)-5-phenyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure-methylester, 4-Cyclopropylaminocarbonyl-N-(2-
- 25 methoxybenzoyl)benzolsulfonamid (Cyprosulfamide), 4-iso-propylaminocarbonyl-N-(2-methoxybenzoyl)benzolsulfonamid und N-(2-Methoxy-benzoyl)-4-[(methylamino-carbonyl)-amino]-benzolsulfonamid.

Ganz besonders bevorzugt sind die Safenern Mefenpyr-diethyl, Cloquintocet-mexyl,

- 30 Isoxadifen-ethyl, 4-Cyclopropylaminocarbonyl-N-(2-methoxybenzoyl)benzolsulfonamid (Cyprosulfamide), 4-iso-propylaminocarbonyl-N-(2-methoxybenzoyl)benzolsulfonamid oder Fenchlorazol-ethyl; insbesondere ganz

besonders bevorzugt sind Mefenpyr-diethyl, Cloquintocet-mexyl oder Isoxadifen-ethyl.

- 5 Besondere Ausführungsformen der Erfindung sind das Verfahren zur Förderung der Penetration und dessen Verwendung, wobei TBEP in den erfindungsgemäßen Mengen (B) mit Mischungen von Herbiziden und Safener (A), entweder gleichzeitig oder sequentiell appliziert wird.

- 10 Bevorzugte Herbizid-Safener-Mischungen sind Kombinationen der folgenden Verbindungen miteinander:

- a) Verbindungen, die als ACCase-Inhibitoren wirksam sind, wie Alloxydim, Butroxydim, Clethodim, Clodinafop-propargyl, Cycloxydim, Cyhalofop-butyl, Diclofop-methyl, Fenoxaprop, Fenoxaprop-ethyl, Fenoxaprop-P, Fenoxaprop-P-ethyl, 15 Fluazifop, Fluazifop-P-butyl, Fluazifop-butyl, Haloxyfop, Haloxyfop-P, Haloxyfop-etotyl, Haloxyfop-P-methyl, Metamifop, Profoxydim, Propaquizafop, Quizalofop-P-tefuryl, Quizalofop-P-ethyl, Sethoxydim, Tepraloxydim, Tralkoxydim und Isoxapyrifop,
- 20 b) Verbindungen, die als *p*-Hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase (HPPD)-Inhibitoren wirksam sind, wie Benzobicyclon, Benzofenap, Isoxaflutole und dessen Diketonitrile, Mesotrione, Pyrazolynate, Pyrazoxyfen, Sulcotrione und Isoxachlortole,
- c) Verbindungen verschiedener Wirkstoffgruppen, wie Atrazin, Acetochlor, Aclonifen, 25 Alachlor, Amidochlor, Amidosulfuron, Azimsulfuron, Bentazon, Bensulfuron(-methyl), Bromoxynil(-octanoat/-heptanoat), Butachlor, Bispyribac, Chlorsulfuron, Chlorimuron, Clomazone, Clopyralid, Cinosulfuron, Cyclosulfamuron, 2,4-D-Ester, 2,4-DB-Ester, 2,4-DP-Ester, CMPP-Ester, MCPA-Ester, MCPB, EPTC, Desmedipham, Diflufenican, Dicamba, Ethoxysulfuron, Ethofumesat, Flazasulfuron, Florasulam, 30 Flucarbazone, Flumetsulam, Flufenacet, Fluoroglykufen, Fluroxypyr, Flupyrsulfuron, Foramsulfuron, Flumioxazin, Flumiclorac, Fomesafen, Glufosinate, Glyphosate, Imazapyr, Imazosulfuron, Iodosulfuron, Iodosulfuron-methyl, Ioxynil(-octanoat),

Lactofen, Halosulfuron, Imazamox, Imazapic, Imazapyr, Imazethapyr, Imazaquin, Metosulam, Mesosulfuron(-methyl), (S-)Metolachlor, Metsulfuron-methyl, Metamitron, Nicosulfuron, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Phenmedipham, Picloram, Pinoxaden, Primisulfuron-methyl, Prosulfuron, Propanil, Propoxycarbazone,

- 5 Pyrazosulfuron(-methyl), Rimsulfuron, Sulfentrazone, Sulfosulfuron, Sulfometuron, Terbutylazin, Thifensulfuron, Triasulfuron, Tribenuron, Triclopyr, Triflusulfuron-methyl, Trifluralin, Tritosulfuron, Topramezone, Oxazinon, Oxadiargyl, Metribuzin, und deren Salze, z.B. die Natriumsalze.

- 10 d) Verbindungen, die als Safener wirksam sind, wie AD 67 (4-(dichloroacetyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane), Benoxacor, CL 304,415 (4-carboxymethylchroman-4-carboxylic acid), Cloquintocet, Cloquintocet-mexyl, Cyprosulfamide, Dichlormid, Dicyclonon, DKA-24 (N1,N2-diallyl-N2-dichloroacetylglycinamide), Fenchlorazole, Fenchlorazole-ethyl, Fenclozim, Flurazole, Fluxofenim, Furilazole, Isoxadifen-ethyl,
- 15 Mefenpyr-diethyl, MG 191 (2-dichloromethyl-2-methyl-1,3-dioxolane), Naphthalsäureanhydrid (naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride), Oxabetrinil and TI-35 (1-dichloroacetylazepane).

- In einer weiteren Ausführungsform können z.B. verschiedene Herbizide miteinander
- 20 kombiniert werden, z.B. Fenoxaprop-p-ethyl + Ioxynil-octanoat, Diclofop-methyl + Bromoxynil-octanoat, CMPP + Bromoxynil-octanoat, MCPA + Ioxynil-octanoat, Bromoxynil-octanoat + Bromoxynil-heptanoat, Bromoxynil-octanoat + Bromoxynil-heptanoat + MCPA, Bromoxynil-octanoat + Bromoxynil-heptanoat + 2,4-D, Phenmedipham + Desmedipham, Phenmedipham + Desmedipham + Ethofumesate,
- 25 Metamitron + Ethofumesate, Phenmedipham + Ethofumesate + Metamitron, Fenoxaprop-p-ethyl + Iodosulfuron-methyl-natrium, Fenoxaprop-p-ethyl + Diclofop-methyl, Fenoxaprop-p-ethyl + Iodosulfuron-methyl-natrium + Diclofop-methyl.

- Als besonders bevorzugt sind die Kombinationen aus: Foramsulfuron + Iodosulfuron-
- 30 methyl-sodium + Isoxadifen-ethyl, Iodosulfuron-methyl-sodium + Isoxadifen-ethyl, Foramsulfuron + Isoxadifen-ethyl, Fenoxaprop-P-ethyl + Ethoxysulfuron + Isoxadifen-ethyl, Ethoxysulfuron + Isoxadifen-ethyl, Fenoxaprop-P-ethyl +

50

- Isoxadifen-ethyl, Iodosulfuron-methyl-sodium + Mesosulfuron-methyl + Mefenpyr-diethyl, Mesosulfuron-methyl + Mefenpyr-diethyl, Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl, Fenoxaprop-P-ethyl + Mefenpyr-diethyl, Fenoxaprop-P-ethyl + Diclofop-methyl + Mefenpyr-diethyl, Diclofop-methyl + Mefenpyr-diethyl, Diclofop-methyl + Sethoxydim + Mefenpyr-diethyl, Sethoxydim + Mefenpyr-diethyl, Fenoxaprop-P-ethyl + Isoproturon + Mefenpyr-diethyl, Isoproturon + Mefenpyr-diethyl, Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl, Fenoxaprop-ethyl + Fenchlorazole-ethyl, Fenoxaprop-P-ethyl + Fenchlorazole-ethyl, Flucarbazone + Cyprosulfamide, Foramsulfuron + Cyprosulfamide, Iodosulfuron(-methyl) +
- 5 10 Cyprosulfamide, Metosulam + Cyprosulfamide, Metsulfuron(-methyl) + Cyprosulfamide, Nicosulfuron + Cyprosulfamide, Primisulfuron(.methyl) + Cyprosulfamide, Prosulfuron + Cyprosulfamide, Thifensulfuron + Cyprosulfamide, Tribenuron + Cyprosulfamide, Cloransulam-methyl + Cyprosulfamide, Chlorimuron + Cyprosulfamide, Ethoxysulfuron + Cyprosulfamide, Flazasulfuron + Cyprosulfamide,
- 15 Florasulam + Cyprosulfamide, Flumetsulam + Cyprosulfamide, Halosulfuron + Cyprosulfamide, Imazamox + Cyprosulfamide, Imazapic + Cyprosulfamide, Imazapyr + Cyprosulfamide, Imazethapyr + Cyprosulfamide, Mesosulfuron + Cyprosulfamide, Propoxycarbazone + Cyprosulfamide, Sulfosulfuron + Cyprosulfamide, Amidosulfuron + Cyprosulfamide, Chlorsulfuron + Cyprosulfamide, Imazaquin +
- 20 Cyprosulfamide, Triasulfuron + Cyprosulfamide, Sulfometuron + Cyprosulfamide, Cyclosulfamuron + Cyprosulfamide, Flupyrsulfuron + Cyprosulfamide, Pyrazosulfuron + Cyprosulfamide, Azimsulfuron + Cyprosulfamide, Bensulfuron + Cyprosulfamide, Bispyribac + Cyprosulfamide, Rimsulfuron + Cyprosulfamide, Tritosulfuron + Cyprosulfamide, Sulcotrione + Cyprosulfamide, Clomazone +
- 25 Cyprosulfamide, Mesotrione + Cyprosulfamide, Topramezone + Cyprosulfamide, Metribuzin + Cyprosulfamide, Bentazon + Cyprosulfamide, Bromoxynil + Cyprosulfamide, Propanil + Cyprosulfamide, Atrazin + Cyprosulfamide, Terbutylazin + Cyprosulfamide, EPTC + Cyprosulfamide, Tepraloxydim + Cyprosulfamide, Clethodim + Cyprosulfamide, Alloyxdim + Cyprosulfamide, Sethoxydim +
- 30 Cyprosulfamide, Tralkoxydim + Cyprosulfamide, Clodinafop-propargyl + Cyprosulfamide, Cyhalofop-butyl + Cyprosulfamide, Diclofop-methyl + Cyprosulfamide, Fenoxaprop-P-ethyl + Cyprosulfamide, Fluazifop-P-butyl +

- Cyprosulfamide, Haloxyfop-methyl + Cyprosulfamide, Haloxyfop-etotyl +
 Cyprosulfamide, Haloxyfop-R-methyl + Cyprosulfamide, Haloxyfop-ethoxyethyl +
 Cyprosulfamide, Propaquizafop + Cyprosulfamide, Quizalofop-P-tefuryl +
 Cyprosulfamide, Quizalofop-P-ethyl + Cyprosulfamide, Acetochlor + Cyprosulfamide,
 5 S-Metolachlor + Cyprosulfamide, Flumioxazin + Cyprosulfamide, Flumiclorac +
 Cyprosulfamide, Fomesafen + Cyprosulfamide, Sulfentrazone + Cyprosulfamide,
 Dicamba + Cyprosulfamide, MCPA + Cyprosulfamide, MCPB + Cyprosulfamide, 2,4-
 D + Cyprosulfamide, Clopyralid + Cyprosulfamide, Fluroxypyr + Cyprosulfamide,
 Picloram + Cyprosulfamide, Triclopyr + Cyprosulfamide, Glufosinate +
 10 Cyprosulfamide, Glyphosate + Cyprosulfamide und Pendimethalin + Cyprosulfamide.

- Das Gewichtsverhältnis Safener : Herbizid kann innerhalb weiter Grenzen variieren
 und liegt vorzugsweise im Bereich von 1 : 100 bis 100 : 1, insbesondere von 1 : 100
 bis 50 : 1, ganz besonders bevorzugt 1 : 10 bis 10 : 1. Die jeweils optimalen Mengen
 15 an Herbizid(en) und Safener(n) sind üblicherweise vom Typ des Herbizids und/oder
 vom verwendeten Safener sowie von der Art des zu behandelnden
 Pflanzenbestandes abhängig.

- Ganz besonders bevorzugt in den erfindungsgemäßen Pflanzenschutzmittel sind
 20 Herbizide aus der Gruppe der ACCase-Inhibitoren, wie Alloxydim, Butroxydim,
 Clethodim, Clodinafop-propargyl, Cycloxydim, Cyhalofop-butyl, Diclofop-methyl,
 Fenoxaprop, Fenoxaprop-ethyl, Fenoxaprop-P, Fenoxaprop-P-ethyl, Fluazifop,
 Fluazifop-P-butyl, Fluazifop-butyl, Haloxyfop, Haloxyfop-P, Haloxyfop-etotyl,
 Haloxyfop-P-methyl, Metamifop, Profoxydim, Propaquizafop, Quizalofop-P-tefuryl,
 25 Quizalofop-P-ethyl, Sethoxydim, Tepraloxydim, Tralkoxydim und Isoxapyrifop; aus
 der Gruppe der p-Hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase (HPPD)-Inhibitoren, wie
 Benzobicyclon, Benzofenap, Isoxaflutole und dessen Diketonitrile, Mesotrione,
 Pyrazolynate, Pyrazoxyfen, Sulcotrione und Isoxachlortole; aus der Gruppe der ALS-
 Inhibitoren, Hydroxybenzonitrile und weiterer verschiedener Wirkstoffgruppen, wie
 30 Atrazin, Acetochlor, Aclonifen, Alachlor, Amidochlor, Amidosulfuron, Azimsulfuron,
 Bentazon, Bensulfuron(-methyl), Bromoxynil(-octanoat/-heptanoat), Butachlor,
 Bispyribac, Chlorsulfuron, Chlorimuron, Clomazone, Clopyralid, Cinosulfuron,
 Cyclosulfamuron, 2,4-D-Ester, 2,4-DB-Ester, 2,4-DP-Ester, CMPP-Ester, MCPA-

Ester, MCPB, EPTC, Desmedipham, Diflufenican, Dicamba, Ethoxysulfuron,
 Ethofumesat, Flazasulfuron, Florasulam, Flucarbazone, Flumetsulam, Flufenacet,
 Fluoroglykofen, Fluroxypyr, Flupyrsulfuron, Foramsulfuron, Flumioxazin, Flumiclorac,
 Fomesafen, Glufosinate, Glyphosate, Imazapyr, Imazosulfuron, Iodosulfuron,
 5 Iodosulfuron-methyl, Ioxynil(-octanoat), Lactofen, Halosulfuron, Imazamox, Imazapic,
 Imazapyr, Imazethapyr, Imazaquin, Metosulam, Mesosulfuron(-methyl), (S-
)Metolachlor, Metsulfuron-methyl, Metamitron, Nicosulfuron, Oxyfluorfen,
 Pendimethalin, Phenmedipham, Picloram, Pinoxaden, Primisulfuron-methyl,
 Prosulfuron, Propanil, Propoxycarbazon, Pyrazosulfuron(-methyl), Rimsulfuron,
 10 Sulfentrazone, Sulfosulfuron, Sulfometuron, Terbutylazin, Thifensulfuron,
 Triasulfuron, Tribenuron, Triclopyr, Triflursulfuron-methyl, Trifluralin, Tritosulfuron,
 Topramezone, Oxazinon, Oxadiargyl, Metribuzin, und deren Salze, z.B. die
 Natriumsalze; aus der Gruppe der Pflanzenwuchsregulatoren, wie Ethephon,
 Cyclanilide und Thidiazuron; aus der Gruppe der Safener, wie AD 67 (4-
 15 (dichloroacetyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane), Benoxacor, CL 304,415 (4-
 carboxymethylchroman-4-carboxylic acid), Cloquintocet, Cloquintocet-mexyl,
 Cyprosulfamide, Dichlormid, Dicyclonon, DKA-24 (N1,N2-diallyl-N2-
 dichloroacetyl-glycinamide), Fenchlorazole, Fenchlorazole-ethyl, Fenclozim,
 Flurazole, Fluxofenim, Furilazole, Isoxadifen-ethyl, Mefenpyr-diethyl, MG 191 (2-
 20 dichloromethyl-2-methyl-1,3-dioxolane), Naphthalsäureanhydrid (naphthalene-1,8-
 dicarboxylic anhydride), Oxabetrinil and TI-35 (1-dichloroacetylazepane); sowie
 Mischungen aus Herbiziden und Safenern, wie Isoxadifen-ethyl-Mischungen mit
 Foramsulfuron, Iodosulfuron-methyl-sodium, Fenoxaprop-P-ethyl, Ethoxysulfuron,
 wie Mefenpyr-diethyl-Mischungen mit Iodosulfuron-methyl-sodium, Mesosulfuron-
 25 methyl, Fenoxaprop-P-ethyl, Diclofop-methyl, Sethoxydim, Isoproturon, wie
 Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl, wie Fenoxaprop-P-ethyl +
 Fenchlorazole-ethyl, wie Cyprosulfamide-Mischungen mit Flucarbazone,
 Foramsulfuron, Iodosulfuron(-methyl), Metosulam, Metsulfuron(-methyl),
 Nicosulfuron, Primisulfuron(-methyl), Prosulfuron, Thifensulfuron, Tribenuron,
 30 Cloransulam-methyl, Chlorimuron, Ethoxysulfuron, Flazasulfuron, Florasulam,
 Flumetsulam, Halosulfuron, Imazamox, Imazapic, Imazapyr, Imazethapyr,
 Mesosulfuron, Propoxycarbazon, Sulfosulfuron, Amidosulfuron, Chlorsulfuron,

53

Imazaquin, Triasulfuron, Sulfometuron, Cyclosulfamuron, Flupyrsulfuron,
Pyrazosulfuron, Azimsulfuron, Bensulfuron, Bispyribac, Rimsulfuron, Tritosulfuron,
Sulcotrione, Clomazone, Mesotrione, Topramezone, Metribuzin, Bentazon,
Bromoxynil, Propanil, Atrazin, Terbutylazin, EPTC, Tepraloxydim, Clethodim,
5 Alloyxdim, Sethoxydim, Tralkoxydim, Clodinafop-propargyl, Cyhalofop-butyl,
Diclofop-methyl, Fenoxaprop-P-ethyl, Fluazifop-P-butyl, Haloxyfop-methyl,
Haloxypop-etotyl, Haloxypop-R-methyl, Haloxypop-ethoxyethyl, Propaquizafop,
Quizalofop-P-tefuryl, Quizalofop-P-ethyl, Acetochlor, S-Metolachlor, Flumioxazin,
Flumiclorac, Fomesafen, Sulfentrazone, Dicamba, MCPA, MCPB, 2,4-D, Clopyralid,
10 Fluroxypyr, Picloram, Triclopyr, Glufosinate, Glyphosate, Pendimethalin.

Die bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittel
enthalten in der Regel 0,01 bis 99 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 95 Gew.-%, der
Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und/oder Safener. Die flächenbezogenen
15 Aufwandmengen der Komponente (A) liegen im allgemeinen zwischen 10 und 2000
g AS/ha (AS = Aktivsubstanz, d. h. Aufwandmenge bezogen auf den aktiven
Wirkstoff), bevorzugt zwischen 50 und 300 g AS/ha.

Tributoxyethylphosphat (TBEP) als Komponente (B) hat die CAS Regno: 78-51-3
20 und wird unter diesem Eintrag in der Fachliteratur in seinen weiteren Eigenschaften
ausführlich beschrieben.

Der Gehalt an TBEP (B) in den bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten
Pflanzenschutzmitteln ist abhängig von der flächenbezogenen Applikationsmenge
25 pro Hektar (ha) und muss daher entsprechend angepasst werden. Dies gilt auch für
die Herstellung einer Applikationslösung, beispielsweise einer Spritzbrühe, beim
Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die flächenbezogenen
Applikationsmengen für TBEP (B) liegen zwischen 2,5 und 150 g/ha, bevorzugt 5 bis
100 g/ha, besonders bevorzugt 10 bis 100 g/ha, wobei das Volumen der Spritzbrühe
30 in der Regel zwischen 100-500 L/ha liegt.

Gegebenenfalls kann als Komponente (C) bei der Herstellung von

Pflanzenschutzmitteln für das erfindungsgemäße Verfahren und/oder der Applikation gemäß des erfindungsgemäßen Verfahrens, bevorzugt in Form von Spritzbrühen, die Zugabe eines oder mehrerer Emulgatoren notwendig sein. Geeignete Emulgatoren sind aus der Gruppe der ionischen und nicht-ionischen Emulgatoren und deren Gemische mit HLB-Werten von 10 bis 17 (z.B. Emulgator 1371B). Sie können entweder direkt und/oder durch die Formulierung der Komponenten (A) und/oder (B) zugesetzt werden.

Die flächenbezogenen Aufwandmengen der Komponente (C) liegen bei der Applikation des erfindungsgemäßen Pflanzenschutzmittels und/oder des erfindungsgemäßen Verfahrens im allgemeinen zwischen 10 und 200 g/ha, bevorzugt zwischen 20 und 200 g/ha.

Als weitere Hilfs - und Zusatzstoffe (Komponente D), die in den, gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren, vorzugsweise flüssige Formulierungen enthalten sein können, kommen alle üblichen Formulierungshilfsmittel in Frage, wie organische Solventien, Entschäumer, von Komponente (C) verschiedene Emulgatoren, Dispergiermittel, Konservierungsmittel, Säuren und Basen, Farbstoffe, Füllstoffe und auch Wasser.

Als organische Solventien kommen alle üblichen organischen Lösungsmittel in Betracht, welche die eingesetzten agrochemischen Wirkstoffe gut lösen. Vorzugsweise genannt seien aliphatische und aromatische, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Toluol, Xylol, Solvesso®, Pflanzen- und Mineralöle, wie Testbenzin, Petroleum, Alkylbenzole und Spindelöl, weiterhin Propylencarbonat, Tetrachlormethan, Chloroform, Methylenchlorid und Dichlormethan, außerdem Ester, wie Ethylacetat, Lactate ferner Lactone, wie Butyrolacton, außerdem Lactame, wie N-Methylpyrrolidon, N-Octylpyrrolidon, N-Dodecylpyrrolidon N-Octylcaprolactam und N-Methylcaprolactam, γ -Butyrolacton, Dimethylformamid sowie Tributylphosphat.

Als Entschäumer kommen übliche, in Formulierungen von agrochemischen

Wirkstoffen vorhandene Entschäumer in Frage. Beispielhaft genannt seien Silikonöle, Dispersionen von Silikonölen, Magnesiumstearat, Phosphin- und Phosphonsäuren, insbesondere Fluowet PL 80®.

- 5 Als von Komponente (C) verschiedene Emulgatoren kommen übliche, in Formulierungen von agrochemischen Wirkstoffen vorhandene oberflächenative Substanzen in Frage. Beispielhaft genannt seien ethoxylierte Nonylphenole, Polyethylenglykolether von linearen Alkoholen, Endgruppen-verschlossene und nicht
- 10 Endgruppen-verschlossene alkoxylierte lineare und verzweigte, gesättigte und ungesättigte Alkohole, Umsetzungsprodukte von Alkylphenolen mit Ethylenoxid und/oder Propylenoxid, Ethylenoxid- Propylenoxid-Blockcopolymere, Polyethylenglykole und Polypropylenglykole, weiterhin Fettsäureester, Endgruppen-verschlossene und nicht Endgruppen-verschlossene alkoxylierte lineare und verzweigte, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, Alkylsulfonate, Alkylsulfate,
- 15 Alkylethersulfate, Arylsulfate, ethoxylierte Arylalkylphenole, wie zum Beispiel Tristyryl-phenol-ethoxylat mit durchschnittlich 16 Ethylenoxid-Einheiten pro Molekül, weiterhin ethoxylierte und propoxylierte Arylalkylphenole sowie sulfatierte oder phosphatierte Arylalkylphenol-ethoxylate bzw. -ethoxy- und -propoxylate.
- 20 Als Dispergiermittel kommen alle üblicherweise in Pflanzenschutzmitteln für diesen Zweck eingesetzten Substanzen in Betracht. Vorzugsweise genannt seien, neben den oben unter von Komponente (C) verschiedenen Emulgatoren genannten Verbindungen, natürliche und synthetische, wasserlösliche Polymere, wie Gelatine, Stärke und Cellulosederivate, insbesondere Celluloseester und Celluloseether,
- 25 ferner Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Polyacrylsäure, Ligninsulfonate, Polymethacrylsäure und Co-Polymerisate aus (Meth)acrylsäure und (Meth)acrylsäureestern, und außerdem auch mit Alkalimetallhydroxid neutralisierte Co-Polymerisate aus Methacrylsäure und Methacrylsäureester.
- 30 Als Konservierungsmittel kommen alle üblicherweise für diesen Zweck in Pflanzenbehandlungsmitteln vorhandenen Substanzen in Betracht. Als Beispiele genannt seien Preventol® und Proxel®.

Als Farbstoffe kommen alle für die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln üblichen anorganischen oder organischen Farbstoffe in Frage. Beispielhaft genannt seien Titandioxid, Farbruß, Zinkoxid und Blaupigmente.

5

Als Füllstoffe kommen alle üblicherweise für diesen Zweck in Pflanzenschutzmitteln eingesetzten Substanzen in Betracht. Vorzugsweise genannt seien anorganische Partikel, wie Carbonate, Silikate und Oxide mit einer mittleren Teilchengröße von 0,005 bis 10 µm, besonders bevorzugt von 0,02 bis 2 µm. Beispielhaft erwähnt seien

10 Siliziumdioxid, sogenannte hochdisperse Kieselsäure, Kieselgele, sowie natürliche und synthetische Silikate und Alumosilikate.

Als Verbindungen, die als Emulsions-Stabilisatoren und/oder Kristallisationsinhibitoren wirken, kommen alle üblicherweise für diesen Zweck in

15 Pflanzenschutzmitteln eingesetzte Substanzen in Betracht.

Der Gehalt an den einzelnen Komponenten in den bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmitteln und die flächenbezogenen Applikationsmenge beim Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens kann innerhalb

20 eines größeren Bereichs variiert werden.

Zu den für die bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmitteln mit den Komponenten (A) und (B) sowie gegebenenfalls den Komponenten (C) und/oder (D) in Frage kommenden Formulierungstypen gehören

25 prinzipiell alle Formulierungen, die auf Pflanzen oder deren Vermehrungsgut ausgebracht werden. Die zu deren Herstellung verwendeten Verfahren sind dem Fachmann allgemein geläufig und beispielsweise beschrieben in Winnacker-Küchler, „Chemische Technologie“ Band 7, C. Hanser Verlag München, 4. Aufl., 1986; J.W. van Valkenburg, „Pesticide Formulations“, Marcel Dekker N.Y., 1973, K. Martens,

30 „Spray Drying Handbook“, 3rd Ed. 1979, G. Goodwin Ltd., London, oder Mollet, Grubenmann, „Formulierungstechnik“, Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 2000.

Daneben kommen für die einzelnen Komponenten des erfindungsgemäßen Verfahrens prinzipiell auch alle Formulierungstypen in Frage.

- Beispiele für Formulierungstypen sind die im „Manual on development and use of
5 FAO and WHO specifications for pesticides“ (FAO and WHO, 2002, appendix E)
erwähnten (jeweils Verwendung der GCPF-Formulierungskodes mit englischer
Abkürzung und Bezeichnung): AL Any other liquid; AP Any other powder; CF
Capsule Suspension for Seed Treatment; CG Encapsulated granule; CL Contact
10 liquid or gel; CP Contact powder; CS Capsule suspension; DC Dispersible
concentrate; DP Dustable powder; DS Powder for dry seed treatment; EC
Emulsifiable concentrate; ED Electrochargeable liquid; EG Emulsifiable Granule; EO
Emulsion, water in oil; EP emulsifiable powder; ES Emulsion for seed treatment; EW
Emulsion, oil in water; FG Fine granule; FS Flowable concentrate for seed treatment;
15 GF Gel for Seed Treatment; GG Macrogranule; GL Emulsifiable gel; GP Flo-dust;
GR Granule; GS Grease; GW Water soluble gel; HN Hot fogging concentrate; KK
Combi-pack solid/liquid; KL Combi-pack liquid/liquid; KN Cold fogging concentrate;
KP Combi-pack solid/solid; LA Lacquer; LS Solution for seed treatment; ME Micro-
emulsion; MG Microgranule; OD Oil dispersion; OF Oil miscible flowable
20 concentrate/oil miscible suspension; OL Oil miscible liquid; OP Oil dispersible
powder; PA Paste; PC Gel or paste concentrate; PO Pour-on; PR Plant rodlet; PT
Pellet; SA Spot-on; SC suspension concentrate; SD suspension concentrate for
direct application; SE Suspo-emulsion; SG Water soluble granule; SL Soluble
concentrate; SO Spreading oil; SP Water soluble powder; SS Water soluble powder
25 for seed treatment; ST Water soluble tablet; SU Ultra-low volume (ULV) suspension;
TB Tablet; TC Technical material; TK Technical concentrate; UL Ultra-low volume
(ULV) liquid; WG Water dispersible granules; WP Wettable powder; WS Water
dispersible powder for slurry seed treatment; WT Water dispersible tablet; XX
Others.
- 30 Bevorzugt sind flüssige Formulierungstypen. Hierzu gehören die Formulierungstypen
OD Oil dispersion; DC (GCPF-Formulierungskode für dispergierbares Konzentrat);
EC (GCPF-Formulierungskode für Emulsionskonzentrat); EW (GCPF-

Formulierungskode für Öl-in-Wasser-Emulsion); ES (GCPF-Formulierungskode für Emulsionsbeize); FS (GCPF-Formulierungskode für Mehrphasenkonzentrat zur Saatgutbehandlung); EO (GCPF-Formulierungskode für Wasser in Öl Emulsion); ME (GCPF-Formulierungskode für Mikroemulsion); SE (GCPF-Formulierungskode für
5 Suspoemulsion); SL (GCPF-Formulierungskode für wasserlösliches Konzentrat); CS (GCPF-Formulierungskode für Kapselsuspension) und AL (GCPF-Formulierungskode für gebrauchsfertige Flüssigformulierung, sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung).

10 Besonders bevorzugt sind Öldispersionen (syn. oil dispersion; Formulierungstyp OD) Emulsionskonzentrate (Formulierungstyp EC).

In Spritzpulvern beträgt die Wirkstoffkonzentration z. B. etwa 10 bis 90 Gew.-%; der Rest zu 100 Gew.-% besteht aus TBEP (B) und üblichen
15 Formulierungsbestandteilen (Emulgator, Hilfs- und Zusatzstoffen), welches für alle Formulierungen gilt. Bei emulgierbaren Konzentraten kann die Wirkstoffkonzentration etwa 1 bis 90, vorzugsweise 5 bis 80 Gew.-% betragen. Staubförmige Formulierungen enthalten 1 bis 30 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise meistens 5 bis 20 Gew.-% an Wirkstoff, versprühbare Lösungen enthalten etwa 0.05
20 bis 80, vorzugsweise 2 bis 50 Gew.-% Wirkstoff. Bei wasserdispergierbaren Granulaten hängt der Wirkstoffgehalt zum Teil davon ab, ob die wirksame Verbindung flüssig oder fest vorliegt und welche Granulierhilfsmittel, Füllstoffe usw. verwendet werden. Bei den in Wasser dispergierbaren Granulaten liegt der Gehalt an Wirkstoff beispielsweise zwischen 1 und 95 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 10
25 und 80 Gew.-%. Bei Öldispersionen kann die Wirkstoffkonzentration etwa 1 bis 50, vorzugsweise 3 bis 30 Gew.-% betragen.

Weiterhin Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Bekämpfung von
30 Schadorganismen, vorzugsweise schädlichen Pflanzen, wobei die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Komponenten, bevorzugt in einer wirksamen Menge, auf die Schadpflanzen appliziert wird.

Die Erfindung betrifft weiterhin auch erfindungsgemäße Verfahren, enthaltend mindestens die Komponenten (A) und (B), die in einer bevorzugten Ausführungsform überadditive Effekte (Synergismus) zeigen. Aufgrund der verbesserten Kontrolle der Schadorganismen durch die erfindungsgemäßen Verfahren wird es möglich, die

- 5 Aufwandmenge zu senken und/oder die Sicherheitsmarge zu erhöhen. Beides ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll. Die Wahl der von den Komponenten (A) und (B) einzusetzenden Mengen und das Verhältnis der Komponenten (A) : (B) sind dabei von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig.

- 10 Die Herstellung der bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittel erfolgt z.B. in der Weise, dass man die Komponenten in den jeweils gewünschten Verhältnissen miteinander vermischt. Handelt es sich bei den Herbiziden und/oder Safenern, im Folgenden als agrochemische Wirkstoffe bezeichnet, um eine Festsubstanz, so setzt man diesen im allgemeinen entweder in
- 15 fein gemahlener Form oder in Form einer Lösung oder Suspension in einem organischen Solvens oder Wasser ein. Ist der agrochemische Wirkstoff flüssig, so erübrigt sich häufig die Verwendung eines organischen Lösungsmittels. Es ist außerdem möglich, einen festen agrochemischen Wirkstoff in Form einer Schmelze einzusetzen.

20

Die Temperaturen können bei der Durchführung des Verfahrens in einem bestimmten Bereich variiert werden. Man arbeitet im allgemeinen bei Temperaturen zwischen 0°C und 80°C, vorzugsweise zwischen 10°C und 60°C.

- 25 Zur Herstellung der bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittel geht man im Allgemeinen so vor, dass man TBEP (B) mit einem oder mehreren der agrochemischen Wirkstoffe (A) sowie gegebenenfalls mit dem Emulgator (C) und den Hilfs- und Zusatzstoffen (D) vermischt. Die Reihenfolge, in der die Komponenten miteinander vermischt werden, hängt vom jeweiligen
- 30 Formulierungstyp ab.

Zur Durchführung des Herstellungsverfahrens kommen übliche Geräte in Betracht,

die zur Herstellung von agrochemischen Formulierungen eingesetzt werden.

Zum Einsatz des bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittels und zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
5 können als Applikationsformen alle, dem Fachmann als gebräuchlich bekannten Verfahren verwendet werden; beispielsweise genannt seien: Spritzen, Tauchen, Nebeln sowie eine Reihe spezieller Verfahren zur direkten unter- oder oberirdischen Behandlung von gesamten Pflanzen oder Teilen (Saatgut, Wurzel, Stolonen, Stengel, Stamm, Blatt), wie beispielsweise Stamminjektion bei Bäumen oder
10 Stengelbandagen bei perennierenden Pflanzen, und eine Reihe spezieller indirekter Applikationsverfahren.

Die jeweilige flächen- und/oder objektbezogene Aufwandmenge der bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittel
15 unterschiedlichster Formulierungstypen und des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Bekämpfung der genannten Schadorganismen variiert sehr stark. Im Allgemeinen werden hierfür die, dem Fachmann als gebräuchlich für das jeweilige Einsatzgebiet bekannten Applikationsmedien in den gebräuchlichen Mengen eingesetzt; wie beispielsweise von mehreren hundert Liter Wasser pro Hektar bei Standard-
20 Spritzverfahren über wenige Liter Öl pro Hektar bei der 'Ultra Low Volume'-Flugzeugapplikation bis hin zu wenigen Millilitern einer physiologischen Lösungen bei Injektionsverfahren. Die Konzentrationen der bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittel in den entsprechenden Applikationsmedien variieren daher in einem weiten Bereich und sind vom jeweiligen
25 Einsatzgebiet abhängig. Im Allgemeinen werden Konzentrationen verwendet, die dem Fachmann als gebräuchlich für das jeweilige Einsatzgebiet bekannt sind. Bevorzugt sind Konzentrationen von 0,01 Gew.-% bis 99 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,1 Gew.-% bis 90 Gew.-%.

30 Die bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittel unterschiedlichster Formulierungstypen, wie auch die zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens notwendigen Komponenten, können z.B. in den für

Flüssigpräparate üblichen Zubereitungsformen entweder als solche oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser ausgebracht werden, also z.B. als Emulsionen, Suspensionen oder Lösungen. Die Anwendung erfolgt dabei nach üblichen Methoden, also z.B. durch Verspritzen, Gießen oder Injizieren.

5

Die Aufwandmenge an den bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmitteln unterschiedlichster Formulierungstypen, wie auch die zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens notwendigen Komponenten, kann innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Sie richtet sich nach den jeweiligen Herbiziden und/oder Safenem und nach deren Gehalt in den Formulierungen.

10

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Förderung der Penetration von Wirkstoffen in Pflanzen wird das zu verwendende TBEP (B) in der Regel zusammen mit dem bzw. den Wirkstoffen (A) oder unmittelbar hintereinander ausgebracht, vorzugsweise in Form einer Spritzbrühe, welche TBEP (B) in erfindungsgemäßen Mengen und den oder die Wirkstoffe (A) in wirksamen Mengen und gegebenenfalls einen oder mehrere Emulgatoren (C) enthält. Zusätzlich können weitere übliche Hilfs- und Zusatzmittel zugesetzt werden. Die Spritzbrühe wird bevorzugt auf Basis von Wasser und/oder einem Öl, z.B. einem hochsiedenden Kohlenwasserstoff wie Kerosin oder Paraffin hergestellt. Dabei können die Komponenten für das erfindungsgemäße Verfahren entweder als Tankmischung oder über eine „Fertig-Formulierung“ ("ready-to-use formulation"; Co-Formulierung) realisiert werden.

15

20

Im Falle von Herbiziden und/oder Safenem ist das Aufbringen auf die Schadpflanze bzw. Kulturpflanze bevorzugt. Die erfindungsgemäß behandelten Pflanzen sind, soweit es den Einsatz von Herbiziden betrifft, alle Arten von Schadpflanzen, wie Unkräutern. Im Hinblick auf die Kulturpflanzen ist die Anwendung in wirtschaftlich bedeutenden, beispielsweise auch transgenen Kulturen von Nutz- und Zierpflanzen, z.B. von Getreide, wie Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Hirse, Reis, Maniok und Mais, oder auch Kulturen von Erdnuss, Zuckerrübe, Baumwolle, Soja, Raps, Kartoffel, Tomate, Erbse und anderen Gemüsesorten bevorzugt.

30

Die bei den erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten Pflanzenschutzmittel, sowie die erfindungsgemäßen Verfahren, weisen eine Reihe von Vorteilen auf. So wird die allgemeine Penetration der Wirkstoffe in das Pflanzengewebe durch TBEP deutlich
5 verbessert. Das schnellere Einsetzen der Penetration bewirkt somit auch eine höhere Regenfestigkeit. Gleichzeitig ist die Penetration bei niedrigeren Temperaturen (beispielsweise kleiner 15° C) verbessert. Im Hinblick auf die Kulturpflanzenverträglichkeit erwies sich in Versuchen TBEP als verträglicher als andere Alkylester-Additive. Insgesamt ermöglicht die Verwendung von TBEP damit
10 Einsparungen an den eingesetzten Wirkstoffen. Daneben ist TBEP weniger belastend für die Umwelt, da es über eine reduzierte Flüchtigkeit verfügt.

Die Erfindung wird durch die Beispiele näher erläutert ohne sie darauf zu beschränken.

15

Beispiele

Penetrationstest

20 In diesem Test wurde die Penetration von Wirkstoffen durch enzymatisch isolierte Kutikeln von Apfelbaumblättern gemessen. Die Kutikeln repräsentieren alle grünen Pflanzenteile, wie Blattspreite, Blattstiel, Stengel, Stamm, Hypokotyl und viele Früchte.

25 Verwendet wurden Blätter, die in voll entwickeltem Zustand von Apfelbäumen der Sorte Golden Delicious abgeschnitten wurden. Die Isolierung der Kutikeln erfolgte in der Weise, dass

- zunächst auf der Unterseite mit Farbstoff markierte und ausgestanzte
30 Blattscheiben mittels Vakuuminfiltration mit einer auf einen pH-Wert zwischen 3 und 4 gepufferten Pectinase-Lösung (0,2 bis 2 Gew.-%ig) gefüllt wurden,

- dann Natriumazid hinzugefügt wurde und
- die so behandelten Blattscheiben bis zur Auflösung der ursprünglichen Blattstruktur und zur Ablösung der nicht zellulären Kutikula stehen gelassen wurden.

5

Danach wurden nur die von Spaltöffnungen und Haaren freien Kutikeln der Blattoberseiten weiter verwendet. Sie wurden mehrfach abwechselnd mit Wasser und einer Pufferlösung vom pH-Wert 7 gewaschen. Die erhaltenen sauberen Kutikel wurden schließlich auf Teflonplättchen aufgezogen und mit einem schwachen Luftstrahl geglättet und getrocknet.

10

Im nächsten Schritt wurden die so gewonnenen Kutikelmembranen für Membran-Transport-Untersuchungen in Diffusionszellen (= Transportkammern) aus Edelstahl eingelegt. Dazu wurden die Kutikeln mit einer Pinzette mittig auf die mit Silikonfett bestrichenen Ränder der Diffusionszellen platziert und mit einem ebenfalls gefetteten Ring verschlossen. Die Anordnung wurde so gewählt, dass die morphologische Außenseite der Kutikeln nach außen, also zur Luft, gerichtet war, während die ursprüngliche Innenseite dem Inneren der Diffusionszelle zugewandt war. Die Diffusionszellen waren mit Wasser bzw. mit einem Gemisch aus Wasser und Lösungsmittel gefüllt.

15

20

Zur Bestimmung der Penetration wurden jeweils 10 µl einer Spritzbrühe der in den Beispielen genannten Zusammensetzung auf die Außenseite einer Kutikula appliziert.

25

In den Spritzbrühen wurden jeweils die unten in den Tabellen aufgelisteten Lösungsmittel (Leitungswasser oder einem Gemisch aus Aceton 20 Gew.-% / Leitungswasser 80 Gew.-%) verwendet.

30

Nach dem Auftragen der Spritzbrühen ließ man jeweils das Lösungsmittel verdunsten, drehte dann jeweils die Kammern um und stellte sie in thermostatisierte

Wannen, wobei auf die Außenseite der Kutikula Luft mit einer definierten Temperatur und Luftfeuchtigkeit geblasen wurde. Die einsetzende Penetration fand daher bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und einer eingestellten Temperatur von 20 bzw. 25 °C statt. Die Wirkstoffpenetration wurde mit radioaktiv markiertem Wirkstoff
5 gemessen.

Tabelle 1: Förderung der Penetration verschiedener Herbizide und Safener* durch TBEP im Vergleich zur Kontrolle

| Wirkstoff ohne/mit TBEP | % Penetration
(nach Stunden)** | % Penetration (nach
Stunden)** |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Safener
0,2 g/l Isoxadifen-ethyl (A) | 1,7 (3) | 17,4 (24) |
| 0,2 g/l Isoxadifen-ethyl (A)
+ 0,5 g/l TBEP (B) | 26,5 (3) | 73,1 (24) |
| Safener
0,2 g/l Mefenpyr-diethyl (A) | 0,4 (3) | 4,9 (24) |
| 0,2 g/l Mefenpyr-diethyl (A)
+ 0,5 g/l TBEP (B) | 3,4 (3) | 25,5 (24) |
| Safener
0,2 g/l Cyprosulfamide (A) | 0,1 (3) | 0,3 (24) |
| 0,2 g/l Cyprosulfamide (A)
+ 0,5 g/l TBEP (B) | 5,7 (3) | 10,2 (24) |
| Herbizid (Wachstumsregulator)
0,2 g/l Thidiazuron (A) | 0,6 (6) | 0,9 (24) |
| 0,2 g/l Thidiazuron (A)
mit 3 g/l TBEP (B) | 74,4 (6) | 93,1 (24) |

* Wirkstoff gelöst in einem Gemisch aus Aceton/ Leitungswasser (20/80 Gew.-%);

10 ** Mittelwerte aus 4-8 Wiederholungen für die Penetration durch Apfelblattkutikeln (Temperatur = 20-25°C, rel. Luftfeuchte 56-60 %); Isoxadifen-ethyl (Hersteller Bayer CropScience), Mefenpyr-diethyl (Hersteller Bayer CropScience), Cyprosulfamide (4-Cyclopropylaminocarbonyl-N-(2-methoxybenzoyl)benzolsulfonamid, Hersteller Bayer CropScience), Thidiazuron (Hersteller Bayer CropScience).

65

Wie anhand der in der Tabelle 1 aufgeführten Beispiele zu erkennen ist, führt TBEP zu einer beträchtlichen Aufnahmesteigerung der Wirkstoffe.

5

Tabelle 2: Vergleichsversuche verschiedener Verbindungen als Penetrationsförderer der herbiziden Wirkstoffe Fenoxaprop-P-ethyl *

| Wirkstoff ohne/mit Penetrationsförderer
*** | % Penetration
(nach 24
Stunden)** | % Penetration (nach
48 Stunden)** |
|--|---|--------------------------------------|
| Herbizid
0,3 g/l Fenoxaprop-P-ethyl (A) | 0,3 | 0,9 |
| 0,3 g/l Fenoxaprop-P-ethyl (A)
+ 2,0 g/l TBP (B) | 66 | 76 |
| 0,3 g/l Fenoxaprop-P-ethyl (A)
+ 2,0 g/l TPP (B) | 10 | 22 |
| 0,3 g/l Fenoxaprop-P-ethyl (A)
+ 2,0 g/l TBEP (B) | 77 | 86 |

* Wirkstoff gelöst in einem Gemisch aus Aceton/ Leitungswasser (20/80 Gew.-%); ** Mittelwerte aus 10 Wiederholungen für die Penetration durch Apfelblattkutikeln (T = 20-25°C, rel. Luftfeuchte 56-60 %); Fenoxaprop-P-ethyl (Hersteller Bayer CropScience); *** TBP = Tributylphosphat und TPP = Tripropylphosphat (Stand der Technik: EP 579052 A2); TBEP = Tributoxyethylphosphat (erfindungsgemäß).

10

Wie anhand der in Tabelle 2 aufgeführten Beispiele zu erkennen ist, führt das erfindungsgemäße TBEP zu einer vorteilhaft höheren Aufnahmesteigerung von Wirkstoffen als die Penetrationsförderer des Standes der Technik. Dieses Ergebnis ist überraschend und war in Hinblick auf den Stand der Technik nicht zu erwarten.

15

Patentansprüche

- 5 1. Verfahren zur Förderung der Penetration, wobei man die Komponenten
- (A) einen oder mehrere Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und/oder Safener,
- (B) Tributoxyethylphosphat (TBEP) in Dosierungen von 2,5 bis 150,0 g/ha und
- 10 (C) gegebenenfalls einen oder mehrere Emulgatoren, vorzugsweise aus der Gruppe der ionischen und nicht-ionischen Emulgatoren und deren Gemische mit HLB-Werten von 10 bis 17, gleichzeitig oder sequentiell auf die Schadpflanzen appliziert.
- 15 2. Verwendung des Verfahrens gemäß Anspruch 1, wobei man die Komponenten gleichzeitig oder sequentiell auf die Schadpflanzen appliziert.
3. Verfahren zur Bekämpfung von Schadorganismen, wobei das Verfahren gemäß Anspruch 1, auf die Schadpflanzen appliziert wird.

Descripción

MEJORADOR DE PENETRACIÓN PARA HERBICIDAS Y ASEGURADORES

- 5 La invención se relaciona con el campo de la protección de cultivos, en particular con el uso de un compuesto específico como un mejorador de penetración para sustancias activas agroquímicas seleccionado del grupo que consiste de los herbicidas y aseguradores y agentes de protección de cultivos que contienen este compuesto. El compuesto es tributoxietil fosfato (CAS reg. no.: 78-51-3; 10 denominado adelante como TPEP).

El mejoramiento de la penetración de herbicidas y aseguradores en plantas se efectúa por "mejoradores de la penetración". El término mejorador de la penetración se entiende con el significado de compuestos que aceleran la toma de 15 herbicidas y aseguradores, solos o como una mezcla, a través de la cutícula de una planta en la planta, es decir la velocidad de toma, y/o incrementar la cantidad de sustancia activa absorbida por la planta.

Las sustancias que incrementan la penetración de herbicidas y/o aseguradores a 20 través de la cutícula de la planta son auxiliares valiosos en la protección química de cultivos. Varias clases de sustancias ya son conocidas como mejoradores de la penetración (compárese por ejemplo WO 2005/104844 A). El DE 3513889 A1 discute de manera general los mejoradores de penetración como un "activador" para biocidas y el EP 579052 A2 describe el compuesto seleccionado del grupo 25 que consiste de alquil fosfatos, tal como tributil fosfato y tripropil fosfato, como mejoradores de la penetración. Sin embargo, desde varios puntos de vista,

subsiste la necesidad de compuestos adicionales que tengan propiedades más ventajosas.

Por lo tanto es un objeto de la invención suministrar sustancias ventajosas
5 adicionales que tengan propiedades mejoradoras de la penetración para sustancias agroquímicas activas.

Se ha encontrado ahora sorprendentemente que el disolvente TPEP, a diferencia de muchos otros disolventes, es adecuado en ciertas tasas de aplicación
10 relativamente bajas y en ciertas proporciones de mezcla con la sustancia activa para incrementar la penetración de los herbicidas y aseguradores, solos o como una mezcla, a través de la cutícula de la planta y así para incrementar la acción biológica de los agentes de protección de cultivos.

15 El TPEP ya se conoce como un disolvente a tasas de aplicación adecuadamente altas en la protección de cultivos, tal como en herbicidas (compárese por ejemplo la WO 01/47356 A1, EP 1251736 B1, WO 00/56146 A1, EP 1164842 B1) y los insecticidas (compárese por ejemplo JP 08291004 A, US 5674517 A). La GB 2022070 A describe el TPEP para defoliación, siendo éste agregado en
20 proporciones (TPEP: sustancia activa) de desde 2:1 a 4:1 a sustancias herbicidas activas. En el campo de los fungicidas, el uso de TPEP como un mejorador de la penetración parece ser aún desconocido.

La invención se relaciona con un método para mejorar la penetración, los
25 componentes

(A) una o más sustancias activas seleccionadas del grupo que consiste de los herbicidas y/o aseguradores,

(B) tributoxietil fosfato (TBEP) en dosis desde 2.5 a 150.0 g/ha y

(C) opcionalmente uno o más emulsificadores, preferiblemente seleccionados

5 del grupo que consiste de los emulsificadores iónicos y aniónicos y mezclas de éstos que tienen valores HLB de desde 10 a 17.

se aplican simultánea o secuencialmente a las plantas dañinas.

La invención también se relaciona con el uso del método descrito aquí, siendo
10 aplicados los componentes simultánea o secuencialmente a las plantas dañinas.

En razón a que el mecanismo de acción del TBEP como mejorador de la penetración es en principio independiente del tipo de sustancia agroquímica activa utilizada, son adecuadas todas las sustancias activas seleccionadas del grupo que
15 consiste de los herbicidas, cuyas actividades biológicas contra las malezas en el sentido más amplio, denominadas en adelante como plantas dañinas, se puede incrementar por la mayor penetración en la planta dañina. En el caso de las sustancias activas seleccionadas del grupo que consiste de aseguradores, se desea mayor penetración en la planta de cultivo de tal manera que se incremente
20 el efecto protector.

Las sustancias activas seleccionadas del grupo que consiste de herbicidas, que comprenden también reguladores del crecimiento de la planta, y seleccionadas del grupo que consiste de los aseguradores, y nutrientes de la planta que tienen
25 propiedades sistémicas y agentes de contacto adecuados como compañeros de combinación se pueden mencionar preferiblemente. Adelante, el término

herbicidas incluye tanto herbicidas como reguladores de crecimiento de la planta, a menos que sea evidente otra cosa del contexto.

También preferiblemente dentro de los grupos anteriormente mencionados están las sustancias sistémicas activas, es decir, aquellas que toma la planta a través de las hojas o por vía de las raíces y distribuidas en la corriente de la sabia, el sistema de transporte o la planta. Las sustancias activas particularmente preferidas son aquellas que tienen un valor $\log P \leq 4$ (determinados de acuerdo a la Directiva EEC 79/831 Anexo V. A8 mediante HPLC, método de gradiente, acetonitrilo/ácido fosfórico acuoso 0.1%) en particular aquellos que tienen un valor $\log P$ de ≤ 4 y ≥ 0.1 .

Ejemplos de sustancias activas individuales seleccionadas del grupo que consiste de herbicidas, también incluyen reguladores del crecimiento de planta, y seleccionados del grupo que consiste de aseguradores son:

Herbicidas

Ejemplos de herbicidas son, por ejemplo, los inhibidores ALS (inhibidores de sintetasa acetolactato) o herbicidas seleccionados del grupo que consiste de los carbamatos, tiocarbamatos, haloacetanilidas, fenoxi sustituido, naftoxi y derivados de ácido fenoxifenoxicarboxílico y derivados de ácido heteroariloxifenoxialcanocarboxílico, tal como ésteres de quinoliloxi-, quinoxaliloxi-, piridiloxi-, benzoxazoliloxi-, y benzotiazoliloxifenoxialcanocarboxílicos, derivados de ciclohexanodiona, imidazolinonas, herbicidas que contienen fósforo, por ejemplo del tipo glufosinato o del tipo glifosato, derivados de ácido pirimidiniloxipiridinocarboxílico, derivados de ácido pirimidiloxibenzóico, derivados

de triazolopirimidina sulfonamida y ésteres de S-(N-aril-N-alquilcarbamoilmetil)ditiofosfórico, ureas e hidroxibenzonitrilos.

En el caso de sustancias herbicidas activas seleccionadas del grupo que consiste de los inhibidores ALS, tales como sulfonilureas, no solamente los compuestos neutrales sino también las sales de éstos con contra iones inorgánicos y/o orgánicos se deben entender siempre en el contexto de la presente invención. Así, por ejemplo, las sulfonilureas pueden formar, por ejemplo, sales en las cuales el hidrógeno del grupo $-\text{SO}_2\text{-NH}$ se reemplaza por un catión adecuado para la agricultura. Estas sales son, por ejemplo, sales metálicas, en particular sales de metal alcalino o sales de metal alcalino térreo, en particular sales de sodio y potasio, o sales de amonio o sales con aminas orgánicas. La formación de sal también se puede efectuar mediante una reacción de adición de un ácido con grupos básicos, tales como, por ejemplo, amino o alquilamino. Los ácidos adecuados para este propósito son ácidos fuertemente inorgánicos y orgánicos, por ejemplo HCl, HBr, H_2SO_4 o HNO_3 .

A) Los inhibidores ALS preferidos se originan de la serie que consiste de las sulfonilureas y/o sus sales, por ejemplo, pirimidina- o triazinilaminocarbonil-[benceno-, piridina-, pirazol-, tiofeno- y (alquilsulfonil)alquilamino]-sulfamidas. Tales sulfonilureas adecuadas son, por ejemplo.

A1) fenil y bencilsulfonilureas y compuestos relacionados, por ejemplo.

1-(2-clorofenilsulfonil)-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea (clorsulfurón),

1-(2-etoxicarbonilfenilsulfonil)-3-(4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)urea (clorimuron-etilo),

1-(2-metoxifenilsulfonil)-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea(metsulfurón-metilo),

1-(2-cloroetoxifenilsulfonil)-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea(triasulfurón),

5

1-(2-metoxicarbonilfenilsulfonil)-3-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)urea(sulfumeturon-metilo),

1-(2-metoxicarbonilfenilsulfonil)-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-

10 metilurea(tribenuron-metilo),

1-(2-metoxicarbonilbencilsulfonil)-3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)urea(bensulfurón-metilo),

15 1-(2-metoxicarbonilfenilsulfonil)-3-(4,6-bis(difluorometoxi)pirimidin-2-il)urea(primisulfurón-metilo),

3-(4-etil-6-metoxi-1,3,5-triazin-2-il)-1-(2,3-dihidro-1,1-dioxo-2-metilbenzo[b]tiofeno-7-sulfonil)urea (EP-A 0 079 683),

20

3-(4-etoxi-6-etil-1,3,5-triazin-2-il)-1-(2,3-dihidro-1,1-dioxo-2-metilbenzo[b]tiofeno-7-sulfonil)urea (EP-A 0 079 683),

3-(4-metoxi-6-metoxi-1,3,5-triazin-2-il)-1-(2-metoxicarbonil-5-yodofenilsulfonil)urea

25 (yodosulfurón-metilo y la sal de sodio de ésta, la WO 92/13845), DPX-66037, triflusulfurón-metilo (compárese Brighton Crop Prot. Conf. –Weeds – 1995, página 853), CGA-277476 (compárese Brighton Crop Prot. Conf. –Weeds – 1995, página

79), metal 2-[3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)ureidosulfonil]-4-metanosulfonamidometilbenzoato (mesosulfurón-metilo, WO 95/10507), N,N-dimetil-2-[3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)ureidosulfonil]-4-formil-aminobenzamida (foramsulfúron, WO 95/01344);

5

A2) tienilsulfonilureas, por ejemplo,

1-(2-metoxicarboniltiofen-3-il)-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea (tifensulfurón-metil);

10 A3) pirazolilsulfonilureas, por ejemplo,

1-(4-etoxicarbonil-1-metilpirazol-5-ilsulfonil)-3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)urea (pirazosulfurón-metilo);

15 metil 3-cloro-5-(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoilsulfamoil)-1-metil-pirazol-4-ilcarboxilato (EP-A 0 282 613);

metil 5-(4,6-dimetilpirimidin-2-ilcarbamoilsulfamoil)-1-(2-piridil)pirazol-4-ilcarboxilato (NC-330, compárese Brighton Crop Prot. Conference "Weeds" 1991, vol. 1, página 45 et seq.);

20

A4) derivados de sulfondiamida, por ejemplo,

3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonilaminosulfonil)-urea (amidosulfurón) y los análogos estructurales de éste EP-A 0 131 258 y Z. Pfl. Krankh. Pfl. Schutz, emisión especial XII, 489-497 (1990));

25

A5) piridilsulfonilureas, por ejemplo


1-(3-N,N-dimetilaminocarbonilpiridin-2-ilsulfonil)-3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)urea (nicosulfurón),

1-(3-etilsulfonilpiridin-2-ilsulfonil)-3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)urea (rimsulfurón),

5

metil 2-[3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)ureidosulfonil]-6-trifluorometil-3-piridinocarboxilato, sal de sodio (DPX-KE 459, flupirsulfúron, compárese Brighton Crop Prot. Conf. Weeds 1995, página 49),

10 piridilsulfonilureas, como se describieron, por ejemplo, en la DE-A 40 00 503 y DE-A 40 30 577, preferiblemente aquellos con la fórmula



en la cual

15 E es CH o N, preferiblemente CH,

R²⁰ es yodo o NR²⁵R²⁶,

R²¹ es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo(C₁-C₃), alcoxi(C₁-C₃), haloalquilo(C₁-C₃), haloalcoxi(C₁-C₃), alquiltio(C₁-C₃), alcoxi(C₁-C₃)-alquilo(C₁-C₃), alcoxycarbonilo(C₁-C₃), mono o di(alquilo(C₁-C₃))-amino, alquilsulfinilo(C₁-C₃) o sulfonilo, SO₂-NR^xR^y o CO-NR^xR^y, en particular hidrógeno,

20

R^x, R^y, independientemente uno del otro, son hidrógeno, alquilo(C₁-C₃), alquenilo(C₁-C₃), alquinilo(C₁-C₃) o juntos son -(CH₂)₄-, -(CH₂)₅- o -(CH₂)₂-O-(CH₂)₂-,

n es 0, 1, 2 o 3, preferiblemente 0 o 1,

R²² es hidrógeno o CH₃,

R²³ es halógeno, alquilo(C₁-C₂), alcoxi(C₁-C₂), haloalquilo(C₁-C₂), en particular CF₃, haloalcoxi(C₁-C₂), preferiblemente OCHF₂ u OCH₂CF₃,

5 R²⁴ es alquilo(C₁-C₂), haloalcoxi(C₁-C₂), preferiblemente OCHF₂, o alcoxi(C₁-C₂),


R²⁵ es alquilo(C₁-C₄),

R²⁶ es alquilsulfonyl(C₁-C₄) o

R²⁵ y R²⁶ juntos son una cadena de la fórmula -(CH₂)₃SO₂- o -(CH₂)₄SO₂-, por

10 ejemplo, 3-(4,6-dimetoxipirimiden-2-il)-1-(3-N-metilsulfonyl-N-metilaminopiridin-2-il)sulfonylurea, o sales de éstos;

A6) alcoxifenoxisulfonylureas, tal como se describieron, por ejemplo, en la EP-A 0 342 569, preferiblemente aquellas de la fórmula



en la cual

E es CH o N, preferiblemente CH,

R²⁷ es etoxi, propoxi o isopropoxi,

20 R²⁸ es halógeno, NO₂, CF₃, CN, alquilo(C₁-C₄), alcoxi(C₁-C₄), alquiltio(C₁-C₄), o alcoxycarbonilo(C₁-C₃), preferiblemente en la posición 6 sobre el anillo de fenilo,

n es 0, 1, 2 o 3, preferiblemente 0 o 1,

R²⁹ es hidrógeno, alquilo(C₁-C₄) o alqueno(C₃-C₄),

JL

R^{30}, R^{31} , independientemente uno del otro, son halógeno, alquilo(C_1-C_2), alcoxi(C_1-C_2), haloalquilo(C_1-C_2), haloalcoxi(C_1-C_2), o alcoxi(C_1-C_2)-alquilo(C_1-C_2), preferiblemente OCH_3 o CH_3 , por ejemplo, 3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-1-(2-etoxifenoxi)sulfonilurea, o sales de éstos;

5

A7) imidazolilsulfonilureas, por ejemplo,

MON 37500, sulfosulfurón (compárese Brighton Crop Prot. Conf. "Weeds" 1995, página: 57), y otros derivados de sulfonilurea relacionados y mezclas de éstos;

- 10 Representantes típicos de estas sustancias activas son, entre otros, los compuestos mencionados adelante: amidosulfúron, azimsulfúron, benzulfuron-metilo, clorimuron-etilo, clorsulfúron, cinosulfúron, ciclosulfamuron, etametsulfurón-metilo, etoxisulfúron, flazasulfúron, flupirsulfurón-metilo-sodio, halosulfurón-metilo, imazosulfúron, metsulfurón-metilo, nicosulfúron, oxasulfúron, primisulfurón-metilo,
- 15 prosulfúron, pirazosulfurón-etilo, rimsulfúron, sulfometuron-metilo, sulfosulfúron, tifensulfurón-metilo, triasulfúron, tribenuron-metilo, triflusulfurón-metilo, yodosulfurón-metilo y la sal de sodio de éste (WO 92/13845), mesosulfurón-metilo y la sal de sodio de éste (Agrow no. 347, Marzo 3, 2000, página 22 (PJB Publications Ltd., 2000)) y foramsulfurón y la sal de sodio de éste (Agrow no. 338,
- 20 Octubre 15, 1999, página 26 (PJB Publications Ltd., 2000)).

B) Los herbicidas del tipo que consisten de los derivados de ácido fenoxifenoxi y heteroariloxifenoxicarboxílico, tales como

- 25 B1) derivados de ácido fenoxifenoxi y benciloxifenoxicarboxílico, por ejemplo, metil 2-(4-(2,4-diclorofenoxi)fenoxi)propionato (diclofop-metil),

77

metil 2-(4-(4-bromo-2-clorofenoxi)fenoxi)propionato
(DE-A 26 01 548)

metil 2-(4-(4-bromo-2-fluorofenoxi)fenoxi)propionato
5 (US-A 4,808,750),

metil 2-(4-(2-cloro-4-trifluorometilfenoxi)fenoxi)propionato
(DE-A 24 33 067),

10 metil 2-(4-(2-fluoro-4-trifluorometoxifenoxi)fenoxi)propionato
(US-A 4,808,750),

metil 2-(4-(2,4-diclorobencil)fenoxi)fenoxi)propionato
(DE-A 24 17 487),

15 etil 4-(4-(4-trifluorometilfenoxi)fenoxi)pent-2-enoato,

metil 2-(4-(4-trifluorometilfenoxi)fenoxi)propionato
(DE-A 24 33 067);

20 B2) derivados de ácido heteroariloxifenoxialcanocarboxílico "mononuclear", por
ejemplo,

etil 2-(4-(3,5-dicloropiridil-2-oxi)fenoxi)propionato (EP-A 0 002 925),

25 propargil 2-(4-(3,5-dicloropiridil-2-oxi)fenoxi)propionato
(EP-A 0 003 114),

metil 2-(4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi)propionato

(EP-A 0 003 890),

5 etil 2-(4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi)propionato (EP-A 0 003 890),

propargil 2-(4-(5-cloro-3-fluoro-2-piridiloxi)fenoxi)propionato

(EP-A 0 191 736),

10 butil 2-(4-(5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi)propionato (fluazifop-butilo);

B3) derivados de ácido heteroariloxifenoxialcanocarboxílico "dinuclear" por ejemplo,

15 metil y etil 2-(4-(6-cloro-2-quinoxaliloxi)fenoxi)propionato

(quizalofopmetilo y quizalofopetilo),

metil 2-(4-(6-fluoro-2-quinoxaliloxi)fenoxi)propionato (compárese J. Pest. Sci. Vol. 10, 61 (1985)),

20

isopropilidenoaminoxietil 2-(4-(6-cloro-2-quinoxaliloxi)fenoxi)-propionato (propaquizafof),

etil 2-(4-(6-clorobenzoxazol-2-iloxi)fenoxi)propionato (fenoxaprop-etilo), el isómero

25 D(+) de éste (fenoxaprop-P-etilo) y etil 2-(4-(6-clorobenzotiazol-2-iloxi)fenoxi)propionato (DE-A 26 40 730), tetrahidro-2-furilmetil 2-(4-(6-cloroquinoxaliloxi)fenoxi)propionato (EP-A 0 323 727);

79

C) cloroacetanilidas, por ejemplo,

N-metoximetil-2,6-dietilcloroacetanilida (alcaclor),

5 N-(3-metoxiprop-2-il)-2-metil-6-etilcloroacetanilida (metoalaclor),

ácido 2,6-dimetilanilida N-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-ilmetil)cloroacético

N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1-pirazolilmetil)cloroacetamida (metazaclor);

10

D) tiocarbamatos, por ejemplo,

S-etil N,N-dipropiltiocarbamato (EPTC),

S-etil N,N-diisobutiltiocarbamato (butilato);

15 E) ciclohexanodiona oximas, por ejemplo,

metil 3-(1-aliloxiiminobutil)-4-(hidroxi-6,6-dimetil-2-oxociclohex-3-enecarboxilato
(aloxidim),

2-(1-etoxiiminobutil)-5-(2-etiltiopropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona (setoxidim),

20

2-(1-etoxiiminobutil)-5-(2-feniltiopropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona (cloproxidim),

2-(1-(3-cloroaliloxi)iminobutil)-5-(2-etiltiopropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona,

25 2-(1-(3-cloroaliloxi)iminopropil)-5-(2-etiltiopropil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona
(cletodim),

2-(1-etoxiiminobutil)-3-hidroxi-5-(3-tien-3-il)ciclohex-2-enona (cicloxiidim),

2-(1-etoxiiminopropil)-5-(2,4,6-trimetilfenil)-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona
(tralcocidim);

5

F) imidazolinonas, por ejemplo,

metil 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5-metilbenzoato y ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-4-metilbenzoico (imazametabenz),

10 ácido 5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)piridina-3-carboxílico
(imazetapir),

ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)quinolina-3-carboxílico
(imazaquin),

15

ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)piridina-3-carboxílico (imazapir),

ácido 5-metil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)piridina-3-carboxílico
(imazetametapir);

20

G) derivados de triazolopirimidinasulfonamida, por ejemplo

N-(2,6-difluorofenil)-7-metil-1,2,4-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonamida
(flumetsulam),

25 N-(2,6-dicloro-3-metilfenil)-5,7-dimetoxi-1,2,4-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonamida,

N-(2,6-difluorofenil)-7-fluoro-5-metoxi-1,2,4-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonamida,

N-(2,6-dicloro-3-metilfenil)-7-cloro-5-metoxi-1,2,4-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonamida,

5

N-(2-cloro-6-metoxicarbonil)-5,7-dimetil-1,2,4-triazolo[1,5-c]pirimidin-2-sulfonamida (EP-A 0 343 752, US-A 4,988,812);

H) benzoilciclohexanodionas, por ejemplo

10 2-(2-cloro-4-metilsulfonilbenzoil)ciclohexano-1,3-diona (SC-0051, EP-A 0 137 963),
2-(2-nitrobenzoil)-4,4-dimetilciclohexano-1,3-diona (EP-A 0 274 634),

2-(2-nitro-3-metilsulfonilbenzoil)-4,4-dimetilciclohexano-1,3-diona (WO 91/13548);

15 I) derivados de ácido pirimidiniloxipiridinocarboxílico o ácido pirimidiniloxibenzóico, por ejemplo,

bencil 3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxipiridina-2-carboxilato (EP-A 0 249 707),

metil 3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxipiridina-2-carboxilato (EP-A 0 249 707),

20

ácido 2,6-bis[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxi]benzóico (EP-A 0 321 846),


1-(etoxicarboniloxietil) 2,6-bis[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxi]-benzoato (EP-A 0 472 113);

25

J) ésteres S-(N-aril-N-alquilcarbamoilmetil)ditiofosónico, tales como S-[N-(4-clorofenil)-N-isopropilcarbamoilmetil]-O,O-dimetil ditiofosfato (anilofos).



82





- K) alquilacinas, por ejemplo como se describe en la WO-A 97/08156, WO-A-97/31904, DE-A-19826670, WO-A-98/15536, WO-A-98/15537, WO-A-98/15538, WO-A-98/15539 y también DE-A-19828519, WO-A-98/34925, WO-A-98/42684, 5 WO-A-99/18100, WO-A-99/19309, WO-A-99/37627 y WO-A-99/65882, preferiblemente aquellas de la fórmula (K)




en la cual

- 10 R^1 es alquilo($\text{C}_1\text{-C}_4$) o haloalquilo($\text{C}_1\text{-C}_4$);
 R^2 es alquilo($\text{C}_1\text{-C}_4$), cicloalquilo($\text{C}_3\text{-C}_6$) o cicloalquilo($\text{C}_3\text{-C}_6$)-alquilo($\text{C}_1\text{-C}_4$) y
 A es $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$, $-\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-O}-$, $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O}-$,
Particularmente de manera preferible aquellos de las fórmulas K1-K7






89



L) los herbicidas que contienen fósforo, por ejemplo uno o más compuestos de la fórmula (IV) o derivados de éstos, tales como sales,




5 en la cual

Z^1 es un radical de la fórmula $-\text{OM}$, $-\text{NHCH}(\text{CH}_3)\text{CONHCH}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{M}$ o $-\text{NHCH}(\text{CH}_3)\text{CONHCH}[\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2]\text{CO}_2\text{M}$ y

M es H o un catión formador de sal,

y/o uno o más compuestos de la fórmula (V) o derivados de éstos, tales como las

10 sales,



en la cual

Z^2 es un radical de la fórmula CN o CO_2R^1 , en la cual R^1 es Q o un catión formador

15 de sal y Q es H , alquilo, alquenilo, alcoxialquilo o arilo $\text{C}_6\text{-C}_{10}$, que es no sustituido

o sustituido y preferiblemente no sustituido o sustituido por uno o más radicales

seleccionados del grupo que consiste de alquilo, alcoxi, halógeno, CF_3 , NO_2 , y CN ,

y

25

R^2 , R^3 , en cada caso independientemente uno del otro, son H, alquilo, arilo C_6 - C_{10} , que es no sustituido o sustituido y preferiblemente no sustituido o sustituido por uno o más radicales seleccionados del grupo que consiste de alquilo, alcoxi, halógeno, CF_3 , NO_2 y CN, o bifenilo o un catión formador de sal.

Ejemplos de sustancias activas de las fórmulas (IV) y (V) son los siguientes:

- glufosinato y la sal de amonio de éste en forma racémica, es decir, ácido 2-amino-4-[hidroxi(metil)fosfinoil]butanóico o la sal de amonio de éste,
- el enantiómero L de glufosinato y la sal de amonio de éste;
- bilanafos/bialafos, es decir, L-2-amino-4-[hidroxi(metil)fosfinoil]-butanoil-L-alaninil-L-alanina y la sal de sodio de éste,
- glifosato.

15

M) carbamatos, por ejemplo, asulam, carbetamida, clorofam y profam;

N) benzofuranos, por ejemplo, benfuresato y etofumesato;

20 O) fitohormonas;

P) auxinas y análogos de auxina, por ejemplo, ácido 4-indol-3-butírico, ácido indol-3-acético, ácido 1-naftilacético, ácido 2-(1-naftil)acetamida y 2-naftiloxiacético;

25 Q) zitoquininas, por ejemplo, citoquinina, quinetina y 6-bencilaminopurina;

R) giberelinas, por ejemplo ácido giberélico, giberelina A4 y A7;

86

S) ácido abscisico y derivados de éste;

T) precursores de etileno, por ejemplo, etefon;

5

U) herbicidas seleccionados del grupo que consiste de inhibidores sintetasa de ácido graso;

V) ureas, por ejemplo, clorotoluron, dimefúron, diuron, fluometuron, isoproturon, isouron, carbutilato, linuron, metabenzthiazuron, metobenzuron, metoxuron, monolinuron, neburon, sidurón y tebutiurón y

10

W) metamitron.

15 X) hidroxibenzonitrilos, por ejemplo tales como bromoxinil e ioxinil y sales y ésteres de éstos, tales como bromoxinil octanoato e ioxinil octanoato.

Las sustancias agroquímicas activas también pueden ser reguladores del crecimiento. Ejemplos de éstos son etefon, tributos, ciclanilida, y tidiazuron.

20

Los herbicidas (reguladores del crecimiento de plantas) de los grupos A a X se describen, por ejemplo, en los documentos mencionados anteriormente en cada caso y/o en "The Pesticide Manual", 12th edition (2000) to 14th edition (2006), The British Crop Protection Council, "Agricultural Chemicals Book II – Herbicides – ", by

25 W.T. Thompson, Thompson Publications, Fresno CA, USA 1990 and "Farm Chemicals Handbook '90", Meister Publishing Company, Willoughby OH, USA, 1990.


87

Aseguradores


Ejemplos de aseguradores son, entre otros:

5


a) Compuestos de las fórmulas (S-II) a (S-IV).



(S-II)



(S-III)



(S-IV)

los símbolos e índices que tienen los siguientes significados:


10

n' es un número natural de 0 a 5, preferiblemente de 0 a 3;


T es una cadena de alcanodiilo (C_1 o C_2) el cual es no sustituido o sustituido por uno o dos radicales alquilo (C_1 - C_4) o por [alcoxi (C_1 - C_3)]carbonilo;

W es un radical heterocíclico divalente no sustituido o sustituido seleccionado del grupo que consiste de heterociclos parcialmente insaturados o aromáticos que tienen un anillo de cinco miembros y 1 a 3 heteroátomos en el anillo del tipo N u O, por lo menos un átomo de N y no más de un átomo de O están presentes en el anillo, preferiblemente un radical seleccionado del grupo que consiste de (W1) a (W4),


15




(W1)



(W2)



(W3)



(W4)

20

m' es 0 o 1;

R¹⁷, R¹⁹ son idénticos o diferentes y son halógeno, alquilo(C₁-C₄), alcoxi(C₁-C₄), nitro o haloalquilo(C₁-C₄);

- 5 R¹⁸, R²⁰ son idénticos o diferentes y son OR²⁴, SR²⁴ o NR²⁴R²⁵ o un heterociclo de 3 a 7 miembros saturado o insaturado que tiene por lo menos un átomo de N y hasta 3 heteroátomos, preferiblemente seleccionados del grupo que consiste de O y S, que está ligado por vía de un átomo N al grupo carbonilo en (S-II) o (S-III) y es no sustituido o sustituido por los radicales seleccionados en el grupo que consiste de alquilo(C₁-C₄), alcoxi(C₁-C₄) o fenilo opcionalmente sustituido, preferiblemente un radical de fórmula OR²⁴, NHR²⁵ o N(CH₃)₂, en particular de la fórmula OR²⁴;
- 10

R²⁴ es hidrógeno o un radical hidrocarburo alifático no sustituido o sustituido, preferiblemente que tiene en conjunto 1 a 18 átomos de carbono;

- 15 R²⁵ es hidrógeno, alquilo(C₁-C₄), alcoxi(C₁-C₄) o fenilo sustituido o no sustituido;

R^x es H, alquilo(C₁-C₈), (haloalquilo)C₁-C₈, alcoxi(C₁-C₄)alquilo(C₁-C₈), ciano o COOR²⁶, en el cual R²⁶ es hidrógeno, alquilo(C₁-C₈), haloalquilo(C₁-C₈), alcoxi(C₁-C₄)-alquilo(C₁-C₄), hidroxialquilo(C₁-C₆), cicloalquilo(C₃-C₁₂) o trialquilsililo(C₁-C₄);

- 20 R²⁷, R²⁸, R²⁹ son idénticos o diferentes y son hidrógeno, alquilo(C₁-C₈), haloalquilo(C₁-C₈), cicloalquilo(C₃-C₁₂) o fenilo sustituido o no sustituido;

R²¹ es alquilo(C₁-C₄), haloalquilo(C₁-C₄), alquenilo(C₂-C₄), haloalquenilo(C₂-C₄), cicloalquilo(C₃-C₇), preferiblemente diclorometilo;

R²², R²³ son idénticos o diferentes y son hidrógeno, alquilo(C₁-C₄), alquenilo(C₂-

- 25 C₄), alquinilo(C₂-C₄), haloalquilo(C₁-C₄), haloalquenilo(C₂-C₄), alquilbarbamoilo(C₁-C₄)alquilo(C₁-C₄), alquenilcarbamoilo(C₂-C₄)alquilo(C₁-C₄), alcoxi(C₁-C₄)alquilo(C₁-C₄), dioxolanil-alquilo(C₁-C₄),

tiazolilo, furilo, furialquilo, tienilo, piperidilo, fenilo sustituido o no sustituido, o R^{22} y R^{23} forman juntos un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido, preferiblemente una oxazolidina, tiazolidina, piperidina, morfolino, hexahidropirimidina o un anillo de benzoxazina;

5 Preferiblemente aseguradores de los siguientes subgrupos de compuestos de las fórmulas (S-II) a (S-IV):

- 10 - los compuestos del tipo que consiste de ácido diclorofenilpirazolina-3-carboxílico (es decir, de la fórmula (S-II), en la cual $W = (W1)$ y $(R^{17})_n = 2,4-Cl_2$, preferiblemente los compuestos tales como etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-(etoxicarbonil)-5-metil-2-pirazolina-3-carboxilato (II-1, mefenpir-dietil), mefenpir-dimetilo y mefenpir (II-0), y los compuestos relacionados, como se describe en la WO-A-91/07874;
- 15 - derivados de ácido diclorofenilpirazolocarboxílico (es decir, de la fórmula (S-II), en la cual W es $(W2)$ y $(R^{17})_n$ es $2,4-Cl_2$), preferiblemente los compuestos tal como etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-metilpirazol-3-carboxilato (II-2), etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-isopropilpirazol-3-carboxilato (II-3), etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-(1,1-dimetiletil)pirazol-3-carboxilato (II-4), etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-fenilpirazol-3-carboxilato (II-5) y compuestos relacionados como se describe en la EP-A-0333131 y EP-A-0269806;
- 20 - los compuestos del tipo que consiste de ácido triazolocarboxílico (es decir, de la fórmula (S-II), en la cual W es $(W3)$ y $(R^{17})_n$ es $2,4-Cl_2$, preferiblemente los compuestos tal como fenclorazol-etil, es decir, etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-triclorometil-(1H)-1,2,4-triazolo-3-carboxilato (II-6), y compuestos relacionados (compárese, EP-A-0174562 y EP-A-0346620);
- 25 - los compuestos del tipo que consiste de ácido 5-bencil o 5-fenil-2-isoxazolina-3-carboxílico o de ácido 5,5-difenil-2-isoxazolina-3-carboxílico, tal como isoxadifen (II-12), (en el cual W es $(W4)$), preferiblemente los

compuestos tales como etil 5-(2,4-diclorobencil)-2-isoxazolina-3-carboxilato (II-7) o etil 5-fenil-2-isoxazolina-3-carboxilato (II-8) y compuestos relacionados como se describió en la WO-A-91/08202, o etil 5,5-difenil-2-isoxazolinocarboxilato (II-9, isoxadifen-etilo) o n-propilo 5,5-difenil-2-isoxazolinocarboxilato (II-10) o etil 5-(4-fluorofenil)-5-(fenil-2-isoxazolino-3-carboxilato (II-11), como se describió en la WO-A-95/07897.

- los compuestos del tipo que consisten de ácido 8-quinolinoxiacético, por ejemplo aquellos de la fórmula (S-III), en el cual $(R^{19})_n$ es 5-Cl, R^{20} es OR^{24} y T es CH_2 , preferiblemente los compuestos 1-metilhexil (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-1, cloquintocet-mexil), 1,3-dimetilbut-1-il(5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-2), 4-alliloxibutil (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-3), 1-alliloxiprop-2-il (5-cloro-8-quinolinoxi)-acetato (III-4), etil (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-5), metil (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-6), alil (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-7), 2-(2-propilidenoiminoxi)-1-etil (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-8), 2-oxoprop-1-il (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-9), ácido (5-cloro-8-quinolinoxi)acetato (III-10) y las sales de éstos, como se describió, por ejemplo, en la WO-A-02/34048, y compuestos relacionados como se describieron en la EP-A-0860750, EP-A-0094349 y EP-A-0191736 o EP-A-0492366.

- los compuestos del tipo que consisten de ácido (5-cloro-8-quinolinoxi)malónico es decir, de la fórmula (S-III), en la cual $(R^{19})_n$ es 5-Cl, R^{20} es OR^{24} y T es $-CH(COO\text{-alquilo})-$, preferiblemente los compuestos dietilo (5-cloro-8-quinolinoxi)malonato (III-11), dialil (5-cloro-8-quinolinoxi)malonato, metil etil (5-cloro-8-quinolinoxi)malonato y compuestos relacionados como se describió en la EP-A-0582198.

- los compuestos del tipo que consiste de dicloroacetamidas, es decir, de la fórmula (S-IV), preferiblemente: N,N-dialin-2,2-dicloroacetamida (diclormid


(IV-1), de la US 4,137,070), 4-dicloroacetil-3,4-dihidro-3-metil-2H-1,4-benzoxazina (IV-2, benoxacor, de la EP 0149974), N1,N2-dialil-N2-dicloroacetilglicinamida (DKA-24 (IV-3), de la HU 2143821), 4-dicloroacetil-1-oxa-4-azaspiro[4,5]decano (AD-67), 2,2-dicloro-N-(1,3-dioxolan-2-ilmetil)-
5 N-(2-propenil)acetamida (PPG-1292), 3-dicloroacetil-2,2,5-trimetiloxazolidina (R-29148, IV-4), 3-dicloroacetil-2,2-dimetil-5-feniloxazolidina, 3-dicloroacetil-2,2-dimetil-5-(2-tienil)oxazolidina, 3-dicloroacetil-5-(2-furanil)-2,2-dimetiloxazolidina, (furilazol (IV-5), MON
13900), 1-dicloroacetilhexahidro-3,3,8a-trimetilpirrolo[1,2-a]pirimidin-6(2H)-
10 ona (diciclonon, BAS 145138),

b) uno o más compuestos del grupo:

anhídrido 1,8-naftálico, metil difenilmetoxiacetato, 1-(2-clorobencil)-3-(1-metil-1-feniletil)urea (cumiluron), O,O-dietil S-2-etiltioetil fosforoditioato (disulfoton), 4-
15 clorofenilmetilcarbamato (mefenato), O,O-dietil-O-fenil fosforotioato (dietolato), ácido 4-carboxi-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-acético (CL-304415, CAS reg. no.: 31541-57-8), cianometoxiimino(fenil)-acetonitrilo (ciometrinil), 1,3-dioxolan-2-ilmetoxiimino(fenil)acetonitrilo (oxabetrinil), 4'-cloro-2,2,2-trifluoroacetofenona O-1,3-dioxolan-2-ilmetiloxima (fluoxofenim), 4,6-dicloro-2-fenilpirimidina (fenclorim),
20 bencil-2-cloro-4-trifluorometil-1,3-tiazol-5-carboxilato (flurazol), 2-diclorometil-2-metil-1,3-dioxolano (MG-191), N-(4-metilfenil)-N'-(1-metil-1-feniletil)urea (dymron), ácido (2,4-diclorofenoxi)acético (2,4-D), ácido (4-clorofenoxi)acético, ácido (R,S)-2-(4-cloro-o-toliloxi)-propiónico (mecoprop), ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), ácido (4-cloro-o-toliloxi)acético (MCPA), ácido 4-(4-cloro-o-toliloxi)butírico,
25 ácido 4-(4-clorofenoxi)butírico, ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzóico (dicamba), 1-(etoxicarbonil)etil 3,6-dicloro-2-metoxibenzoato (lactidiclor) y las sales y los ésteres de éstos, preferiblemente (C₁-C₈);

92

c) N-acilsulfonamidas de la fórmula (S-V) y sus sales,



5 en la cual

R^{30} es hidrógeno, un radical hidrocarburo, un radical hidrocarburo-oxi, un radical hidrocarburo-tiol o un radical heterociclilo que está preferiblemente unido por vía de un átomo de carbono, cada uno de los últimos 4 radicales mencionados está sustituido o no sustituido por uno o más radicales idénticos o diferentes del grupo que consiste de halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, carboxilo, formilo, carbonamida, sulfonamida y los radicales de la fórmula $-Z^a-R^a$,

cada grupo funcional hidrocarburo tiene preferiblemente 1 a 20 átomos de carbono y un radical que contiene carbono R^{30} , incluyendo sustituyentes, teniendo preferiblemente 1 a 30 átomos de carbono;

R^{31} es hidrógeno o alquilo(C_1-C_4), preferiblemente hidrógeno, o

R^{30} y R^{31} , junto con el grupo de la fórmula $-CO-N-$, que forma el radical de un anillo saturado o insaturado de 3 a 8 miembros;

R^{32} son idénticos o diferentes y son halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, carboxilo, formilo, $CONH_2$, SO_2NH_2 o un radical de la fórmula $-Z^b-R^b$;

R^{33} es hidrógeno o alquilo(C_1-C_4), preferiblemente H;

R^{34} son idénticos o diferentes y son halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, carboxilo, CHO , $CONH_2$, SO_2NH_2 , o un radical de la fórmula $-Z^c-R^c$;

TB

R^a es un radical hidrocarburo o un radical heterociclilo, cada uno de los dos últimos radicales mencionados es no sustituido o sustituido por uno o más radicales idénticos o diferentes del grupo que consiste de halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, mono, y di[alquil(C_1-C_4)]amino, o un radical alquilo en el cual una pluralidad de grupos no vecinos CH_2 , preferiblemente 2 o 3 grupos no vecinos CH_2 , se reemplazan en cada caso por un átomo de oxígeno; y

R^b , R^c son idénticos o diferentes y son un radical hidrocarburo o un radical heterociclilo, cada uno de los dos últimos radicales mencionados es no sustituido o sustituido por uno o más radicales idénticos o diferentes del grupo que consiste de halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, fosforilo, halo-alcoxi(C_1-C_4), mono y di[alquil(C_1-C_4)]amino, o un radical alquilo en el cual una pluralidad de grupos CH_2 no vecinos, preferiblemente 2 o 3 grupos CH_2 no vecinos se reemplazan en cada caso por un átomo de oxígeno;

Z^a es un grupo divalente de la fórmula $-O-$, $-S-$, $-CO-$, $-CS-$, $-CO-O-$, $-CO-S-$, $-O-CO-$, $-S-CO-$, $-SO-$, $-SO_2-$, $-NR^*-$, $-CO-NR^*-$, $-NR^*-CO-$, $-SO_2-NR^*-$, o $-NR^*-SO_2-$, el enlace a mano derecha del respectivo grupo divalente es el enlace al radical R^a , y R^* en los 5 últimos radicales mencionados, independientemente uno del otro, siendo en cada caso H, alquilo(C_1-C_4) o halo-alquilo(C_1-C_4);

Z^b , Z^c independientemente uno del otro, son un enlace directo o un grupo divalente de la fórmula $-O-$, $-S-$, $-CO-$, $-CS-$, $-CO-O-$, $-CO-S-$, $-O-CO-$, $-S-CO-$, $-SO-$, $-SO_2-$, $-NR^*-$, $-SO_2-NR^*-$, $-NR^*-SO_2-$, $-CO-NR^*-$ o $-NR^*-CO-$, el enlace a mano derecha del respectivo grupo divalente es el enlace del radical R^b o R^c , y R^* en los 5 últimos radicales mencionados, independientemente uno del otro, , siendo en cada caso H, alquilo(C_1-C_4) o halo-alquilo(C_1-C_4);

99


n es un entero de 0 a 4, preferiblemente 0, 1 o 2, en particular 0 o 1, y

m es un entero de 0 a 5, preferiblemente 0, 1, 2 o 3, en particular 0, 1 o 2;

preferiblemente los aseguradores de los compuestos de fórmula (S-V), en el cual

- R^{30} es $H_3C-O-CH_2-$, R^{31} es R^{33} es H, R^{34} es 2-OMe (V-1),
- 5 - R^{30} es $H_3C-O-CH_2-$, R^{31} es R^{33} es H, R^{34} es 2-OMe-5-Cl (V-2),
- R^{30} es ciclopropilo, R^{31} es R^{33} es H, R^{34} es 2-OMe (V-3),
- R^{30} es ciclopropilo, R^{31} es R^{33} es H, R^{34} es 2-OMe-5-Cl (V-4),
- R^{30} es ciclopropilo, R^{31} es R^{33} es H, R^{34} es 2-OMe (V-5),
- R^{30} es terc-butilo, R^{31} es R^{33} es H, R^{34} es 2-OMe (V-6).

- 10 d) Acilsulfamoilbenzamidias de la fórmula (S-VI), opcionalmente también en forma de sal,



en la cual

- 15 X^3 es CH o N;

R^{35} es hidrógeno, heterociclilo o un radical hidrocarburo, los dos últimos radicales mencionados siendo opcionalmente sustituidos por uno o más, radicales idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, carboxilo, CHO, CONH₂, SO₂NH₂ y Z^a-R^a ;

20

R^{36} es hidrógeno, hidroxilo, alquilo(C₁-C₆), alquenilo(C₂-C₆), alquinilo(C₂-C₆), alcoxi(C₁-C₆), alqueniloxi(C₂-C₆), los cinco últimos radicales mencionados siendo opcionalmente sustituidos por uno o más, radicales idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, hidroxilo,

25 alquilo(C₁-C₄), alcoxi(C₁-C₄) y alquiltio(C₁-C₄), o

R^{35} y R^{36} , juntos con el átomo de nitrógeno que llevan, son un anillo saturado o insaturado de 3 a 8 miembros;

R^{37} es halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, carboxilo, CHO, CONH₂, SO₂NH₂ o Z^b - R^b ;

5 R^{38} es hidrógeno, alquilo(C₁-C₄), alquenilo(C₂-C₄) o alquinilo(C₂-C₄);

R^{39} es halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, carboxilo, fosforilo, CHO, CONH₂, SO₂NH₂ o Z^c - R^c ;

R^a es un radical alquilo(C₂-C₂₀) cuya cadena de carbono se interrumpe una vez o varias veces por átomos de oxígeno, un radical heterociclilo o uno
10 hidrocarburo, los dos últimos radicales mencionados siendo opcionalmente sustituidos por uno o más, radicales idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, mono y di[alquilo(C₁-C₄)]amino;

R^b , R^c son idénticos o diferentes y son un radical alquilo(C₂-C₂₀) cuya cadena de
15 carbono se interrumpe una vez o varias veces por átomos de oxígeno, heterociclilo o un radical hidrocarburo, los dos últimos radicales mencionados opcionalmente estando sustituidos por uno o más, radicales idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxilo, fosforilo, haloalcoxi(C₁-C₄), mono y
20 di[alquilo(C₁-C₄)]amino;

Z^a es una unidad divalente seleccionada del grupo que consiste de O, S, CO, CS, C(O)O, C(O)S, SO, SO₂, NR^d, C(O)NR^d o SO₂NR^d;

Z^b , Z^c son idénticos o diferentes y son un enlace directo a una unidad divalente seleccionada del grupo que consiste de de O, S, CO, CS, C(O)O, C(O)S,
25 SO, SO₂, NR^d, SO₂NR^d o C(O)NR^d;

R^d es hidrógeno, alquilo(C₁-C₄), o haloalquilo(C₁-C₄);

n es un entero de 0 a 4, y

m es un entero de 0 a 5 donde X es CH y es un entero de 0 a 4 donde X es N;

preferiblemente los aseguradores de los compuestos de fórmula (S-VI), en la cual

5 X^3 es CH;

R^{35} es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), cicloalquilo(C_3-C_6), alquenilo(C_2-C_6), cicloalquenilo(C_5-C_6), fenilo o heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene hasta 3 hetero-átomos seleccionados del grupo que consiste de nitrógeno, oxígeno y azufre, los seis últimos radicales mencionados opcionalmente estando sustituidos por uno o más, sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, alcoxi(C_1-C_6), haloalcoxi(C_1-C_6), alquilsulfinilo(C_1-C_2), alquilsulfonilo(C_1-C_2), cicloalquilo(C_3-C_6), alcóxicarbonilo(C_1-C_4), alquilcarbonilo(C_1-C_4), y fenilo y, en el caso de los radicales cíclicos, también alquilo(C_1-C_4) y haloalquilo(C_1-C_4);

R^{36} es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), alquenilo(C_2-C_6), alquinilo(C_2-C_6), los tres últimos radicales mencionados siendo opcionalmente sustituidos por uno o más, sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, hidroxilo, alquilo(C_1-C_4), alcoxi(C_1-C_4) y alquiltio(C_1-C_4);

R^{37} es halógeno, haloalquilo(C_1-C_4), haloalcoxi(C_1-C_4), nitro, alquilo(C_1-C_4), alcoxi(C_1-C_4), alquilsulfonilo(C_1-C_4), alcóxicarbonilo(C_1-C_4), o alquilcarbonilo(C_1-C_4);

R^{38} es hidrógeno;

25 R^{39} es halógeno, nitro, alquilo(C_1-C_4), haloalquilo(C_1-C_4), haloalcoxi(C_1-C_4), cicloalquilo(C_3-C_6), fenilo, alcoxi(C_1-C_4), ciano, alquiltio(C_1-C_4),


alquilsulfinilo(C₁-C₄), alquilsulfonilo(C₁-C₄), alcoxycarbonilo(C₁-C₄) o alquilcarbonilo(C₁-C₄);

n es un 0, 1 o 2 y

m es 1 o 2.

5

En particular, los compuestos del tipo que consisten de las acilsulfamoilbenzamidias de la siguiente fórmula (S-VII), que se describen, por ejemplo, en la WO-A-99/16744,



10

en la cual

R²¹ es ciclopropilo y R²² es H (S3-1 = 4-ciclopropilaminocarbonil-N-(2-metoxibenzoil)bencenosulfonamida; cipro-sulfamida);


R²¹ es ciclopropilo y R²² es 5-Cl (S3-2),

15 R²¹ es etilo y R²² es H (S3-3),

R²¹ es isopropilo y R²² es 5-Cl (S3-4) y


R²¹ es isopropilo y R²² es H (S3-5 = 4-isopropilaminocarbonil-N-(2-metoxibenzoil)bencenosulfonamida);

20 e) los compuestos del tipo que consisten de las N-acilsulfamoilfenilureas de la fórmula (S-VIII), que se describen, por ejemplo, en la EP-A-365484,




en la cual


A es un radical seleccionado del grupo que consiste de



- 5 R^α y R^β , independientemente uno del otro, son hidrógeno, alquilo C_1-C_8 , cicloalquilo C_3-C_8 , alqueno C_3-C_6 , alquino C_3-C_6 ,



o alcoxi C_1-C_4 sustituido por alcoxi C_1-C_4 o por



10

R^α y R^β juntos son un puente de alqueno C_4-C_6 o un puente de alqueno C_4-C_6 interrumpido por oxígeno, azufre, SO, SO₂, NH o -N(alquilo C_1-C_4)-,

R^γ es hidrógeno o alquilo C_1-C_4 ,

R^a y R^b , independientemente uno del otro, son hidrógeno, halógeno, ciano, nitro,
 15 trifluorometilo, alquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 , alquiltio C_1-C_4 , alquilsulfinilo C_1-C_4 ,
 alquilsulfonilo C_1-C_4 , -COOR^j, -CONR^kR^m, -CORⁿ, -SO₂NR^kR^m o -OSO₂-
 alquilo C_1-C_4 , o R^a y R^b juntos son un puente de alqueno C_3-C_4 que se
 puede sustituir por halógeno o alquilo C_1-C_4 , o un puente de alqueno C_3 -

99

C₄, que se puede sustituir por halógeno o alquiloC₁-C₄, o un puente de alcadienilenoC₄, que se puede sustituir por halógeno o alquiloC₁-C₄,

R^g y R^h, independientemente uno del otro, son hidrógeno, halógeno, alquiloC₁-C₄, trifluorometilo, metoxi, metiltio o -COOR^j,

5 R^c es hidrógeno, halógeno, alquiloC₁-C₄ o metoxi.

R^d es hidrógeno, halógeno, nitro, alquiloC₁-C₄, alcoxiC₁-C₄, alquiltioC₁-C₄, alquilsulfiniloC₁-C₄, alquilsulfoniloC₁-C₄, -COOR^j o -CONR^kR^m,

R^e es hidrógeno, halógeno, alquiloC₁-C₄, -COOR^j, trifluorometilo o metoxi, o R^d y R^e juntos son un puente de alquilenoc₃-C₄,

10 R^f es hidrógeno, halógeno o alquiloC₁-C₄,

R^x y R^y, independientemente uno del otro, son hidrógeno, halógeno, alquiloC₁-C₄, alcoxiC₁-C₄, alquiltioC₁-C₄, -COOR⁴, trifluorometilo, nitro o ciano,

R^j, R^k y R^m, independientemente uno del otro, son hidrógeno o alquiloC₁-C₄,

R^k y R^m juntos son un puente de alquilenoc₄-C₆, o un puente de alquilenoc₄-C₆

15 interrumpido por oxígeno, NH o -N(alquiloC₁-C₄)-, y

Rⁿ es alquiloC₁-C₄, fenilo o fenilo sustituido por halógeno, alquiloC₁-C₄, metoxi, nitro o trifluorometilo;

preferiblemente los aseguradores de la fórmula (S-VIII) son

- 20 1-[4-(N-2-metoxibenzoilsulfamoil)fenil]-3-metilurea,
1-[4-(N-2-metoxibenzoilsulfamoil)fenil]-3,3-dimetilurea,
1-[4-(N-4,5-dimetilbenzoilsulfamoil)fenil]-3-metilurea,
1-[4-(N-naftoilsulfamoil)fenil]-3,3-dimetilurea,

que incluye los estereoisómeros y las sales de costumbre en agricultura.

25

A menos que se defina de otra manera específicamente, en general las siguientes definiciones aplican a los radicales de las fórmulas (S-II) a (S-VIII).

Los radicales alquilo, alcoxi, haloalquilo, haloalcoxi, alquilamino y alquiltio y los correspondientes radicales insaturados y/o sustituidos pueden ser en cada caso de cadena recta o ramificada en el esqueleto de carbono.

5

Los radicales alquilo, también en significados de combinación, tal como alcoxi, haloalquilo, etc., preferiblemente tienen de 1 a 4 átomos de carbono y son, por ejemplo, metilo, etilo, n-propilo o isopropilo, n-butilo, isobutilo, terc-butilo o 2-butilo.

Los radicales alquenilo y alquinilo tienen los significados de los posibles radicales insaturados que corresponden a los radicales alquilo; alquenilo es, por ejemplo, alilo, 1-metilprop-2-en-1-ilo, 2-metilprop-2-en-1-ilo, but-2-en-1-ilo, but-3-en-1-ilo, 1-metilbut-3-en-1-ilo y 1-metilbut-2-en-1-ilo. Alquinilo es, por ejemplo, propargilo, but-2-in-1-ilo, but-3-in-1-ilo, 1-metilbut-3-in-1-ilo.

15 "Alquilo(C₁-C₄)" es la notación abreviada para alquilo que tiene 1 a 4 átomos de carbono; lo mismo aplica a las otras definiciones generales de los radicales que tienen rangos establecidos entre paréntesis para el posible número de átomos de carbono.

20 Cicloalquilo es preferiblemente un radical alquilo cíclico que tiene 3 a 8, preferiblemente 3 a 7, particularmente preferiblemente 3 a 6, átomos de carbono, por ejemplo ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo. Cicloalquenilo y cicloalquinilo son los compuestos insaturados correspondientes.

25 Halógeno es flúor, cloro, bromo o yodo. Haloalquilo, haloalquenilo y haloalquinilo son alquilo, alquenilo o alquinilo parcial o completamente sustituidos por halógeno, preferiblemente por flúor, cloro y/o bromo, en particular por flúor o cloro, por

901

ejemplo, CF_3 , CHF_2 , CH_2F , CF_2CF_3 , CH_2CHFCl , CCl_3 , CHCl_2 , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$. Haloalcoxi es, por ejemplo, OCF_3 , OCHF_2 , OCH_2F , OCF_2CF_3 , OCH_2CF_3 y $\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$. Lo mismo aplica a otros radicales sustituidos con halógeno.

- 5 Un radical hidrocarburo puede ser un radical hidrocarburo aromático o alifático, un radical hidrocarburo alifático que es generalmente de cadena recta o un radical hidrocarburo saturado o insaturado ramificado, que tiene preferiblemente de 1 a 18, particularmente de manera preferible 1 a 12, átomos de carbono, por ejemplo, alquilo, alquenilo o alquinilo.

10

Preferiblemente, un radical hidrocarburo alifático es alquilo, alquenilo o alquinilo que tiene hasta 12 átomos de carbono; lo mismo aplica a un radical hidrocarburo alifático en un radical hidrocarburo-oxi.

- 15 Arilo es generalmente un sistema aromático mono, bi o policíclico que tiene preferiblemente 6 a 20 átomos de carbono, preferiblemente 6 a 14 átomos de carbono, particularmente de manera preferible 6 a 10 átomos de carbono, por ejemplo, fenilo, naftilo, tetrahidronaftilo, indenilo, indanilo, pentalenilo y fluórenlo, particularmente de manera preferible fenilo.

20

El anillo heterocíclico, radical heterocíclico o heterociclilo es un sistema de anillo mono, bi o policíclico que es saturado, insaturado y/o aromático y que contiene uno o más, preferiblemente 1 a 4 hetero-átomos, preferiblemente seleccionados del grupo que consiste de N, S y O.

25

Los heterociclos saturados que tienen 3 a 7 átomos en el anillo y uno o dos hetero-átomos seleccionados del grupo que consiste de N, O y S se prefieren,

p2

siendo los chalcogenos no vecinos. Los anillos monocíclicos que tienen 3 a 7 átomos por anillo y un hetero-átomo seleccionado del grupo que consiste de N, O y S, y morfolino, dioxolano, piperazina, imidazolina y oxazolidina, se prefieren en particular. Los heterociclos saturados particularmente preferidos son oxirano, 5 pirrolidona, morfolino y tetrahidrofurano.

Los heterociclos parcialmente insaturados que tienen 5 a 7 átomos por anillo y uno o dos heteroátomos seleccionados del grupo que consiste de N, O y S también se prefieren. Los heterociclos parcialmente insaturados que tiene 5 o 6 átomos por 10 anillo y un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste de N, O y S se prefieren particularmente. Los heterociclos parcialmente insaturados muy particularmente preferidos son pirazolina, imidazolina e isoxazolina.

Heteroarilo, por ejemplo, heterociclos aromáticos mono o bicíclicos que tienen 5 o 15 6 átomos por anillo que contienen uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste de N, O, S, también se prefieren, los chalcogenos siendo no vecinos. Los heterociclos aromáticos monocíclicos que tienen 5 o 6 átomos por anillo que contienen un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste de N, O y S, y pirimidina, pirazina, piridazina, oxazol, tiazol, tiadiazol, oxadiazol, pirazol, 20 triazol e isoxazol, se prefieren particularmente. Se prefieren muy particularmente el pirazol, tiazol, triazol y furano.

Los radicales sustituidos, tales como radicales hidrocarburo sustituidos, por ejemplo, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo sustituidos, tales como fenilo, y 25 arilalquilo, tales como bencilo, o heterociclilo sustituido son un radical sustituido derivado de un cuerpo padre no sustituido, siendo preferiblemente los sustituyentes uno o más, preferiblemente 1, 2 o 3, sustituyentes, en el caso de Cl y

p3

F aún hasta el número máximo posible de sustituyentes, seleccionados del grupo que consiste de halógeno, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, hidroxilo, amino, nitro, carboxilo, ciano, ácido, alcóxicarbonilo, alquilocarbonilo, formilo, carbamilo, mono y dialquilaminocarbonilo, amino sustituido, tales como acilamino, mono y dialquilamino, y alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo y, en el caso de los radicales cíclicos, también alquilo y haloalquilo, y los sustituyentes alifáticos insaturados que corresponden a dichos sustituyentes que contienen hidrocarburo saturado, preferiblemente alquenilo, alquinilo, alquenilo, alquilo, alquilo. En el caso de los radicales que tienen átomos de carbono, se prefieren aquellos que tienen 1 a 4 átomos de carbono, en particular 1 o 2 átomos de carbono. Como regla, los sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, por ejemplo, flúor o cloro, alquilo(C₁-C₄), se prefieren preferiblemente metilo o etilo, haloalquilo(C₁-C₄), preferiblemente trifluorometilo, alcoxi(C₁-C₄), preferiblemente metoxi o etoxi, haloalcoxi(C₁-C₄), nitro y ciano. Se prefieren particularmente los sustituyentes metilo, metoxi y cloro.

Amino mono o disustituido es un radical químicamente estable seleccionado del grupo que consiste de radicales amino sustituidos que son N-sustituidos, por ejemplo, por uno o dos radicales idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de alquilo, alcoxi, acilo y arilo; preferiblemente monoalquilamino, dialquilamino, acilamino, arilamino, N-alquil-N-arilamino y N-heterociclos. Se prefieren los radicales alquilo que tienen de 1 a 4 átomos de carbono. El arilo es preferiblemente fenilo. El arilo sustituido es preferiblemente fenilo sustituido. La definición mencionada adicionalmente adelante, preferiblemente alcanoilo(C₁-C₄), es aplicable para acilo. Lo mismo aplica a hidroxilamino o hidrazino sustituido.

109

El fenilo opcionalmente sustituido es preferiblemente fenilo que no es sustituido o mono o polisustituido, preferiblemente hasta trisustituido, en el caso del halógeno, tal como Cl o F, también hasta pentasustituido, por radicales idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, alquilo(C₁-C₄), alcoxi(C₁-C₄), haloalquilo(C₁-C₄), haloalcoxi(C₁-C₄) y nitro, por ejemplo, o-, m- y p-tolilo, dimetilfenilos, 2-, 3- y 4-clorofenilo, 2-, 3- y 4-trifluoro- y triclorofenilo, 2,4-, 3,5-, 2,5- y 2,3-diclorofenilo, o-, m-, y p-metoxifenilo.

Un radical acilo es el radical de un ácido orgánico que tiene preferiblemente hasta 6 átomos de carbono, por ejemplo el radical de un ácido carboxílico y los radicales de los ácidos derivados de éstos, tales como ácido tiocarboxílico, opcionalmente ácidos iminocarboxílicos N-sustituidos, o el radical de monoésteres de ácido carbónico, ácidos carbámicos opcionalmente N-sustituidos, ácidos sulfónicos, ácidos sulfínicos, ácidos fosfónicos, ácidos fosfínicos. El acilo es, por ejemplo, formililo, alquilcarbonilo, tal como (alquilC₁-C₄)carbonilo, fenilcarbonilo, siendo posible para el anillo de fenilo ser sustituido, por ejemplo, como se estableció anteriormente para fenilo, o alquiloxicarbonilo, feniloxicarbonilo, benciloxicarbonilo, alquilsulfonilo, alquilsulfinilo o N-alquil-1-iminoalquilo.

Las fórmulas (S-II) a (S-VIII) también comprenden todos los estereoisómeros que tienen el mismo enlace topológico de los átomos, y mezclas de éstos. Tales compuestos contienen uno o más átomos de carbono asimétricos o aún dobles enlaces, que no se muestran especialmente en la fórmula general. Los posibles estereoisómeros definidos por su forma espacial específica, tales como los enantiómeros, diastereómeros, isómeros Z y E, se pueden obtener mediante métodos de costumbre de las mezclas de los estereoisómeros o se pueden



preparar mediante reacciones estereoselectivas en combinación con el uso de materiales de partida estereoquímicamente puros.

Los compuestos de la fórmula (S-II) se describen, por ejemplo, en la EP-A-0333131 (ZA-89/1960), EP-A-0269806 (US 4,891,057), EP-A-0346620 (AU-A-89/34951), EP-A-0174562, EP-A-0346620 (WO-A-91/08202), WO-A-91/07874 o WO-A-95/07897 (ZA 94/7120) y la literatura citada allí o se pueden preparar mediante o análogamente a los procesos descritos allí. Los compuestos de la fórmula (S-II) se describen en la EP-A-0086750, EP-A-094349 (US 4,902,340), EP-A-0191736 (US 4,881,966) y EP-A-0492366 y la literatura citada allí o se pueden preparar mediante o análogamente a los procesos descritos allí. Algunos compuestos se describen adicionalmente en la EP-A-0582198 y la WO-A-02/34048. Los compuestos de la fórmula (S-IV) se describen en numerosas solicitudes de patente, por ejemplo la US 4,021,224 y la US 4,021,229. Los compuestos del subgrupo b) se describen adicionalmente en la CN-A-87/102789, la EP-A-365484 y en "The Pesticide Manual", 11th to 13th edition, British Crop Protection Council and The Royal Society of Chemistry (1997). Los compuestos del subgrupo c) se describen en la WO-A-97/45016, aquellos del subgrupo d) en la WO-A-99/16744 (en particular en la EP-A-365484). Los documentos citados contienen información detallada a cerca de procesos de preparación y los materiales de partida y mencionan los compuestos preferidos. Se hace referencia expresamente a estas publicaciones y ellos se consideran como parte de esta descripción a través de las citas.

Los aseguradores de los grupos anteriores a) a e) reducen o suprimen los efectos fitotóxicos que pueden ocurrir con el uso de herbicidas de acuerdo con la invención en cultivos de plantas útiles sin dañar la eficiencia de los herbicidas

contra las plantas dañinas. Como resultado de esto, el campo de uso de los herbicidas se puede extender considerablemente y en particular el uso de herbicidas que se podrían utilizar a la fecha solamente en una extensión limitada o con éxito insuficiente, es decir, de combinaciones que, sin asegurador, en bajas
5 dosis con un pobre espectro de actividad, conducen a un control insuficiente de las plantas dañinas, es por el uso de aseguradores.

Entre otros, los aseguradores particularmente preferidos en las formulaciones de acuerdo con la invención son: 4-dicloroacetil-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decano (AD-67),
10 1-dicloroacetilhexahidro-3,3,8a-trimetilpirrolo[1,2-a]pirimidin-6(2H)-ona (diciclonon, BAS-145138), 4-dicloroacetil-3,4-dihidro-3-metil-2H-1,4-benzoxazina (benoxacor), cloquintocet, 1-metilhexil 5-cloroquinolin-8-oxiacetato (cloquintocet-mexilo), α -(cianometoxiimino)fenilacetoniitrilo (ciometrinilo), 2,2-dicloro-N-(2-oxo-2(2-propenilamino)etil)-N-(2-propenil)acetamida (DKA-24), 2,2-dicloro-N,N-di-2-
15 propenilacetamida (dicloromid), N-(4-metilfenil)-N'-(1-metil-1-feniletil)urea (dymron), 4,6-dicloro-2-fenilpirimidina (fenclorim), etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-triclorometil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxilato (fenclorazol-etilo), fenilmetil 2-cloro-4-trifluorometiltiazol-5-carboxilato (flurazol), 4-cloro-N-(1,3-dioxolan-2-ilmetoxi)- α -trifluoroacetofenona oxima (fluxofenim), 3-dicloroacetil-5-(2-furanil)-2,2-
20 dimetiloxazolidina (furilazol, MON-13900), etil-4,5-dihidro-5,5-difenil-3-isoxazol-carboxilato (isoxadifen-etilo), dietil 1-(2,4-diclorofenil)-4,5-dihidro-5-metil-1H-pirazol-3,5-dicarboxilato (mefenpir-dietilo), 2-diclorometil-2-metil-1,3-dioxolano (MG-191), anhídrido 1,8-naftálico, α -(1,3-dioxolan-2-ilmetoximino)fenilacetoniitrilo (oxabetrinil), 2,2-dicloro-N-(1,3-dioxolan-2-ilmetil)-N-(2-propenil)acetamida (PPG-
25 1292), 3-dicloroacetil-2,2-dimetiloxazolidina (R-28725), 3-dicloroacetil-2,2,5-trimetiloxazolidina (R-29148), metil 1-(2-clorofenil)-5-fenil-1H-pirazol-3-carboxilato, 4-ciclopropilaminocarbonil-N-(2-metoxibenzoil)bencenosulfonamida,

107

(ciprosulfamida), 4-isopropilaminocarbonil-N-(2-metoxibenzoil)bencenosulfonamida y N-(2-metoxibenzoil)-4-[(metilaminocarbonil)amino]bencenosulfonamida.

Se prefieren muy particularmente los aseguradores mefenpir-dietilo, cloquintocet-mexilo, isoxadifen-etilo, 4-ciclopropilaminocarbonil-N-(2-metoxibenzoil)bencenosulfonamida (ciprosulfamida), 4-isopropilamino-carbonil-N-(2-metoxibenzoil)bencenosulfonamida o fenclorazol-etilo; en particular, se prefieren muy particularmente mefenpir-dietilo, cloquintocet-mexilo o isoxadifen-etilo.

10

Las modalidades particulares de la invención son el método para mejorar la penetración y el uso de estos, TBEP en cantidades de acuerdo con la invención (B) estando aplicado simultánea o secuencialmente con mezclas de herbicidas y aseguradores (A).

15

Las mezclas herbicida-asegurador preferidas son combinaciones de los siguientes compuestos con algún otro:

a) compuestos que son efectivos como inhibidores ACCasa, tal como aloxidim, butroxidim, cletodim, clodinafop-propargilo, cicloxidim, cihalofop-butilo, diclofop-metilo, fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, fenoxaprop-P, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop, fluazifop-P-butilo, fluazifop-butilo, haloxifop, haloxifop-P, haloxifop-etotilo, haloxifop-P-metilo, metamifop, profoxidim, propaquizafop, quizalofop-P-tefurilo, quizalofop-P-etilo, setoxidim, tepraloxidim, tralcoxidim e isoxapirifop,

25

YSA

b) los compuestos que son efectivos como inhibidores de p-hidroxifenil piruvato dioxigenasa (HPPD), tal como benzobiciclon, benzofenap, isoxaflutol y sus dicetonitrilos, mesotriona, pirazolinato, pirazoxifeno, sulcotriona e isoxaclortola,

- 5 c) los compuestos de diferentes grupos de las sustancias activas, tales como atrazin, acetoclor, aclonifen, alaclor, amidoclor, amidosulfúron, azimsulfúron, bentazon, benzulfuron(metilo), bromoxinil(-octanoato/heptanoato), butaclor, bispiribac, clorsulfúron, clorimuron, clomazona, clopiralid, cinosulfúron, ciclosulfamuron, 2,4-D-éster, 2,4-DB-éster, 2,4-DP-éster, CMPP-éster, MCPA-
10 éster, MCPB, EPTC, desmedifam, diflufenican, dicamba, etoxisulfúron, etofumesat, flazasulfúron, florasulam flucarbazona, flumetsulam, flufenacet, fluoroglicofeno, fluoxipir, flupirsulfúron, foramsulfúron, flumioxazina, flumiclorac, fomesafen, flufosinato, flifosato, imazapir, imazosulfúron, yodosulfúron, yodosulfurón-metilo, ioxinil(-octanoato), lactofen, halosulfúron, imazamox,
15 imazapic, imazapir, imazetapir, imazaquin, metosulam, mesosulfuron(-metilo), (S-)metolaclor, metsulfurón-metilo, metamitron, nicosulfúron, oxifluorfen, pentimetalin, fenmedifam, picloram, pinoxaden, primisulfurón-metilo, prosulfúron, propanilo, propoxicarbazona, pirazosulfuron(-metilo), rimsulfúron, sulfentrazona, sulfosulfúron, sulfometuron, terbutilazin, tifensulfúron, triasulfúron, tribenuron,
20 triclopir, triflusulfurón-metilo, trifluralina, tritosulfúron, topamezona, oxazinon, oxadiargilo, metribuzin, y sales de éstos, por ejemplo, sales de sodio.

- d) los compuestos que son efectivos como aseguradores, tales como AD 67 (4-(dicloroacetil)-1-oxa-4-azaspiro[4,5]decano), benoxacor, CL 304,415 (ácido(4-
25 carboximetilcroman-4-carboxílico), cloquintocet, cloquintocet-mexilo, ciprosumfamidá, dicloromid, diciclonon, DKA-24 (N1,N2-dialil-N2-dicloroacetilglicinamida), fenclorazol, fenclorazol-etilo, fenclorim, flurazol,

189

fluxofenim, furilazol, isoxadifen-etilo, mefenpir-dietilo, MG 191 (2-diclorometil-2-metil-1,3-dioxolano), anhídrido naftálico (anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxílico), oxabetrinil y TI-35 (1-dicloroacetilazepano).

- 5 En una modalidad adicional, por ejemplo, se pueden combinar diferentes herbicidas uno con otro, por ejemplo, fenoxaprop-p-etilo + octanoato de ioxinilo, diclofop-metilo + octanoato de bromoxinilo, CMPP + octanoato de bromoxinilo, MCPA + octanoato de ioxinilo, octanoato de bromoxinilo + heptanoato de bromoxinilo, octanoato de bromoxinilo + heptanoato de bromoxinilo + MCPA,
- 10 octanoato de bromoxinilo + heptanoato de bromoxinilo + 2,4-D, fenmedifam + desmedifam, fenmedifam + desmedifam + etofumesato, metamitron + etofumesato, fenmedifam + etofumesato + metamitron, fenoxaprop-p-etilo + yodosulfurón-metil-sodio, fenoxaprop-p-etilo + diclofop-metilo, fenoxaprop-p-etilo + yodosulfurón-metil-sodio + diclofop-metilo.

15

- Las combinaciones particularmente preferidas son las siguientes: foramsulfurón + yodosulfurón-metil-sodio + isoxadifen-etilo, yodosulfurón-metil-sodio + isoxadifen-etilo, foramsulfurón + isoxadifen-etilo, fenoxaprop-P-etilo + etoxisulfurón + isoxadifen-etilo, etoxisulfurón + isoxadifen-etilo, fenoxaprop-P-etilo + isoxadifen-
- 20 etilo, yodosulfurón-metil-sodio + mesosulfurón-metilo + mefenpir-dietilo, mesosulfurón-metilo + mefenpir-dietilo, yodosulfurón-metil-sodio + mefenpir-dietilo, fenoxaprop-P-etilo + mefenpir-dietilo, fenoxaprop-P-etilo + diclofop-metilo + mefenpir-dietilo, diclofop-metilo + mefenpir-dietilo, diclofop-metilo + setoxidim + mefenpir-dietilo, setoxidim + mefenpir-dietilo, fenoxaprop-P-etilo + isoproturón +
- 25 mefenpir-dietilo, isoproturón + mefenpir-dietilo, clodinafop-propargilo + cloquintocet-mexilo, fenoxaprop-etilo + feclorazol-etilo, fenoxaprop-P-etilo + fenclorazol-etilo, flucarbazona + ciprosumamida, foramsulfurón + ciprosumamida,

116

yodosulfuron(-metilo) + ciprosofamida, metosulam + ciprosofamida, metsulfuron(-metilo) + ciprosofamida, nicosulfurón + ciprosofamida, primisulfuron(.metilo) + ciprosofamida, prosulfurón + ciprosofamida, tifensulfurón + ciprosofamida, tribenurón + ciprosofamida, cloransulam-metilo + ciprosofamida, clorimurón +

5 ciprosofamida, etoxisulfurón + ciprosofamida, flazasulfurón + ciprosofamida, florasulam + ciprosofamida, flumetsulam + ciprosofamida, halosulfurón + ciprosofamida, imazamox + ciprosofamida, imazapic + ciprosofamida, imazapir + ciprosofamida, imazetapir + ciprosofamida, mesosulfurón + ciprosofamida, propoxicarbazona + ciprosofamida, sulfosulfurón + ciprosofamida, amidosulfurón

10 + ciprosofamida, clorsulfurón + ciprosofamida, imazaquin + ciprosofamida, triasulfurón + ciprosofamida, sulfometurón + ciprosofamida, ciclosulfamurón + ciprosofamida, flupirsulfurón + ciprosofamida, pirazosulfurón + ciprosofamida, azimsulfurón + ciprosofamida, bensulfurón + ciprosofamida, bispiribac + ciprosofamida, rimsulfurón + ciprosofamida, tritosulfurón + ciprosofamida,

15 sulcotriona + ciprosofamida, clomazona + ciprosofamida, mesotriona + ciprosofamida, topramezona + ciprosofamida, metribuzina + ciprosofamida, bentazon + ciprosofamida, bromoxinilo + ciprosofamida, propanilo + ciprosofamida, atrazina + ciprosofamida, terbutilazina + ciprosofamida, EPTC + ciprosofamida, tepraloxidim + ciprosofamida, cletodim + ciprosofamida, alloixidim

20 + ciprosofamida, setoxidim + ciprosofamida, tralcoxidim + ciprosofamida, clodinafop-propargilo + ciprosofamida, cihalofof-butilo + ciprosofamida, diclofof-metilo + ciprosofamida, fenoxaprop-P-etilo + ciprosofamida, fluazifop-P-butilo + ciprosofamida, haloxifop-metilo + ciprosofamida, haloxifop-etotilo + ciprosofamida, haloxifop-R-metilo + ciprosofamida, haloxifop-etoxietilo +

25 ciprosofamida, propaquizafop + ciprosofamida, quizalofop-P-tefurilo + ciprosofamida, quizalofop-P-etilo + ciprosofamida, acetoclor + ciprosofamida, S-metolaclor + ciprosofamida, flumioxazin + ciprosofamida, flumiclorac +

ciprosulfamida, fomesafen + ciprosulfamida, sulfentrazona + ciprosulfamida, dicamba + ciprosulfamida, MCPA + ciprosulfamida, MCPB + ciprosulfamida, 2,4-D + ciprosulfamida, clopiralid + ciprosulfamida, fluroxipir + ciprosulfamida, picloram + ciprosulfamida, triclopir + ciprosulfamida, glufosinato + ciprosulfamida, glifosato +
5 ciprosulfamida y pendimetalina + ciprosulfamida.

El asegurador: la proporción en peso de herbicida puede variar dentro de límites amplios y está preferiblemente en el rango de 1 : 100 a 100 : 1, en particular de 1 :
100 a 50 : 1, particularmente muy preferible de 1 : 10 a 10 : 1. Las cantidades
10 óptimas respectivas del o los herbicidas y el o los aseguradores usualmente son dependientes del tipo de herbicida y/o del asegurador utilizado y del tipo de planta que se va a tratar.

Los agentes de protección de cultivo de acuerdo con la invención muy
15 particularmente de manera preferible incluyen herbicidas seleccionados del grupo que consiste de los inhibidores de ACCasa, tales como aloxidim, butroxidim, cletodim, clodinafop-propargilo, cicloxidim, cihalofop-butilo, diclofop-metilo, fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, fenoxaprop-P, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop, fluazifop-P-butilo, fluazifop-butilo, haloxifop, haloxifop-P, haloxifop-etotilo,
20 haloxifop-P-metilo, metamifop, profoxidim, propaquizafop, quizalofop-P-tefurilo, quizalofop-P-etilo, setoxidim, tepraloxidim, tralcoxidim e isoxapirifop; seleccionados del grupo que consisten de inhibidores de p-hidroxifenil piruvato dioxigenasa (HPPD), tal como benzobiciclon, benzofenap, isoxaflutol y sus dicetonitrilos, mesotriona, pirazolinato, pirazoxifeno, sulcotriona e isoxaclortola;
25 seleccionados del grupo que consiste de los inhibidores ALS, hidroxibenzonitrilos y diferentes grupos adicionales de sustancias activas, tales como atrazina, acetoclor, aclonifen, alaclor, amidochlor, amidosulfúron, azimsulfúron, bentazon,

bensulfuron(-metilo), bromoxinil(-octanoato/heptanoato), butaclor, bispiribac, clorsulfúron, clorimuron, clomazona, clopiralid, cinosulfúron, ciclosulfamuron, 2,4-D-éster, 2,4-DB-éster, 2,4-DP-éster, CMPP-éster, MCPA-éster, MCPB, EPTC, desmedifam, diflufenican, dicamba, etoxisulfúron, etofumesato, flazasulfúron, 5 florasulam, flucarbazona, flumetsulam, flufenacet, fluoroglicofeno, fluroxipir, flupirsulfúron, foramsulfúron, flumioxazina, flumiclorac, fomesafen, glufosinato, glifosato, imazapir, imazosulfúron, yodosulfúron, yodosulfurón-metilo, ioxinil(-octanoato), lactofen, halosulfúron, imazamox, imazapic, imazapir, imazetapir, imazaquin, metosulam, mesosulfuron(-metilo), (S-)metolaclor, metsulfurón-metilo, 10 metamitron, nicosulfúron, oxifluorfen, pendimetalina, fenmedifam, picloram, pinoxaden, primisulfurón-metilo, prosulfúron, propanilo, propoxicarbazona, pirazosulfuron(-metilo), rimsulfúron, sulfentrazona, sulfosulfúron, sulfometuron, terbutilazin, trifensulfúron, triasulfúron, tribenuron, triclopir, triflusulfurón-metilo, trifluralina, tritosulfúron, topramezona, oxazinona, oxadiargilo, metribuzina, y sales 15 de éstos, por ejemplo las sales de sodio; seleccionadas del grupo que consiste de los reguladores de crecimiento de las plantas, tales como etefon, ciclanilida y tidiazuron; seleccionados del grupo que consiste de los aseguradores, tales como AD 67 (4-(dicloroacetil)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decano, benoxacor, CL 304,415 ácido (4-carboximetilcroman-4-carboxílico), cloquintocet, cloquintocet-mexilo, 20 ciprosulfamida, diclormid, diciclonon, DKA-24, (N1,N2-diallil-N2-dicloroacetilglicinamida), fenclorazol, fenclorazol-etilo, fenclorim, flurazol, fluxofenim, furilazol, isoxadifen-etilo, mefenpir-dietilo, MG 191 (2-diclorometil-2-metil-1,3-dioxolano), anhídrido naftálico (anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxílico), oxabetrinil y TI-35 (1-dicloroacetilazepano); y mezclas de herbicidas y 25 aseguradores, tales como mezclas de isoxadifen-etilo con foramsulfúron, yodosulfurón-metil-sodio, fenoxaprop-P-etilo, etoxisulfúron, tales como mezclas de mefenpir-dietilo con yodosulfurón-metil-sodio, mesosulfurón-metilo, fenoxaprop-P-

(33)

- etilo, diclofop-metilo, setoxidim, isoproturon, tal como clodinafop-propargilo + cloquintocet-mexilo, tal como fenoxaprop-P-etilo + fenclorazol-etilo, tales como mezclas de ciprosulfamida con flucarbazona, foramsulfúron, yodosulfuron(-metilo), metosulam, metsulfuron(-metilo), nicosulfúron, primisulfuron(-metilo), prosulfúron,
- 5 tifensulfúron, tribenuron, clorasulam-metilo, clorimuron, etoxisulfúron, flazasulfúron, florasulam, flumetsulam, halosulfúron, imazamox, imazapic, imazapir, imazetapir, mesosulfúron, propoxicarbazona, sulfosulfúron, amidosulfúron, clorsulfúron, imazaquina, triasulfúron, sulfometuron, ciclosulfamuron, flupirsulfúron, pirazosulfúron, azimsulfúron, bensulfúron,
- 10 bispiribac, rimsulfúron, tritosulfúron, sulcotriona, clomazona, mesotriona, topramezona, metribusina, bentazona, bromoxinilo, propanilo, atrazina, terbutilazina, EPTC, tepraloxidim, cletodim, alloixdim, setoxidim, tralcoixdim, clodinafop-propargilo, cihalofop-butilo, diclofop-metilo, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop-P-butilo, haloxifop-metilo, haloxifop-etotilo, haloxifop-R-metilo, haloxifop-
- 15 etoxietilo, propaquizafop, quizalofop-P-tefurilo, quizalofop-P-etilo, acetoclor, S-metolaclor, flumioxazina, flumiclorac, fomesafen, sulfentrazona, dicamba, MCPA, MCPB, 2,4-D, clopiralid, fluroxipir, picloram, triclopir, glufosinato, glifosato, pendimetalina.
- 20 Los agentes de protección de cultivo utilizados en el método de acuerdo con la invención contienen como regla de 0.01 a 99% en peso, en particular de 0.1 a 95% en peso, de las sustancias activas seleccionadas del grupo que consiste de herbicidas y/o aseguradores. Las tasas de aplicación por unidad de área del componente (A) están en general entre 10 y 2000 g AS/ha (AS = sustancia activa,
- 25 es decir la tasa de aplicación con base en la sustancia activa), preferiblemente entre 50 y 300 g AS/ha.

164

El tributoxietil fosfato (TBEP) como componente (B) tiene el reg. CAS no.: 78-51-3 y se describe en detalle en sus propiedades adicionales bajo esta entrada en la literatura técnica.

- 5 El contenido de TBEP (B) en los agentes de protección de cultivos utilizados en el método de acuerdo con la invención es dependiente de la tasa de aplicación por unidad de área, es decir, por hectárea (ha) y se debe por lo tanto adaptar apropiadamente. Esto también aplica a la preparación de una solución de aplicación, por ejemplo un licor de pulverizado, con el uso del método de acuerdo
- 10 con la invención. Las tasas de aplicación por unidad de área para TBEP (B) están entre 2.5 y 150 g/ha, preferiblemente desde 5 a 100 g/ha, particularmente preferido de 10 a 100 g/ha, el volumen del licor de pulverizado siendo como una regla 100-500 l/ha.
- 15 Si es apropiado, la adición de uno o más emulsificadores puede ser necesario como el componente (C) en la preparación de agentes de protección de cultivo utilizados en el método de acuerdo con la invención y/o la aplicación de acuerdo con el método de acuerdo con la invención, preferiblemente en la forma de licores de pulverizado. Los emulsificadores adecuados se seleccionan del grupo que
- 20 consiste de emulsificadores iónicos y no iónicos y mezclas de éstos que tienen valores HLB de desde 10 a 17 (por ejemplo, emulsificador 1371B). Ellos se pueden agregar directamente y/o a través de la formulación de los componentes (A) y/o (B).
- 25 Las tasas de aplicación por unidad de área del componente (C) en la aplicación del agente de protección de cultivo de acuerdo con la invención y/o del proceso de

115

acuerdo con la invención está en general entre 10 y 200 g/ha, preferiblemente entre 20 y 200 g/ha.

Todos los auxiliares de formulación de costumbre, tales como los disolventes orgánicos, los antiespumantes, los emulsificadores difieren del componente (C), dispersantes, conservantes, ácidos y bases, tintes, rellenos y también agua, son adecuados como auxiliares adicionales y aditivos (componente D) que puede estar presente en las formulaciones que son preferiblemente líquidas de acuerdo con el método de acuerdo con la invención.

10

Los disolventes orgánicos adecuados son todos los disolventes orgánicos de costumbre que disuelven fácilmente las sustancias activas agroquímicas utilizadas. Los hidrocarburos alifáticos y aromáticos opcionalmente halogenados, tales como tolueno, xileno, Solvesso[®], aceites vegetales y minerales, tales como espíritu mineral, petróleo, alquilbencenos y aceite de eje, y adicionalmente propileno carbonato, tetraclorometano, cloroformo, cloruro de metileno y diclorometano, y adicionalmente ésteres, tales como etil acetato, lactatos y adicionalmente lactonas, tal como butirolactona, y adicionalmente se pueden preferiblemente mencionar lactamas, tales como N-metilpirrolidona, N-octilpirrolidona, N-dodecilpirrolidona, N-octilcaprolactama y N-metilcaprolactama, γ -butirolactona, dimetilformamida, y tributil fosfato.

20

Los antiespumantes adecuados son los antiespumantes de costumbre presentes en las formulaciones de las sustancias agroquímicas activas. Se pueden mencionar por vía de ejemplo los aceites de silicona, las dispersiones de aceites de silicona, estearato de magnesio, ácidos fosfínico y fosfónico, en particular Fluowet PL 80[®].

25

16

Los emulsificadores adecuados que difieren del componente (C) son las sustancias activas de superficie de costumbre presentes en formulaciones de las sustancias agroquímicas activas. Los nonilfenoles etoxilados, el polietilenglicol éter de alcoholes lineales, los alcoholes alcoxilados lineales y ramificados saturados e insaturados que están terminados en cubierta y aquellos que no están terminados con cubierta, los productos de reacción de alquilfenoles con óxido de etileno y/o óxido de propileno, copolímeros de bloque de óxido de etileno-óxido de propileno, glicoles de polietileno y polipropilenglicoles, y adicionalmente se pueden

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

1415

1420

1425

1430

1435

1440

1445

1450

1455

1460

1465

1470

1475

1480

1485

1490

1495

1500

1505

1510

1515

1520

1525

1530

1535

1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

1575

1580

1585

1590

1595

1600

1605

1610

1615

1620

1625

1630

1635

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

1690

1695

1700

1705

1710

1715

1720

1725

1730

1735

1740

1745

1750

1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

1805

1810

1815

1820

1825

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

2105

2110

2115

2120

2125

2130

2135

2140

2145

2150

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185

2190

2195

2200

2205

2210

2215

2220

2225

2230

2235

2240

2245

2250

2255

2260

2265

2270

2275

2280

2285

2290

2295

2300

2305

2310

2315

2320

2325

2330

2335

2340

2345

2350

2355

2360

2365

2370

2375

2380

2385

2390

2395

2400

2405

2410

2415

2420

2425

2430

2435

2440

2445

2450

2455

2460

2465

2470

2475

2480

2485

2490

2495

2500

2505

2510

2515

2520

2525

2530

2535

2540

2545

2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585

2590

2595

2600

2605

2610

2615

2620

2625

2630

2635

2640

2645

2650

2655

2660

2665

2670

2675

2680

2685

2690

2695

2700

2705

2710

2715

2720

2725

2730

2735

2740

2745

2750

2755

2760

2765

2770

2775

2780

2785

2790

2795

2800

2805

2810

2815

2820

2825

2830

2835

2840

2845

2850

2855

2860

2865

2870

2875

2880

2885

2890

2895

2900

2905

2910

2915

2920

2925

2930

2935

2940

2945

2950

2955

2960

2965

2970

2975

2980

2985

2990

2995

3000

3005

3010

3015

3020

3025

3030

3035

3040

3045

3050

3055

3060

3065

3070

3075

3080

3085

3090

3095

3100

3105

3110

3115

3120

3125

3130

3135

3140

3145

3150

3155

3160

3165

3170

3175

3180

3185

3190

3195

3200

3205

3210

3215

3220

3225

3230

3235

3240

3245

3250

3255

3260

3265

3270

3275

3280

3285

3290

3295

3300

3305

3310

3315

3320

3325

3330

3335

3340

3345

3350

3355

3360

3365

3370

3375

3380

3385

3390

3395

3400

3405

3410

3415

3420

3425

3430

3435

3440

3445

3450

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3485

3490

3495

3500

3505

3510

3515

3520

3525

3530

3535

3540

3545

3550

3555

3560

3565

3570

3575

3580

3585

3590

3595

3600

3605

3610

3615

3620

3625

3630

3635

3640

3645

3650

3655

3660

3665

3670

3675

3680

3685

3690

3695

3700

3705

3710

3715

3720

3725

3730

3735

3740

3745

3750

3755

3760

3765

3770

3775

3780

3785

3790

3795

3800

3805

3810

3815

3820

3825

3830

3835

3840

3845

3850

3855

3860

3865

3870

3875

3880

3885

3890

3895

3900

3905

3910

3915

3920

3925

3930

3935

3940

3945

3950

3955

3960

3965

3970

3975

3980

3985

3990

3995

4000

4005

4010

4015

4020

4025

4030

4035

4040

4045

4050

4055

4060

4065

4070

4075

4080

4085

4090

4095

4100

4105

4110

4115

4120

4125

4130

4135

4140

4145

4150

4155

4160

4165

4170

4175

4180

4185

4190

4195

4200

4205

4210

4215

4220

4225

4230

4235

4240

4245

4250

4255

4260

4265

4270

4275

4280

4285

4290

4295

4300

4305

4310

4315

4320

4325

4330

4335

4340

4345

4350

4355

4360

4365

4370

4375

4380

4385

4390

4395

4400

4405

4410

4415

4420

4425

4430

4435

4440

4445

4450

4455

4460

4465

4470

4475

4480

4485

4490

4495

4500

4505

4510

4515

4520

4525

4530

4535

4540

4545

4550

4555

4560

4565

4570

4575

4580

4585

4590

4595

4600

4605

4610

4615

4620

4625

4630

4635

4640

4645

4650

4655

4660

4665

4670

4675

4680

4685

4690

4695

4700

4705

4710

4715

4720

4725

4730

4735

4740

4745

4750

4755

4760

4765

4770

4775

4780

4785

4790

4795

4800

4805

4810

4815

4820

4825

4830

4835

4840

4845

4850

4855

4860

4865

4870

4875

4880

4885

4890

4895

4900

4905

4910

4915

4920

4925

4930

4935

4940

4945

4950

4955

4960

4965

4970

4975

4980

4985

4990

4995

5000

5005

5010

5015

5020

5025

5030

5035

5040

5045

5050

5055

5060

5065

5070

5075

5080

5085

5090

5095

5100

5105

5110

5115

5120

5125

5130

5135

5140

5145

5150

5155

5160

5165

5170

5175

5180

5185

5190

5195

5200

5205

5210

5215

5220

5225

5230

5235

5240

5245

5250

5255

5260

5265

5270

5275

5280

5285

5290

5295

5300

5305

5310

5315

5320

5325

5330

5335

5340

5345

5350

5355

5360

5365

5370

5375

5380

5385

5390

5395

5400

5405

5410

5415

5420

5425

5430

5435

5440

5445

5450

5455

5460

5465

5470

5475

5480

5485

5490

5495

5500

5505

5510

5515

5520

5525

5530

5535

5540

5545

5550

5555

5560

5565

5570

5575

5580

5585

5590

5595

5600

5605

5610

5615

5620

5625

5630

5635

5640

5645

5650

5655

5660

5665

5670

5675

5680

5685

5690

5695

5700

5705

5710

5715

5720

5725

5730

5735

5740

5745

5750

5755

5760

5765

5770

5775

5780

5785

5790

5795

5800

5805

5810

5815

5820

5825

5830

5835

5840

5845

5850

5855

5860

5865

5870

5875

5880

5885

5890

5895

5900

5905

5910

5915

5920

5925

5930

5935

5940

5945

5950

5955

5960

5965

5970

5975

5980

5985

5990

5995

6000

6005

6010

6015

6020

6025

6030

6035

6040

6045

6050

6055

6060

6065

6070

6075

6080

6085

6090

6095

6100

6105

6110

6115

6120

6125

6130

6135

6140

6145

6150

6155

6160

6165

6170

6175

6180

6185

6190

6195

6200

6205

6210

6215

6220

6225

6230

6235

6240

6245

6250

6255

6260

6265

6270

6275

6280

6285

6290

6295

6300

6305

6310

6315

6320

6325

6330

6335

6340

6345

6350

6355

6360

6365

6370

6375

6380

6385

6390

6395

6400

6405

6410

6415

6420

6425

6430

6435

6440

6445

6450

6455

6460

6465

6470

6475

6480

6485

6490

6495

6500

6505

6510

6515

6520

6525

6530

6535

6540

6545

6550

6555

6560

6565

6570

6575

6580

6585

6590

6595

6600

6605

6610

6615

6620

6625

6630

6635

6640

6645

6650

6655

6660

6665

6670

6675

6680

6685

6690

6695

6700

6705

6710

6715

6720

6725

6730

6735

6740

6745

6750

6755

6760

6765

6770

6775

6780

6785

6790

6795

6800

6805

6810

<

117

Los conservantes adecuados son todas las sustancias usualmente presentes para este propósito en los agentes de tratamiento de cultivo. Se pueden mencionar como ejemplo Preventol® y Proxel®.

5

Los tintes adecuados son todos tintes inorgánicos u orgánicos de costumbre para la preparación de agentes de protección de cultivos. Se pueden mencionar por vía de ejemplo, dióxido de titanio, negro de humo, óxido de zinc y pigmentos azules.

10 Los rellenos adecuados, son todos, sustancias usualmente utilizadas para este propósito en los agentes de protección de cultivos. Se pueden mencionar preferiblemente las partículas inorgánicas, tales como carbonatos, silicatos y óxidos, que tienen un tamaño de partícula medio de desde 0.005 a 10 μm , particularmente de manera preferible de 0.02 a 2 μm . Se pueden mencionar por
15 vía de ejemplo el dióxido de silicio, los así llamados silicios coloidales, las silica geles y los silicatos y aluminosilicatos naturales y sintéticos.

Los compuestos adecuados que actúan como estabilizadores de emulsión y/o inhibidores de cristalización son todas las sustancias usualmente utilizadas para
20 este propósito en los agentes de protección de cultivos.

El contenido de los componentes individuales en los agentes de protección de cultivo utilizados en los métodos de acuerdo con la invención y la tasa de aplicación por unidad de área con el uso del método de acuerdo con la invención
25 se pueden variar en un rango relativamente grande.

18

Los tipos de formulación adecuados para los agentes de protección de cultivo utilizados en los métodos de acuerdo con la invención y que comprenden los componentes (A) y (B) y opcionalmente los compuestos (C) y/o (D) incluyen en principio todas las formulaciones que se aplican a plantas o al material de propagación de plantas. Los procesos utilizados para la preparación de éstos son en general familiares a la persona experta en la técnica y se describen, por ejemplo, en Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie [Chemical Technology]", volume 7, C. Hanser Verlag Munich, 4th edition, 1986; J.W. van Valkenburg, "Pesticide Formulations", Marcel Dekker N.Y., 1973, K. Martens, "Spray Drying Handbook", 3rd Ed. 1979, G. Goodwin Ltd., London, o Mollet, Grubenmann, "Formulierungstechnik [Formulation Technology]", Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 2000.

Además, en principio todos los tipos de formulación también son adecuados para los componentes individuales del método de acuerdo con la invención.

Ejemplos de tipos de formulación son aquellos mencionados en el "Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides" (FAO y WHO, 2002, apéndice E) (en cada caso el uso de los códigos de formulación GCPF con abreviaturas y designaciones en Inglés): AL Cualquier otro líquido; AP Cualquier otro polvo; CF Suspensión de Cápsula para Tratamiento de Semillas; CG Gránulo encapsulado; CL Líquido o gel de contacto; CP Polvo de contacto; CS Suspensión de cápsula; DC Concentrado dispersable; DP Polvo espolvoreable; DS Polvo para el tratamiento de semillas secas; EC Concentrado emulsificable; ED Líquido electrocargable; EG Gránulo emulsificable; EO Emulsión, agua en aceite; EP Polvo emulsificable; ES Emulsión para tratamiento de semilla; EW Emulsión, aceite en agua; FG Gránulo fino; FS Concentrado fluible para

119

tratamiento de semilla; GF Gel para Tratamiento de Semilla; GG Macrogránulo; GL Gel emulsificable; GP Flo-dust; GR Gránulo; GS Grasa; GW Gel soluble en agua; HN Concentrado de niebla Caliente; KK Combi-paquete sólido/líquido; KL Combi-paquete líquido/líquido; KN Concentrado de niebla Fría; KP Combi-paquete sólido/sólido; LA Laca; LS Solución para tratamiento de semilla; ME Micro-emulsión; MG Microgránulo; OD Dispersión en aceite; OF concentrado fluible miscible en aceite/suspensión miscible en aceite; OL Líquido miscible en aceite; OP polvo dispersable en aceite; PA Pasta; PC Gel o concentrado de pasta; PO Vertido; PR barrilete de planta; PT Glóbulo; SA "Spot-on"; SC concentrado en suspensión; SD concentrado en suspensión para aplicación directa; SE Suspo-emulsión; SG Gránulo soluble en agua; SL Concentrado soluble; SO Aceite esparcible; SP Polvo soluble en agua; SS Polvo soluble en agua para tratamiento de semilla; ST Comprimido soluble en agua; SU Suspensión con volumen Ultra-bajo (ULV); TB Tableta; TC Material técnico; TK Concentrado técnico; UL Líquido con volumen Ultra-bajo (ULV); WG Gránulos dispersables en agua; WP Polvo humectable; WS Polvo dispersable en agua para tratamiento de semilla en suspensión; WT Tableta dispersable en agua; XX otros.

Se prefieren los tipos de formulación líquida. Estos incluyen tipos de formulaciones OD Dispersión en aceite; DC (código de formulación GCPF para concentrado dispersable); EC (código de formulación GCPF para concentrado de emulsión); EW (código de formulación GCPF para emulsión de aceite en agua); ES (código de formulación GCPF para una emulsión para tratamiento de semilla); FS (código de formulación GCPF para concentrado fluible para el tratamiento de semillas); EO (código de formulación GCPF para emulsión de agua en aceite); ME (código de formulación GCPF para microemulsión); SE (código de formulación GCPF para suspo-emulsión); SL (código de formulación GCPF para concentrado soluble en

120

agua); CS (código de formulación GCPF para suspensión de cápsula) y AL (código de formulación GCPF para formulación líquida lista para usar, otros líquidos para uso en forma no diluida).

- 5 Se prefieren particularmente las dispersiones en aceite (sinónimo. Aceite de dispersión; tipo de formulación OD) y concentrados de emulsión (tipo de formulación EC).

En polvos en pulverizado, la concentración de la sustancia activa es, por ejemplo de aproximadamente 10 a 90% en peso; el resto a 100% en peso consiste de TBEP (B) y los constituyentes de formulación de costumbre (emulsificador, auxiliares y aditivos), que son ciertos para todas las formulaciones. En el caso de los concentrados emulsificables, la concentración de la sustancia activa puede ser de aproximadamente 1 a 90, preferiblemente de 5 a 80, % en peso. Las formulaciones similares a polvo contienen de 1 a 30% en peso de la sustancia activa, preferiblemente en general de 5 a 20% en peso de la sustancia activa, y las soluciones esparcibles contienen desde aproximadamente 0.05 a 80, preferiblemente desde 2 a 50, % en peso de la sustancia activa. En el caso de gránulos dispersables en agua, el contenido de la sustancia activa depende en algunos casos de si está presente o no el compuesto activo en forma líquida o sólida, y cuales auxiliares de formulación, filtros, etc. se utilizan. En el caso de los gránulos dispersables en agua, el contenido de la sustancia activa está, por ejemplo, entre 1 y 95% en peso, preferiblemente entre 10 y 80% en peso. En el caso de las dispersiones en aceite, la concentración de la sustancia activa puede ser de aproximadamente 1 a 50, preferiblemente de 3 a 30, % en peso.

La invención se relaciona además con un método para controlar organismos dañinos, preferiblemente plantas dañinas, los componentes utilizados en el método de acuerdo con la invención se aplican a plantas dañinas, preferiblemente en una cantidad efectiva.

5

Adicionalmente, la invención también se relaciona con un método de acuerdo con la invención, que contiene por lo menos los componentes (A) y (B) los cuales, en una modalidad preferida, muestran efectos superaditivos (sinergismo). Teniendo el control mejorado de los organismos dañinos mediante los métodos de acuerdo con la invención, es posible disminuir la tasa de aplicación y/o incrementar los márgenes de seguridad. Ambos son tanto económica como ecológicamente expeditos. La elección de las cantidades de los componentes (A) y (B) que se van a utilizar y la proporción de los componentes (A): (B) dependen de un rango completo de los factores.

15

La preparación de los agentes de protección de cultivo utilizados en los métodos de acuerdo con la invención se efectúa, por ejemplo, mediante un procedimiento en el cual los componentes se mezclan uno con el otro en la proporción respectiva deseada. Si los herbicidas y/o los aseguradores, designados adelante como sustancias agroquímicas activas, son sustancias sólidas, ellos se utilizan generalmente en una forma finamente molida o en la forma de solución o suspensión en un disolvente orgánico o agua. Si la sustancia agroquímica activa es líquida, el uso de un disolvente orgánico es frecuentemente superfluo. También es posible utilizar una sustancia agroquímica activa sólida en la forma de un fundido.

25

122

Mientras se lleva a cabo el método, las temperaturas pueden variar en un cierto rango. En general, se emplean temperaturas entre 0°C y 80°C, preferiblemente entre 10°C y 60°C.

- 5 Para la preparación de los agentes de protección de cultivo utilizados en los métodos de acuerdo con la invención, en general se adopta un procedimiento en el cual se mezcla el TBEP (B) con una o más sustancias agroquímicas activas (A) y opcionalmente con el emulsificador (C) y los auxiliares y los aditivos (D). La secuencia en la cual los componentes se mezclan el uno con el otro depende del
- 10 tipo de formulación respectiva.

Los aparatos de costumbre que se utilizan para la preparación de las formulaciones agroquímicas son adecuados para llevar a cabo el proceso de preparación.

15

- Todos los métodos conocidos por la persona experta en la técnica que son de costumbre se pueden utilizar como formas de aplicación para uso del agente de protección de cultivo utilizado en los métodos de acuerdo con la invención y para llevar a cabo el método de acuerdo con la invención; lo siguiente se puede
- 20 mencionar por vía de ejemplo: pulverizado, inmersión, aplicación como una niebla y un número de métodos especiales para dirigir el tratamiento por debajo y por encima de la tierra de plantas completas o partes (semilla, raíz, estoroles, tallos, troncos, follaje), tal como, por ejemplo, inyección en troncos en el caso de árboles o bandas de tallos en el caso de plantas perennes, y un número de métodos de
- 25 aplicación indirecta especiales.

1253

La respectiva tasa de aplicación por unidad de área y/o por objeto de los agentes de protección de cultivo de un muy amplio rango de los tipos de formulación que se utilizan en los métodos de acuerdo con la invención y del método de acuerdo con la invención para controlar dichos organismos dañinos varía muy
5 ampliamente. En general, el medio de aplicación conocido para la persona experta en la técnica por ser de costumbre para el campo respectivo de uso se utilizan para este propósito en cantidades de costumbre; tales como, por ejemplo, varios cientos de litros de agua por hectárea en el caso de métodos de rociado estándar a unos pocos litros de aceite por hectárea en el caso de la aplicación para
10 aeronaves con volúmenes ultra bajos a unos pocos milímetros de una solución fisiológica en el caso de los métodos de inyección. Las concentraciones de los agentes de protección de cultivo utilizados en los métodos de acuerdo con la invención en el medio de aplicación correspondiente pueden variar por lo tanto en un amplio rango y son dependientes del campo respectivo de uso. En general, se
15 utilizan las concentraciones conocidas por la persona experta en la técnica por ser de costumbre para el campo respectivo de uso. Se prefieren las concentraciones desde 0.01% en peso a 99% en peso, particularmente de manera preferible de 0.1% en peso a 90% en peso.

20 Se pueden aplicar agentes de protección de cultivo de un rango muy amplio de tipos de formulación que se utilizan en los métodos de acuerdo con la invención, así como también componentes necesarios para llevar a cabo el método de acuerdo con la invención, por ejemplo, en las formas de formulaciones de costumbre para las preparaciones líquidas, como tales o después de antes de
25 dilución con agua, es decir, por ejemplo como emulsiones, suspensiones o soluciones. La aplicación se efectúa mediante los métodos de costumbre, es decir, por ejemplo mediante pulverizado, vertido o inyección.

(29)

La tasa de aplicación de los agentes de protección de cultivo de un muy amplio rango de tipos de formulación que se utilizan en los métodos de acuerdo con la invención, así como también los componentes necesarios para llevar a cabo el método de acuerdo con la invención, se pueden variar dentro de un rango relativamente grande. Esto depende de los herbicidas y/o aseguradores respectivos y del contenido de éstos en las formulaciones.

En el método de acuerdo con la invención para mejorar la penetración de las sustancias activas en las plantas, el TBEP (B) que se va a utilizar es como una regla aplicada junto con la sustancia o sustancias activas (A) o directamente en sucesión, preferiblemente en la forma de un licor en pulverizado que contiene TBEP (B) en cantidades de acuerdo con la invención y la sustancia o sustancias activas (A) en cantidades efectivas y opcionalmente uno o más emulsificadores (C). Además, se pueden agregar auxiliares y aditivos de costumbre adicionales. El licor en pulverizado se prepara preferiblemente sobre la base de agua y/o un aceite, por ejemplo un hidrocarburo de alto punto de ebullición, tal como queroseno o parafina. Los componentes para el método de acuerdo con la invención se pueden efectuar como una mezcla de tanque o por vía de una formulación lista para utilizar (coformulación).

En el caso de herbicidas y/o aseguradores, se prefiere la aplicación a la planta o plantas de cultivo dañinas. Con relación al uso de herbicidas, las plantas tratadas de acuerdo con la invención son todos los tipos de plantas dañinas, tales como malezas. Con respecto a las plantas de cultivo, la aplicación es económicamente importante, por ejemplo incluyendo transgénicos, cultivos de plantas útiles y ornamentales; por ejemplo de cereales, tales como trigo, cebada, centeno, avena,

125

mijo, arroz, casaba y maíz, o cultivos de maní, remolacha azucarera, algodón, soya, colsa, papa, tomate, alverja y otras variedades vegetales se prefieren.

Los agentes de protección de cultivo utilizados en los métodos de acuerdo con la invención, como los métodos de acuerdo con la invención, tienen numerosas ventajas. Así, la penetración general de las sustancias activas en el tejido de la planta se mejora sustancialmente por TBEP. El efecto más rápido de la penetración también resulta así en una resistencia mayor a la lluvia. Al mismo tiempo, se mejora la penetración a temperaturas relativamente bajas (por ejemplo menos de 15°C). Con relación a la tolerancia de las planta de cultivo, el TBEP probó de ser más tolerante que otros aditivos de alquil éster en pruebas. En total, el uso de TBEP permite por lo tanto el ahorro de las sustancias activas utilizadas. Además, el TBEP da como resultado menos polución ambiental en razón a que éste tiene una volatilidad reducida.

La invención se ilustra con más detalle en los ejemplos sin limitarlos a éstos.

Ejemplos

Prueba de Penetración

En esta prueba, se midió la penetración de las sustancias activas a través de cutículas enzimáticamente aisladas de hojas de árbol de manzana. Las cutículas representan todas las partes verdes del árbol, tales como la superficie de la hoja, el pecíolo, el tallo, el tronco, el hipocótilo, y muchas frutas.

126

Se utilizaron las hojas que se cortaron en la etapa de desarrollo completo de los árboles de manzana de la variedad Goleen Delicious. El aislamiento de las cutículas se efectuó de manera tal que

- 5 - primero, los discos de hoja marcados sobre la parte inferior con tinta y punzados se rellenaron por medios de infiltración de vacío con solución de pectinasa (0.2 a 2% de concentración en peso) amortiguado a un pH entre 3 y 4,

- 10 - se agregó entonces acida de sodio y

- Los discos de hojas así tratados se les permitió permanecer hasta la desintegración de la estructura de la hoja original y la separación de la cutícula no celular.

15

Posteriormente, solamente se utilizaron además aquellas cutículas de los lados superiores de las hojas que estuvieron libres de estomas y pelos. Ellas se lavaron varias veces alternativamente con agua y una solución amortiguadora a pH 7. Las cutículas limpias obtenidas se arrastraron finalmente sobre placas de Teflón

20 pequeñas, suavizadas y secadas con un chorro de aire suave.

En la siguiente etapa, las membranas de cutícula así obtenidas se colocaron en celdas de difusión de acero inoxidable (=cámaras de transporte) para las investigaciones de transporte de membrana. Para este propósito, las cutículas se

25 colocaron por medio de fórceps centralmente sobre los bordes cubiertos con grasa de silicona de las celdas de difusión y cerradas con un anillo similarmente engrasado. La disposición se escogió de tal manera que el exterior morfológico de

las cutículas dio hacia fuera, es decir, hacia el aire, mientras que el interior original enfrentaba al interior de la celda de difusión. Las celdas de difusión se llenaron con agua o con una mezcla de agua y disolvente.

5 Para determinar la penetración, en cada caso se aplicó 10 µl de un licor de pulverizado de la composición mencionada hacia el exterior de la cutícula.

En cada caso se utilizaron los disolventes listados adelante en la tabla (agua de llave o una mezcla con 20% en peso de acetona/80% en peso de agua de llave)

10 en los licores de pulverizado.

Después de la aplicación de los licores de pulverizado, en cada caso al disolvente se le permitió evaporarse, y en cada caso las cámaras se giraron y se colocaron entonces en bandejas controladas con termostato, aire que tiene una temperatura

15 definida y una humedad atmosférica que es soplada hacia el exterior de la cutícula. La penetración incipiente por lo tanto tuvo lugar a una humedad relativa del 60% y una temperatura ajustada de 20 o 25°C. La penetración de la sustancia activa se midió con una sustancia activa radioactivamente marcada.

20 Tabla 1: Mejoramiento de penetración de varios herbicidas y aseguradores* por TBEP en comparación con el control

| Sustancia activa sin/con
TBEP | % Penetración
(horas después)** | % Penetración
(horas después)** |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Asegurador
0.2 g/l de isoxadifen-etilo (A) | 1.7 (3) | 17.4 (24) |
| 0.2 g/l de isoxadifen-etilo (A)
+ 0.5 g/l TBEP (B) | 26.5 (3) | 73.1 (24) |
| Asegurador
0.2 g/l de mefenpir-dietilo (A) | 0.4 (3) | 4.9 (24) |

728

| | | |
|--|----------|-----------|
| 0.2 g/l de mefenpir-dietilo (A)
+ 0.5 g/l TBEP (B) | 3.4 (3) | 25.5 (24) |
| Asegurador
0.2 g/l de cipro sulfamida (A) | 0.1 (3) | 0.3 (24) |
| 0.2 g/l de cipro sulfamida (A)
+ 0.5 g/l TBEP (B) | 5.7 (3) | 10.2 (24) |
| Herbicida (regulador del crecimiento)
0.2 g/l de tidiazurón (A) | 0.6 (3) | 0.9 (24) |
| 0.2 g/l de tidiazurón (A)
con 3 g/l TBEP (B) | 74.4 (6) | 93.1 (24) |

* Sustancia activa disuelta en una mezcla de acetona/agua de llave (20/80% en peso); **Valores medios de 4-8 repeticiones para la penetración a través de las cutículas de hoja de manzana (temperatura = 20-25°C, humedad rel. 56-60%); isoxadifen-etilo (fabricante Bayer CropScience), mefenpir-dietilo (fabricante Bayer CropScience), cipro sulfamida (4-ciclopropilaminocarbonil-N-(2-metoxibenzoil)bencenosulfonamida, fabricante Bayer CropScience), tidiazurón (fabricante Bayer CropScience).

Como es evidente de los ejemplos mostrados en la Tabla 1, TBEP conduce a un incremento considerable en la toma de sustancias activas.

5 Tabla 2: Experimentos comparativos para diferentes compuestos como mejoradores de penetración de sustancias activas herbicidas fenoxaprop-P-etilo*

| Sustancia activa sin/con
mejorador de penetración*** | % Penetración
(después 24 horas)** | % Penetración
(después 24 horas)** |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Herbicida
0.3 g/l de fenoxaprop-P-etilo (A) | 0.3 | 0.9 |
| 0.3 g/l de fenoxaprop-P-etilo (A)
+ 0.2 g/l TBP (B) | 66 | 76 |
| 0.3 g/l de fenoxaprop-P-etilo (A)
+ 0.2 g/l TPP (B) | 10 | 22 |
| 0.3 g/l de fenoxaprop-P-etilo (A)
+ 0.2 g/l TBEP (B) | 77 | 86 |
| * Sustancia activa disuelta en una mezcla de acetona/agua de llave (20/80% en | | |

peso); **Valores medios de 10 repeticiones para la penetración a través de las cutículas de hoja de manzana (T = 20-25°C, humedad rel. 56-60%); fenoxaprop-P-etilo (fabricante Bayer CropScience);*** TBP = tributil fosfato y TPP = tripropil fosfato (técnica anterior: EP 579052 A2); TBEP = tributoxietil fosfato (de acuerdo con la invención).

Como es evidente de los ejemplos mostrados en la tabla 2, el TBEP de acuerdo con la invención conduce a un incremento ventajosamente mayor en la toma de sustancias activas que los mejoradores de penetración de la técnica anterior. Este resultado es sorprendente y no se esperaba en vista de la técnica anterior.

130

REIVINDICACIONES

1. Un método para mejorar la penetración, los componentes
 - (A) una o más sustancias activas seleccionadas del grupo que consiste de herbicidas y/o aseguradores,
 - (B) tributoxietil fosfato (TBEP) en dosis de 2.5 a 150.0 g/h y
 - (C) opcionalmente uno o más emulsificadores, seleccionados preferiblemente del grupo que consiste de los emulsificadores iónicos y no iónicos y las mezclas de éstos que tienen valores HLB desde 10 a 17,se aplican simultánea o secuencialmente a las plantas dañinas.
2. El uso del método como se reivindica en la reivindicación 1, siendo los componentes aplicados simultánea o secuencialmente a las plantas dañinas.
3. Un método para controlar organismos dañinos, el método como se reivindica en la reivindicación 1 se aplica a plantas dañinas.

RESUMEN

MEJORADOR DE PENETRACIÓN PARA HERBICIDAS Y ASEGURADORES

5. La invención se relaciona con el campo de protección química de plantas, en particular con el uso de un compuesto específico como un mejorador de penetración para sustancias agroquímicas activas seleccionadas del grupo que consiste de herbicidas y aseguradores. El compuesto es tributoxietil fosfato (TBEP).

6132
68

GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

beim Internationalen Büro eingegangen am 09 April 2009 (09.04.2009)

- 5 1. Verfahren zur Förderung der Penetration, wobei man die Komponenten
- (A) einen oder mehrere Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und/oder Safener,
- (B) Tributoxyethylphosphat (TBEP) in Dosierungen von 2,5 bis 150,0 g/ha und
- 10 (C) gegebenenfalls einen oder mehrere Emulgatoren, vorzugsweise aus der Gruppe der ionischen und nicht-ionischen Emulgatoren und deren Gemische mit HLB-Werten von 10 bis 17, gleichzeitig oder sequentiell auf die Schadpflanzen appliziert.
- 15 2. Verwendung des Verfahrens gemäß Anspruch 1, wobei man die Komponenten gleichzeitig oder sequentiell auf die Schadpflanzen appliziert.

68
B3

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

- PARA REALIZAR EL EXAMEN DE
PATENTABILIDAD

69
134

REIVINDICACIONES

(recibidas por la Oficina Internacional el 9 de abril de 2009 (09.04.2009))

1. Un método para mejorar la penetración, los componentes
 - (A) una o más sustancias activas seleccionadas del grupo formado por herbicidas y o protectores
 - (B) tributoietil fosfato (TBEP) en dosis de 2.5 a 150.0 g/ha y
 - (C) opcionalmente uno o más emulsificadores, preferiblemente seleccionados del grupo formado por emulsificadores iónicos y no iónicos y mezclas de los mismos con valores HLB entre 10 y 17, que se aplican simultanea o secuencialmente a plantas dañinas.
2. El uso del método reivindicado en la reivindicación 1, los componentes que se aplican simultanea o secuencial mente a las plantas dañinas.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2007/010643

| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. A01N57/12 A01N47/36 A01N43/76 A01N43/56 A01N25/32
A01P13/00 | | |
|---|---|--|
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | |
| B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A01N
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data, CHEM ABS Data | | |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| Y | DATABASE WPI Week 199703
Thomson Scientific, London, GB; AN
1997-029410
XP002434499
& JP 08 291004 A (NIPPON KAYAKU KK)
5 November 1996 (1996-11-05)
cited in the application
abstract | 3 |
| Y | DATABASE WPI Week 198211
Thomson Scientific, London, GB; AN
1982-21087E
XP002434500
& JP 57 024303 A (MITSUI TOATSU CHEM INC)
8 February 1982 (1982-02-08)
abstract | 3 |
| -----
-/-- | | |
| ☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex. | | |
| * Special categories of cited documents :
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
E earlier document but published on or after the international filing date
L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
& document member of the same patent family | | |
| Date of the actual completion of the international search | | Date of mailing of the international search report |
| 11 Februar 2009 | | 23/02/2009 |
| Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 | | Authorized officer

Molina de Alba, José |

51
136

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2007/010643

| C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
|--|---|-----------------------|
| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| X | WO 00/56146 A (AVENTIS CROPSCIENCE GMBH [DE]; WUERTZ JOCHEN [DE]; MAIER THOMAS [DE];) 28 September 2000 (2000-09-28)
cited in the application.
abstract
tables 1,2 | 3 |
| X | WO 01/47356 A (AVENTIS CROPSCIENCE GMBH [DE]) 5 July 2001 (2001-07-05)
cited in the application
abstract; tables 1,2 | 3 |
| Y | EP 0 579 052 A2 (SCHOENHERR JOERG [DE] BAYER AG [DE] BAYER CROPSCIENCE AG [DE]) 19 January 1994 (1994-01-19)
cited in the application
abstract
page 3, line 36 - line 45
page 4, line 30 - line 32
figures 16-27 | 3 |
| Y | DE 35 13 889 A1 (KAO CORP [JP]) 24 October 1985 (1985-10-24)
cited in the application
page 5, line 32 - line 35
page 6, line 19 - line 27 | 3 |
| Y | GB 2 022 070 A (SANDOZ LTD) 12 December 1979 (1979-12-12)
cited in the application
abstract
example 7 | 3 |

72
137

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2007/010643

| Patent document
cited in search report | | Publication
date | Patent family
member(s) | Publication
date |
|---|----|---------------------|--|--|
| JP 8291004 | A | 05-11-1996 | NONE | |
| JP 57024303 | A | 08-02-1982 | NONE | |
| WO 0056146 | A | 28-09-2000 | AT 259589 T
AU 3166300 A
BG 65410 B1
BG 105908 A
CA 2366645 A1
CZ 20013398 A3
DE 19913036 A1
DE 50005330 D1
DK 1164842 T3
EE 200100496 A
EP 1164842 A1
ES 2215616 T3
HR 20010691 A2
HU 0200351 A2
JP 2002539225 T
PL 351811 A1
PT 1164842 T
RU 2322059 C2
SK 13492001 A3
TR 200102652 T2
UA 72757 C2
US 2004214722 A1
ZA 200107237 A | 15-03-2004
09-10-2000
31-07-2008
28-06-2002
28-09-2000
16-01-2002
28-09-2000
25-03-2004
14-06-2004
17-02-2003
02-01-2002
16-10-2004
31-10-2002
29-05-2002
19-11-2002
16-06-2003
30-07-2004
20-04-2008
07-01-2002
22-04-2002
15-01-2002
28-10-2004
11-09-2002 |
| WO 0147356 | A | 05-07-2001 | AT 288679 T
AU 778419 B2
AU 3159901 A
BR 0017051 A
CA 2395351 A1
CN 1433268 A
CZ 20022241 A3
DE 19963381 A1
DE 50009518 D1
EP 1251736 A1
ES 2236039 T3
HR 20020553 A2
HU 0203552 A2
JP 2003518479 T
MX PA02006445 A
PL 357651 A1
PT 1251736 T
RU 2332845 C2
SK 9512002 A3
US 2002006889 A1
ZA 200205629 A | 15-02-2005
02-12-2004
09-07-2001
05-11-2002
05-07-2001
30-07-2003
12-02-2003
12-07-2001
17-03-2005
30-10-2002
16-07-2005
31-08-2004
28-03-2003
10-06-2003
29-11-2002
26-07-2004
31-05-2005
10-09-2008
04-02-2003
17-01-2002
29-09-2003 |
| EP 0579052 | A2 | 19-01-1994 | AT 290779 T
AT 197750 T
CA 2099631 A1
DE 4319263 A1
DK 579052 T3
ES 2238214 T3
ES 2152937 T3
GR 3035260 T3 | 15-04-2005
15-12-2000
04-01-1994
05-01-1994
29-01-2001
01-09-2005
16-02-2001
30-04-2001 |

138
13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2007/010643

| Patent document
cited in search report | | Publication
date | Patent family
member(s) | Publication
date |
|---|----|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DE 3513889 | A1 | 24-10-1985 | GB 2157952 A | 06-11-1985 |
| | | | JP 1014883 B | 14-03-1989 |
| | | | JP 1733609 C | 17-02-1993 |
| | | | JP 60224606 A | 09-11-1985 |
| | | | US 4976769 A | 11-12-1990 |
| | | | US 5043008 A | 27-08-1991 |
| <hr/> | | | | |
| GB 2022070 | A | 12-12-1979 | NONE | |
| <hr/> | | | | |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/010643

| | | |
|--|---|---|
| A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES | | |
| INV. | A01N57/12
A01P13/00 | A01N47/36
A01N43/56
A01N43/56
A01N25/32 |
| Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC | | |
| B. RECHERCHIERTE GEBIETE | | |
| Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) | | |
| A01N | | |
| Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen | | |
| Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) | | |
| EPO-Internal, WPI Data, CHEM ABS Data | | |
| C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | |
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| Y | DATABASE WPI Week 199703
Thomson Scientific, London, GB; AN
1997-029410
XP002434499
& JP 08 291004 A (NIPPON KAYAKU KK)
5. November 1996 (1996-11-05)
in der Anmeldung erwähnt
Zusammenfassung | 3 |
| Y | DATABASE WPI Week 198211
Thomson Scientific, London, GB; AN
1982-21087E
XP002434500
& JP 57 024303 A (MITSUI TOATSU CHEM INC)
8. Februar 1982 (1982-02-08)
Zusammenfassung | 3 |
| -----
-/- | | |
| ☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie | | |
| <p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</p> <p>*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>*E* Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>*L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeliefert)</p> <p>*O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>*P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> <p>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>*G* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p> | | |
| Datum des Abschlusses der internationalen Recherche | | Absenddatum des internationalen Recherchenberichts |
| 11. Februar 2009 | | 23/02/2009 |
| Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 | | Bevollmächtigter Bediensteter

Molina de Alba, José |

75
140

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2007/010643

| C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | |
|---|---|--------------------|
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| X | WO 00/56146 A (AVENTIS CROPSCIENCE GMBH [DE]; WUERTZ JOCHEN [DE]; MAIER THOMAS [DE];) 28. September 2000 (2000-09-28)
in der Anmeldung erwähnt
Zusammenfassung
Tabellen 1,2
----- | 3 |
| X | WO 01/47356 A (AVENTIS CROPSCIENCE GMBH [DE]) 5. Juli 2001 (2001-07-05)
in der Anmeldung erwähnt
Zusammenfassung; Tabellen 1,2
----- | 3 |
| Y | EP 0 579 052 A2 (SCHOENHERR JOERG [DE] BAYER AG [DE] BAYER CROPSCIENCE AG [DE]) 19. Januar 1994 (1994-01-19)
in der Anmeldung erwähnt
Zusammenfassung
Seite 3, Zeile 36 - Zeile 45
Seite 4, Zeile 30 - Zeile 32
Abbildungen 16-27
----- | 3 |
| Y | DE 35 13 889 A1 (KAO CORP [JP]) 24. Oktober 1985 (1985-10-24)
in der Anmeldung erwähnt
Seite 5, Zeile 32 - Zeile 35
Seite 6, Zeile 19 - Zeile 27
----- | 3 |
| Y | GB 2 022 070 A (SANDOZ LTD) 12. Dezember 1979 (1979-12-12)
in der Anmeldung erwähnt
Zusammenfassung
Beispiel 7
----- | 3 |

76
191

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/010643

| Im Recherchenbericht
angeführtes Patentedokument | Datum der
Veröffentlichung | Mitglied(er) der
Patentfamilie | Datum der
Veröffentlichung |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| JP 8291004 | A | 05-11-1996 | KEINE |
| JP 57024303 | A | 08-02-1982 | KEINE |
| WO 0056146 | A | 28-09-2000 | AT 259589 T 15-03-2004
AU 3166300 A 09-10-2000
BG 65410 B1 31-07-2008
BG 105908 A 28-06-2002
CA 2366645 A1 28-09-2000
CZ 20013398 A3 16-01-2002
DE 19913036 A1 28-09-2000
DE 50005330 D1 25-03-2004
DK 1164842 T3 14-06-2004
EE 200100496 A 17-02-2003
EP 1164842 A1 02-01-2002
ES 2215616 T3 16-10-2004
HR 20010691 A2 31-10-2002
HU 0200351 A2 29-05-2002
JP 2002539225 T 19-11-2002
PL 351811 A1 16-06-2003
PT 1164842 T 30-07-2004
RU 2322059 C2 20-04-2008
SK 13492001 A3 07-01-2002
TR 200102652 T2 22-04-2002
UA 72757 C2 15-01-2002
US 2004214722 A1 28-10-2004
ZA 200107237 A 11-09-2002 |
| WO 0147356 | A | 05-07-2001 | AT 288679 T 15-02-2005
AU 778419 B2 02-12-2004
AU 3159901 A 09-07-2001
BR 0017051 A 05-11-2002
CA 2395351 A1 05-07-2001
CN 1433268 A 30-07-2003
CZ 20022241 A3 12-02-2003
DE 19963381 A1 12-07-2001
DE 50009518 D1 17-03-2005
EP 1251736 A1 30-10-2002
ES 2236039 T3 16-07-2005
HR 20020553 A2 31-08-2004
HU 0203552 A2 28-03-2003
JP 2003518479 T 10-06-2003
MX PA02006445 A 29-11-2002
PL 357651 A1 26-07-2004
PT 1251736 T 31-05-2005
RU 2332845 C2 10-09-2008
SK 9512002 A3 04-02-2003
US 2002006889 A1 17-01-2002
ZA 200205629 A 29-09-2003 |
| EP 0579052 | A2 | 19-01-1994 | AT 290779 T 15-04-2005
AT 197750 T 15-12-2000
CA 2099631 A1 04-01-1994
DE 4319263 A1 05-01-1994
DK 579052 T3 29-01-2001
ES 2238214 T3 01-09-2005
ES 2152937 T3 16-02-2001
GR 3035260 T3 30-04-2001 |

27
142

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/010643

| Im Recherchenbericht
angeführtes Patentdokument | | Datum der
Veröffentlichung | | Mitglied(er) der
Patentfamilie | | Datum der
Veröffentlichung |
|--|----|-------------------------------|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| DE 3513889 | A1 | 24-10-1985 | GB | 2157952 A | | 06-11-1985 |
| | | | JP | 1014883 B | | 14-03-1989 |
| | | | JP | 1733609 C | | 17-02-1993 |
| | | | JP | 60224606 A | | 09-11-1985 |
| | | | US | 4976769 A | | 11-12-1990 |
| | | | US | 5043008 A | | 27-08-1991 |
| ----- | | | | | | |
| GB 2022070 | A | 12-12-1979 | KEINE | | | |
| ----- | | | | | | |

57
13B

| | |
|--|---|
| (21) N° de solicitud: | (51) Int Cl: A01N 057/012 |
| 22) Fecha de solicitud: | (71) Solicitante(s) BAYER CROPS SCIENCE AG |
| (30) Prioridad (31) Prioridad (32) Fecha (33) País
06026145.0 18/12/2006 EP | (72) Inventor(es) PETER BAUR
Y OTROS |
| | (74) Apoderado: EMILIO FERRERO |
| (85) Fecha limite inicio fase nacional: 18/07/2009 | (87) Publicación internacional |
| (86) Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT | Fecha: 26/06/2008 |
| Fecha de presentación de la solicitud: 07/12/2007 | N° publicación: WO 2008/074406 A4 |
| No. de solicitud PCT/EP2007/010643 | |
| (54) Titulo: MEJORADOR DE PENETRACIÓN PARA HERBICIDAS Y ASEGURADORES | |

Reivindicación(es):

1. Un método para mejorar la penetración, los componentes

- (A) una o más sustancias activas seleccionadas del grupo que consiste de herbicidas y/o aseguradores,
 - (B) tributoxietil fosfato (TBEP) en dosis de 2.5 a 150.0 g/h y
 - (C) opcionalmente uno o más emulsificadores, seleccionados preferiblemente del grupo que consiste de los emulsificadores iónicos y no iónicos y las mezclas de éstos que tienen valores HLB desde 10 a 17,
- se aplican simultánea o secuencialmente a las plantas dañinas.

2. El uso del método como se reivindica en la reivindicación 1, siendo los componentes aplicados simultánea o secuencialmente a las plantas dañinas.

3. Un método para controlar organismos dañinos, el método como se reivindica en la reivindicación 1 se aplica a plantas dañinas.

144

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-063561- -00000-0000

Fecha: 2009-06-18 17:10:46 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 379 FASENACIONALII
Act. 411 PRESENTACION Folios: 144

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 39,962
FECHA : JUNIO 1 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

| DEPOSITANTE | TIPO PAGO | BANCO | CUENTA | No. PAGO | FECHA PAGO | Vr. PAGO |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CAVELIER ABOGADOS | CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 111857745 | 01/06/2009 | 45,405,000.00 |

***** CONCEPTO *****

| CANT. | RENTISTICO | CONCEPTO | TOTAL CONCEPTO |
|---------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 50005-01-01 SOLICITUDES | 1 TRAMITES DE SOL. DE PATENTE DE IN | 540,000.00 |
| TOTAL : | | | \$ 540,000.00 |

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo: 13549 - 841 - 139 - 0



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA


REQUISITOS MINIMOS PARA ADMISION A TRAMITE
PCT

PATENTE DE INVENCION



MODELO DE UTILIDAD []

- ◆ Indicación de que se solicita la concesión de una patente
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
- ◆ Descripción de la invención
- ◆ Dibujos de ser estos pertinentes
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas



COMPLETA [X]

INCOMPLETA []

DISEÑO INDUSTRIAL []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica y fotográfica del Diseño Industrial o muestra del material que incorpora el diseño []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

ESQUEMA DE TRAZADO []

- ◆ Indicación de que se solicita el registro de un Esquema de Trazado []
- ◆ Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud []
- ◆ Representación gráfica del esquema trazado []
- ◆ Comprobante de pago de las tasas establecidas []

COMPLETA []

INCOMPLETA []

Firma Responsable

Fecha **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**



No. 09-063561- -00000-0000
Fecha: 2009-06-18 17:10:46 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 411 PRESENTACION Folios: 144

arrera 13 No. 27-00 Piso 5, 7 y 10
Conmutador: 3 82 08 40
Fax: 350 52 20
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
FERRERO EMILIO
Apoderado(a) y/o Representante de
ACORDIS KELHEIM GMBH

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| REFERENCIA | Radicación No. | 9 63561 |
| | Solicitud internacional | PCT/EP2007/010643 |
| | Fecha inicio fase nacional | 18/07/2009 |
| | Trámite | 11 |
| | Evento | 379 |
| | Actuación | 430 |
| | Oficio No. | 08480 |

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, estos deberán legalizarse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil. Cuando se trate de las declaraciones a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT., el alcance de las tales declaraciones se determinará según indiquen claramente una cesión de derechos del inventor al solicitante o su causante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2.15 del Capítulo Quinto, Título X de la Circular Única de Superintendencia de Industria y Comercio.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No.10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha 24 JUL. 2009
jfernand