Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación	16 2111 0000 0000	2016-01-06 10:54:36	
Trámite	11	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	
Evento	378	FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I	
Actuación	411	PRESENTACION	Folios: 393
Dependencia	2020	DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	
Pago #1	817	$ 64000	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SOLICITUD FASE NACIONAL - PCT

1	**Titulo de la Invención** (200 caractares o espacios máximos)
	PIRAZOLPIRIDINAS SUSTITUIDAS

2	**Datos del Solicitante / Titular**			
	Nombre:	BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	**Dirección Electrónica:**	clientes@cavelier.com
	Dirección:	Müllerstr. 178, 13353 Berlin, Alemania	**Domicilio/País de constitución:**	ALEMANIA - BERLIN - BERLIN

Identificación:

- ☐ CEDULA DE CIUDADANIA
- ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA
- ☒ EMPRESA EXTRANJERA
- ☐ NIT
- ☐ PASAPORTE

Número: 888773-

3	**Solicitantes**		
	Apellidos - Nombres o Razón Social	**Tipo**	**Identificación**
1.	BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	EE	888773

4	**Datos del Inventor**			
	Nombre:	Ulrich KLAR	**Dirección Electrónica:**	clientes@cavelier.com

Dirección:	Isegrimsteig 8 a 13503 Berlin, Alemania	**Domicilio/País de constitución:**	ALEMANIA - BERLIN - BERLIN

Identificación:

☐ CEDULA DE CIUDADANIA	☐ CEDULA DE EXTRANJERIA
☐ EMPRESA EXTRANJERA	☐ NIT
☐ PASAPORTE	☒ No Aplica

Número: -

5 Inventor(es)

	Apellidos - Nombres	Domicilio
1.	KLAR Ulrich	ALEMANIA
2.	WORTMANN Lars	ALEMANIA
3.	KETTSCHAU Georg	ALEMANIA
4.	GRAHAM Keith	ALEMANIA
5.	RICHTER Anja	ALEMANIA
6.	LIENAU Philip	ALEMANIA
7.	PUEHLER Florian	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
8.	PETERSEN Kirstin	ALEMANIA
9.	SIEGEL Franziska	ALEMANIA
10.	SÜLZLE Detlev	ALEMANIA

6 Datos Inventor(es)

	País de Residencia	Departamento/Estado	Ciudad	Dirección
1.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Isegrimsteig 8 a 13503 Berlin, Alemania

2.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Kastanienallee 103 10435 Berlin, Alemania
3.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Kavalierstr. 15 13187 Berlin, Alemania
4.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Greifswalderstr. 228 10405 Berlin, Alemania Greifswalderstr. 228 10405 Berlin, Alemania
5.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Schützenstr. 18 12105 Berlin, Alemania
6.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Jahnstr. 13 10967 Berlin, Alemania
7.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MASSACHUSETTS	WELLESLEY	28 Croton St. Wellesley, Massachussets 02481, Esta
8.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Stolzingstr. 45 13465 Berlin, Alemania
9.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Pappelallee 58 10437 Berlin, Alemania
10.	ALEMANIA	BERLIN	BERLIN	Otternweg 15 13465 Berlin, Alemania

7	**Datos del Representante Legal / Apoderado**		
Nombre:	LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ	**Dirección Electrónica:**	cavelier@cavelier.com
Dirección:	CARRERA. 4 No. 72-35	**Domicilio/País de constitución:**	COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.

Identificación:

- ☒ CEDULA DE CIUDADANIA
- ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA
- ☐ EMPRESA EXTRANJERA
- ☐ NIT
- ☐ PASAPORTE

Número:	35456344-

Presentación de Poder

Año de Radicación	
Número de Radicación	

8	**Datos Solicitud: PCT / WO**		
Número Solicitud:	PCT/EP2014/064347	**Fecha Solicitud:**	04/07/2014
Número Publicacion:	WO 2015/004024 A1	**Fecha Publicacion:**	15/01/2015

9	**Declaraciones de prioridad**	☒ SI ☐ NO

	(33) País de origen	**Codigo del país**	**(31) No. Solicitud**	**(32) Fecha** _
1.	EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)	EP	13175526.6	08/07/2013
2.	EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)	EP	13194902.6	28/11/2013
3.	EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)	EP	13195131.1	29/11/2013

10	**Reivindicaciones**			
Número reivindicaciones:	19	**Pago Reivindicaciones:**	No	

11	**Reducción de tasas.**

Declaro que carezco de medios económicos para presentar la solicitud de patente.

☐ SI ☒ NO

Nota: En caso de ser persona natural y carecer de medios económicos, y por lo tanto, aplique la reducción de tasas a que se refiere la resolucón vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud bajo la gravedad de juramento.

☐ Micro, pequeñas y medianas empresas
☐ Universidades públicas o privadas
☐ Entidades sin ánimo de lucro

Debe aportar los documentos que se indican en el numeral 17 de anexos

12	**Documentos Anexos**

☒ Reivindicaciones
☒ Descripción
☐ Dibujos y/o Figuras
☒ Resumen
☐ Certificado Depósito Material Biológico
☐ Uso de Conocimiento tradicional
☐ Listado de secuencias

☐ Artes finales 12 x 12 cm
☒ Poderes, si fuere el caso
☐ Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad
☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad
☒ Otros Anexos

PIRAZOLPIRIDINAS SUSTITUIDAS

La presente invención se relaciona con compuestos de pirazolpiridina sustituida de fórmula general **I** como se los describe y define aquí, a métodos para preparar dichos compuestos, a compuestos intermediarios útiles para preparar dichos compuestos, a composiciones farmacéuticas y combinaciones que comprenden dichos compuestos y al uso de dichos compuestos para elaborar una composición farmacéutica para el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad, en particular de un trastorno hiperproliferativo y/o de angiogénesis, como único agente o en combinación con otros ingredientes activos.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La presente invención está relacionada con compuestos químicos que pueden inhibir la quinasa MKNK1 (que también se conoce como la quinasa que puede interactuar con la quinasa MAP Mnk1) y/o la quinasa MKNK2 (que también se conoce como la quinasa que puede interactuar con la quinasa MAP Mnk2).

Las quinasas MKNK humanas son un grupo de cuatro proteínas que son codificadas por dos genes (la nomenclatura de los genes es MKNK1 y MKNK2), merced a una escisión alternativa. Las formas b carecen del dominio que puede unirse a la quinasa MAP en el extremo

C. Los dominios catalíticos de las quinasas MKNK1 y MKNK2 son muy similares y contienen un motivo DFD (Asp-Phe-Asp) único en el subdominio VII, que usualmente es DFG (Asp-Phe-Gly) en otras proteína quinasas, del que se ha sugerido que altera la unión al ATP (Jauch et al., Structure, 13, 1559-1568, 2005, y Jauch et al., EMBO J., 25, 4020-4032, 2006). La quinasa MKNK1a puede unirse a las quinasas ERK y MAP p38 y es activada por ellas, pero no interactúa con JNK1. La quinasa MKNK2a solamente puede unirse a la quinasa ERK, y también es activada por ella. La quinasa MKNK1b presenta una actividad reducida bajo cualquier condición, y la quinasa MKNK2b presenta una actividad basal que es independiente de las quinasas ERK o MAP p38 (Buxade, M., et al., Frontiers in Bioscience 5359-5374, 1º de Mayo de 2008).

Se ha demostrado que las quinasas MKNK fosforilan el factor de inicio de los eucariotas 4E (eIF4E), la proteína nuclear heterogénea que puede unirse al ARN A1 (hnRNP A1), el factor de escisión que está asociado a las proteínas y que puede unirse al tracto de polipirimidina (PSF), la fosfolipasa citoplasmática A2 (cPLA2) y Sprouty 2 (hSPRY2) (Buxade, M., et al., Frontiers in Bioscience 5359-5374, 1º de Mayo de 2008).

eIF4E es un oncogen que se encuentra amplificado

en numerosos cánceres y que es fosforilado de manera exclusiva por las proteínas MKNK, según se ha demostrado en estudios basados en ratones KO (Konicek et al., Cell Cycle, 7:16, 2466-2471, 2008; Ueda et al., Mol. Cell Biol., 24, 6539-6549, 2004). eIF4E tiene una función fundamental, ya que posibilita la traducción del ARNm en las células. eIF4E se une al ápice de 7-metilguanosina que se halla en el extremo 5’ del ARNm en las células, lo que le permite transportarlo al ribosoma como parte de un complejo que forma con él, junto con eIF4G y eIF4A. Aunque eIF4E es imprescindible para la traducción del cualquier ARNm que comprenda ápices, un subconjunto de éste es excepcionalmente dependiente de una actividad elevada de eIF4E para la traducción. Se trata de lo que se conoce como el “ARN débil”, que usualmente es traducido de una manera menos eficiente a causa de su región UTR 5’ larga y compleja, y que codifica proteínas que tienen una participación importante en diversos aspectos relacionados con los tumores malignos, que abarcan elementos como el VEGF, FGF-2, c-Myc, la ciclina D1, la survivina, BCL-2, MCL-1, MMP-9 y la heparanasa, entre otros. La expresión y la función de eIF4E se encuentran incrementadas en múltiples cánceres humanos, y están asociadas de manera directa al progreso de la enfermedad (Konicek et al.,

Cell Cycle, 7:16, 2466-2471, 2008).

MKNK1 y MKNK2 son las únicas quinasas conocidas que fosforilan eIF4E en Ser209. La velocidad de traducción en general no se ve afectada por la fosforilación de eIF4E, pero se ha sugerido la posibilidad de que la fosforilación de eIF4E contribuya a la formación de los polisomas (es decir, la presencia de múltiples ribosomas en un solo ARNm), que finalmente posibilita que haya una traducción más eficiente del "ARNm débil" (Buxade, M., et al., Frontiers in Bioscience, 5359-5374, 1º de Mayo de 2008). Como alternativa, la fosforilación de eIF4E por parte de las proteínas MKNK podría facilitar la liberación del extremo 5' de eIF4E, lo que posibilitaría que el complejo 48S recorriera el "ARNm débil" para localizar el codón de inicio (Blagden, S. P., y Willis, A. E., Nat. Rev. Clin. Oncol., 8(5):280-91, 2011). De esta manera, un incremento en la fosforilación de eIF4E podría ser útil para determinar un pronóstico pobre en aquellos pacientes que padecen cánceres en las células no pequeñas del pulmón (Yoshizawa et al., Clin. Cancer. Res., 16(1):240-8, 2010). Hay evidencias adicionales de la participación funcional de la quinasa MKNK1 en la carcinogénesis: la sobreexpresión de una variante de la quinasa MKNK1 con una actividad constitutiva en

fibroblastos de embriones de ratón, pero no de una quinasa MKNK1 inactiva, da como resultado un incremento en la velocidad de formación de tumores (Chrestensen, C. A., et al., Genes Cells, 12, 1133-1140, 2007). Más aun, el incremento en la fosforilación y la actividad de las proteínas MKNK ha sido correlacionado con la sobreexpresión de HER2 en el contexto del cáncer de mama (Chrestensen, C. A., et al., J. Biol. Chem., 282, 4243-4252, 2007). La expresión de una variante de la quinasa MKNK1 con una actividad constitutiva, pero no de una quinasa MKNK1 inactiva, también dio como resultado un incremento en la velocidad de crecimiento de los tumores en un modelo de tumores en ratones basado en células madre hematopoyéticas Eμ-Myc transgénicas. Fue posible obtener resultados comparables cuando se analizó una variante de eIF4E que comprendía la mutación S209D. La mutación S209D imita una fosforilación en el sitio propio de la quinasa MKNK1. En contraste, la forma no fosforilada de eIF4E dio como resultado una atenuación en el crecimiento de los tumores (Wendel, H. G., et al., Genes Dev., 21(24):3232-7, 2007). Se ha comprobado que un inhibidor selectivo de la quinasa MKNK que bloquea la fosforilación de eIF4E es útil para inducir la apoptosis y para suprimir la proliferación y el

crecimiento de las células cancerosas en agar blando in vitro. Con este inhibidor, también es posible suprimir el crecimiento de las metástasis pulmonares del melanoma experimental B16, así como el crecimiento de los tumores del carcinoma de colon HCT116 xenoinjertados, sin afectar el peso corporal (Konicek et al., Cancer Res., 71(5):1849-57, 2011). La selección de una cohorte de pacientes de adenocarcinoma ductal de páncreas por inmunohistoquímica mostró que la fosforilación de eIF4E presenta una correlación con el grado de la enfermedad, el inicio temprano de la enfermedad y un peor pronóstico. Además, en base a descubrimientos preclínicos *in vitro* se sugirió que la vía MNK/eIF4E representa una ruta de escape utilizada por las células del adenocarcinoma ductal de páncreas para soportar los tratamientos quimioterapéuticos (por ejemplo con Gemcitabina) [Adesso L, et al., Oncogene. 16 de jul de 2012]. Además, se observó que la Rapamicina activa la actividad quinasa de MKNK1 en múltiples líneas celulares de mieloma y especimenes primarios por un mecanismo dependiente de MKNK. La inhibición farmacológica de la actividad de MKNK o el silenciamiento genético de MKNK1 previnieron un aumento de la expresión inducido por rapalog de la actividad de IRES de c-myc. Aunque la Rapamicina utilizada sola tuvo

poco efecto sobre la expresión de la proteína myc, cuando se la combinó con un inhibidor de MKNK, se abolió la expresión de la proteína myc. Dichos datos aportan una razón para dirigirse terapéuticamente a las quinasas MKNK como objetivos para los tratamientos combinados con inhibidores de mTOR [Shi Y et al., Oncogene. 2012 Feb 27]. En resumen, la fosforilación de eIF4E por parte de las proteínas MKNK podría ser útil para promover la proliferación y la supervivencia de las células y sería crítica para una transformación maligna, por lo que la inhibición de la actividad de las quinasas MKNK podría ser un abordaje terapéutico apropiado para combatir el cáncer.

WO 2006/136402 A1 y WO 2007/059905 A2 (Develogen AG) divulgan las tienopirimidin-4-aminas y su uso para la profilaxis y/o el tratamiento de enfermedades sobre las que puede tener influencia la inhibición de la actividad quinasa de Mnk1 y/o Mnk2. El grupo 4-amino está sustituido con un grupo fenilo sustituido. La publicaciones WO no proveen datos biológicos.

WO 2010/023181 A1, WO 2011/104334 A1, WO 2011/104337 A1, WO 2011/104338 A1 y WO 2011/104340 A1 (Boehringer Ingelheim) se relacionan con tienopirimidin-4-aminas para la profilaxis y/o el tratamiento de enfermedades sobre las que puede tener

influencia la inhibición de la actividad quinasa de Mnk1 y/o Mnk2.

WO2014/001973 (A1) describe 4-(substituted-amino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidinas como inhibidores de LRRK2.

Los compuestos pirazolopiridina sustituidos específicos de fórmula general **I** de la presente invención como se define en la presente, o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos, como se describe y se define en la presente, y mencionados en adelante en la presente como “compuestos de la presente invención”, o su actividad farmacológica, no han sido descritos hasta el momento.


Se ha descubierto que los compuestos de acuerdo con la invención presentan propiedades sorprendentes y ventajosas, lo que constituye el fundamento para la presente invención.

En particular, sorprendentemente se ha descubierto que los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden inhibir de manera efectiva la quinasa MKNK, por lo que pueden ser apropiados en el tratamiento o la profilaxis de aquellas enfermedades que están relacionadas con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una

respuesta inflamatoria inapropiada, particularmente donde el crecimiento, la proliferación y/o la supervivencia sin control de las células, la respuesta inmune celular inapropiada o la respuesta inflamatoria inapropiada están mediados por la vía MKNK, más particularmente donde las enfermedades que están relacionadas con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada abarcan los tumores hematológicos, los tumores sólidos o las metástasis de éstos, por ejemplo, la leucemia, el síndrome mielodisplástico, el linfoma maligno, los tumores en la cabeza o en el cuello, lo que abarca los tumores y las metástasis en el cerebro, los tumores en el tórax, lo que abarca los tumores que afectan a las células pulmonares no pequeñas o pequeñas, los tumores gastrointestinales, los tumores endocrinos, los tumores mamarios, los tumores ginecológicos de otro tipo, los tumores urológicos, lo que abarca los tumores en los riñones, en la vejiga y en la próstata, los tumores en la piel, los sarcomas y las metástasis de éstos.

RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención cubre compuestos de fórmula general **I**:










I

en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;

A representa un grupo seleccionado entre:


,

,

,

,

,

,

;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo,

halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o

diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, ciano, $-(CH_2)_q-U-(CH_2)_p-R^{3a}$; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r-T-(CH_2)_s-$;

T representa un grupo seleccionado entre: U, $-C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t-U-R^{3a}]-$;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, -S(=O)-, $-S(=O)_2-$, $-S(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-S(=O)-$, $-S(=O)_2-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-S(=O)_2-$, -C(=O)-, $-N(R^{3b})-$, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -O-C(=S)-, $-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-O-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-O-$;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo

seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y

10 miembros, arilo, heteroarilo, donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, halo-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -$N(R^{5b})$-C(=O)-R^{5c}, -$N(R^{5c})$-C(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, -$N(R^{5a})R^{5b}$, -C(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-$S(=O)_2$-, -$N(R^{5c})$-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, -$N(R^{5c})$-$S(=O)_2$-R^{5b}, -$S(=O)_2$-

$N(R^{5a})R^{5b}$, $-S(=O)=N(R^{5c})R^{5b}$, $-S(=O)=N(R^{5c})R^{5b}$ o $-N=S(=O)(R^{5c})R^{5b}$;

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, fenilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido una vez con fenilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

o

$N(R^{5a})R^{5b}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-

alquilo;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;

s representa el entero 1, 2 o 3; y

t representa el entero 0 o 1;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

La presente invención se relaciona además con métodos para preparar compuestos de fórmula general **I**, con composiciones farmacéuticas y combinaciones que comprenden dichos compuestos, con el uso de dichos compuestos para elaborar una composición farmacéutica para el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad, así como también con compuestos intermediarios útiles en la preparación de dichos compuestos.

Descripción detallada de la invención

Los términos mencionados en la presente preferentemente tienen los siguientes significados:

El término “átomo de halógeno”, “halo-” o “Hal-” significa un átomo de flúor, cloro, bromo o iodo, preferentemente un átomo de flúor, cloro o bromo.

El término “C_1-C_{10}-alquilo” preferentemente significa un grupo hidrocarbonado lineal o ramificado, saturado, monovalente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó

10 átomos de carbono, por ejemplo un grupo metilo, etilo, propilo, butilo, pentilo, hexilo, iso-propilo, iso-butilo, sec-butilo, tert-butilo, iso-pentilo, 2-metilbutilo, 1-metilbutilo, 1-etilpropilo, 1,2-dimetilpropilo, neo-pentilo, 1,1-dimetilpropilo, 4-metilpentilo, 3-metilpentilo, 2-metilpentilo, 1-metilpentilo, 2-etilbutilo, 1-etilbutilo, 3,3-dimetilbutilo, 2,2-dimetilbutilo, 1,1-dimetilbutilo, 2,3-dimetilbutilo, 1,3-dimetilbutilo, o 1,2-dimetilbutilo, o un isómero del mismo. Particularmente, dicho grupo tiene 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 átomos de carbono ("C_1-C_6-alquilo"), más particularmente, dicho grupo tiene 1, 2, 3 ó 4 átomos de carbono ("C_1-C_4-alquilo"), por ejemplo un grupo metilo, etilo, propilo, butilo, iso-propilo, iso-butilo, sec-butilo, tert-butilo, más particularmente 1, 2 o 3 átomos de carbono ("C_1-C_3-alquilo"), por ejemplo un grupo metilo, etilo, n-propilo o iso-propilo.

Se debe entender que el término "C_2-C_{10}-alquileno" significa preferentemente un grupo hidrocarburo bivalente saturado, lineal o ramificado, con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 átomos de carbono, *por ejemplo* un grupo metileno, etileno, n-propileno, n-butileno, n-pentileno, 2-metilbutileno, n-hexileno, 3-metilpentileno, o un isómero de los mismos. En

particular, dichos grupos son lineales y tienen 2, 3, 4 o 5 átomos de carbono (“C_2-C_5-alquileno”), *por ejemplo* un grupo etileno, n-propileno, n-butileno, n-pentileno, más particularmente 3 o 4 átomos de carbono (“C_3-C_4-alquileno”), *por ejemplo* un grupo n-propileno o n-butileno.

Se debe entender que el término “halo-C_1-C_6-alquilo” preferiblemente significa un grupo hidrocarburo monovalente saturado, lineal o ramificado en el cual el término “C_1-C_6-alquilo” es según se lo definió anteriormente, y en el cual uno o más átomos de hidrógeno han sido reemplazados por un átomo de halógeno, de manera idéntica o diferente, *es decir* donde los átomos de halógeno son independientes entre sí. En particular, dicho átomo de halógeno es F. Dicho grupo halo-C_1-C_6-alquilo es, por ejemplo, -CF_3, -CHF_2, -CH_2F, -CF_2CF_3, o -CH_2CF_3.

Se debe entender que el término “C_1-C_6-alcoxi” preferiblemente significa un grupo hidrocarburo monovalente saturado, lineal o ramificado, de fórmula -O-(C_1-C_6-alquilo), en el cual el término “C_1-C_6-alquilo” es según se lo definió anteriormente, *por ejemplo* un grupo metoxi, etoxi, n-propoxi, iso-propoxi, n-butoxi, iso-butoxi, tert-butoxi, sec-butoxi, pentoxi, iso-pentoxi, o n-hexoxi, o un isómero de los mismos.

El término “halo-C_1-C_6-alcoxi” preferentemente significa un grupo C_1-C_6-alcoxi lineal o ramificado, saturado, monovalente, como se ha definido, en donde uno o más de los átomos hidrógeno se reemplaza, en forma idéntica o diferente, por un átomo de halógeno. Particularmente, dicho átomo de halógeno es F. Dicho grupo halo-C_1-C_6-alcoxi es, por ejemplo, $-OCF_3$, $-OCHF_2$, $-OCH_2F$, $-OCF_2CF_3$, o $-OCH_2CF_3$.

El término “C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo” preferentemente significa un grupo C_1-C_6-alquilo lineal o ramificado, saturado, monovalente, como se ha definido, en donde uno o más de los átomos hidrógeno se reemplaza, en forma idéntica o diferente, por un grupo C_1-C_6-alcoxi, como se ha definido, por ejemplo un grupo metoxialquilo, etoxialquilo, propiloxialquilo, iso-propoxialquilo, butoxialquilo, iso-butoxialquilo, tert-butoxialquilo, sec-butoxialquilo, pentiloxialquilo, iso-pentiloxialquilo, hexiloxialquilo, o un isómero del mismo.

El término “halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo” preferentemente significa un grupo C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo lineal o ramificado, saturado, monovalente, como se ha definido, en donde uno o más de los átomos hidrógeno se reemplaza, en forma idéntica o diferente, por un átomo de halógeno. Particularmente, dicho átomo

de halógeno es F. Dicho grupo halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo es, por ejemplo, -$CH_2CH_2OCF_3$, -$CH_2CH_2OCHF_2$, -$CH_2CH_2OCH_2F$, -$CH_2CH_2OCF_2CF_3$, o -$CH_2CH_2OCH_2CF_3$.

El término "C_2-C_{10}-alquenilo" preferentemente significa un grupo hidrocarbonado lineal o ramificado, monovalente, que contiene uno o más enlaces dobles, y que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 átomos de carbono, particularmente 2, 3, 4, 5 ó 6 átomos de carbono ("C_2-C_6-alquenilo"), más particularmente 2 ó 3 átomos de carbono ("C_2-C_3-alquenilo"), donde debe comprenderse que en el caso en donde dicho grupo alquenilo contiene más que un enlace doble, luego dichos enlaces dobles pueden estar aislados o conjugados entre sí. Dicho grupo alquenilo es, por ejemplo, un grupo vinilo, alilo, (E)-2-metilvinilo, (Z)-2-metilvinilo, homoalilo, (E)-but-2-enilo, (Z)-but-2-enilo, (E)-but-1-enilo, (Z)-but-1-enilo, pent-4-enilo, (E)-pent-3-enilo, (Z)-pent-3-enilo, (E)-pent-2-enilo, (Z)-pent-2-enilo, (E)-pent-1-enilo, (Z)-pent-1-enilo, hex-5-enilo, (E)-hex-4-enilo, (Z)-hex-4-enilo, (E)-hex-3-enilo, (Z)-hex-3-enilo, (E)-hex-2-enilo, (Z)-hex-2-enilo, (E)-hex-1-enilo, (Z)-hex-1-enilo, isopropenilo, 2-metilprop-2-enilo, 1-metilprop-2-enilo, 2-metilprop-1-enilo, (E)-1-metilprop-1-enilo, (Z)-1-metilprop-1-enilo, 3-metilbut-3-enilo, 2-metilbut-3-

enilo, 1-metilbut-3-enilo, 3-metilbut-2-enilo, (E)-2-metilbut-2-enilo, (Z)-2-metilbut-2-enilo, (E)-1-metilbut-2-enilo, (Z)-1-metilbut-2-enilo, (E)-3-metilbut-1-enilo, (Z)-3-metilbut-1-enilo, (E)-2-metilbut-1-enilo, (Z)-2-metilbut-1-enilo, (E)-1-metilbut-1-enilo, (Z)-1-metilbut-1-enilo, 1,1-dimetilprop-2-enilo, 1-etilprop-1-enilo, 1-propilvinilo, 1-isopropilvinilo, 4-metilpent-4-enilo, 3-metilpent-4-enilo, 2-metilpent-4-enilo, 1-metilpent-4-enilo, 4-metilpent-3-enilo, (E)-3-metilpent-3-enilo, (Z)-3-metilpent-3-enilo, (E)-2-metilpent-3-enilo, (Z)-2-metilpent-3-enilo, (E)-1-metilpent-3-enilo, (Z)-1-metilpent-3-enilo, (E)-4-metilpent-2-enilo, (Z)-4-metilpent-2-enilo, (E)-3-metilpent-2-enilo, (Z)-3-metilpent-2-enilo, (E)-2-metilpent-2-enilo, (Z)-2-metilpent-2-enilo, (E)-1-metilpent-2-enilo, (Z)-1-metilpent-2-enilo, (E)-4-metilpent-1-enilo, (Z)-4-metilpent-1-enilo, (E)-3-metilpent-1-enilo, (Z)-3-metilpent-1-enilo, (E)-2-metilpent-1-enilo, (Z)-2-metilpent-1-enilo, (E)-1-metilpent-1-enilo, (Z)-1-metilpent-1-enilo, 3-etilbut-3-enilo, 2-etilbut-3-enilo, 1-etilbut-3-enilo, (E)-3-etilbut-2-enilo, (Z)-3-etilbut-2-enilo, (E)-2-etilbut-2-enilo, (Z)-2-etilbut-2-enilo, (E)-1-etilbut-2-enilo, (Z)-1-etilbut-2-enilo, (E)-3-etilbut-1-enilo, (Z)-3-etilbut-1-enilo, 2-

etilbut-1-enilo, (E)-1-etilbut-1-enilo, (Z)-1-etilbut-1-enilo, 2-propilprop-2-enilo, 1-propilprop-2-enilo, 2-isopropilprop-2-enilo, 1-isopropilprop-2-enilo, (E)-2-propilprop-1-enilo, (Z)-2-propilprop-1-enilo, (E)-1-propilprop-1-enilo, (Z)-1-propilprop-1-enilo, (E)-2-isopropilprop-1-enilo, (Z)-2-isopropilprop-1-enilo, (E)-1-isopropilprop-1-enilo, (Z)-1-isopropilprop-1-enilo, (E)-3,3-dimetilprop-1-enilo, (Z)-3,3-dimetilprop-1-enilo, 1-(1,1-dimetiletil)etenilo, buta-1,3-dienilo, penta-1,4-dienilo, hexa-1,5-dienilo, o metilhexadienilo. Particularmente, dicho grupo es vinilo o alilo.

El término "C_2-C_{10}-alquinilo" preferentemente significa un grupo hidrocarbonado lineal o ramificado, monovalente que contiene uno o más enlaces triples, y que contiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 átomos de carbono, particularmente 2, 3, 4, 5 ó 6 átomos de carbono ("C_2-C_6-alquinilo"), más particularmente 2 ó 3 átomos de carbono ("C_2-C_3-alquinilo"). Dicho grupo C_2-C_{10}-alquinilo es, por ejemplo, un grupo etinilo, prop-1-inilo, prop-2-inilo, but-1-inilo, but-2-inilo, but-3-inilo, pent-1-inilo, pent-2-inilo, pent-3-inilo, pent-4-inilo, hex-1-inilo, hex-2-inilo, hex-3-inilo, hex-4-inilo, hex-5-inilo, 1-metilprop-2-inilo, 2-metilbut-3-inilo, 1-metilbut-3-inilo, 1-metilbut-2-inilo, 3-


metilbut-1-inilo, 1-etilprop-2-inilo, 3-metilpent-4-inilo, 2-metilpent-4-inilo, 1-metilpent-4-inilo, 2-metilpent-3-inilo, 1-metilpent-3-inilo, 4-metilpent-2-inilo, 1-metilpent-2-inilo, 4-metilpent-1-inilo, 3-metilpent-1-inilo, 2-etilbut-3-inilo, 1-etilbut-3-inilo, 1-etilbut-2-inilo, 1-propilprop-2-inilo, 1-isopropilprop-2-inilo, 2,2-dimetilbut-3-inilo, 1,1-dimetilbut-3-inilo, 1,1-dimetilbut-2-inilo, o 3,3-dimetilbut-1-inilo. Particularmente, dicho grupo alquinilo es etinilo, prop-1-inilo, o prop-2-inilo.

El término "C_3-C_{10}-cicloalquilo" significa un anillo hidrocarbonado saturado, monovalente, monocíclico o bicíclico que contiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 átomos de carbono ("C_3-C_{10}-cicloalquilo"). Dicho grupo C_3-C_{10}-cicloalquilo es por ejemplo, un anillo hidrocarbonado monocíclico, por ejemplo un grupo ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, cicloheptilo, ciclooctilo, ciclononilo o ciclodecilo, o un anillo hidrocarbonado bicíclico, por ejemplo un anillo perhidropentalenileno o decalina. En particular, dicho anillo contiene 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono ("C_3-C_6-cicloalquilo").

El término "C_3-C_6-cicloalquiloxi" se refiere a un grupo (C_3-C_6-cicloalquil)-O- en el cual "C_3-C_6-cicloalquilo" es como se define aquí. Los ejemplos

incluyen, pero de manera no taxativa, a ciclopropanoxi y ciclobutanoxi.

El término "C_4-C_{10}-cicloalquenilo" preferentemente significa un anillo hidrocarbonado no aromático monovalente, monocíclico o bicíclico que contiene 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 átomos de carbono y uno, dos, tres o cuatro enlaces dobles, conjugados o no, según lo permita el tamaño de dicho anillo cicloalquenilo. Dicho grupo C_4-C_{10}-cicloalquenilo es, por ejemplo, un anillo hidrocarbonado monocíclico, por ejemplo un grupo ciclobutenilo, ciclopentenilo, o ciclohexenilo o un hidrocarburo bicíclico, por ejemplo:



.

El término "C_5-C_8-cicloalqueniloxi" hace referencia a un grupo (C_5-C_8-cicloalquenil)-O- en donde "C_5-C_8-cicloalquenilo" es como se define en la presente.

El término "heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros", significa un anillo hidrocarbonado saturado, monovalente, monocíclico o bicíclico que contiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 átomos de carbono, y uno o más grupos que contienen heteroátomos seleccionados entre C(=O), O, S, S(=O), $S(=O)_2$, $N(R^a)$, en donde R^a representa un átomo de hidrógeno, o un grupo C_1-C_6-alquilo; donde es

posible que dicho grupo heterocicloalquilo esté unido al resto de la molécula a través de cualquiera de los átomos de carbono o, si se encuentra presente, el átomo de nitrógeno. Heteroespirocicloalquilo, heterobicicloalquilo y heterocicloalquilo en puente, como se define *infra*, también se incluyen dentro del alcance de esta definición.

El término "heteroespirocicloalquilo" significa un radical hidrocarbonado bicíclico monovalente saturado en donde los dos anillos comparten un átomo de carbono del anillo en común, y donde dicho radical hidrocarbonado bicíclico contiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 átomos de carbono, y uno o más grupos que contienen heteroátomos seleccionados entre C(=O), O, S, S(=O), $S(=O)_2$, NR^a, en donde R^a representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6-alquilo o C_3-C_7-cicloalquilo; donde es posible para dicho grupo heteroespirocicloalquilo estar unido al resto de la molécula a través de cualquiera de los átomos de carbono o, si se encuentra presente, el átomo de nitrógeno. Dicho grupo heteroespirocicloalquilo es, por ejemplo, azaespiro[2.3]hexilo, azaespiro[3.3]heptilo, oxaazaespiro[3.3]heptilo, tiaazaespiro[3.3]heptilo, oxaespiro[3.3]heptilo, oxazaespiro[5.3]nonilo, oxazaespiro[4.3]octilo, oxazaespiro[5.5]undecilo,

diazaespiro[3.3]heptilo, tiazaespiro[3.3]heptilo, tiazaespiro[4.3]octilo, o azaespiro[5.5]decilo.

El término "heterobicicloalquilo" significa un radical hidrocarbonado bicíclico monovalente saturado en donde los dos anillos comparten dos átomos del anillo inmediatamente adyacentes, y donde dicho radical hidrocarbonado bicíclico contiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 átomos de carbono, y uno o más grupos que contienen heteroátomos seleccionados entre C(=O), O, S, S(=O), $S(=O)_2$, NR^a, en donde R^a representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6-alquilo o C_3-C_7-cicloalquilo; donde es posible para dicho grupo heterobicicloalquilo estar unido al resto de la molécula a través de cualquiera de los átomos de carbono o, si se encuentra presente, el átomo de nitrógeno. Dicho grupo heterobicicloalquilo es, por ejemplo, azabiciclo[3.3.0]octilo, azabiciclo[4.3.0]nonilo, diazabiciclo[4.3.0]nonilo, oxazabiciclo[4.3.0]nonilo, tiazabiciclo[4.3.0]nonilo, o azabiciclo[4.4.0]decilo.

El término "heterocicloalquilo en puente" significa un radical hidrocarbonado bicíclico monovalente saturado en donde los dos anillos comparten dos átomos del anillo en común que no son inmediatamente adyacentes, y donde dicho radical hidrocarbonado bicíclico contiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 átomos de carbono, y uno o más

grupos que contienen heteroátomos seleccionados entre C(=O), O, S, S(=O), $S(=O)_2$, NR^a, en donde R^a representa un átomo de hidrógeno, o un grupo C_1-C_6-alquilo o C_3-C_7-cicloalquilo; donde es posible para dicho grupo heterocicloalquilo en puente estar unido al resto de la molécula a través de cualquiera de los átomos de carbono o, si se encuentra presente, el átomo de nitrógeno. Dicho grupo heterocicloalquilo en puente es, por ejemplo, azabiciclo[2.2.1]heptilo, oxazabiciclo[2.2.1]heptilo, tiazabiciclo[2.2.1]heptilo, diazabiciclo[2.2.1]heptilo, azabiciclo[2.2.2]octilo, diazabiciclo[2.2.2]octilo, oxazabiciclo[2.2.2]octilo, tiazabiciclo[2.2.2]octilo, azabiciclo[3.2.1]octilo, diazabiciclo[3.2.1]octilo, oxazabiciclo[3.2.1]octilo, tiazabiciclo[3.2.1]octilo, azabiciclo[3.3.1]nonilo, diazabiciclo[3.3.1]nonilo, oxazabiciclo[3.3.1]nonilo, tiazabiciclo[3.3.1]nonilo, azabiciclo[4.2.1]nonilo, diazabiciclo[4.2.1]nonilo, oxazabiciclo[4.2.1]nonilo, tiazabiciclo[4.2.1]nonilo, azabiciclo[3.3.2]decilo, diazabiciclo[3.3.2]decilo, oxazabiciclo[3.3.2]decilo, tiazabiciclo[3.3.2]decilo, o azabiciclo[4.2.2]decilo.

Particularmente, dicho heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros puede contener 2, 3, 4, o 5 átomos de carbono, y uno o más de los grupos que contienen heteroátomos que se han mencionado (un

“heterocicloalquilo de entre 3 y 6 miembros”), más particularmente dicho heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros puede contener 4 o 5 átomos de carbono, y uno o más de los grupos que contienen heteroátomos que se han mencionado (un “heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros”).

En particular, sin ser limitados por esto, dicho heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros puede ser un anillo de 4 miembros, como por ejemplo un azetidinilo, oxetanilo, o un anillo de 5 miembros, como por ejemplo tetrahidrofuranilo, dioxolinilo, pirrolidinilo, imidazolidinilo, pirazolidinilo, o un anillo de 6 miembros, como por ejemplo tetrahidropiranilo, piperidinilo, morfolinilo, ditianilo, tiomorfolinilo, piperazinilo, o tritianilo, o un anillo de 7 miembros, como por ejemplo un anillo diazepanilo, por ejemplo.

Dicho heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros puede ser bicíclico, tal como, sin ser limitados por esto, un anillo de 5,5 miembros, por ejemplo un anillo hexahidrociclopenta[c]pirrol-2(1H)-ilo, o un anillo bicíclico de 5,6 miembros, por ejemplo un anillo hexahidropirrolo[1,2-a]pirazin-2(1H)-ilo.

El término “heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros”, significa un anillo hidrocarbonado no aromático insaturado, monovalente, monocíclico o

bicíclico que contiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 átomos de carbono, y uno o más grupos que contienen heteroátomos seleccionados entre C(=O), O, S, S(=O), $S(=O)_2$, $N(R^a)$, en donde R^a representa un átomo de hidrógeno, o un grupo C_1-C_6-alquilo; donde es posible que dicho grupo heterocicloalquenilo esté unido al resto de la molécula a través de cualquiera de los átomos de carbono o, si se encuentra presente, el átomo de nitrógeno. Los ejemplos de dicho heterocicloalquenilo son por ejemplo un grupo 4H-piranilo, 2H-piranilo, 3H-diazirinilo, 2,5-dihidro-1H-pirrolilo, [1,3]dioxolilo, 4H-[1,3,4]tiadiazinilo, 2,5-dihidrofuranilo, 2,3-dihidrofuranilo, 2,5-dihidrotiofenilo, 2,3-dihidrotiofenilo, 4,5-dihidrooxazolilo, o 4H-[1,4]tiazinilo.

El término “arilo” preferentemente significa un anillo hidrocarbonado monovalente, aromático o parcialmente aromático, monocíclico, bicíclico o tricíclico con 6, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 átomos de carbono (un grupo “C_6-C_{14}-arilo”), particularmente un anillo con 6 átomos de carbono (un grupo “C_6-arilo”), por ejemplo un grupo fenilo; o un grupo bifenilo, o un anillo con 9 átomos de carbono (un grupo “C_9-arilo”), por ejemplo un grupo indanilo o indenilo, o un anillo con 10 átomos de carbono (un grupo “C_{10}-arilo”), por

ejemplo un grupo tetralinilo, dihidronaftilo, o naftilo, o un anillo con 13 átomos de carbono, (un grupo "C_{13}-arilo"), por ejemplo un grupo fluorenilo, o un anillo con 14 átomos de carbono, (un grupo "C_{14}-arilo"), por ejemplo un grupo antranilo. Preferentemente, el grupo arilo es un grupo fenilo.

El término "heteroarilo" preferentemente significa un sistema de anillos aromático monovalente, monocíclico, bicíclico o tricíclico con 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 átomos del anillo (un grupo "heteroarilo de entre 5 y 14 miembros"), particularmente 5 o 6 o 9 o 10 átomos, y que contiene al menos un heteroátomo que puede ser idéntico o diferente, donde dicho heteroátomo es por ejemplo oxígeno, nitrógeno o azufre, y además en cada caso puede ser benzocondensado. Particularmente, heteroarilo se selecciona entre tienilo, furanilo, pirrolilo, oxazolilo, tiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, tiadiazolilo, tia-4H-pirazolilo *etc*., y benzoderivados de los mismos, como por ejemplo benzofuranilo, benzotienilo, benzoxazolilo, bencisoxazolilo, bencimidazolilo, benzotriazolilo, indazolilo, indolilo, isoindolilo, *etc*.; o piridilo, piridazinilo, pirimidinilo, pirazinilo, triazinilo, *etc*., y benzoderivados de los mismos, como por ejemplo

quinolinilo, quinazolinilo, isoquinolinilo, *etc*.; o azocinilo, indolizinilo, purinilo, *etc*., y benzoderivados de los mismos; o cinolinilo, ftalazinilo, quinazolinilo, quinoxalinilo, naftpiridinilo, pteridinilo, carbazolilo, acridinilo, fenazinilo, fenotiazinilo, fenoxazinilo, xantenilo, o oxepinilo, *etc*..

En general, y salvo que se especifique lo contrario, los radicales heteroarílicos o heteroarilénicos incluyen todas las formas isoméricas posibles de los mismos, por ejemplo los isómeros posicionales de los mismos. De este modo, a modo de ejemplo ilustrativo no restrictivo, el término piridinilo o piridinileno incluye piridin-2-ilo, piridin-2-ileno, piridin-3-ilo, piridin-3-ileno, piridin-4-ilo y piridin-4-ileno; o el término tienilo o tienileno incluye tien-2-ilo, tien-2-ileno, tien-3-ilo y tien-3-ileno.

Se debe entender que el término “C_1-C_6”, tal como se lo utiliza durante todo el presente texto, *por ejemplo* en el contexto de la definición de “C_1-C_6-alquilo”, “C_1-C_6-haloalquilo”, “C_1-C_6-alcoxi”, o “C_1-C_6-haloalcoxi” significa un grupo alquilo con un número finito de átomos de carbono entre 1 y 6, *por ejemplo* 1, 2, 3, 4, 5, o 6 átomos de carbono. También se debe

entender que dicho término "C_1-C_6" se debe interpretar como cualquier sub-rango comprendido en el mismo, *por ejemplo* C_1-C_6, C_2-C_5, C_3-C_4, C_1-C_2, C_1-C_3, C_1-C_4, C_1-C_5; en particular C_1-C_2, C_1-C_3, C_1-C_4, C_1-C_5, C_1-C_6; más particularmente C_1-C_4; en el caso de "C_1-C_6-haloalquilo" o "C_1-C_6-haloalcoxi" aún más particularmente C_1-C_2.

De manera similar, según se usa aquí, se debe entender que el término "C_2-C_6", tal como se lo utiliza durante todo el presente texto, *por ejemplo* en el contexto de las definiciones de "C_2-C_6-alquenilo" y "C_2-C_6-alquinilo", significa un grupo alquenilo o un grupo alquinilo con un número finito de átomos de carbono de entre 2 y 6, *por ejemplo* 2, 3, 4, 5, o 6 átomos de carbono. También se debe entender que dicho término "C_2-C_6" se debe interpretar como cualquier sub-rango comprendido en el mismo, *por ejemplo* C_2-C_6, C_3-C_5, C_3-C_4, C_2-C_3, C_2-C_4, C_2-C_5; en particular C_2-C_3.

Además, según se usa aquí, se debe entender que el término "C_3-C_6", tal como se lo utiliza durante todo el presente texto, *por ejemplo* en el contexto de la definición de "C_3-C_6-cicloalquilo", significa un grupo cicloalquilo con un número finito de átomos de carbono de entre 3 y 6, *por ejemplo* 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono. También se debe entender que dicho término "C_3-C_6" se debe interpretar como cualquier sub-rango

comprendido en el mismo, *por ejemplo* C_3-C_6, C_4-C_5, C_3-C_5, C_3-C_4, C_4-C_6, C_5-C_6; en particular C_3-C_6.

El término “sustituido" denota que uno o más hidrógenos en el átomo designado han sido reemplazados por una selección de los grupos que se enumeran, con la condición de que no se supere la valencia normal del átomo bajo las circunstancias del caso y de que la sustitución dé como resultado un compuesto estable. Las combinaciones de sustituyentes y/o variables están permitidas pero solamente si dichas combinaciones dan como resultado un compuesto estable.

El término “opcionalmente sustituido" hace referencia a una sustitución opcional con los grupos, los radicales o las unidades que se enumeran.

Como se lo usa en la presente, el término “uno o más”, por ejemplo, en la definición de los sustituyentes de los compuestos de las fórmulas generales de la presente invención, ha de interpretarse como “uno, dos, tres, cuatro o cinco”, particularmente uno, dos, tres o cuatro, más particularmente uno, dos o tres veces, más particularmente uno o dos”.

Según se usa aquí, el término “grupo saliente” se refiere a un átomo o un grupo de átomos que es desplazado en una reacción química como una especie estable llevándose con él a los electrones de la unión.

Preferentemente, un grupo saliente se selecciona entre el grupo que comprende: halo, en particular cloro, bromo o yodo, metanosulfoniloxi, p-toluensulfoniloxi, trifluorometanosulfoniloxi, nonafluorobutanosulfoniloxi, (4-bromo-benceno)sulfoniloxi, (4-nitro-benceno)sulfoniloxi, (2-nitro-benceno)-sulfoniloxi, (4-isopropil-benceno)sulfoniloxi, (2,4,6-tri-isopropil-benceno)-sulfoniloxi, (2,4,6-trimetil-benceno)sulfoniloxi, (4-tertbutil-benceno)sulfoniloxi, bencenosulfoniloxi, y (4-metoxi-benceno)sulfoniloxi.

Según se usa aquí, el término “grupo protector” es un grupo protector unido a un nitrógeno en los intermediarios que se utilizan para la preparación de compuestos de la fórmula general **I**. Dichos grupos se introducen *por ejemplo* por modificación química del respectivo grupo amino para obtener quimioselectividad en una reacción química subsiguiente. Los grupos protectores de grupos amino han sido descritos por ejemplo en T.W. Greene y P.G.M. Wuts en *Protective Groups in Organic Synthesis*, 3ª edición, Wiley 1999; más específicamente, dichos grupos se pueden seleccionar entre grupos sulfonilo sustituidos, como por ejemplo grupos mesilo-, tosilo- o fenilsulfonilo-, grupos acilo tales como benzoílo, acetilo o

tetrahidropiranoílo-, o a base de carbamato, como por ejemplo *tert*.-butoxicarbonilo (Boc), o puede incluir silicio, como por ejemplo en 2-(trimetilsilil)etoximetilo (SEM).

La invención incluye todas las variantes isotópicas de los compuestos de acuerdo con la invención. Una variante isotópica de un compuesto de acuerdo con la invención se define como una variante en la cual se ha reemplazado al menos un átomo natural por otro que tiene un número atómico idéntico pero que se caracteriza por un número másico diferente. Los ejemplos de isótopos que pueden incorporarse en los compuestos de acuerdo con la invención incluyen los isótopos del hidrógeno, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo, del azufre, del flúor, del cloro, del bromo y del iodo, tales como el ^{2}H (el deuterio), el ^{3}H (el tritio), el ^{11}C, el ^{13}C, el ^{14}C, el ^{15}N, el ^{17}O, el ^{18}O, el ^{32}P, el ^{33}P, el ^{33}S, el ^{34}S, el ^{35}S, el ^{36}S, el ^{18}F, el ^{36}Cl, el ^{82}Br, el ^{123}I, el ^{124}I, el ^{129}I y el ^{131}I. Algunas de las variantes isotópicas de los compuestos de acuerdo con la invención, por ejemplo, aquellas en las que se han incorporado uno o más isótopos radiactivos como el ^{3}H o el ^{14}C, pueden resultar útiles para analizar la distribución de una droga y/o de un sustrato en un tejido. Desde el punto de vista de la

facilitad de la manipulación y la idoneidad para la detección, resultan preferibles los isótopos tritio y ^{14}C. Por otra parte, mediante una sustitución con un isótopo como el deuterio, pueden obtenerse determinadas ventajas terapéuticas a causa de una mayor estabilidad metabólica, por ejemplo, una mayor vida media in vivo o un menor requerimiento de dosificación. Como consecuencia, estos isótopos pueden resultar preferibles bajo circunstancias específicas. En general, las variantes isotópicas de los compuestos de acuerdo con la invención pueden elaborarse de acuerdo con procedimientos convencionales conocidos por aquellos versados en la técnica, por ejemplo, sobre la base de los métodos o los procedimientos ilustrativos que se describen en la sección de ejemplos en la presente, mediante el uso de las variantes isotópicas correspondientes en lugar de los reactivos que se mencionan.


Cuando en la presente se usa la forma en plural de la palabra, los compuestos, sales, formas polimórficas, hidratos, solvatos y semejantes, se considera que también comprende un solo compuesto, sal, forma polimórfica, isómero, hidrato, solvato o semejantes.


Un “compuesto estable” o una “estructura estable” representan un compuesto que es suficientemente robusto

para sobrevivir el aislamiento, con un grado de pureza útil para formar una mezcla de reacción y para formularlo en un agente terapéutico eficaz.

Los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden contener uno o más centros asimétricos, dependiendo de la localización y la naturaleza de los distintos sustituyentes deseados. Puede haber átomos de carbono asimétricos en la configuración (R) o (S), lo cual dará como resultado mezclas racémicas en el caso de un solo centro asimétrico, y mezclas diastereoméricas en el caso de múltiples centros asimétricos. En determinados casos, también puede haber asimetría presente debido a la rotación restringida alrededor de un enlace determinado, por ejemplo, el enlace central que une los dos anillos aromáticos sustituidos de los compuestos especificados.

Los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden contener átomos de azufre asimétricos, como es el caso de los grupos sulfóxido o sulfoximina asimétricos, que tienen la siguiente estructura:





, por ejemplo,

donde * representa los átomos a los cuales puede estar

unido el resto de la molécula.

Los sustituyentes en un anillo también pueden estar presentes en la forma cis o trans. Todas estas configuraciones (incluyendo los enantiómeros y los diastereómeros) han de quedar incluidas dentro del alcance de la presente invención.

Los compuestos preferidos son aquellos que producen la actividad biológica más deseable. Dentro del alcance de la presente invención también se incluyen los isómeros y estereoisómeros o mezclas racémicas o diastereoméricas separados, puros o parcialmente purificados de los compuestos de esta invención. La purificación y la separación de dichos materiales se pueden efectuar usando técnicas estándar conocidas en la técnica.

Los isómeros puros se pueden obtener por resolución de las mezclas racémicas de acuerdo con procesos convencionales, por ejemplo, por formación de sales diastereoisoméricas usando un ácido o una base ópticamente activo o por formación de diastereómeros covalentes. Los ejemplos de los ácidos apropiados son el ácido tartárico, diacetiltártarico, ditoluiltartárico y alcanforsulfónico. Pueden separarse las mezclas de diastereoisómeros en sus diastereómeros individuales sobre la base de sus diferencias físicas


y/o químicas, empleando métodos conocidos en la técnica, por ejemplo, por cromatografía o cristalización fraccionada. Las bases o ácidos ópticamente activos entonces se liberan de las sales diastereoméricas separadas. Un proceso diferente para separar isómeros ópticos comprende el uso de cromatografía quiral (por ejemplo, columnas quirales para HPLC), con o sin una derivatización convencional, elegida óptimamente para maximizar la separación de los enantiómeros. Las columnas quirales de HPLC apropiadas son producidas por Diacel, por ejemplo, Chiracel OD y Chiracel OJ, entre muchos otros, todos los cuales se pueden seleccionar de forma rutinaria. También son de utilidad las separaciones enzimáticas, con o sin derivatización. Del mismo modo, pueden obtenerse los compuestos ópticamente activos de la presente invención por síntesis quiral, usando materiales iniciales ópticamente activos.

Con el fin de diferenciar los distintos tipos de isómeros unos de otros, puede usarse la Sección E de las reglas de la IUPAC como referencia (Pure Appl Chem 45, 11-30, 1976).


Dentro del alcance de la presente invención se incluyen todos los estereoisómeros posibles de los compuestos de acuerdo con la presente invención, que

pueden tomar la forma de estereoisómeros individuales o de mezclas de estereoisómeros, por ejemplo, de isómeros R o S o de isómeros E o Z, en cualquier proporción. El aislamiento de un estereoisómero individual de un compuesto de acuerdo con la presente invención, por ejemplo, de un enantiómero o un diastereómero individual, puede llevarse a cabo de acuerdo con cualquier método conocido en la técnica, lo que en particular abarca la cromatografía, especialmente la cromatografía quiral.


Además, los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden existir como tautómeros. Por ejemplo, cualquier compuesto de acuerdo con la presente invención que, por ejemplo, contenga una unidad de pirazol como un grupo heteroarilo podrá tomar la forma de un tautómero 1H o de un tautómero 2H, o incluso podrá tomar la forma de una mezcla de los tautómeros en cualquier cantidad. En otro ejemplo, una unidad de triazol podrá tomar la forma de un tautómero 1H, de un tautómero 2H o de un tautómero 4H tautómero, o incluso de una mezcla de dichos tautómeros 1H, 2H y 4H en cualquier cantidad, donde los tautómeros 1H, 2H y 4H son como se los representa a continuación:



tautómero 1H



tautómero 2H



tautómero 4H .

Dentro del alcance de la presente invención se incluyen todos los tautómeros posibles de los compuestos de acuerdo con la presente invención, que pueden tomar la forma de tautómeros individuales o de mezclas de dichos tautómeros, en cualquier proporción.

Por otro lado, los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden tomar la forma de N-óxidos, los cuales se definen como compuestos de acuerdo con la presente invención en los que al menos un átomo de nitrógeno ha sido oxidado. Más particularmente, dentro del alcance de la presente invención se incluyen todos los N-óxidos posibles de este tipo.

La presente invención también se relaciona con aquellas formas de los compuestos que se describen en la presente que pueden resultar útiles, lo que abarca los metabolitos, los hidratos, los solvatos, las prodrogas y las sales, particularmente las sales y los coprecipitados farmacéuticamente aceptables.

Los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden tomar la forma de hidratos o de solvatos, en cuyo caso los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden contener solventes polares,

particularmente agua, metanol o etanol, por ejemplo, como un elemento estructural de su red cristalina. La cantidad de los solventes polares, particularmente del agua, puede presentan en una relación estequiométrica o no estequiométrica. En el caso de los solvatos estequiométricos, por ejemplo, los hidratos, son posibles los hemi, (semi), mono, sesqui, di, tri, tetra, penta-solvatos o hidratos, respectivamente, etcétera. Dentro del alcance de la presente invención se incluyen todos los hidratos y los solvatos que se han definido.

Adicionalmente, los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden tomar formas libres, por ejemplo, pueden tomar la forma de bases libres o de ácidos libres. Como alternativa, pueden tomar la forma de zwitteriones o de sales. Las sales abarcan todas las sales de adición orgánicas o inorgánicas, particularmente las sales orgánicas o inorgánicas que son farmacéuticamente aceptables y que suelen emplearse en el ámbito de la farmacia.

El término “sal farmacéuticamente aceptable" hace referencia a una sal de adición ácida inorgánica u orgánica, relativamente no tóxica, de un compuesto de acuerdo con la presente invención. Por ejemplo, véase S. M. Berge, et al. “Pharmaceutical salts,” J. Pharm.

Sci. 1977, 66, 1-19.

Una sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto de acuerdo con la presente invención puede ser, por ejemplo, una sal de adición ácida de un compuesto de acuerdo con la presente invención, que por ejemplo, puede comprender un átomo de nitrógeno en una cadena o en un anillo que sea suficientemente básico para formar una sal de adición ácida con un ácido inorgánico, tal como los ácidos clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, sulfúrico, bisulfúrico, fosfórico o nítrico, o con un ácido orgánico, tal como los ácidos fórmico, acético, acetoacético, pirúvico, trifluoroacético, propiónico, butírico, hexanoico, heptanoico, undecanoico, láurico, benzoico, salicílico, 2-(4-hidroxibenzoíl)-benzoico, alcanfórico, cinámico, ciclopentanopropiónico, diglucónico, 3-hidroxi-2-naftoico, nicotínico, pamoico, pectínico, persulfúrico, 3-fenilpropiónico, pícrico, piválico, 2-hidroxietansulfónico, itacónico, sulfámico, trifluorometansulfónico, dodecilsulfúrico, etansulfónico, bencensulfónico, para-toluensulfónico, metansulfónico, 2-naftalensulfónico, naftalenodisulfónico, alcanforsulfónico, cítrico, tartárico, esteárico, láctico, oxálico, malónico, succínico, málico, adípico, algínico, maleico,

fumárico, D-glucónico, mandélico, ascórbico, glucoheptanoico, glicerofosfórico, aspártico, sulfosalicílico, hemisulfúrico, o tiociánico.

Además, otra sal apropiada farmacéuticamente aceptable de un compuesto de acuerdo con la presente invención es una sal de metal alcalino suficientemente ácida, por ejemplo, una sal de sodio o potasio, una sal de metal alcalino térreo, por ejemplo, una sal de calcio o magnesio, una sal de amonio o una sal con una base orgánica que proporciona un catión aceptable para el uso fisiológico, por ejemplo, una sal con N-metil-glucamina, dimetil-glucamina, etil-glucamina, lisina, diciclohexilamina, 1,6-hexadiamina, etanolamina, glucosamina, sarcosina, serinol, tris-hidroxi-metil-aminometano, aminopropandiol, base sovak, 1-amino-2,3,4-butantriol, o con una sal de amonio cuaternario, como por ejemplo tetrametilamonio, tetraetilamonio, tetra(*n*-propil)amonio, tetra (*n*-butil)amonio, o *N*-bencilo- *N,N,N*-trimetilamonio.

Aquellos versados en la técnica comprenderán además que las sales de adición ácida de los compuestos reivindicados se pueden preparar por reacción de los compuestos con el ácido inorgánico u orgánico apropiado utilizando cualquiera de los numerosos métodos conocidos. Como alternativa, se pueden preparar sales

de metales alcalinos y alcalino-térreos de los compuestos ácidos de la invención por reacción de los compuestos de acuerdo con la invención con la base apropiada utilizando diversos métodos conocidos.

Dentro del alcance de la presente invención se incluyen todas las sales posibles de los compuestos de acuerdo con la presente invención, que pueden tomar la forma de sales individuales o de mezclas de sales, en cualquier proporción.

Como se lo usa en la presente, el término “éster que puede hidrolizarse *in vivo*” se interpreta como un éster que puede hidrolizarse *in vivo* de un compuesto de acuerdo con la presente invención que contiene un grupo carboxilo o hidroxilo, por ejemplo, un éster farmacéuticamente aceptable que se hidroliza en el cuerpo del ser humano o el animal para producir el ácido o el alcohol original. Los ésteres farmacéuticamente aceptables para carboxi incluyen por ejemplo, alquilo, cicloalquilo y fenilalquilo opcionalmente sustituido, en particular ésteres de bencilo, ésteres de C_1-C_6 alcoximetilo, por ejemplo, metoximetilo, ésteres de C_1-C_6 alcanoiloximetilo, por ejemplo, pivaloiloximetilo, ésteres de ftalidilo, ésteres de C_3-C_8 cicloalcoxi-carboniloxi-C_1-C_6 alquilo, por ejemplo, 1-ciclohexilcarboniloxietilo; ésteres de


1,3-dioxolen-2-onilmetilo, por ejemplo, 5-metil-1,3-dioxolen-2-onilmetilo; y ésteres de C_1-C_6-alcoxicarboniloxietilo, por ejemplo, 1-metoxicarboniloxietilo, y pueden formarse en cualquier grupo carboxi en los compuestos de esta invención.

Un éster hidrolizable *in vivo* de un compuesto de acuerdo con la presente invención que contiene un grupo hidroxi incluye ésteres inorgánicos tal como ésteres de fosfato y éteres de aciloxialquilo y compuestos relacionados que, como resultado de la ruptura del éster por hidrólisis *in vivo* para dar el grupo hidroxi madre. Los ejemplos de ésteres de [alfa]-aciloxialquilo incluyen acetoximetoxilo y 2,2-dimetilpropioniloximetoxilo. Una selección de grupos formadores de ésteres hidrolizables *in vivo* para hidroxi comprende alcanoílo, benzoílo, fenilacetilo y benzoílo y fenilacetilo sustituidos, alcoxicarbonilo (para dar ésteres de alquilcarbonato), dialquilcarbamoílo y N-(dialquilaminoetil)-N-alquilcarbamoílo (para dar carbamatos), dialquilaminoacetilo y carboxiacetilo. Dentro del alcance de la presente invención se incluyen todos los ésteres que se han definido.

Por otra parte, dentro del alcance de la presente invención se incluyen todas las formas cristalinas o

polimórficas de los compuestos de acuerdo con la presente invención, que pueden ser formas polimórficas individuales o mezclas de formas polimórficas, en cualquier proporción.

De acuerdo con un primer aspecto, la presente invención cubre compuestos de fórmula general **I**:










I

en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;

A representa un grupo seleccionado entre:


,

,

,

,

,

,

;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos

al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:
C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros,

arilo, heteroarilo, ciano, $-(CH_2)_q-U-(CH_2)_p-R^{3a}$; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, ciano, $-(CH_2)_q-U-(CH_2)_p-R^{3a}$; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r-T-(CH_2)_s-$;

T representa un grupo seleccionado entre: U, $-C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t-U-R^{3a}]-$;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, -S(=O)-, -

$S(=O)_2$-, -S(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-S(=O)-, -$S(=O)_2$-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-$S(=O)_2$-,-C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -O-C(=S)-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -O-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-O-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido,

en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, halo-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo,

C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-S(=O)$_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-S(=O)$_2$-R^{5b}, -S(=O)$_2$-N(R^{5a})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b} o -N=S(=O)(R^{5c})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, fenilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido una vez con fenilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

o

N(R^{5a})R^{5b} juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo,

C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;

s representa el entero 1, 2 o 3; y


t representa el entero 0 o 1;


o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

En una forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde Q-V representa N-C(R^{1a}).

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde Q-V representa C(R^{1a})-N.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde A representa un grupo seleccionado entre:




,


;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula.


En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde A representa:



;

donde * indica el punto de unión de dicho grupo al resto de la molécula.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde A representa:




;

donde * indica el punto de unión de dicho grupo al resto de la molécula,

y donde R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r-T-(CH_2)_s-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde A

representa



;

donde * indica el punto de unión de dicho grupo al resto de la molécula.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se

relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo hidroxi o un grupo C_1-C_3-alcoxi.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo hidroxi o metoxi.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un grupo hidroxi.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un grupo metoxi.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1a} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula (I), *supra*, donde Q-V representa N-C(R^{1a}) y R^{1a} representa un grupo seleccionado entre C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula (I), *supra*, donde Q-V representa N-C(R^{1a}) y R^{1a} representa un grupo seleccionado entre C_1-C_3-alcoxi, halo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula (I), *supra*, donde Q-V representa N-C(R^{1a}) y R^{1a} representa un grupo C_1-C_3-alcoxi, preferentemente un grupo metoxi.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula (I), *supra*, donde Q-V representa C(R^{1a})-N y R^{1a} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo

seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1b} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo,

C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{1c}

representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde cada de R^{1a}, R^{1b}, y R^{1c} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde cada de R^{1b} y R^{1c} representa un átomo de hidrógeno, y donde R^{1a} representa un grupo metoxi.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, ciano, -

$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo,-$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo,-$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6

alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} representa un grupo $-(CH_2)_q-U-(CH_2)_p-R^{3a}$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, $-(CH_2)_q-U-(CH_2)_p-R^{3a}$; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo,

halo-C_1-C_3-alquilo, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2b} representa un grupo -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2b} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde uno

de R^{2a} y R^{2b} representa $-(CH_2)_q-U-(CH_2)_p-R^{3a}$ y el otro representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r-T-(CH_2)_s-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_2-T-CH_2-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-CH_2-T-(CH_2)_2-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde T representa $-C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t-U-R^{3a}]-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde T representa $-C[H][(CH_2)_t-U-R^{3a}]-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde T representa $-C(R^{6a})(U-R^{3a})-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde T representa $-C(H)(U-R^{3a})-$.

En otra forma de realización preferida, la invención se

relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa una unión simple.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, -S(=O)-, -$S(=O)_2$-, -S(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-S(=O)-, -$S(=O)_2$-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-$S(=O)_2$-, -C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -O-C(=S)-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -O-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-O-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -O-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-O-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa un grupo bivalente seleccionado entre: -C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa un grupo bivalente seleccionado entre: -C(=O)-O-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa -C(=O)-O-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa -C(=O)-N(R^{3b})-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde U representa -S(=O)$_2$-N(R^{3b})- o -N(R^{3c})-S(=O)$_2$-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se

relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3a} representa un grupo C_3-C_6-cicloalquilo; donde dicho grupo C_3-C_6-cicloalquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3a} representa un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se

relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde $N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde $N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde $N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un heterocicloalquilo de entre 3

y 10 miembros, donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^4 representa halo, hidroxi, ciano, nitro, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-S(=O)$_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-S(=O)$_2$-R^{5b} o -S(=O)$_2$-N(R^{5a})R^{5b}.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^4 representa halo, hidroxi, ciano, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b} o R^{5c}-S(=O)$_2$-.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^4 representa halo, hidroxi- o -N(R^{5a})R^{5b}.

En otra forma de realización preferida, la invención se

relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6-alquilo o bencilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5a} representa un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5a} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5b} representa un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5b} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5c}

representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5c} representa un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{5c} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde $N(R^{5a})R^{5b}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un grupo C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4.

En otra forma de realización preferida, la invención se

relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un grupo C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un grupo C_1-C_6 alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a} representa un grupo C_1-C_3-alquilo, y donde t representa 0.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6a}

representa un átomo de hidrógeno, y donde t representa 0.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6b} representa un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6b} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6c} representa un grupo C_1-C_3-alquilo.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde R^{6c} representa un átomo de hidrógeno.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde p representa 0 o 1.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde p representa 0.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde q representa 0 o 1.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde q representa 0.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde r representa 1 o 2.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde r representa 1.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde r representa 2.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde s representa 1 o 2.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde s representa 1.

En otra forma de realización preferida, la invención se

relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde s representa 2.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde s representa 1 y r representa 2.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde s representa 2 y r representa 1.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, donde t representa 0.


Debe comprenderse que la presente invención también se relaciona con cualquier combinación de las formas de realización preferidas descritas precedentemente.


A continuación se proveen algunos ejemplos de combinaciones. Sin embargo, la invención no se encuentra limitada a estas combinaciones.


En una forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;


A representa un grupo seleccionado entre:



,


,


,



donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -N(R^{5b})R^{5c}, -SCF_3, -SF_5;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -N(R^{5b})R^{5c}, -SCF_3, -SF_5;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo,

halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o

diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r-T-(CH_2)_s-$;

T representa un grupo seleccionado entre: U, $-C[H][(CH_2)_t-U-R^{3a}]-$;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, $-S(=O)-$, $-S(=O)_2-$, $-S(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-S(=O)-$, $-C(=O)-$, $-N(R^{3b})-$, $-C(=O)-O-$, $-O-C(=O)-$, $-C(=S)-O-$, $-O-C(=S)-$, $-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-O-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-O-$;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3

y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está

opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, halo-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-S(=O)$_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-S(=O)$_2$-R^{5b}, -S(=O)$_2$-N(R^{5a})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b} o -N=S(=O)(R^{5c})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

o

N(R^{5a})R^{5b} juntos forman un grupo heterocicloalquilo de

entre 3 y 7 miembros;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;

s representa el entero 1, 2 o 3; y








t representa el entero 0 o 1;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;

A representa un grupo seleccionado entre:


,

,

,

,

,

,

;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo

seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: ciano, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, $-(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo

de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan -$(CH_2)_r$-T-$(CH_2)_s$-;

T representa -C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))$_t$-U-R^{3a}]-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, -S(=O)-, -$S(=O)_2$-, -S(=O)-N(R^{3b})-, -N(R^{3c})-S(=O)-, -C(=O)-, -N(R^{3b})-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -O-C(=S)-, -C(=O)-N(R^{3b})-, -N(R^{3c})-C(=O)-, -N(R^{3c})-C(=O)-N(R^{3b})-, -O-C(=O)-N(R^{3b})-, -N(R^{3c})-C(=O)-O-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está

opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y

10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, halo-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo,

halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c},

-C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-$S(=O)_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-$S(=O)_2$-R^{5b}, -$S(=O)_2$-N(R^{5a})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b} o -N=S(=O)(R^{5c})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

o

N(R^{5a})R^{5b} juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-

alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;

s representa el entero 1, 2 o 3; y


t representa el entero 0 o 1;


o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.


En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:


Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;


A representa un grupo seleccionado entre:





,


,


,


,


,


,


;

donde * indica el punto de unión de dicho grupo al

resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros,

heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan -$(CH_2)_r$-T-$(CH_2)_s$-;

T representa un grupo seleccionado entre: U, -$C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t$-U-$R^{3a}]$-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, -S(=O)-, -$S(=O)_2$-, -S(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-S(=O)-, -C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -O-C(=S)-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -O-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-O-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está

opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-S(=O)$_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-S(=O)$_2$-R^{5b} o -S(=O)$_2$-N(R^{5a})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-

alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{5a})R^{5b}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;

s representa el entero 1, 2 o 3; y


t representa el entero 0 o 1;


o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;

A representa un grupo seleccionado entre:



,


;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi,

C_1-C_3-alquil-C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi-;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r$-T-$(CH_2)_s$-;

T representa un grupo seleccionado entre: U, -$C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t$-U-$R^{3a}]$-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, -S(=O)-, -$S(=O)_2$-, -S(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-S(=O)-, -C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -O-C(=S)-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -O-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-O-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos

R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-$S(=O)_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-$S(=O)_2$-R^{5b} o -$S(=O)_2$-N(R^{5a})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-

alquilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{5a})R^{5b}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;

s representa el entero 1, 2 o 3; y


t representa el entero 0 o 1;


o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;

A representa un grupo seleccionado entre:



,


;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_3-alquil-C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi-;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo,

heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, halo-C_1-C_3-alquilo, $-(CH_2)_q-U-(CH_2)_p-R^{3a}$; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r-T-(CH_2)_s-$;

T representa un grupo seleccionado entre: U, $-C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t-U-R^{3a}]-$;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -C(=O)-, $-N(R^{3b})-$, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, $-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-O-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-O-$;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, ciano, nitro, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-$S(=O)_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-$S(=O)_2$-R^{5b} o -$S(=O)_2$-N(R^{5a})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-

alquilo;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{5a})R^{5b}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa 0;

q representa 0;

r representa 1 o 2;


s representa 1 o 2; y


t representa 0;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

A representa un grupo seleccionado entre:



,


;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

Q-V representa $C(R^{1a})$-N, y R^{1a} representa un átomo de hidrógeno;

o

Q-V representa N-$C(R^{1a})$, y R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, C_1-C_3-alquil-C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi-;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros,

arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan -$(CH_2)_r$-T-$(CH_2)_s$-;

T representa -C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))$_t$-U-R^{3a}]-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -C(=O)-, -

$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -O-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-O-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano,

nitro, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-S(=O)$_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-S(=O)$_2$-R^{5b} o -S(=O)$_2$-N(R^{5a})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

N(R^{5a})R^{5b} juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-

alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;


s representa el entero 1, 2 o 3; y


t representa el entero 0 o 1;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

A representa un grupo seleccionado entre:



,


;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

Q-V representa $C(R^{1a})$-N, y R^{1a} representa un átomo de hidrógeno;

o

Q-V representa N-$C(R^{1a})$, y R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, C_1-C_3-alquil-C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi-;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo,

heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r-T-(CH_2)_s-$;

T representa $-C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t-U-R^{3a}]-$;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -C(=O)-, $-N(R^{3b})-$, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, $-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-O-C(=O)-N(R^{3b})-$, $-N(R^{3c})-C(=O)-O-$;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_3-alquilo está

opcionalmente sustituido con 1 grupo R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -$N(R^{5b})$-C(=O)-R^{5c}, -$N(R^{5c})$-C(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, -$N(R^{5a})R^{5b}$, -C(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-$S(=O)_2$-, -$N(R^{5c})$-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, -$N(R^{5c})$-$S(=O)_2$-R^{5b} o -$S(=O)_2$-$N(R^{5a})R^{5b}$;

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa 0;

q representa 0;

r representa 1 o 2;

s representa 1 o 2; y


t representa 0;


o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.


En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;


A representa un grupo seleccionado entre:



,


,


,



donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, -$N(R^{5b})R^{5c}$, -SCF_3, -SF_5;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno;

uno de R^{2a} y R^{2b} representa -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}, donde el otro uno de R^{2a} y R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan -$(CH_2)_r$-T-$(CH_2)_s$-;

T representa un grupo seleccionado entre: U, -$C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t$-U-$R^{3a}]$-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -

C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=O)-N(R^{3b})-, -N(R^{3c})-C(=O)-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros,

arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de

entre 4 y 10 miembros, donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, halo-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-S(=O)$_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-S(=O)$_2$-R^{5b}, -S(=O)$_2$-N(R^{5a})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b} o -N=S(=O)(R^{5c})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un

heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

o

$N(R^{5a})R^{5b}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa 0 o 1;

q representa 0 o 1;

r representa 1 y s representa 2;

o

s representa 1 y r representa 2;

y


t representa el entero 0 o 1;


o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

En otra forma de realización preferida, la invención se relaciona con compuestos de fórmula **I**, *supra*, en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;

A representa un grupo seleccionado entre:



,


;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno;

uno de R^{2a} y R^{2b} representa $-(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}, donde el otro uno de R^{2a} y R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r$-T-$(CH_2)_s$-;

T representa un grupo seleccionado entre: U, -$C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t$-U-$R^{3a}]$-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -C(=O)-, -$N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo,

C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-

alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, halo-C_1-C_3-alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, arilo, heteroarilo o halo-C_1-C_3-alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo, junto con los grupos R^4 unidos opcionalmente al mismo, no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros; donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o

diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, halo-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5c})-C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5a})R^{5b}, -C(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-S(=O)$_2$-, -N(R^{5c})-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-N(R^{5a})R^{5b}, -N(R^{5c})-S(=O)$_2$-R^{5b}, -S(=O)$_2$-N(R^{5a})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b}, -S(=O)=N(R^{5c})R^{5b} o -N=S(=O)(R^{5c})R^{5b};

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

o

N(R^{5a})R^{5b} juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa 0 o 1;

q representa 0 o 1;

r representa 1 y s representa 2;

o

s representa 1 y r representa 2;

y

t representa el entero 0 o 1;


o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

Debe comprenderse que la presente invención se relaciona con cualquier subcombinación dentro de cualquier forma de realización o aspecto de la presente invención de los compuestos de fórmula general **I**, *supra*.

Aun más particularmente, la presente invención cubre compuestos de fórmula general **I** que se describen en la sección de Ejemplos de este texto, *infra*.

De acuerdo con otro aspecto, la presente invención cubre métodos para preparar compuestos de la presente invención, donde dichos métodos comprenden los pasos descritos en la Sección Experimental en la presente.

En una forma de realización preferida, la presente invención se relaciona con un método para preparar compuestos de fórmula general **I**, *supra,* en donde un compuesto intermediario de fórmula general **IV**:



IV

en donde Q-V, R^{1b}, y R^{1c} son como se definen para la fórmula general **I**, *supra*, y PG representa un grupo protector o un átomo de hidrógeno;

se hace reaccionar con un compuesto intermediario de fórmula general **II**:




II

en donde A es como se define para la fórmula general **I**, *supra*, y LG representa un grupo saliente.

En otro aspecto, la presente invención se relaciona con

compuestos intermediarios que son útiles para la preparación de los compuestos de fórmula general **I**, *supra*.

En particular, la presente invención se relaciona con compuestos intermediarios de fórmula general **IV**:




IV

en donde Q-V, R^{1b}, y R^{1c} son como se definen para la fórmula general **I**, *supra*, y PG representa un grupo protector o un átomo de hidrógeno.

Síntesis de compuestos de fórmula general I de la presente invención

Los compuestos de fórmula general **I, I'**, **II**, **III y IV,** donde R^{1b}, R^{1c}, Q-V, y A tienen el significado que se les dio en la anterior fórmula general **I**, LG representa a un grupo saliente y PG representa a un grupo protector o a un átomo de hidrógeno, se pueden sintetizar de acuerdo con los procedimientos que se muestran en el Esquema 1.

Esquema 1



El Esquema 1 ejemplifica una ruta que permite realizar variaciones y modificaciones de A, R^{1b} y R^{1c} en diferentes etapas de la síntesis. Sin embargo, también se pueden utilizar otras rutas para sintetizar los compuestos objetivo, de acuerdo con el conocimiento general común de las personas con experiencia en el arte de la síntesis orgánica. Por lo tanto, no es la intención que el orden de las transformaciones que se ejemplifican en el Esquema sea limitante. Además, la interconversión de cualquiera de los sustituyentes de A, R^{1b} y R^{1c} tal como se definen en la presente se puede realizar antes de las transformaciones que se

ejemplifican y/o después de las mismas.

Dichas modificaciones pueden ser tal por ejemplo la introducción de grupos protectores, clivaje de grupos protectores, reducción u oxidación de grupos funcionales, halogenación, metalación, sustitución u otras reacciones conocidas por las personas con experiencia en el arte.

Estas transformaciones incluyen las que dan como resultado la introducción de una funcionalidad que permite una interconversión adicional de los sustituyentes. Los grupos protectores apropiados, su introducción y su escisión son bien conocidos por aquellos versados en la técnica (véase, por ejemplo, T.W. Greene y P.G.M. Wuts en Protective Groups in Organic Synthesis, 3ª edición, Wiley 1999). En los párrafos subsiguientes se describen ejemplos específicos. Adicionalmente, es posible poner en práctica dos o más pasos sucesivos sin un procesamiento intermedio, por ejemplo, en una reacción en un solo recipiente, lo cual ha de resultar evidente para aquellos versados en la técnica.

Los compuestos de las fórmulas **II**, **III**, o **IV** están disponibles comercialmente o pueden sintetizarse de acuerdo con procedimientos conocidos por los especialistas en la materia.

Los compuestos de fórmula II en los cuales LG representa a un grupo saliente, como por ejemplo, un átomo de halógeno tal como, por ejemplo, un átomo de cloro o bromo, pueden estar disponibles comercialmente o se obtienen de los compuestos de fórmula **III** haciendo reaccionar al alcohol con un agente halogenante, como por ejemplo, tricloruro de fósforo o tribromuro de fósforo con un solvente inerte adicional tal como, por ejemplo, tolueno o sin el mismo, a temperaturas dentro del rango entre la temperatura ambiente y el punto de ebullición del solvente, por ejemplo.

Los compuestos de fórmula II en los cuales LG representa a un grupo saliente, como por ejemplo, un alquilsulfonato tal como, por ejemplo, metanosulfonato o trifluorometanosulfonato o 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato o un arilsulfonato, como por ejemplo, bencenosulfonato o 4-metilbencenosulfonato se obtienen de compuestos de fórmula **III** haciendo reaccionar al alcohol con un haluro de alquilsulfonilo apropiado tal como, por ejemplo, cloruro de metanosulfonilo o trifluorocloruro de metanosulfonilo o fluoruro de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutan-1-sulfonilo o haciendo reaccionar al alcohol con un haluro de arilsulfonilo apropiado tal como, por ejemplo, cloruro de bencenosulfonilo o cloruro de 4-

metilbencenosulfonilo en un solvente inerte, como por ejemplo, tetrahidrofurano o tolueno o diclorometano opcionalmente en presencia de una base apropiada, como por ejemplo, trietilamina o piridina o N,N-dimetilpiridin-4-amina a temperaturas dentro del rango entre -40ºC y el punto de ebullición del solvente, por ejemplo.

Los compuestos de fórmula I se pueden sintetizar haciendo reaccionar a los compuestos de fórmula general **II** con un compuesto de fórmula general **IV** con R^{1b}, R^{1c}, V, Q y A, según se los definió anteriormente para dar compuestos de la fórmula general **I**. El grupo amino presente en IV desplaza al LG en los compuestos de fórmula general **II** para formar las aminas de fórmula general **I' o I**.

Los compuestos de fórmula general II se pueden hacer reaccionar con aminas de la fórmula IV en donde PG representa un grupo protector o un átomo de hidrógeno opcionalmente en presencia de un ácido, como por ejemplo, ácido clorhídrico en un solvente inerte, como por ejemplo, etanol o 1,4-dioxano a temperaturas dentro del rango entre la temperatura ambiente y el punto de ebullición del solvente, por ejemplo, para dar compuestos de fórmula general **I' o I**.

Los compuestos de fórmula general **I' o I** también

se pueden construir por reacciones de acoplamiento del tipo de Ullmann en presencia de catalizadores apropiados, tales como, por ejemplo, catalizadores a base de cobre como diacetato de cobre(II) o cloruro de cobre(I) en presencia de una base apropiada, como por ejemplo, carbonato de cesio comenzando a partir de compuestos de fórmula general **IV**. Opcionalmente, se pueden agregar ligandos apropiados como la N,N-dimetilglicina o pirrolidin-2-ilfosfonato de fenilo monoácido. La reacción se puede llevar a cabo a temperaturas dentro del rango entre -40ºC y el punto de ebullición del solvente, por ejemplo. De manera similar, pueden usarse reacciones de aminación catalizada por paladio para formar compuestos de fórmula general **I'** o **I** a partir de compuestos de las fórmulas generales **IV** con **II**; por un informe actualizado sobre dichas aminaciones véase por ejemplo David S. Surry y Stefen L Buchwald, Chem. Sci. **2011**, 2, 27, y la bibliografía citada en el mismo.

Los compuestos de fórmula general **I, I', II**, **III y IV** en los cuales R^{1a}, R^{1b}, R^{1c}, R^{2a} y/o R^{2b} representan un átomo de halógeno tal como, por ejemplo, un átomo de cloro, bromo o yodo, se pueden modificar adicionalmente mediante reacciones de acoplamiento tales como, por ejemplo reacciones de acoplamiento del tipo de Ullmann,

Negishi, Suzuki o Sonogashira.

Dichas reacciones de acoplamiento se llevan a cabo en presencia de catalizadores apropiados, tales como, por ejemplo, catalizadores a base de cobre o paladio, como por ejemplo, diacetato de cobre(II), cloruro de cobre(I), acetato de paladio (II), tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0), cloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II) o (1,1,-bis(difenilfosfino) ferroceno)-dicloropaladio (II) y opcionalmente aditivos apropiados tales como, por ejemplo, fosfinas, como por ejemplo, $P(oTol)_3$ o trifenilfosfina y, opcionalmente con una base apropiada, tal como, por ejemplo, carbonato de potasio, 2-metilpropan-2-olato de sodio, fluoruro de tetrabutilamonio o fosfato tribásico de potasio en un solvente apropiado, tal como, por ejemplo, tetrahidrofurano.

Los ejemplos de dichas reacciones de acoplamiento se pueden ver en el libro de texto cuyo título es “Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions”, Armin de Meijere (Editor), François Diederich (Editor) septiembre 2004, Wiley Interscience ISBN: 978-3-527-30518-6.

Los compuestos de fórmula general **I, I’, II**, **III y IV** en el cual R^{1a}, R^{1b}, R^{1c}, R^{2a} y/o R^{2b} representa a un

átomo de halógeno tal como un átomo de flúor, cloro, bromo o yodo, también se puede modificar adicionalmente por reacciones de sustitución. Dichos átomos de halógeno de R^{1a}, R^{1b}, R^{1c}, R^{2a} y/o R^{2b} se pueden sustituir por nucleófilos como aminas primarias o secundarias, alcóxidos, tiolatos o grupos que portan carbonos aniónicos para agregar aminas secundarias o terciarias, éteres, tioéteres o grupos unidos a carbono. Las reacciones se llevan a cabo en solventes inertes como tetrahidrofurano.

Además, los residuos en los compuestos de fórmulas **I, I', II**, **III y IV** se pueden modificar opcionalmente usando, por ejemplo, reacciones de oxidación, reducción, sustitución o eliminación y condiciones que son bien conocidas por las personas con experiencia en el arte de la síntesis orgánica. Por ejemplo, los tioéteres se pueden oxidar usando reactivos de oxidación como ácido 3-clorobencenocarboperoxoico, oxona o dimetildioxirano en solventes inertes como diclorometano o acetona, respectivamente. Dependiendo de la proporción estequiométrica entre el reactivo oxidante y se obtendrán los compuestos sulfóxidos o sulfonas mencionados anteriormente o mezclas de los mismos.

Además, los compuestos de fórmula **I** de la presente

invención se pueden convertir en cualquiera de las sales descritas aquí, por cualquier método conocido por las personas con experiencia en el arte. De manera similar, cualquier sal de un compuesto de fórmula **I** de la presente invención se puede convertir en el compuesto libre, por cualquier método conocido por las personas con experiencia en el arte.

Los compuestos e intermediarios que se producen de acuerdo con los métodos de la invención pueden requerir purificación. La purificación de compuestos orgánicos es bien conocida por las personas con experiencia en el arte y puede haber varias maneras de purificar el mismo compuesto. En algunos casos, puede no ser necesaria una purificación. En algunos casos, los compuestos se pueden purificar por cristalización. En algunos casos, las impurezas se pueden eliminar por agitación usando un solvente apropiado. En algunos casos, los compuestos se puede purificar mediante cromatografía, en particular cromatografía rápida, usando por ejemplo cartuchos de gel de sílice preempaquetados, *por ejemplo* de Separtis, tales como el gel de sílice Isolute® Flash o el gel de sílice Isolute® Flash NH_2 en combinación con un sistema de cromatografía apropiado, tal como un sistema Isolera (Biotage) y eluyentes tales como, por ejemplo, gradientes de hexano/acetato de etilo o


diclorometano/metanol. En algunos casos, los compuestos se pueden purificar por HPLC preparativa usando, por ejemplo, un purificador automático Waters equipado con un detector de matriz de diodos y/o un espectrómetro de masas con ionización por electrospray en línea en combinación con una columna de fase inversa preempaquetada apropiada y eluyentes tales como, por ejemplo, gradientes de agua y acetonitrilo que pueden contener aditivos tales como ácido trifluoroacético, ácido fórmico o amoníaco acuoso.

EJEMPLOS

Los ejemplos e intermediarios se nombraron usando el programa de computación ACD de ACD/LABS (Name Batch versión 12.01.)

Ejemplo 1

N-(7H-Pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina




Una mezcla de 57,2 mg (373 µmol) de 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (Nro. CAS 3680-69-1), 100 mg de 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (Nro. CAS 942185-01-5), 23,3 µL de ácido clorhídrico (4M) y 1,5 mL de

etanol se calentó bajo reflujo durante 6 horas. El solvente se eliminó para dar 95,0 mg (100%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 6,95 (1H), 7,46 (1H), 8,23 (1H), 8,30 (1H), 8,48 (1H), 8,68 (1H), 11,39 (1H), 12,74 (1H), 13,86 (1H) ppm.

Ejemplo 2

N-(7H-Pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina




Una mezcla de 114,5 mg (745 µmol) de 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (Nro. CAS 3680-69-1), 100 mg de 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina (Nro. CAS 1049672-75-4), 93 µL de ácido clorhídrico (4M) y 5 mL de etanol se calentó a 120°C bajo irradiación de microondas durante 2 horas. El solvente se eliminó y el residuo se purificó mediante cromatografía para dar 11,0 mg (6%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 7,01 (1H), 7,20 (1H), 8,20 (1H), 8,34 (1H), 8,81-8,84 (2H), 9,86 (1H), 11,72 (1H), 13,43 (1H) ppm.

Ejemplo 3

N-(5-Metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina




Se transformaron 124,9 mg (745 µmol) de 4-cloro-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (Nro. CAS 1618-36-6) de manera análoga al ejemplo 1 para dar 198 mg (100%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,52 (3H), 7,28 (1H), 8,17 (1H), 8,24 (1H), 8,42 (1H), 8,63 (1H), 9,75 (1H), 12,47 (1H), 13,87 (1H) ppm.

Ejemplo 4

N-(5-Metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina




Se transformaron 124,9 mg (745 µmol) de 4-cloro-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (Nro. CAS 1618-36-6) de manera análoga al ejemplo 2 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 26,0 mg (13%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,53 (3H), 7,04 (1H), 8,12 (1H),

8,21 (1H), 8,33 (1H), 8,77 (1H), 8,81 (1H), 11,54 (1H), 13,45 (1H) ppm.

Ejemplo 5

N-(5-Etil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina




Se transformaron 47 mg (259 µmol) de 4-cloro-5-etil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (Nro. CAS 1004992-44-2) de manera análoga al ejemplo 1 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 45 mg (62%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,28 (3H), 2,99 (2H), 7,27 (1H), 8,18 (1H), 8,24 (1H), 8,41 (1H), 8,62 (1H), 9,62 (1H), 12,51 (1H), 13,83 (1H) ppm.

Ejemplo 6

N-(5-Etil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina




Una mezcla de 43 mg (237 µmol) de 4-cloro-5-etil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (Nro. CAS 1004992-44-2), 34,9

mg de 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina (Nro. CAS 1049672-75-4), 17 µL de ácido clorhídrico (4M en dioxano) y 1,0 mL de etanol se calentó en un tubo sellado a 120°C durante 16 horas. El solvente se eliminó y el residuo se purificó mediante cromatografía para dar 5,0 mg (8%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,32 (3H), 2,96 (2H), 7,05 (1H), 8,01 (1H), 8,22 (1H), 8,35 (1H), 8,80 (1H), 8,82 (1H), 11,62 (1H), 13,48 (1H) ppm.

Ejemplo 7

N-(6-Etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina




Una mezcla de 50 mg (256 µmol) de 4-cloro-6-etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 7a), 34,3 mg de 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (Nro. CAS 942185-01-5), 15,9 µL de ácido clorhídrico (4M en dioxano) y 0,8 mL de etanol se sometió a radiación de microondas a 150°C durante 5 horas. Se agregó metanol, el precipitado se retiró por filtración, se lavó con metanol y éter dietílico y se secó para dar 56,5 mg (72%) del

compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,20 (3H), 2,45 (3H), 2,71 (2H), 8,12 (1H), 8,22 (1H), 8,40 (1H), 8,62 (1H), 9,53 (1H), 12,39 (1H), 13,83 (1H) ppm.

Ejemplo 7a


4-Cloro-6-etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina



Una mezcla de 1,18 g (6,64 mmol) de 6-etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ol (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 7b) y 37,1 mL de oxicloruro de fósforo se calentó a 100°C durante 1 hora. El reactivo se retiró y el residuo se purificó mediante cromatografía. El producto se purificó adicionalmente por digestión con éter dietílico para dar 855 mg (66%) del compuesto del título.

Ejemplo 7b

6-Etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ol




Una mezcla de 735 mg (3,78 mmol) de 6-[2-(pentan-3-iliden)hidrazino]pirimidin-4-ol (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 7c) y 20 mL de 2-[2-(2-

tert-butoxietoxi)etoxi]-2-metilpropano se calentó a 250°C durante 2,5 horas. El sólido se retiró por filtración y se lavó con éter dietílico para dar 477 mg (68%) del compuesto del título.

Ejemplo 7c


6-[2-(Pentan-3-iliden)hidrazino]pirimidin-4-ol



Una mezcla de 5,0 g (39,6 mmol) de 6-hidrazinopirimidin-4-ol/6-hidrazinopirimidin-4(1H)-ona (CAS-No: 29939-37-5), 5,12 g de pentan-3-ona y 80,8 mL de etanol se calentó bajo reflujo durante 2 horas. Luego de enfriar a 3°C, el sólido precipitado se retiró por filtración y se lavó con éter dietílico para dar 5,82 g (72%) del compuesto del título.

Ejemplo 8

N-(6-Etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina




Se transformaron 50 mg (256 µmol) (256 µmol) de 4-

cloro-6-etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 7a) de manera análoga al ejemplo 7 usando 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina (Nro. CAS 1049672-75-4) para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 15,4 mg (20%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,19 (3H), 2,45 (3H), 2,66 (2H), 8,07 (1H), 8,20 (1H), 8,28 (1H), 8,75 (1H), 8,80 (1H), 11,51 (1H), 13,42 (1H) ppm.

Ejemplo 9

4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo




Se transformaron 168 mg (745 µmol) de 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (Nro. CAS 187725-00-4) de manera análoga al ejemplo 1 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 204 mg (85%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,34 (3H), 4,33 (2H), 7,58 (1H), 8,14 (1H), 8,36 (1H), 8,77 (2H), 9,86 (1H), 12,62 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 10

4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo




Se transformaron 168 mg (745 µmol) de 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (Nro. CAS 187725-00-4) de manera análoga al ejemplo 2 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 220 mg (91%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,35 (3H), 4,36 (2H), 8,11 (1H), 8,31 (1H), 8,37 (1H), 8,62 (1H), 8,99 (1H), 12,31 (1H), 13,47 (1H), 13,84 (1H) ppm.

Ejemplo 11

ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico




Una mezcla de 1,00 g (3,09 mmol) de 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo 10), 30 mL de dioxano, 10 mL de etanol y 37,1

mL de solución de hidróxido de litio (1M en agua) se agitó a 23°C durante la noche. La mezcla se acidificó con ácido clorhídrico, el precipitado se retiró por filtración, se lavó con agua y se secó para dar 820 mg (90%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 8,23 (1H), 8,36 (2H), 8,64 (1H), 9,01 (1H), 12,92 (1H), 13,42 (1H), 13,92 (1H) ppm.

Ejemplo 12

5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo




Se transformaron 52 mg (171 µmol) de 5-bromo-4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 12a) de manera análoga al ejemplo 6 usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (Nro. CAS 942185-01-5) para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 17,0 mg (25%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,35 (3H), 4,35 (2H), 8,15 (1H), 8,31 (1H), 8,55 (1H), 8,68 (1H), 8,73 (1H), 12,99 (1H), 13,63 (1H) ppm.

Ejemplo 12a


5-bromo-4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo



Una mezcla de 1,01 g (4,45 mmol) de 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (Nro. CAS 187725-00-4), 10 mL de N,N-dimetilformamida y 832 mg de N-bromosuccinimida se agitó a 23°C durante 16 horas. La mezcla se volcó sobre hielo-agua fría, el precipitado se retiró por filtración y se secó para dar 1,17 g (86%) del compuesto del título.

Ejemplo 13

5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo




Se transformaron 49 mg (161 µmol) de 5-bromo-4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 12a) de manera análoga al ejemplo 6 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 31,0 mg (65%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,35 (3H), 4,36 (2H), 8,28 (1H),

8,55 (1H), 8,86 (1H), 8,90 (1H), 9,08 (1H), 13,14 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 14

ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico




Se transformaron 26 mg (65 µmol) de 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo 13) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 9,0 mg (37%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 8,28 (1H), 8,53 (1H), 8,86 (1H), 8,87 (1H), 9,15 (1H), 13,03 (1H), 13,57 (1H) ppm.

Ejemplo 15

N-[5-(Trifluorometil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina




Se transformaron 50 mg (226 µmol) de 4-cloro-5-(trifluorometil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 15a) de manera análoga al ejemplo 2 usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (Nro. CAS 942185-01-5) para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 55 mg (76%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 7,38 (1H), 8,16 (1H), 8,39 (1H), 8,69 (1H), 8,74 (1H), 10,12 (1H), 13,20 (1H), 13,63 (1H) ppm.

Ejemplo 15a

4-Cloro-5-(trifluorometil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina




A una mezcla de 940 mg (6,12 mmol) de 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (Nro. CAS 3680-69-1), 2,87 g de trifluorometilsulfinato de sodio, 26 mL de diclorometano y 10 mL de agua se agregaron lentamente a 0°C 4,37 mL de hidroperóxido de tert-butilo. La mezcla se agitó a 23°C durante 3 días, se agregó diclorometano y solución saturada de bicarbonato de sodio, la fase acuosa se extrajo con diclorometano y las fases orgánicas combinadas se secaron sobre sulfato de sodio. Luego de la filtración y la eliminación del solvente,

el residuo se purificó mediante cromatografía para dar 247 mg (18%) del compuesto del título.

Ejemplo 16

N-[5-(Trifluorometil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina




Se transformaron 50 mg (226 µmol) de 4-cloro-5-(trifluorometil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 15a) de manera análoga al ejemplo 2 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 55,0 mg (69%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 7,96 (1H), 8,34 (1H), 8,37 (1H), 8,65 (1H), 8,99 (1H), 12,24 (1H), 13,77 (1H), 13,90 (1H) ppm.

Ejemplo 17

[4-(1H-Pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il]metanol




Se transformaron 50 mg (272 µmol) de (4-cloro-7H-

pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)metanol (adquirido de FCH Group Company, Ucrania) de manera análoga al ejemplo 2 usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (Nro. CAS 942185-01-5) para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 24,0 mg (28%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 4,78 (2H), 6,42 (1H), 7,18 (1H), 8,12 (1H), 8,29 (1H), 8,58 (1H), 8,83 (1H), 10,09 (1H), 11,63 (1H), 13,52 (1H) ppm.

Ejemplo 18

N,N-Dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Una mezcla de 50 mg (169 µmol) de ácido 4-(1H-Pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 11), 2 mL de sulfóxido de dimetilo, 88 µL de N-etil-N-isopropilpropan-2-amina, 51 µL de N-metilmetanamina y 302 µL de solución de 2,4,6-trióxido de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinano (50% en acetato de etilo) se agitó a 23°C durante la noche. Los solventes se eliminaron y el residuo se purificó

mediante cromatografía para dar 11 mg (20%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,34 (6H), 7,56 (1H), 8,23 (1H), 8,41 (1H), 8,82-8,89 (2H), 10,18 (1H), 12,16 (1H), 13,47 (1H) ppm.

Ejemplo 19

[4-(1H-Pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](pirrolidin-1-il)metanona




Se transformaron 50 mg (169 µmol) de ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 11) de manera análoga al ejemplo 18 usando pirrolidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,2 mg (7%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,89 (2H), 2,00 (2H), 3,54 (2H), 3,81 (2H), 7,72 (1H), 8,22 (1H), 8,42 (1H), 8,85 (1H), 8,87 (1H), 10,20 (1H), 12,12 (1H), 13,48 (1H) ppm.

Ejemplo 20

Piperidin-1-il[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]metanona




Se transformaron 50 mg (169 µmol) de ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 11) de manera análoga al ejemplo 18 usando piperidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 6,4 mg (10%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,55-1,64 (4H), 1,68 (2H), 3,68 (4H), 7,39 (1H), 8,22 (1H), 8,40 (1H), 8,83-8,86 (2H), 10,16 (1H), 12,15 (1H), 13,47 (1H) ppm.

Ejemplo 21

Morfolin-4-il[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]metanona




Se transformaron 50 mg (169 µmol) de ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el

ejemplo 11) de manera análoga al ejemplo 18 usando morfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 11,0 mg (18%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,62-3,80 (8H), 7,46 (1H), 8,22 (1H), 8,42 (1H), 8,85 (2H), 10,15 (1H), 12,23 (1H), 13,46 (1H) ppm.

Ejemplo 22

N-[2-(Dimetilamino)etil]-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 50 mg (169 µmol) de ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 11) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 10,0 mg (16%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,19 (6H), 2,41 (2H), 3,37 (2H), 7,49 (1H), 8,07 (1H), 8,22 (1H), 8,40 (1H), 8,73 (1H), 8,85 (1H), 10,13 (1H), 12,16 (1H), 13,48 (1H) ppm.

Ejemplo 23


(RS)-N-(Propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida



Se transformaron 100 mg (323 µmol) de (RS)-4-cloro-N-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 23a) de manera análoga al ejemplo 6 usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (Nro. CAS 942185-01-5) para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 23,5 mg (17%) del compuesto del título. ^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,00-1,11 (6H), 1,79 (1H), 2,05 (1H), 2,59 (1H), 2,90 (2H), 3,08 (1H), 3,26 (1H), 3,41 (1H), 3,85 (1H), 7,81 (1H), 8,11 (1H), 8,27 (1H), 8,33 (1H), 8,58 (1H), 13,58 (1H) ppm.

Ejemplo 23a

(RS)-4-Cloro-N-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 13,2 g (49,0 mmol) de ácido (RS)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-

7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 23b) de manera análoga al ejemplo 18 usando propan-2-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 11,4 g (71%) del compuesto del título.

Ejemplo 23b


ácido (RS)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico



Se transformaron 20,0 g (37,4 mmol) de (RS)- 4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 23c) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 17,2 g (95%) del compuesto del título.

Ejemplo 23c

(RS)- 4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo




Una mezcla de 195 g (700,6 mmol) de (RS)- 4-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-

carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con WO2005/10008), 1,92 L de tolueno, 195 mL de N-etil-N-isopropilpropan-2-amina y 78,4 mL de oxicloruro de fósforo se calentó a 80°C durante la noche. La mezcla se volcó sobre solución de carbonato ácido de sodio y se extrajo con acetato de etilo. La fase orgánica se lavó con salmuera y se secó sobre sulfato de sodio. Luego de la filtración y la eliminación del solvente el residuo se cristalizó a partir de éter diisopropílico para dar 120 g (58%) del compuesto del título.

Ejemplo 24

(RS)-N-(Propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (323 µmol) de (RS)-4-cloro-N-isopropil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 23a) de manera análoga al ejemplo 6 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 33,3 mg (24%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,01-1,10 (6H), 1,80 (1H), 2,07

(1H), 2,58 (1H), 2,90 (2H), 3,05-3,45 (2H), 3,84 (1H), 7,84 (1H), 8,21 (1H), 8,36 (1H), 8,50 (1H), 8,63 (1H), 8,82 (1H), 13,54 (1H) ppm.

Ejemplo 25

(RS)-(4-Metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 70 mg (200 µmol) de (RS)-(4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il)(4-metilpiperazin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 25a) de manera análoga al ejemplo 7 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 38,0 mg (38%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,81 (1H), 2,04 (1H), 2,21 (3H), 2,30 (2H), 2,37 (2H), 2,84-3,06 (2H), 3,13-3,29 (3H), 3,50 (2H), 3,57 (2H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,36 (2H), 8,60 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 25a


(RS)-(4-Cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il)(4-metilpiperazin-1-il)metanona



Se transformaron 500 mg (1,861 mmol) de ácido (RS)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 23b) de manera análoga al ejemplo 18 usando 1-metilpiperazina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 204 mg (28%) del compuesto del título.

Ejemplo 26

(RS)-(4-Metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 70 mg (200 µmol) de (RS)-(4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il)(4-metilpiperazin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 25a) de manera análoga al ejemplo 7 usando 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 14,6 mg (16%) del compuesto

del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,81 (1H), 2,10 (1H), 2,19 (3H), 2,25-2,38 (4H), 2,86-3,04 (2H), 3,16 (1H), 3,27 (2H), 3,50 (2H), 3,56 (2H), 8,24 (1H), 8,33 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,84 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 27

(RS)-N,N-Dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 60 mg (203 µmol) de (RS)-4-cloro-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 27a) de manera análoga al ejemplo 6 usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 10,6 mg (13%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,76 (1H), 2,05 (1H), 2,85 (3H), 2,87-2,98 (2H), 3,07 (3H), 3,10-3,23 (2H), 3,31 (1H), 8,11 (1H), 8,27 (1H), 8,34 (2H), 8,58 (1H), 13,58 (1H) ppm.

Ejemplo 27a

(RS)-4-Cloro-N,N-dimetil-5,6,7,8-


tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida



Se transformaron 500 mg (1,861 mmol) de ácido (RS)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 23b) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilmetanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 350 mg (64%) del compuesto del título.

Ejemplo 28

(RS)-N,N-Dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 60 mg (203 µmol) de (RS)-4-cloro-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 27a) de manera análoga al ejemplo 6 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 24,7 mg (29%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,76 (1H), 2,10 (1H), 2,85 (3H), 2,86-2,97 (2H), 3,07 (3H), 3,11 (1H), 3,24 (2H), 8,21 (1H), 8,32 (1H), 8,51 (1H), 8,66 (1H), 8,81 (1H), 13,53 (1H) ppm.

Ejemplo 29

(RS)-N-(Propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida




Se transformaron 60 mg (205 µmol) de (RS)-4-cloro-N-isopropil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 29a) de manera análoga al ejemplo 6 usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 58,7 mg (70%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,04 (6H), 1,77 (1H), 1,95 (1H), 2,51 (1H), 2,68 (1H), 2,94 (1H), 3,09 (1H), 3,36 (1H), 3,84 (1H), 7,75 (1H), 8,03 (1H), 8,06 (1H), 8,20 (1H), 8,33 (1H), 8,60 (1H), 11,42 (1H), 13,50 (1H) ppm.

Ejemplo 29a

(RS)-4-Cloro-N-isopropil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-


pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida



Se transformaron 550 mg (2,19 mmol) de ácido (RS)-4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 29b) de manera análoga al ejemplo 18 usando propan-2-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 526,7 mg (82%) del compuesto del título.

Ejemplo 29b


ácido (RS)-4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxílico



Se transformaron 4,56 g (16,3 mmol) de (RS)- 4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 29c) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 3,57 g (83%) del compuesto del título.

Ejemplo 29c


(RS)- 4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxilato de etilo



Una mezcla de 412 mg (1,58 mmol) de (RS)- 4-hidroxi-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 29d) y 8,82 mL de oxicloruro de fósforo se calentó a 100°C durante 1 hora. El reactivo se retiró y el residuo se purificó mediante cromatografía para dar 321,6 mg (73%) del compuesto del título.

Ejemplo 29d

(RS)- 4-hidroxi-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxilato de etilo




Una mezcla de 3,17 g (11,37 mmol) de 4-[(6-hidroxipirimidin-4-il)hidrazono]ciclohexancarboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo

intermediario 29e) y 20 mL xilol se calentó a 250°C bajo irradiación de microondas durante 5 horas. El sólido se retiró por filtración y se lavó con éter dietílico para dar 2,83 g (95%) del compuesto del título.

Ejemplo 29e


4-[(6-hidroxipirimidin-4-il)hidrazono]ciclohexancarboxilato de etilo



Una mezcla de 4,29 g (34,0 mmol) de 6-hidrazinopirimidin-4-ol/6-hidrazinopirimidin-4(1H)-ona (CAS-No: 29939-37-5), 8,69 g de 4-oxociclohexancarboxilato de etilo y 69 mL de etanol se calentó bajo reflujo durante 1,5h. Luego de enfriar a 3°C, el sólido precipitado se retiró por filtración y se lavó con éter dietílico para dar 6,83 g (72%) del compuesto del título.

Ejemplo 30

(RS)-N,N-Dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida




Se transformaron 80 mg (287 µmol) de (RS)-4-cloro-N,N-dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 27a) de manera análoga al ejemplo 7 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 73,3 mg (64%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,79 (1H), 1,99 (1H), 2,74-2,95 (3H), 2,85 (3H), 3,01-3,19 (2H), 3,09 (3H), 8,15 (1H), 8,23 (1H), 8,36 (1H), 8,59 (1H), 9,75 (1H), 12,56 (1H), 13,84 (1H) ppm.

Ejemplo 31

(RS)-N,N-Dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida




Se transformaron 80 mg (287 µmol) de (RS)-4-cloro-N,N-dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo

intermediario 27a) de manera análoga al ejemplo 7 usando 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 9,4 mg (8%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,77 (1H), 1,98 (1H), 2,67-2,84 (2H), 2,89 (3H), 2,95-3,14 (3H), 3,10 (3H), 7,95 (1H), 8,19 (1H), 8,28 (1H), 8,72 (1H), 8,78 (1H), 11,54 (1H), 13,42 (1H) ppm.

Ejemplo 32

(RS)-(4-Metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-il]metanona




Se transformaron 60 mg (180 µmol) de (RS)-(4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-il)(4-metilpiperazin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 32a) de manera análoga al ejemplo 7 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 10,4 mg (13%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,81 (1H), 1,95 (1H), 2,25 (3H), 2,29-2,46 (3H), 2,67-2,85 (2H), 2,92-3,13 (3H), 3,33-3,38 (1H), 3,39-3,69 (4H), 8,07 (1H), 8,09 (1H), 8,20

(1H), 8,39 (1H), 8,64 (1H), 11,44 (1H), 13,50 (1H) ppm.

Ejemplo 32a


(RS)-(4-Cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-il)(4-metilpiperazin-1-il)metanona



Se transformaron 500 mg (1,99 mmol) de ácido (RS)-4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 29b) de manera análoga al ejemplo 18 usando 1-metilpiperazina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 411 mg (62%) del compuesto del título.

Ejemplo 33

(RS)-(4-Metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-il]metanona




Se transformaron 60 mg (180 µmol) de (RS)-(4-cloro-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-il)(4-metilpiperazin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con

el ejemplo intermediario 32a) de manera análoga al ejemplo 7 usando 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,0 mg (5%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,78 (1H), 1,96 (1H), 2,20 (3H), 2,24-2,39 (4H), 2,65-2,86 (2H), 2,99-3,17 (3H), 3,46-3,63 (4H), 7,98 (1H), 8,20 (1H), 8,28 (1H), 8,70 (1H), 8,79 (1H), 11,56 (1H), 13,45 (1H) ppm.

Ejemplo 34

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(morfolin-4-il)metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando morfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 43,5 mg (35%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,86 (1H), 2,12 (1H), 2,86-3,05 (2H), 3,12-3,29 (3H), 3,45-3,66 (8H), 4,02 (3H), 8,01 (1H), 8,09 (1H), 8,41 (1H), 8,82 (1H), 13,37 (1H) ppm.

Ejemplo 34a


ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico



Se transformaron 2,60 g (6,13 mmol) de (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34b) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 2,36 g (97%) del compuesto del título.

Ejemplo 34b

(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo




Una mezcla de 2,38 g (8,01 mmol) de (7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34c), 1,32 g de 6-metoxi-1H-

pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 34f) y 25 mL de etanol se calentó a reflujo durante la noche. Se agregaron 1,2 mL trietilamina y el precipitado se purificó por recristalización desde etanol para dar 2,60 g (76%) del compuesto del título.

Ejemplo 34c

(7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo




Una mezcla de 27,6 g (64,6 mmol) (4S,5R)-3-{[(7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]carbonil}-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 34d), 830 mL de etanol y 24,4 mL de tetraetanolato de titanio (4+) se sometió a reflujo durante 20 horas. Se agregó 1,4 L de acetato de etilo y 18 mL de agua y la mezcla se agitó durante 30 minutos. Se agregó gel de sílice y la agitación se continuó durante 10 minutos. La mezcla se filtró a través de celite, los solventes se eliminaron y el residuo se purificó mediante cromatografía para dar 18,8 g (93%) del compuesto del

título.

Ejemplo 34d

(4S,5R)-3-{[(7S)-4-Cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]carbonil}-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona (A) y (4S,5R)-3-{[(7R)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]carbonil}-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona (B)




A una solución de 26,8 g (4S,5R)-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona en 428 mL de tetrahidrofurano se agregaron 70 mL de n-butillitio (2,5 M en hexano) a –78°C y la mezcla se agitó a -60°C durante 1 hora. Se agregó una solución de 45,8 g (159 mmol) de cloruro de 4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7(RS)-carbonilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34e) en 428 mL de tetrahidrofurano y se continuó la agitación a -70°C durante 1 hora. La mezcla se volcó sobre agua, se retiró el tetrahidrofurano, el precipitado se retiró por filtración, se lavó con agua y se redisolvió en diclorometano. La fase orgánica se secó sobre sulfato

de sodio y lugo se agregó acetonitrilo. El diclorometano se retiró, el precipitado se filtró, se lavó con acetonitrilo y éter dietílico para dar 27,6 g (38%) del compuesto del título A. Del licor madre se obtuvo un segundo precipitado al dejarse en reposo durante la noche para dar 25,5 g (35%) del compuesto del título B.

Ejemplo 34e


cloruro de 4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7(RS)-carbonilo



Una mezcla de 42,87 g (159 mmol) de ácido 4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 23b) y 349 mL de cloruro de tionilo se calentó a 100°C durante 3 horas. El reactivo se retiró para dar el compuesto del título que se usó sin purificación adicional.

Ejemplo 34f

6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina




Una mezcla de 4,00 g (20,6 mmol) de 6-metoxi-5-nitro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina (preparada de acuerdo con el

ejemplo intermediario 34g), 120 mL de etanol, 120 mL de tetrahidrofurano y 1,10 g de paladio sobre carbón (10%) se agitó a 23°C bajo una atmósfera de hidrógeno durante la noche. El catalizador y los solventes se eliminaron para dar 3,26 g (96%) del compuesto del título.

Ejemplo 34g


6-Metoxi-5-nitro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina



A 0°C se agregaron 2,2 mL de ácido nítrico fumante cuidadosamente a 6,8 mL de anhídrido acético. Se agregó 1,00 g (mmol) de 6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridina (Nro. CAS 1260664-24-1) en porciones, la mezcla se agitó a 10°C durante 22 horas y se volcó sobre hielo. Se agregó hidrocarbonato de sodio cuidadosamente hasta alcanzar un pH entre 2 y 3 y la mezcla se extrajo con diclorometano. La fase orgánica se lavó con salmuera y se secó sobre sulfato de sodio. Luego de la filtración y la eliminación del solvente, el residuo se purificó mediante cristalización para dar 640 mg (39%) del compuesto del título.

Ejemplo 35

Azetidin-1-il{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando azetidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 44,8 mg (39%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (1H), 2,11 (1H), 2,17-2,27 (2H), 2,76 (1H), 2,90 (2H), 3,13 (1H), 3,24 (1H), 3,88 (2H), 4,02 (3H), 4,24 (2H), 8,01 (1H), 8,09 (1H), 8,41 (1H), 8,83 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 36

[(2R,6S)-2,6-Dimetilmorfolin-4-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico

(preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (2R,6S)-2,6-dimetilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 27,6 mg (21%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,07-1,15 (6H), 1,85 (1H), 2,09 (1H), 2,27 (1H), 2,77 (1H), 2,87-3,06 (2H), 3,23 (3H), 3,44 (1H), 3,52 (1H), 3,99 (1H), 4,01 (3H), 4,31 (1H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,40 (1H), 8,81 (1H), 13,36 (1H) ppm.

Ejemplo 37

(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(propan-2-il)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilpropan-2-amina para dar, después de someterse a tratamiento

posterior y purificación, 57,8 mg (48%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,05+1,18 (6H), 1,84 (1H), 2,10 (1H), 2,71+2,91 (3H), 2,85-3,06 (2H), 3,07-3,25 (3H), 4,02 (3H), 4,29+4,72 (1H), 8,02 (1H), 8,08 (1H), 8,40-8,42 (1H), 8,82+8,86 (1H), 13,33 (1H) ppm.

Ejemplo 38

(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilpropan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 66,0 mg (55%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,83+0,87 (3H), 1,49+1,57 (2H), 1,84 (1H), 2,10 (1H), 2,85+3,08 (3H), 2,88-3,03 (2H),

3,12-3,43 (5H), 4,02 (3H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,41 (1H), 8,82+8,86 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 39

(7S)-N-Etil-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metiletanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 51,3 mg (44%) del compuesto del título. ^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,03+1,15 (3H), 1,84 (1H), 2,10 (1H), 2,85+3,07 (3H), 2,86-3,02 (2H), 3,10-3,52 (5H), 4,02 (3H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,41 (1H), 8,83+8,85 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 40

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-

d]pirimidin-7-il}[(1S,4S)-2-oxa-5-azabiciclo[2.2.1]hept-5-il]metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (1S,4S)-2-oxa-5-azabiciclo[2.2.1]heptano para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 53,7 mg (42%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,75-1,92 (3H), 2,12 (1H), 2,80-3,03 (3H), 3,08-3,25 (3H), 3,53+3,65 (1H), 3,58+3,72 (1H), 3,76 (1H), 4,01 (3H), 4,61+4,66 (1H), 4,77+4,87 (1H), 8,01 (1H), 8,07 (1H), 8,40+8,41 (1H), 8,80+8,85 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 41

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(1R,4R)-2-oxa-5-azabiciclo[2.2.1]hept-5-il]metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (1R,4R)-2-oxa-5-azabiciclo[2.2.1]heptano para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 38,1 mg (30%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,75-1,96 (3H), 2,16 (1H), 2,77-3,25 (5H), 3,51+3,65 (1H), 3,60+3,73 (1H), 3,74 (2H), 4,01 (3H), 4,61+4,67 (1H), 4,78+4,86 (1H), 8,01 (1H), 8,09 (1H), 8,42 (1H), 8,86+8,88 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 42

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(4-metilpiperazin-1-il)metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 1-metilpiperazina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 80,2 mg (63%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,85 (1H), 2,10 (1H), 2,19 (3H), 2,25-2,38 (4H), 2,85-3,01 (2H), 3,14-3,25 (3H), 3,50 (2H), 3,58 (2H), 4,02 (3H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,41 (1H), 8,83 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 43

[4-(Dimetilamino)piperidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilpiperidin-4-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 65,0 mg (48%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,21 (1H), 1,35 (1H), 1,73-1,90 (3H), 2,10 (1H), 2,20 (6H), 2,36 (1H), 2,61 (1H), 2,84-3,24 (6H), 4,02 (3H), 4,06 (1H), 4,41 (1H), 8,02 (1H), 8,08 (1H), 8,41 (1H), 8,83 (1H), 13,34 (1H) ppm.

Ejemplo 44

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a

tratamiento posterior y purificación, 51,1 mg (40%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,15+1,31 (3H), 1,90 (1H), 2,09 (1H), 2,85-3,89 (11H), 4,02 (3H), 4,14+4,42 (1H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,41 (1H), 8,82 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 45

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(3S)-3-metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 83,0 mg (65%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,16+1,29 (3H), 1,83 (1H), 2,10 (1H), 2,84-3,90 (11H), 4,02 (3H), 4,13+4,43 (1H), 8,02 (1H), 8,08 (1H), 8,42 (1H), 8,85 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 46

(7S)-N-Etil-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-etilpropan-2-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 18,6 mg (15%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,04-1,23 (9H), 1,84 (1H), 2,07 (1H), 2,85-36 (7H), 4,24+4,55 (1H), 8,24 (1H), 8,33 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,84 (1H), 13,54 (1H) ppm.

Ejemplo 46a


ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico



Se transformaron 1,79 g (4,53 mmol) de (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46b) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 1,53 g (88%) del compuesto del título.

Ejemplo 46b


(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo



Una mezcla de 1,20 g (4,04 mmol) de (7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34c), 515 mg de 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina (Nro. CAS 1049672-75-4) y 36 mL de etanol se calentó a 150°C bajo irradiación de microondas. El precipitado se lavó con etanol y éter dietílico para dar 618 mg (39%) del compuesto del título.

Ejemplo 47

(7S)-N-(2-Hidroxi-2-metilpropil)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-metil-1-(metilamino)propan-2-ol para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 38,9 mg (30%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,05-1,15 (6H), 1,81 (1H), 2,08+2,16 (1H), 2,84-3,01 (2H), 2,95+3,20 (3H), 3,14-3,44 (5H), 4,49+4,56 (1H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,84 (1H), 13,53 (1H) ppm.

Ejemplo 48

(7S)-N-Metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 3,3,3-trifluoro-N-metilpropan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 37,6 mg (28%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (1H), 2,12 (1H), 2,53 (2H), 2,87+3,12 (3H), 2,93 (2H), 3,05-3,72 (5H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,54 (1H), 8,68 (1H), 8,84 (1H), 13,54 (1H) ppm.

Ejemplo 49

(7S)-N-(2-Metoxietil)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 50 mg (136 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-(2-metoxietil)propan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 6,9 mg (9%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,80-0,89 (3H), 1,41-1,62 (2H), 1,85 (1H), 2,09 (1H), 2,85-3,03 (2H), 3,07-3,66 (12H), 4,02 (3H), 8,02 (1H), 8,10 (1H), 8,41 (1H), 8,84 (1H), 13,36 (1H) ppm.

Ejemplo 50

(7S)-4-[(6-Hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-(2-metoxietil)-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Una mezcla de 31,1 mg (63 µmol) de (7S)-N-(2-metoxietil)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 49), 0,7 mL de etanol y 15,7 µL de ácido clorhídrico (4M en dioxano) se calentó bajo radiación

de microondas a 140°C durante dos horas. Se agregaron 100 µL trietilamina y la mezcla se purificó mediante cromatografía para dar 15,1 mg (47%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,80-0,88 (3H), 1,44-1,61 (2H), 1,86 (1H), 2,07 (1H), 2,84-3,04 (2H), 3,07-3,66 (12H), 8,09 (1H), 8,55 (1H), 8,88 (1H), 8,96 (1H), 12,40 (1H), 13,05 (1H) ppm.

Ejemplo 51

(7S)-N-Butil-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 50 mg (148 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilbutan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 17,1 mg (24%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,86-0,95 (3H), 1,27 (2H), 1,40-1,59 (2H), 1,83 (1H), 2,09 (1H), 2,85+3,07 (3H), 2,93

(2H), 3,03-3,45 (5H), 4,02 (3H), 8,02 (1H), 8,10 (1H), 8,41 (1H), 8,81+8,85 (1H), 13,38 (1H) ppm.

Ejemplo 52

(7S)-N-Butil-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 42,5 mg (91 µmol) de (7S)-N-butil-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 51) de manera análoga al ejemplo 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 6,9 mg (16%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,89 (3H), 1,26 (2H), 1,40-1,59 (2H), 1,85 (1H), 2,10 (1H), 2,85+3,07 (3H), 2,86-3,45 (7H), 8,08 (1H), 8,55 (1H), 8,89 (1H), 8,96 (1H), 12,46 (1H), 13,04 (1H) ppm.

Ejemplo 53

(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N,N-dimetil-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 50 mg (169 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilmetanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 32,7 mg (43%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,82 (1H), 2,12 (1H), 2,87 (3H), 2,93 (2H), 3,10 (3H), 3,13-3,28 (3H), 4,01 (3H), 8,02 (1H), 8,10 (1H), 8,41 (1H), 8,83 (1H), 13,38 (1H) ppm.

Ejemplo 54

(7S)-4-[(6-Hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 31 mg (73 µmol) de (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 53) de manera análoga al ejemplo 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 10,1 mg (32%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,82 (1H), 2,12 (1H), 2,87 (3H), 2,90-3,02 (2H), 3,10 (3H), 3,16-3,26 (3H), 8,07 (1H), 8,55 (1H), 8,90 (1H), 8,95 (1H), 12,47 (1H), 13,03 (1H) ppm.

Ejemplo 55

Azetidin-1-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 78 mg (213 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando aziridina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y

purificación, 63,1 mg (69%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,78 (1H), 2,10 (1H), 2,21 (2H), 2,72 (1H), 2,80-2,98 (2H), 3,14-3,28 (2H), 3,88 (2H), 4,24 (2H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,84 (1H), 13,50 (1H) ppm.

Ejemplo 56

(7S)-N,N-Bis(2-metoxietil)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-metoxi-N-(2-metoxietil)etanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 42,6 mg (11%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,81 (1H), 2,07 (1H), 2,92 (2H), 3,11-3,67 (11H), 3,25 (3H), 3,26 (3H), 8,24 (1H), 8,35 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,84 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 57

(7S)-N-(2-Metoxietil)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-metoxi-N-metiletanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 25,3 mg (21%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (1H), 2,11 (1H), 2,87+3,12 (3H), 2,93 (2H), 3,08-3,64 (7H), 3,25+3,27 (3H), 8,24 (1H), 8,35 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,84 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 58


(7S)-N-Etil-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida



Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metiletanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 30,0 mg (25%) del compuesto del título. ^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,03+1,15 (3H), 1,80 (1H), 1,78 (1H), 2,10 (1H), 2,84+3,06 (3H), 2,93 (2H), 3,08 (1H), 3,22-3,49 (3H), 8,24 (1H), 8,35 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,84 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 59

(7S)-N,N-Dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 50 mg (169 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilmetanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 30,0 mg (43%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,78 (1H), 2,08 (1H), 2,87 (3H), 2,93 (2H), 3,09 (3H), 3,13-3,36 (3H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,36 (2H), 8,61 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 59a


ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico



Se transformaron 5,13 g (13,0 mmol) de (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59b) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,93 g (98%) del compuesto del título.

Ejemplo 59b


(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo



Se transformaron 5,00 g (16,8 mmol) de (7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34c) de manera análoga al ejemplo intermediario 34b usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (Nro. CAS 942185-01-5) para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 5,05 g (72%) del compuesto del título.

Ejemplo 60

(7S)-N,N-Dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 89 mg (301 µmol) de (7S)-4-cloro-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 60a) de manera análoga al ejemplo intermediario 46b para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 46,4 mg (37%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,79 (1H), 2,12 (1H), 2,87 (3H), 2,93 (2H), 3,09 (3H), 3,15 (1H), 3,27 (2H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,84 (1H), 13,53 (1H) ppm.

Ejemplo 60a

(7S)-4-Cloro-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 2,64 g (9,82 mmol) de ácido (7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 60b) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilmetanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 2,74 g (94%)

del compuesto del título.

Ejemplo 60b


ácido (7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico



Se transformaron 5,00 g (16,8 mmol) de (7S)-4-cloro-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34c) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,35 g (96%) del compuesto del título.

Ejemplo 61

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](piperidin-1-il)metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 61a) de manera análoga al ejemplo

18 usando piperidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 20,0 mg (16%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,56 (4H), 1,63 (2H), 3,61 (4H), 8,13 (1H), 8,25 (1H), 8,46 (1H), 8,51 (1H), 8,66 (1H), 12,69 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 61a


ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico



Se transformaron 1,71 g (4,26 mmol) de 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo 12) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 1,68 g (99%) del compuesto del título.

Ejemplo 62

5-Bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N,N'-trimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 31,7 mg (12%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,10-2,25 (6H), 3,03 (3H), 3,35-3,63 (4H), 4,12 (3H), 7,97-8,07 (1H), 8,44 (1H), 8,65-8,75 (1H), 9,28 (1H), 13,05-13,56 (1H) ppm.

Ejemplo 62a


ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (A) y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (B)



Se transformaron 1,65 g (3,81 mmol) de una mezcla de 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo y 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62b) de manera análoga al ejemplo 11 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 1,52 g (50%) de una mezcla de los compuestos del título A y B que no se separó.

Ejemplo 62b


5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (A) y 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (B)



Se transformaron 1,94 g (6,36 mmol) de 5-bromo-4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 61c) de manera análoga al ejemplo 6 usando 6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 34f) para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 1,65 g (60%) de una mezcla de los compuestos del título A y B que no se separó.

Ejemplo 63

5-Bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y

ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N,N'-trimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 68,6 mg (28%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,10 (3H), 2,26 (3H), 3,02 (3H), 3,34-3,70 (4H), 8,09 (1H), 8,16 (1H), 8,47 (1H), 9,04 (1H), 9,26-9,40 (1H), 11,78-12,63 (1H), 12,70-13,24 (1H) ppm.

Ejemplo 64

{5-Bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona



Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario


62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilpiperidin-4-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 32,2 mg (12%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,39 (2H), 1,79 (2H), 2,17 (6H), 2,37 (1H), 2,82-3,31 (4H), 4,10 (3H), 8,03 (1H), 8,39 (1H), 8,64 (1H), 9,28 (1H), 13,33 (1H)

ppm.

Ejemplo 65

{5-Bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilpiperidin-4-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 32,2 mg (12%)

del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,39 (2H), 1,79 (2H), 2,18 (6H), 2,39 (1H), 2,83-3,69 (4H), 8,08 (1H), 8,46 (1H), 9,02 (1H), 9,30 (1H), 12,26 (1H), 13,05 (1H) ppm.

Ejemplo 66

{5-Bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 9,6 mg (4%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,28 (3H), 3,19-3,73 (6H), 3,88 (1H), 4,11 (3H), 8,03 (1H), 8,44 (1H), 8,66 (1H), 9,26 (1H), 12,73 (1H), 13,33 (1H) ppm.

Ejemplo 67

{5-Bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}(morfolin-4-il)metanona




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 28,0 mg (12%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,40-3,76 (8H), 4,11 (3H), 8,03 (1H), 8,44 (1H), 8,67 (1H), 9,25 (1H), 12,74 (1H), 13,34 (1H) ppm.

Ejemplo 68

{5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}(morfolin-4-il)metanona




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 59,0 mg (26%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,41-3,72 (8H), 8,08 (1H), 8,47 (1H), 9,03 (1H), 9,32 (1H), 12,41 (1H), 13,04 (1H) ppm.

Ejemplo 69

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-

(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 14) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilpiperidin-4-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 20,9 mg (15%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,40 (2H), 1,80 (2H), 2,19 (6H), 2,26 (1H), 2,40 (1H), 2,85-3,72 (3H), 8,26 (1H), 8,49 (1H), 8,72 (1H), 8,85 (1H), 8,87 (1H), 12,74 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 70

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 14) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 17,1 mg (13%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,29 (3H), 3,42 (2H), 3,64 (2H), 3,87 (1H), 8,28 (1H), 8,50 (1H), 8,78 (1H), 8,88 (2H), 12,98 (1H) ppm.

Ejemplo 71

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](morfolin-4-il)metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 14) de manera análoga al ejemplo 18 usando morfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 27,8 mg (23%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,30-3,75 (8H), 8,26 (1H), 8,50 (1H), 8,74 (1H), 8,85 (1H), 8,87 (1H), 12,85 (1H), 13,56 (1H) ppm.

Ejemplo 72

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](piperidin-1-il)metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 14) de manera análoga al ejemplo 18 usando piperidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 21,0 mg (17%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,56 (4H), 1,63 (2H), 3,37 (2H), 3,61 (2H), 8,29 (1H), 8,50 (1H), 8,75 (1H), 8,89 (1H), 8,93 (1H), 12,96 (1H) ppm.

Ejemplo 73

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el

ejemplo intermediario 61a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 23,1 mg (17%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,28 (3H), 3,21-3,49 (4H), 3,53-3,75 (2H), 3,87 (1H), 8,13 (1H), 8,26 (1H), 8,47 (1H), 8,51 (1H), 8,66 (1H), 12,74 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 74

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](morfolin-4-il)metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 61a) de manera análoga al ejemplo 18 usando morfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 33,2 mg (26%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,24-3,70 (8H), 8,13 (1H), 8,26 (1H), 8,49 (1H), 8,51 (1H), 8,66 (1H), 12,73 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 75

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3S)-3-metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 61a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 21,9 mg (17%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,28 (3H), 3,20-3,48 (4H), 3,55-3,74 (2H), 3,87 (1H), 8,13 (1H), 8,26 (1H), 8,47 (1H), 8,51 (1H), 8,66 (1H), 12,75 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 76

N-[2-(Dimetilamino)-2-oxoetil]-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 100 mg (339 µmol) de ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 11) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilglicinamida para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 5,0 mg (4%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,87 (3H), 3,01 (3H), 3,10 (1H), 4,15 (2H), 7,59 (1H), 8,19 (1H), 8,22 (1H), 8,41 (1H), 8,75 (1H), 8,86 (1H), 10,22 (1H), 13,46 (1H) ppm.

Ejemplo 77

N-[2-(Dimetilamino)etil]-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 100 mg (339 µmol) de ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 11) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N,N'-trimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 29,0 mg (23%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,18 (6H), 2,93-3,39 (2H), 3,30 (3H), 3,62 (2H), 7,53 (1H), 8,22 (1H), 8,41 (1H), 8,84 (2H), 10,14 (1H), 12,15 (1H), 13,47 (1H) ppm.

Ejemplo 78

N-{2-[Bencil(metil)amino]etil}-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 50 mg (169 µmol) de ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 11) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-bencil-N,N'-dimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 5,0 mg (6%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,17 (3H), 2,60 (2H), 3,30 (3H), 3,52 (2H), 3,68 (2H), 7,16-7,34 (5H), 7,60 (1H), 8,23 (1H), 8,41 (1H), 8,85 (2H), 10,19 (1H), 12,17 (1H), 13,49 (1H) ppm.

Ejemplo 79

2-(2-Feniletil)-N-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-il)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-amina




Se transformaron 40 mg (145 µmol) de 7-cloro-2-(2-feniletil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidina (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 79a) de manera análoga al ejemplo intermediario 46b para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 9,4 mg (16%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,18 (2H), 3,49 (2H), 7,17-7,36 (5H), 8,26 (1H), 8,60 (1H), 8,62 (1H), 8,89 (1H), 9,26 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 79a


7-Cloro-2-(2-feniletil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidina



Se transformaron 485 mg (1,89 mmol) de 2-(2-Feniletil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ol (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 79b) de manera análoga al ejemplo intermediario 7a para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 226 mg (43%) del compuesto del título.

Ejemplo 79b


2-(2-Feniletil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ol



Una mezcla de 789 mg (2,66 mmol) de N-(4,6-dicloropirimidin-5-il)-3-fenilpropanamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 79c), 7,5 mL de etanol, 203 mg de tiourea y 35,7 µL de ácido fórmico se calentó a 90°C durante 12 horas. El precipitado formado se lavó con etanol y éter dietílico y se purificó mediante cromatografía para dar 230 mg (34%) del compuesto del título.

Ejemplo 79c

N-(4,6-Dicloropirimidin-5-il)-3-fenilpropanamida




Una mezcla de 1,00 g (6,10 mmol) de 4,6-dicloropirimidin-5-amina (Nro. CAS 5413-85-4), 4 mL de tetrahidrofurano y 1,82 mL de cloruro de 3-fenilpropanoilo se calentó a 70°C durante la noche. Se agregó diclorometano y metanol se eliminaron los solventes y el residuo se purificó mediante cromatografía para dar 794 mg (44%) del compuesto del título.

Ejemplo 80

(7S)-N-(Propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-


ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida



Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando propan-2-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 27,7 mg (24%) del compuesto del título. ^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,07 (6H), 1,83 (1H), 2,11 (1H), 2,61 (1H), 2,93 (2H), 3,15 (1H), 3,25 (1H), 3,87 (1H), 7,84 (1H), 8,24 (1H), 8,39 (1H), 8,53 (1H), 8,66 (1H), 8,85 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 81

(7S)-N-Metil-N-propil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilpropan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 32,4 mg (27%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,83+0,87 (3H), 1,44-1,62 (2H), 1,81 (1H), 2,10 (1H), 2,85+3,07 (3H), 2,86-3,01 (2H), 3,09-3,41 (5H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,83 (1H), 13,56 (1H) ppm.

Ejemplo 82

1-{[(7S)-4-(1H-Pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]carbonil}azetidin-3-carbonitrilo




Se transformaron 70 mg (191 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando azetidin-3-

carbonitrilo para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 70,2 mg (81%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,77 (1H), 2,12 (1H), 2,68-3,02 (3H), 3,12-3,42 (2H), 3,81 (1H), 4,05 (1H), 4,18 (1H), 4,51 (2H), 8,24 (1H), 8,36 (1H), 8,53 (1H), 8,67 (1H), 8,84 (1H), 13,58 (1H) ppm.

Ejemplo 83

2-Oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 75 mg (205 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptano para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,3 mg (4%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,76 (1H), 2,10 (1H), 2,71 (1H), 2,82-2,95 (2H), 3,15-3,29 (2H), 4,05 (2H), 4,41 (2H),

4,68 (4H), 8,24 (1H), 8,36 (1H), 8,53 (1H), 8,67 (1H), 8,84 (1H), 13,53 (1H) ppm.

Ejemplo 84

[(3R)-3-(Dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 95,1 mg (72%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,60-1,84 (2H), 1,99-2,20 (9H), 2,59-2,74 (1H), 2,92-3,05 (3H), 3,17-3,65 (4H), 3,77+3,86 (1H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,53 (1H), 8,69 (1H), 8,84 (1H), 13,49 (1H) ppm.

Ejemplo 85

[(3S)-3-(Dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 103 mg (78%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,58-1,83 (2H), 1,98-2,21 (9H), 2,61+2,72 (1H), 2,89-3,04 (3H), 3,18-3,46 (4H), 3,73+3,81 (1H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,83 (1H), 13,48 (1H) ppm.

Ejemplo 86

Morfolin-4-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando morfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 67,8 mg (54%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,81 (1H), 2,11 (1H), 2,87-3,04 (2H), 3,10-3,41 (3H), 3,45-3,66 (8H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,83 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 87

[(3S)-3-Metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 24,1 mg (19%) del

compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,16+1,29 (3H), 1,79 (1H), 2,10 (1H), 2,82-4,46 (12H), 8,24 (1H), 8,32 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,83 (1H), 13,58 (1H) ppm.

Ejemplo 88

[(3R)-3-Metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 27,4 mg (21%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,15+1,31 (3H), 1,87 (1H), 2,10 (1H), 2,86-4,45 (12H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,83 (1H), 13,53 (1H) ppm.

Ejemplo 89

[(2R,6S)-2,6-Dimetilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (2R,6S)-2,6-dimetilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 13,1 mg (10%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,10 (6H), 1,81 (1H), 2,10 (1H), 2,26 (1H), 2,76 (1H), 2,87-3,03 (2H), 3,11-3,60 (5H), 3,95 (1H), 4,31 (1H), 8,24 (1H), 8,34 (1H), 8,54 (1H), 8,69 (1H), 8,84 (1H), 13,54 (1H) ppm.

Ejemplo 90

(4-Metilpiperazin-1-il)[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 1-metilpiperazina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 66,5 mg (52%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (1H), 2,10 (1H), 2,19 (3H), 2,27 (2H), 2,34 (2H), 2,82-3,03 (2H), 3,10-3,40 (3H), 3,50 (2H), 3,56 (2H), 8,24 (1H), 8,33 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,84 (1H), 13,55 (1H) ppm.

Ejemplo 91

[4-(Dimetilamino)piperidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 100 mg (273 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilpiperidin-4-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 39,5 mg (29%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,20 (1H), 1,35 (1H), 1,71-1,87 (3H), 2,10 (1H), 2,17 (6H), 2,32 (1H), 2,61 (1H), 2,84-3,37 (6H), 4,03 (1H), 4,40 (1H), 8,24 (1H), 8,33 (1H), 8,53 (1H), 8,69 (1H), 8,84 (1H), 13,56 (1H) ppm.

Ejemplo 92

(7S)-N-Etil-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metiletanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior

y purificación, 69,3 mg (89%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,03+1,15 (3H), 1,81 (1H), 2,05 (1H), 2,84+3,06 (3H), 2,86-3,02 (2H), 3,08-3,39 (4H), 3,44 (1H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,34 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 93

(7S)-N-Metil-N-propil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilpropan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 71,6 mg (74%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,83+0,87 (3H), 1,44-1,62 (2H), 1,81 (1H), 2,05 (1H), 2,85+3,07 (3H), 2,87-3,02 (2H), 3,08-3,40 (5H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,34 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 94

(7S)-N-Metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 70 mg (191 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 3,3,3-trifluoro-N-metilpropan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 57,1 mg (91%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,79 (1H), 2,06 (1H), 2,43-2,60 (2H), 2,87+3,12 (3H), 2,93 (2H), 3,13-3,70 (5H), 8,13 (1H), 8,24-8,47 (3H), 8,60 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 95

(7S)-N-Metil-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilpropan-2-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 55,6 mg (57%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,05+1,18 (6H), 1,81 (1H), 2,04 (1H), 2,71+2,90 (3H), 2,84-3,35 (5H), 4,26+4,72 (1H), 8,13 (1H), 8,24-8,45 (1H), 8,30 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 96

(7S)-N-(2-Metoxietil)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 300 mg (819 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-

pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-metoxi-N-metiletanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 241 mg (64%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (1H), 2,06 (1H), 2,87+3,12 (3H), 2,93 (2H), 3,14-3,34 (3H), 3,25+3,28 (3H), 3,41-3,53 (3H), 3,59 (1H), 8,13 (1H), 8,22-8,42 (1H), 8,30 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 97

Azetidin-1-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando azetidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 47,2 mg (51%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,77 (1H), 2,06 (1H), 2,22 (2H), 2,74 (1H), 2,90 (2H), 3,17 (1H), 3,32 (1H), 3,88 (2H), 4,17-4,32 (2H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,34 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 98

2-Oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 75 mg (205 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptano para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 17,2 mg (18%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,75 (1H), 2,05 (1H), 2,73 (1H), 2,89 (2H), 3,15 (1H), 3,29 (1H), 4,05 (2H), 4,38 (1H), 4,44 (1H), 4,67 (4H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,33 (1H), 8,36 (1H), 8,60 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 99

1-{[(7S)-4-(1H-Pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]carbonil}azetidin-3-carbonitrilo




Se transformaron 70 mg (191 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando azetidin-3-carbonitrilo para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 45,80 mg (53%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,76 (1H), 2,08 (1H), 2,70-2,99 (3H), 3,15 (1H), 3,28 (1H), 3,81 (1H), 4,04 (1H), 4,18 (1H), 4,41-4,61 (2H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,36 (2H), 8,60 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 100

[(3S)-3-(Dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 70 mg (191 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 60,2 mg (65%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,55-1,88 (2H), 1,96-2,13 (2H), 2,16 (6H), 2,54-2,76 (1H), 2,86-3,04 (4H), 3,11-3,28 (2H), 3,51-3,82 (3H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,36 (2H), 8,60 (1H), 13,62 (1H) ppm.

Ejemplo 101

[(3R)-3-(Dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 75 mg (205 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-

pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 28,7 mg (29%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,59-1,84 (2H), 1,97-2,14 (2H), 2,16 (6H), 2,59-2,75 (1H), 2,91-3,06 (3H), 3,12-3,64 (5H), 3,79+3,89 (1H), 8,13 (1H), 8,29 (1H), 8,33 (1H), 8,36 (1H), 8,60 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 102

Morfolin-4-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando morfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y

purificación, 69,3 mg (69%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,82 (1H), 2,06 (1H), 2,87-3,03 (2H), 3,19 (2H), 3,32 (1H), 3,44-3,66 (8H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,34 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 103

[(3R)-3-Metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 64,2 mg (62%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,16+1,31 (3H), 1,87 (1H), 2,03 (1H), 2,84-4,47 (12H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,33 (1H), 8,36 (1H), 8,60 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 104

[(3S)-3-Metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 75,3 mg (73%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,15+1,29 (3H), 1,79 (1H), 2,03 (1H), 2,84-4,47 (12H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,33 (1H), 8,36 (1H), 8,60 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 105

[(2R,6S)-2,6-Dimetilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (2R,6S)-2,6-dimetilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 74,0 mg (69%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,10 (6H), 1,81 (1H), 2,05 (1H), 2,27 (1H), 2,77 (1H), 2,83-3,05 (2H), 3,14-3,58 (5H), 3,95 (1H), 4,31 (1H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,36 (2H), 8,60 (1H), 13,62 (1H) ppm.

Ejemplo 106

(4-Metilpiperazin-1-il)[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-

pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 1-metilpiperazina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 58,0 mg (56%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,82 (1H), 2,04 (1H), 2,19 (3H), 2,27 (2H), 2,34 (2H), 2,84-3,02 (2H), 3,12-3,43 (3H), 3,45-3,61 (4H), 8,13 (1H), 8,23-8,46 (3H), 8,60 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 107

[4-(Dimetilamino)piperidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 80 mg (218 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilpiperidin-4-amina para dar, después de someterse

a tratamiento posterior y purificación, 36,4 mg (33%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,20 (1H), 1,34 (1H), 1,70-1,89 (3H), 2,04 (1H), 2,17 (6H), 2,24-2,40 (2H), 2,61 (1H), 2,85-3,12 (3H), 3,21 (2H), 4,02 (1H), 4,40 (1H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,34 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 108

1-({(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}carbonil)azetidin-3-carbonitrilo




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando azetidin-3-carbonitrilo para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 99,3 mg (81%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (1H), 2,14 (1H), 2,77 (1H), 2,83-3,01 (2H), 3,13 (1H), 3,25 (1H), 3,81 (1H), 4,01

(3H), 4,04 (1H), 4,18 (1H), 4,44-4,60 (2H), 8,00 (1H), 8,09 (1H), 8,41 (1H), 8,82 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 109

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(2-oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-il)metanona




Se transformaron 50 mg (126 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptano para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,5 mg (7%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,78 (1H), 2,10 (1H), 2,74 (1H), 2,82-2,96 (2H), 3,11 (1H), 3,24 (1H), 4,02 (3H), 4,06 (2H), 4,41 (2H), 4,64-4,73 (4H), 8,01 (1H), 8,07 (1H), 8,41 (1H), 8,83 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Ejemplo 110

[(3R)-3-(Dimetilamino)pirrolidin-1-il]{(7S)-4-[(6-

metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3R)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 70,4 mg (54%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,58-1,89 (2H), 1,97-2,22 (2H), 2,16 (6H), 2,55-3,67 (9H), 3,78+3,88 (1H), 4,01 (3H), 8,02 (1H), 8,10 (1H), 8,40 (1H), 8,81+8,83 (1H), 13,37 (1H) ppm.

Ejemplo 111

[(3S)-3-(Dimetilamino)pirrolidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 94,9 mg (73%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,56-1,88 (2H), 1,97-2,23 (2H), 2,17 (6H), 2,53-3,86 (10H), 4,01 (3H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,40 (1H), 8,83+8,85 (1H), 13,34 (1H) ppm.

Ejemplo 112

(7S)-N-Etil-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 18,5 mg (42 µmol) de (7S)-N-etil-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-

metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 39) de manera análoga al ejemplo intermediario 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 6,8 mg (36%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,02+1,14 (3H), 1,85 (1H), 2,09 (1H), 2,84+3,07 (3H), 2,86-3,03 (2H), 3,09-3,53 (5H), 8,07 (1H), 8,33 (2H), 8,55 (1H), 8,86 (1H), 8,95 (1H) ppm.

Ejemplo 113

(7S)-4-[(6-Hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 18,6 mg (41 µmol) de (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 38) de manera análoga al ejemplo intermediario 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 5,7 mg (30%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 0,82+0,87 (3H), 1,42-1,64 (2H), 1,85 (1H), 2,09 (1H), 2,85+3,07 (3H), 2,86-3,04 (2H),

3,11-3,44 (5H), 8,09 (1H), 8,55 (1H), 8,88 (1H), 8,96 (1H), 12,49 (1H), 13,06 (1H) ppm.

Ejemplo 114

(7S)-4-[(6-Hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(propan-2-il)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 19,2 mg (43 µmol) de (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(propan-2-il)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 37) de manera análoga al ejemplo intermediario 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 5,1 mg (26%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,01-1,22 (6H), 1,84 (1H), 2,09 (1H), 2,70+2,91 (3H), 2,83-3,23 (5H), 4,29+4,71 (1H), 8,09 (1H), 8,55 (1H), 8,88 (1H), 8,96 (1H), 12,48 (1H), 13,07 (1H) ppm.

Ejemplo 115

{(7S)-4-[(6-Hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(1S,4S)-2-oxa-5-

azabiciclo[2.2.1]hept-5-il]metanona




Se transformaron 18,4 mg (39 µmol) de {(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(1S,4S)-2-oxa-5-azabiciclo[2.2.1]hept-5-il]metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo 40) de manera análoga al ejemplo intermediario 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 2,8 mg (15%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,73-1,91 (3H), 2,12 (1H), 2,82-3,80 (9H), 4,60+4,85 (1H), 4,76+4,88 (1H), 8,08 (1H), 8,55 (1H), 8,86+8,87 (1H), 8,95 (1H), 12,45 (1H), 13,06 (1H) ppm.

Ejemplo 116

{(7S)-4-[(6-Hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(4-metilpiperazin-1-il)metanona




Se transformaron 19,4 mg (41 µmol) de {(7S)-4-[(6-

metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(4-metilpiperazin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo 42) de manera análoga al ejemplo intermediario 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 2,2 mg (11%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,83 (1H), 2,10 (1H), 2,19 (3H), 2,24-2,38 (4H), 2,88 (1H), 3,00 (1H), 3,12-3,29 (3H), 3,50 (2H), 3,58 (2H), 8,08 (1H), 8,55 (1H), 8,86 (1H), 8,95 (1H), 12,40 (1H), 13,07 (1H) ppm.

Ejemplo 117

[4-(Dimetilamino)piperidin-1-il]{(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona




Se transformaron 19,7 mg (39 µmol) de [4-(dimetilamino)piperidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo 43) de manera análoga al ejemplo intermediario 50 para dar, después

de someterse a tratamiento posterior y purificación, 5,5 mg (27%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,22 (1H), 1,37 (1H), 1,74-1,90 (3H), 2,09 (1H), 2,22 (6H), 2,41 (1H), 2,61 (1H), 2,82-3,28 (6H), 4,07 (1H), 4,42 (1H), 8,09 (1H), 8,55 (1H), 8,86 (1H), 8,96 (1H), 12,43 (1H), 13,04 (1H) ppm.

Ejemplo 118

5-Bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Una mezcla de 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 14), 1,85 mL de sulfóxido de dimetilo, 67 µL de N,N-dimetilpropan-1,3-diamina, 140 µL de N-etil-N-isopropilpropan-2-amina y 209 mg de hexafluorofosfato de (1H-benzotriazol-1-iloxi)(tripirrolidin-1-il)fosfonio se calentó a 50°C durante la noche. La mezcla cruda se purificó mediante cromatografía para dar 20,5 mg (16%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,68 (2H), 2,16 (6H), 2,32 (2H),

3,32 (2H), 8,22 (1H), 8,26 (1H), 8,49 (1H), 8,85 (1H), 8,89 (1H), 8,96 (1H), 13,56 (1H) ppm.

Ejemplo 119

5-Bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 14) de manera análoga al ejemplo 118 usando N'-etil-N,N-dimetiletan-1,2-diamina para dar, después de la purificación, 27,0 mg (21%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,71-1,88 (2H), 2,19 (2H), 2,31 (6H), 2,97 (3H), 3,40-3,54 (2H), 8,25 (1H), 8,48 (1H), 8,82 (1H), 8,84 (1H), 8,90 (1H), 13,54 (1H) ppm.

Ejemplo 120

5-Bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 14) de manera análoga al ejemplo 118 usando N,N-dimetiletan-1,2-diamina para dar, después de la purificación, 5,0 mg (4%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,21 (6H), 2,44 (2H), 3,40 (2H), 8,03 (1H), 8,26 (1H), 8,50 (1H), 8,85 (1H), 8,89 (1H), 8,97 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 121

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3S)-3-metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo 14) de manera análoga al ejemplo 18 usando

(3S)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 12,6 mg (10%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,28 (3H), 3,34-3,91 (7H), 8,26 (2H), 8,49 (1H), 8,71 (1H), 8,85 (1H), 8,87 (1H) ppm.

Ejemplo 122

N-[2-(Dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida




Una mezcla de 100 mg (280 µmol) de N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida de una solución en sulfóxido de dimetilo (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 122a) y 37,5 mg de 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina se calentó a 140°C bajo irradiación de microondas durante cuatro horas. El solvente se eliminó y el residuo se purificó mediante cromatografía para dar 8,2 mg (7%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,86+2,88 (3H), 3,00+3,09 (3H), 3,13+3,58 (3H), 4,39+5,02 (2H), 8,27+8,29 (1H), 8,55+8,71 (1H), 8,67+8,72 (1H), 8,91+8,92 (1H),

9,37+10,13 (1H), 13,64 (1H) ppm.

Ejemplo 122a


N-[2-(Dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida



Una mezcla de 800 mg (2,46 mmol) de N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 122b), 35 mL de diclorometano y 1,41 g de ácido 3-clorobencencarboperoxoico (75%) se agitó a 23°C durante dos horas. Se agregaron 22 mL de sulfóxido de dimetilo y se eliminó el diclorometano para dar el compuesto del título como una solución en sulfóxido de dimetilo 0,1M.

Ejemplo 122b


N-[2-(Dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida



Se transformó 1,00 g (4,40 mmol) de ácido 7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 122c) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N,N^2-trimetilglicinamida para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 1,03 g (72%) del compuesto del título.

Ejemplo 122c

ácido 7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxílico




Una mezcla de 35,2 g (146 mmol) de 7-sulfanil[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxilato de etilo (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 122d), 750 mL de hidróxido de sodio acuoso (2M), y 9,08 mL de iodometano se agitó a 23°C durante la noche. El precipitado se recogió y se lavó con etanol y éter dietílico. Se agregaron 400 mL de agua y el pH se ajustó a 2 agregando ácido clorhídrico (4M). El precipitado se recogió, se lavó con etanol y

éter dietílico y se secó para dar 14,28 g (43%) del compuesto del título.

Ejemplo 122d


7-sulfanil[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxilato de etilo



A una solución de 26,4 g (135 mmol) de 5-aminopirimidin-4,6-ditiol (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 122e) en 720 mL de piridina se agregaron lentamente 20,5 mL de cloro(oxo)acetato de etilo a 0°C y la mezcla se agitó a 23°C durante 4 horas. El solvente se eliminó y se agregó agua. El precipitado se recogió, se recristalizó desde etanol, se lavó con éter dietílico y se secó para dar 35,2 g que se usaron sin purificación adicional.

Ejemplo 122e

5-Aminopirimidin-4,6-ditiol




Una mezcla de 25 g (152 mmol) 4,6-dicloropirimidin-5-amina (CAS-No: 5413-85-4), 45,2 g de hidrato de sulfanilsodio (1:1) y 600 mL de agua se calentó bajo reflujo durante 3 horas. Se agregaron 16,9 g de hidrato

de sulfanilsodio (1:1) y se continuó el calentamiento durante 3 horas. La mezcla se neutralizó con enfriamiento agregando ácido clorhídrico concentrado y se concentró. Después de ajustar el pH entre 2 y 3 agregando ácido clorhídrico (2M) con enfriamiento, el precipitado se recogió, se lavó con agua fría y se secó para dar 26,4 g (88%) del compuesto del título como clorhidrato.

Ejemplo 123

N,N-Dimetil-7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida




Se transformaron 100 mg (349 µmol) de N,N-dimetil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 123a) de manera análoga al ejemplo 122 usando 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,4 mg (4%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 3,09 (3H), 3,56 (3H), 8,17 (1H), 8,54 (1H), 8,55 (1H), 8,76 (1H), 10,29 (1H), 13,67 (1H) ppm.

Ejemplo 123a


N,N-Dimetil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida



Se transformaron 635 mg (2,50 mmol) de N,N-dimetil-7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 123b) de manera análoga al ejemplo intermediario 122a para dar el compuesto del título como una solución en sulfóxido de dimetilo 0,1M.

Ejemplo 123b


N,N-Dimetil-7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida



Se transformó 1,00 g (4,40 mmol) de ácido 7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 122c) de manera análoga al ejemplo 18 usando N-metilmetanamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 907 mg (81%) del compuesto del título.

Ejemplo 124

5-Bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 61a) de manera análoga al ejemplo 118 usando N,N-dimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 1,8 mg (1%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,21 (6H), 2,45 (2H), 3,40 (2H), 7,97 (1H), 8,14 (1H), 8,28 (1H), 8,56 (1H), 8,61 (1H), 8,67 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 125

5-Bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 61a) de manera análoga al ejemplo 118 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 18,8 mg (14%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,68 (2H), 2,16 (6H), 2,33 (2H), 3,34 (2H), 8,14 (1H), 8,17 (1H), 8,28 (1H), 8,57 (1H), 8,60 (1H), 8,68 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 126

Piperidin-1-il[7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]metanona




Se transformaron 100 mg (306 µmol) de [7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il](piperidin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 126a) de manera análoga al ejemplo 122 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 32,7 mg (27%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,44-1,75 (6H), 3,65 (2H), 4,15

(2H), 8,16 (1H), 8,53 (2H), 8,74 (1H), 10,28 (1H), 13,68 (1H) ppm.

Ejemplo 126a


[7-(Metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il](piperidin-1-il)metanona



Se transformaron 100 mg (306 µmol) de [7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il](piperidin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 126b) de manera análoga al ejemplo intermediario 122a para dar el compuesto del título como una solución en sulfóxido de dimetilo 0,1M.

Ejemplo 126b

[7-(Metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il](piperidin-1-il)metanona




Se transformaron 1,00 g (4,40 mmol) de ácido 7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 122c) de manera análoga al ejemplo 18

usando piperidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 998 mg (77%) del compuesto del título.

Ejemplo 127

[5-Bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona




Se transformaron 100 mg (267 µmol) de ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 61a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilpiperidin-4-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 21,0 mg (15%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,39 (2H), 1,80 (2H), 2,18 (6H), 2,38 (2H), 2,82-3,17 (2H), 3,62 (1H), 4,40 (1H), 8,13 (1H), 8,25 (1H), 8,46 (1H), 8,52 (1H), 8,66 (1H), 13,60 (1H) ppm.

Ejemplo 128

N-[2-(Dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-

d]pirimidin-2-carboxamida




Se transformaron 100 mg (280 µmol) de N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 122a) de manera análoga al ejemplo 122 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 112,7 mg (93%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,75+2,86 (3H), 3,00+3,01 (3H), 3,04+3,56 (3H), 4,40+5,21 (2H), 8,17 (1H), 8,55+8,62 (2H), 8,78 (1H), 10,20+10,31 (1H), 13,66 (1H) ppm.

Ejemplo 129


N-[3-(Dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida



Se transformaron 95 mg (256 µmol) de N-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 129a) de manera análoga al ejemplo 122 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 73,5 mg (64%) del compuesto del título. ^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,69+2,88 (2H), 2,79+2,83 (3H), 2,98+3,01 (3H), 3,12+3,58 (3H), 3,69+4,25 (2H), 8,17 (1H), 8,54+8,61 (1H), 8,55+8,80 (1H), 8,76+8,95 (1H), 10,29+10,35 (1H), 13,66 (1H) ppm.

Ejemplo 129a

N-[3-(Dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida




Se transformaron 700 mg (2,06 mmol) de N-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 129b) de manera análoga al ejemplo intermediario 122a para dar el compuesto del título

como una solución en sulfóxido de dimetilo 0,1M.

Ejemplo 129b


N-[3-(Dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida



Se transform+o 1,00 g (4,40 mmol) de ácido 7-(metilsulfanil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 122c) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N,N^3-trimetil-beta-alaninamida para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 759 mg (51%) del compuesto del título.

Ejemplo 130

N-[2-(Dimetilamino)-2-oxoetil]-7-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida




Se transformaron 100 mg (280 µmol) de N-[2-

(dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 122a) de manera análoga al ejemplo 122 usando 6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 53,7 mg (41%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,78+2,85 (3H), 2,98+3,01 (3H), 3,04+3,48 (3H), 3,92+3,96 (3H), 4,37+5,13 (2H), 8,02+8,04 (1H), 8,36+8,49 (1H), 8,51+8,53 (1H), 9,30+9,69 (1H), 13,46 (1H) ppm.

Ejemplo 131

5-Bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida



Se transformaron 175 mg (433 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario


62a) de manera análoga al ejemplo 118 usando N'-etil-N,N-dimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 5,8 mg (2%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,82 (2H), 2,19-2,41 (8H), 2,97 (3H), 3,44 (2H), 4,10 (3H), 8,03 (1H), 8,18 (1H), 8,43 (1H), 8,67+8,73 (1H), 9,30 (1H), 13,28 (1H) ppm.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,68 (2H), 2,16 (6H), 2,33 (2H), 3,34 (2H), 8,14 (1H), 8,17 (1H), 8,28 (1H), 8,57 (1H), 8,60 (1H), 8,68 (1H), 13,61 (1H) ppm.

Ejemplo 132

5-Bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida




Se transformaron 175 mg (433 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 118 usando N'-etil-

N,N-dimetiletan-1,2-diamina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 19 mg (8%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (2H), 2,27 (6H), 2,43 (2H), 2,97 (3H), 3,42 (2H), 8,08 (1H), 8,45 (1H), 9,04 (1H), 9,35 (1H), 12,38 (1H), 13,02 (1H) ppm.

Ejemplo 133

{7-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino][1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il}(piperidin-1-il)metanona




Se transformaron 100 mg (306 µmol) de [7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il](piperidin-1-il)metanona (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 126a) de manera análoga al ejemplo 122 usando 6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 51,9 mg (39%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,46-1,73 (6H), 3,61 (2H), 3,80-4,24 (2H), 3,90 (3H), 8,01 (1H), 8,37 (1H), 8,49 (1H),

9,65 (1H), 13,45 (1H) ppm.

Ejemplo 134

{5-Bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}(piperidin-1-il)metanona




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando piperidina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 9,1 mg (4%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,47-1,69 (6H), 3,36-3,71 (4H), 8,09 (1H), 8,46 (1H), 9,02 (1H), 9,30 (1H), 12,39 (1H), 12,75 (1H), 13,03 (1H) ppm.

Ejemplo 135

{5-Bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[(3S)-3-

metilmorfolin-4-il]metanona




Se transformaron 200 mg (495 µmol) de una mezcla de ácido 5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico y ácido 5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico (preparados de acuerdo con el ejemplo intermediario 62a) de manera análoga al ejemplo 18 usando (3S)-3-metilmorfolina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 19,4 mg (7%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,28 (3H), 3,28-3,93 (7H), 4,10 (3H), 8,04 (1H), 8,44 (1H), 8,66 (1H), 9,26 (1H), 12,60 (1H), 13,30 (1H) ppm.

Ejemplo 136

(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 100 mg (252 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 3,3,3-trifluoro-N-metilpropan-1-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 94,0 mg (74%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,82 (1H), 2,12 (1H), 2,41-2,66 (2H), 2,87+3,13 (3H), 2,92 (2H), 3,09-3,71 (5H), 4,02 (3H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,41 (1H), 8,81+8,84 (1H), 13,37 (1H) ppm.

Ejemplo 137

N-[3-(Dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida




Se transformaron 95 mg (256 µmol) de N-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo intermediario 129a) de manera análoga al ejemplo 122 usando 1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,0 mg (3%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,74+3,00 (2H), 2,84 (3H), 2,94+3,00 (3H), 3,13+3,70 (3H), 3,73+4,19 (2H), 6,06 (2H), 6,80+6,83 (1H), 8,29+8,56 (1H), 9,12+9,13 (1H), 9,56+9,69 (1H) ppm.

Ejemplo 138

N-[3-(Dimetilamino)-3-oxopropil]-7-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida




Se transformaron 95 mg (256 µmol) de N-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(metilsulfonil)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo

intermediario 129a) de manera análoga al ejemplo 122 usando 6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 49,7 mg (41%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 2,66+2,76 (2H), 2,72+2,82 (3H), 2,95+2,97 (3H), 3,08+3,31 (3H), 3,66+4,23 (2H), 3,92+3,95 (3H), 8,01+8,02 (1H), 8,38+8,52 (1H), 8,48+8,52 (1H), 9,40+9,62 (1H), 13,43 (1H) ppm.

Ejemplo 139

(7S)-4-[(6-Hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida




Se transformaron 10 mg (20 µmol) de (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-**(3,3,3-**trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida (preparada de acuerdo con el ejemplo 136) de manera análoga al ejemplo 50 para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 9,0 mg (93%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,81 (1H), 2,11 (1H), 2,39-2,62 (2H), 2,87+3,13 (3H), 2,92 (2H), 3,09-3,72 (5H), 7,49

(1H), 8,43 (1H), 8,63 (1H), 9,77 (1H), 11,68 (1H) ppm.

Ejemplo 140

[3-(Dimetilamino)azetidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 50 mg (136 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 46a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilazetidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 44,6 mg (69%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,77 (1H), 2,09 (6H), 2,11 (1H), 2,76 (1H), 2,91 (2H), 3,05 (1H), 3,15-3,30 (2H), 3,66 (1H), 3,88 (1H), 4,04 (1H), 4,24 (1H), 8,24 (1H), 8,35 (1H), 8,53 (1H), 8,68 (1H), 8,84 (1H), 13,51 (1H) ppm.

Ejemplo 141

[3-(Dimetilamino)azetidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona




Se transformaron 50 mg (126 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilazetidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 17,4 mg (27%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,80 (1H), 2,10 (6H), 2,12 (1H), 2,79 (1H), 2,90 (2H), 2,97-3,30 (3H), 3,67 (1H), 3,88 (1H), 4,02 (3H), 4,05 (1H), 4,25 (1H), 8,01 (1H), 8,08 (1H), 8,41 (1H), 8,84 (1H), 13,34 (1H) ppm.

Ejemplo 142

[3-(Dimetilamino)azetidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona




Se transformaron 50 mg (136 µmol) de ácido (7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico (preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 59a) de manera análoga al ejemplo 18 usando N,N-dimetilazetidin-3-amina para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 47,5 mg (74%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,78 (1H), 2,05 (1H), 2,08 (6H), 2,78 (1H), 2,91 (2H), 3,05 (1H), 3,16 (1H), 3,30 (1H), 3,66 (1H), 3,88 (1H), 4,02 (1H), 4,24 (1H), 8,13 (1H), 8,30 (1H), 8,34 (1H), 8,36 (1H), 8,61 (1H), 13,59 (1H) ppm.

Ejemplo 143

{(7S)-4-[(6-Metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(2-oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-il)metanona



Se transformaron 50 mg (126 µmol) de ácido (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxílico

(preparado de acuerdo con el ejemplo intermediario 34a) de manera análoga al ejemplo 18 usando 2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptano para dar, después de someterse a tratamiento posterior y purificación, 4,5 mg (7%) del compuesto del título.

^{1}H-RMN (DMSO-d6): δ= 1,78 (1H), 2,11 (1H), 2,73 (1H), 2,88 (2H), 3,11 (1H), 3,24 (1H), 4,02 (3H), 4,06 (2H), 4,42 (2H), 4,68 (4H), 8,01 (1H), 8,07 (1H), 8,41 (1H), 8,83 (1H), 13,35 (1H) ppm.

Además, los compuestos de fórmula **I** de la presente invención se pueden convertir en cualquiera de las sales descritas aquí, por cualquier método conocido por las personas con experiencia en el arte. De manera similar, cualquier sal de un compuesto de fórmula **I** de la presente invención se puede convertir en el compuesto libre, por cualquier método conocido por las personas con experiencia en el arte.

Composiciones farmacéuticas de los compuestos de acuerdo con la invención

Esta invención también se relaciona con composiciones farmacéuticas que contienen uno o más de los compuestos de acuerdo con la presente invención. Estas composiciones pueden utilizarse para obtener un efecto farmacológico deseado al administrarse a un paciente que las necesita. Un paciente, para el

propósito de esta invención, es un mamífero, incluyendo un humano, que necesita el tratamiento para una condición o enfermedad particular. Por ello, la presente invención incluye composiciones farmacéuticas compuestas por un vehículo farmacéuticamente aceptable y una cantidad eficaz para uso farmacéutico de un compuesto, o una sal de éste, de la presente invención. Un vehículo farmacéuticamente aceptable es preferiblemente un vehículo que es relativamente no tóxico e inocuo para un paciente, a concentraciones consistentes con la actividad efectiva del ingrediente activo, de modo que los efectos colaterales que pueden adjudicarse al vehículo no perjudican los efectos beneficiosos del ingrediente activo. Una cantidad efectiva para el uso farmacéutico del compuesto es preferiblemente una cantidad que produce un resultado o ejerce una influencia sobre la condición particular a tratar. Los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden administrarse con vehículos farmacéuticamente aceptables bien conocidos en la técnica, usando cualquier forma de dosificación convencional efectiva, incluyendo preparaciones de liberación inmediata, lenta y demorada, de administración oral, parenteral, tópica, nasal, oftálmica, óptica, sublingual, rectal, vaginal y

semejantes.

Para administración oral, pueden formularse los compuestos en preparaciones sólidas o líquidas, tales como cápsulas, píldoras, tabletas, pastillas, grageas, líquidos fundidos, polvos, soluciones, suspensiones o emulsiones, y puede preparárselos de acuerdo con métodos conocidos en la técnica para la fabricación de composiciones farmacéuticas. Las formas de dosificación sólidas pueden comprender una cápsula, que puede ser del tipo de las cápsulas de gelatina convencionales, duras o blandas, que contienen, por ejemplo, agentes tensioactivos, lubricantes y rellenos inertes, tales como lactosa, sacarosa, fosfato de calcio y almidón de maíz.

En otra realización, pueden colocarse los compuestos de esta invención en tabletas con bases para tabletas convencionales, tales como lactosa, sacarosa y almidón de maíz, en combinación con aglutinantes, tales como acacia, almidón de maíz o gelatina, agentes desintegradores dirigidos a contribuir a la degradación y la disolución de la tableta una vez administrada, tal como almidón de papa, ácido algínico, almidón de maíz y goma guar, goma tragacanto, acacia, lubricantes dirigidos a mejorar el flujo de granulación de la tableta y a evitar la adhesión del material de la

tableta a las superficies de los colorantes de la tableta y los envases, por ejemplo, talco, ácido esteárico o estearato de magnesio, calcio o cinc, tinturas, agentes colorantes y agentes saborizantes, tales como menta salvaje, aceite de té del Canadá o sabor a cereza, dirigidos a mejorar las cualidades estéticas de las tabletas y tornarlas más aceptables para el paciente. Los excipientes apropiados para usar en formas líquidas de dosificación oral incluyen fosfato de dicalcio y diluyentes, tales como agua y alcoholes, por ejemplo, etanol, alcohol bencílico y alcoholes polietilenados, con o sin el agregado de un agente tensioactivo, un agente de suspensión o un agente emulsificante farmacéuticamente aceptable. Puede contener diversos materiales adicionales, tales como recubrimientos o para modificar la forma física de la unidad de dosificación. Por ejemplo, pueden recubrirse tabletas, píldoras o cápsulas con shellac, azúcar o ambos.

Los polvos dispersables y los gránulos son apropiados para la preparación de una suspensión acuosa. Proveen el ingrediente activo en combinación con un agente dispersante o humectante, un agente de suspensión y uno o más conservantes. Los ejemplos de agentes dispersantes o humectantes y de suspensión

apropiados son aquellos que se mencionaron con anterioridad. También puede haber excipientes adicionales presentes, por ejemplo, aquellos agentes edulcorantes, saborizantes y colorantes descriptos previamente.

Las composiciones farmacéuticas de esta invención también pueden tomar la forma de emulsiones de aceite en agua. La fase oleosa puede ser un aceite vegetal, tal como parafina líquida o una mezcla de aceites vegetales. Los agentes emulsionantes apropiados pueden ser (1) gomas de origen natural, tales como goma acacia y goma tragacanto, (2) fosfátidos de origen natural, tales como soja y lecitina, (3) ésteres o ésteres parciales derivados de ácidos grasos y anhídridos de hexitol, por ejemplo, monooleato de sorbitan, (4) productos de la condensación de dichos ésteres parciales con óxido de etileno, por ejemplo, monooleato de polioxietilen sorbitan. Las emulsiones también pueden contener agentes edulcorantes y saborizantes.

Pueden formularse suspensiones oleosas suspendiendo el ingrediente activo en un aceite vegetal, tal como, por ejemplo, aceite de maní, aceite de oliva, aceite de sésamo o aceite de coco, o en un aceite mineral, tal como parafina líquida. Las suspensiones oleosas pueden contener un agente

espesante, tal como, por ejemplo, cera de abeja, parafina dura o alcohol cetílico. Las suspensiones pueden contener uno o más conservantes, por ejemplo, p-hidroxibenzoato de etilo o *n*-propilo; uno o más agentes colorantes; uno o más agentes saborizantes; y uno o más agentes saborizantes, tales como sacarosa o sacarina.

Pueden formularse jarabes y elíxires con agentes edulcorantes, por ejemplo, glicerol, propilenglicol, sorbitol o sacarosa. Dichas formulaciones pueden contener un demulcente y un conservante, tal como metil y propil parabeno, y agentes saborizantes y colorantes.

Los compuestos de esta invención también pueden administrarse por vía parenteral, es decir, por vía subcutánea, intravenosa, intraocular, intrasinovial, intramuscular o interperitoneal, como dosificaciones inyectables del compuesto, preferiblemente en un diluyente aceptable para el uso fisiológico, con un vehículo farmacéutico que puede ser un líquido estéril o una mezcla de líquidos, tales como agua, solución salina, dextrosa acuosa y soluciones de azúcares relacionados, un alcohol, tal como etanol, isopropanol o alcohol hexadecílico, glicoles, tal como propilenglicol o polietilenglicol, cetales de glicerol, tales como 2,2-dimetil-1,1-dioxolan-4-metanol, éteres, tales como poli(etilenglicol) 400, un aceite, un ácido

graso, un éster de ácido graso, un glicérido de ácido graso o un glicérido acetilado de ácido graso, con o sin el agregado de un agente tensioactivo farmacéuticamente aceptable, tal como un jabón o un detergente, un agente de suspensión, tal como pectina, carbómeros, meticelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa o carboximetilcelulosa, o un agente emulsionantes, y otros coadyuvantes farmacéuticos.

Los ejemplos de aceites que pueden usarse en las formulaciones parenterales de esta invención son los aceites de petróleo de origen animal, vegetal o sintético, por ejemplo, aceite de maní, aceite de soja, aceite de sésamo, aceite de semilla de algodón, aceite de maíz, aceite de oliva, aceite de vaselina y aceite mineral. Los ácidos grasos apropiados incluyen ácido oleico, ácido esteárico, ácido isoesteárico y ácido mirístico. Los ésteres de ácidos grasos apropiados son, por ejemplo, oleato de etilo y miristato de isopropilo. Los jabones apropiados incluyen sales de ácidos grasos con metales alcalinos, amonio y trietanolamina, los detergentes apropiados incluyen detergentes catiónicos, por ejemplo, haluros de dimetil dialquil amonio, haluros de alquil piridinio y acetatos de alquilamina; detergentes aniónicos, por ejemplo, sulfonatos y sulfosuccinatos de alquilo, arilo y olefina, sulfatos

de alquilo, olefina, éter y monoglicéridos; detergentes no iónicos, por ejemplo, óxidos de aminas grasas, alcanolamidas de ácidos grasos, y poli(oxietilen-oxipropileno), o copolímeros de óxido de etileno y óxido de propileno; y detergentes anfotéricos, por ejemplo, alquil-beta-aminopropionatos, y sales de amonio cuaternario de 2-alquilimidazolina, así como mezclas.

Las composiciones parenterales de esta invención típicamente contendrán entre aproximadamente 0,5% y aproximadamente 25% en peso de ingrediente activo en solución. También pueden usarse ventajosamente conservantes y amortiguadores. Con el fin de minimizar o eliminar la irritación en el sitio de inyección, dichas composiciones pueden contener un agente tensioactivo no iónico que tenga un balance hidrófilo-lipófilo (HLB) preferiblemente de entre aproximadamente 12 y aproximadamente 17. La cantidad de agente tensioactivo en dicha formulación preferiblemente varía entre aproximadamente 5% y aproximadamente 15% en peso. El agente tensioactivo puede ser un único componente con el HLB indicado previamente, o puede ser una mezcla de dos o más componentes con el HLB deseado.

Los agentes tensioactivos ilustrativos usados en las formulaciones parenterales son aquellos de la clase

de los ésteres de ácidos grasos de polioxietilen sorbitan, por ejemplo, monooleato de sorbitan, y los aductos de alto peso molecular de óxido de etileno con a una base hidrofóbica, formados por la condensación de óxido de propileno con propilenglicol.

Las composiciones farmacéuticas pueden tomar la forma de suspensiones acuosas estériles inyectables. Dichas suspensiones pueden formularse de acuerdo con métodos conocidos, usando agentes dispersantes o humectantes, y agentes de suspensión apropiados, tales como, por ejemplo, carboximetilcelulosa de sodio, metilcelulosa, hidroxipropilmetil-celulosa, alginato de sodio, polivinilpirrolidona, goma tragacanto y goma acacia; agentes dispersantes o humectantes, que pueden ser un fosfátido de origen natural, tal como la lecitina, un producto de condensación de un óxido de alquileno con un ácido graso, por ejemplo, estearato de polioxietileno, un producto de condensación de un óxido de etileno con un alcohol alifático de cadena larga, por ejemplo, heptadeca-etilenoxietanol, un producto de condensación de un óxido de etileno con un éster parcial derivado de un ácido graso y un hexitol, tal como monooleato de polioxietilen sorbitol, o un producto de condensación de un óxido de etileno con un éster parcial derivado de un ácido graso y un anhídrido

de hexitol, por ejemplo, monooleato de polioxietilen sorbitan.

La preparación inyectable estéril también puede ser una solución o una suspensión inyectable estéril en un diluyente o solvente no tóxico aceptable para el uso parenteral. Los diluyentes y los solventes que pueden emplearse son, por ejemplo, agua, solución de Ringer, soluciones isotónicas de cloruro de sodio y soluciones isotónicas de glucosa. Además, pueden emplearse comúnmente aceites fijos estériles como solventes o medios de suspensión. Con este propósito, puede emplearse cualquier aceite blando fijo, incluyendo mono o diglicéridos sintéticos. Además, pueden usarse ácidos grasos, tales como ácido oleico, en la preparación de soluciones inyectables.

También puede administrarse una composición de la invención, bajo la forma de supositorios, para la administración rectal de la droga. Pueden prepararse estas composiciones mezclando la droga con un excipiente no irritante apropiado, que sea sólido a temperaturas ordinarias, pero líquido a la temperatura del recto, y, de este modo, se funda en el recto para liberar la droga. Dichos materiales son, por ejemplo, manteca de cacao y polietilenglicol.

Otra formulación empleada en los métodos de la

presente invención utiliza dispositivos de administración transdérmica (“parches”). Pueden usarse dichos parches transdérmicos para obtener una infusión continua o discontinua de los compuestos de acuerdo con la presente invención en cantidades controladas. La construcción y el uso de parches transdérmicos para la administración de agentes farmacéuticos es bien conocida en la técnica (véase, por ejemplo, la Patente de los EE.UU. Nº 5023252, publicada el 11 de Junio de 1991, incorporada en la presente documentación a modo de referencia). Pueden construirse dichos parches para lograr una administración continua, pulsátil o basada en la demanda de los agentes farmacéuticos.

Las formulaciones de liberación controlada para administración parenteral incluyen formulaciones liposómicas, formulaciones de microesferas poliméricas y formulaciones de geles poliméricos, que son conocidas en la técnica.

Puede ser deseable o necesario introducir la composición farmacéutica en el paciente mediante un dispositivo de administración mecánica. La construcción y el uso de dispositivos de administración mecánica para la administración de agentes farmacéuticos son bien conocidos en la técnica. Las técnicas directas, por ejemplo, para administrar una droga directamente al

cerebro, comprenden comúnmente la colocación de un catéter de administración de la droga en el sistema ventricular del paciente para superar la barrera hematoencefálica. Se describe uno de estos sistemas de administración por implantación, usado para transportar los agentes a regiones anatómicas específicas en el cuerpo, en la Patente de los EE.UU. Nº 5011472, publicada el 30 de Abril de 1991.

Las composiciones de la invención también pueden contener otros ingredientes de composición convencionales farmacéuticamente aceptables, generalmente conocidos como vehículos o diluyentes, según sea necesario o se lo desee. Pueden usarse procedimientos convencionales para preparar dichas composiciones en formas de dosificación apropiadas.

Dichos ingredientes y procedimientos incluyen aquellos que se describen en las siguientes referencias, cada una de las cuales se incorpora en la presente documentación a modo de referencia: Powell, M.F. et al, “Compendium of Excipients for Parenteral Formulations” PDA Journal of Pharmaceutical Science & Technology 1998, 52(5), 238-311; Strickley, R.G “Parenteral Formulations of Small Molecule Therapeutics Marketed in the United States (1999)-Part-1” PDA Journal of Pharmaceutical Science & Technology 1999,

53(6), 324-349; y Nema, S. et al, “Excipients and Their Use in Injectable Products” PDA Journal of Pharmaceutical Science & Technology 1997, 51(4), 166-171.

Los ingredientes farmacéuticos de uso común que pueden emplearse, según sea apropiado, para formular la composición destinada a una ruta de administración determinada, incluyen:

agentes acidificantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, ácido acético, ácido cítrico, ácido fumárico, ácido clorhídrico, ácido nítrico);

agentes alcalinizantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, soluciones de amonio, carbonato de amonio, dietanolamina, monoetanolamina, hidróxido de potasio, borato de sodio, carbonato de sodio, hidróxido de sodio, trietanolamina, trolamina);

adsorbentes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, celulosa en polvo y carbón activado);

propelentes de aerosol (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, dióxido de carbono, CCl_2F_2, $F_2ClC\text{-}CClF_2$ y $CClF_3$);

agentes de desplazamiento aéreo (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, nitrógeno y argón);

conservantes antifúngicos (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, ácido benzoico, butilparaben,

etilparaben, metilparaben, propilparaben, benzoato de sodio);

conservantes antimicrobianos (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, cloruro de benzalconio, cloruro de benzetonio, alcohol bencílico, cloruro de cetilpiridinio, clorobutanol, fenol, alcohol feniletílico, nitrato fenilmercúrico y timerosal);

antioxidantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, ácido ascórbico, palmitato de asrcobilo, hidroxianisol butilado, hidroxitolueno butilado, ácido hipofosforoso, monotioglicerol, galato de propilo, ascorbato de sodio, bisulfito de sodio, sulfoxilato de formaldehído de sodio, metabisulfito de sodio);

materiales aglutinantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, polímeros de bloque, goma natural y sintética, poliacrilatos, poliuretanos, siliconas, polisiloxanos y copolímeros de estireno-butadieno);

agentes amortiguadores (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, metafosfato de potasio, fosfato de dipotasio, acetato de sodio, citrato de sodio anhidro y citrato de dihidrato de sodio);

agentes de transporte (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, jarabe de acacia, jarabe aromático, elixir aromático, jarabe de cereza, jarabe de cacao, jarabe de naranja, jarabe, aceite de maíz, aceite

mineral, aceite de maní, aceite de sésamo, inyecciones bacteriostáticas de cloruro de sodio y agua bacteriostática para inyección);

agentes quelantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, edetato disódico y ácido edético);

colorantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, FD&C Rojo Nº 3, FD&C Rojo Nº 20, FD&C Amarillo Nº 6, FD&C Azul Nº 2, D&C Verde Nº 5, D&C Anaranjado Nº 5, D&C Rojo Nº 8, caramelo y óxido férrico rojo);

agentes de transparentado (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, bentonita);

agentes emulsionantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, acacia, cetomacrogol, alcohol cetílico, monoestearato de glicerilo, lecitina, monooleato de sorbitan, monoestearato de polioxietileno 50);

agentes de encapsulación (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, gelatina y acetato de ftalato de celulosa);

saborizantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, aceite de anís, aceite de canela, cacao, mentol, aceite de naranja, aceite de menta salvaje y vainillina);

humectantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, glicerol, propilenglicol y sorbitol);

agentes levigantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, aceite mineral y glicerina);

aceites (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, aceite de maní, aceite mineral, aceite de oliva, aceite de maní, aceite de sésamo y aceite vegetal);

bases de ungüentos (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, lanolina, ungüentos hidrofílicos, ungüentos de polietilenglicol, vaselina, vaselina hidrofílica, ungüento blanco, ungüento amarillo y ungüento de agua de rosa);

potenciadores de la penetración (administración transdérmica) (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, alcoholes monohidroxilados o polihidroxilados, alcoholes mono o polivalentes, alcoholes grasos saturados o no saturados, ésteres grasos saturados o no saturados, ácidos dicarboxílicos saturados o no saturados, aceites esenciales, derivados de fosfatidilo, cefalina, terpenos, amidas, éteres, cetonas y ureas);

plastificantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, ftalato de dietilo y glicerol);

solventes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, etanol, aceite de maíz, aceite de semilla de algodón, glicerol, isopropanol, aceite mineral, ácido oleico, aceite de maní, agua purificada, agua para inyección, agua estéril para inyección y agua estéril para irrigación);

agentes endurecedores (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, alcohol cetílico, ceras de ésteres cetílicos, cera microcristalina, parafina, alcohol estearílico, cera blanca y cera amarilla);

bases para supositorios (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, manteca de cacao y polietilenglicoles (mezclas));

agentes tensioactivos (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, cloruro de benzalconio, nonoxinol 10, oxtoxinol 9, polisorbato 80, lauril sulfato de sodio y mono-palmitato de sorbitano);

agentes de suspensión (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, agar, bentonita, carbómeros, carboximetilcelulosa de sodio, hidroxietil celulosa, hidroxipropil celulosa, hidroxipropil metilcelulosa, caolín, metilcelulosa, goma tragacanto y Veegum);

agentes edulcorantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, aspartamo, dextrosa, glicerol, manitol, propilenglicol, sacarina de sodio, sorbitol y sacarosa);

anti-adherentes para tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, estearato de magnesio y talco);

aglutinantes para tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, acacia, ácido algínico, carboximetilcelulosa de sodio, azúcar compresible,

etilcelulosa, gelatina, glucosa líquida, metilcelulosa, polivinil pirrolidona no reticulada y almidón pregelatinizado);

diluyentes para tabletas y cápsulas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, fosfato de calcio dibásico, caolín, lactosa, manitol, celulosa microcristalina, celulosa en polvo, carbonato de calcio precipitado, carbonato de sodio, fosfato de sodio, sorbitol y almidón);

agentes de recubrimiento para tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, glucosa líquida, hidroxietil celulosa, hidroxipropil celulosa, hidroxipropil metilcelulosa, metilcelulosa, etilcelulosa, acetato de ftalato de celulosa y shellac);

excipientes para la compresión directa de tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, fosfato de calcio dibásico);

desintegradores para tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, ácido algínico, carboximetilcelulosa de calcio, celulosa microcristalina, poloacrilina de potasio, polivinilpirrolidona reticulada, alginato de sodio, glicolato de almidón de sodio y almidón);

deslizantes para tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, sílice coloidal, almidón de maíz y

talco);

lubricantes para tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, estearato de calcio, estearato de magnesio, aceite mineral, ácido esteárico y estearato de cinc);

opacantes para tabletas/cápsulas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, dióxido de titanio);

agentes de acabado de tabletas (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, cera de carnaúba y cera blanca);

agentes espesantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, cera de abeja, alcohol cetílico y parafina);

agentes para proporcionar tonicidad (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, dextrosa y cloruro de sodio);

agentes para incrementar la viscosidad (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, ácido algínico, bentonita, carbómeros, carboximetilcelulosa de sodio, metilcelulosa, polivinil pirrolidona, alginato de sodio y tragacanto); y

agentes humectantes (los ejemplos incluyen, sin limitaciones, heptadecaetilen oxicetanol, lecitinas, monooleato de sorbitol, monooleato de polioxietilen sorbitol, y estearato de polioxietileno).

Pueden ilustrarse las composiciones farmacéuticas

de acuerdo con la presente invención como se indica a continuación.

Solución IV estéril. Puede prepararse una solución de 5 mg/ml del compuesto deseado de esta invención usando agua estéril para inyección, y puede ajustarse el pH según sea necesario. La solución se diluye para la administración a 1 - 2 mg/ml con dextrosa estéril 5% y se administra como una infusión IV sobre un período de 60 minutos aproximadamente.

Polvo liofilizado que puede administrarse por vía IV. Se puede hacer un preparado estéril con (i) 100 - 1000 mg del compuesto deseado de esta invención como un polvo liofilizado, (ii) 32- 327 mg/ml de citrato de sodio, y (iii) 300 - 3000 mg Dextrano 40. La formulación se reconstituye con solución salina o dextrosa estéril, inyectable 5% a una concentración de 10 a 20 mg/ml, que se diluye adicionalmente con solución salina o dextrosa 5% a 0.2 - 0.4 mg/ml, y se administra o bien como un bolo IV o por infusión IV durante 15 - 60 minutos.

Suspensión intramuscular. Puede prepararse la siguiente solución o suspensión para inyección intramuscular:

50 mg/ml del compuesto insoluble en agua deseado de esta invención

5 mg/ml de carboximetilcelulosa de sodio

4 mg/ml de TWEEN 80

9 mg/ml de cloruro de sodio

9 mg/ml de alcohol bencílico

Cápsulas con un recubrimiento duro. Se prepara una gran cantidad de cápsulas rellenando cápsulas de gelatina convencionales de dos piezas con 100 mg de ingrediente activo en polvo, 150 mg de lactosa, 50 mg de celulosa y 6 mg de estearato de magnesio cada una.

Cápsulas de gelatina duras. Se prepara una mezcla de ingrediente activo en un aceite digerible, tal como aceite de soja, aceite de semilla de algodón o aceite de oliva, y se la inyecta por medio de una bomba de desplazamiento positivo en gelatina fundida, de modo de formar cápsulas de gelatina blandas que contienen 100 mg de ingrediente activo. Las cápsulas se lavan y secan. Puede disolverse el ingrediente activo en una mezcla de polietilenglicol, glicerina y sorbitol para preparar una mezcla medicinal miscible con agua.

Tabletas. Se prepara una gran cantidad de tabletas empleando procedimientos convencionales, de modo que la unidad de dosificación comprende 100 mg de ingrediente activo, 0,2 mg de dióxido de silicio coloidal, 5 mg de estearato de magnesio, 275 mg de celulosa microcristalina, 11 mg de almidón y 98,8 mg de lactosa. Pueden aplicarse recubrimientos acuosos y no acuosos

apropiados para incrementar la palatabilidad, mejorar la elegancia y la estabilidad o demorar la absorción.

Tabletas/cápsulas de liberación inmediata. Son formas de dosificación sólidas orales elaboradas mediante procesos convencionales y novedosos. Estas unidades se toman por vía oral sin agua para una disolución y una administración inmediata de la medicación. Se mezcla el ingrediente activo en un líquido que contiene un ingrediente, tal como azúcar, gelatina, pectina y edulcorantes. Estos líquidos se solidifican en tabletas o cápsulas sólidas mediante técnicas de secado por congelamiento y extracción en estado sólido. Los compuestos de droga pueden comprimirse con azúcares y polímeros viscoelásticos y termoelásticos para producir matrices porosas de liberación inmediata que no requieren agua.

Terapias de combinación

En la presente invención, el término “combinación” se usa con el significado conocido para las personas con experiencia en el arte y puede estar presente como una combinación fija, una combinación no fija o un conjunto de elementos.

En la presente invención, una “combinación fija” se usa con el significado conocido para las personas con experiencia en el arte y se define como una

combinación donde dicho primer ingrediente activo y dicho segundo ingrediente activo están presentes juntos en una unidad de dosificación o como una única entidad. Un ejemplo de una “combinación fija” es una composición farmacéutica donde dicho primer ingrediente activo y dicho segundo ingrediente activo están presentes en combinación para una administración simultánea, como por ejemplo en una formulación. Otro ejemplo de “combinación fija” es una combinación farmacéutica donde dicho primer ingrediente activo y dicho segundo ingrediente activo están presentes en una unidad sin estar formando parte de una combinación.

En la presente invención, una combinación no fija o “conjunto de elementos” se usa con el significado conocido para las personas con experiencia en el arte y se define como una combinación donde dicho primer ingrediente activo y dicho segundo ingrediente activo están presentes en más de una unidad. Un ejemplo de una combinación no fija o un conjunto de elementos es una combinación donde dicho primer ingrediente activo y dicho segundo ingrediente activo están presentes por separado. Los componentes de la combinación no fija o el conjunto de elementos se puede administrar por separado, en forma secuencial, simultáneamente, de manera concurrente o escalonada cronológicamente.

Los compuestos de esta invención pueden administrarse como el único agente farmacéutico o en combinación con uno o más agentes farmacéuticos adicionales, donde la combinación no posee efectos adversos inaceptables. La presente invención también está relacionada con las combinaciones de este tipo. Por ejemplo, pueden combinarse los compuestos de esta invención con agentes quimioterapéuticos o anticancerígenos, por ejemplo, anti-hiperproliferativos conocidos o con agentes para tratar otras indicaciones, y semejantes, así como con mezclas y combinaciones de éstos. Otros agentes que se pueden indicar incluyen, pero en un sentido no limitativo, agentes anti-angiogénicos, inhibidores mitóticos, agentes alquilantes, antimetabolitos, antibióticos intercaladores de ADN, inhibidores de factores de crecimiento, inhibidores del ciclo celular, inhibidores de enzimas, inhibidores de topoisomerasa, inhibidores de proteasoma, modificadores de la respuesta biológica o antihormonas.

Los términos “agente quimioterapéutico” y “agente anticancerígeno” hacen referencia, sin limitaciones, a los agentes que se detallan a continuación: ^{131}I-chTNT, abarelix, abiraterona, aclarubicina, aldesleuquina alemtuzumab, alitretinoína, altretamina,

aminoglutetimida, amrubicina, amsacrina, anastrozol, arglabina, trióxido de arsénico, asparaginasa, azacitidina, basiliximab, BAY 80-6946, BAY 1000394, BAY 86-9766 (RDEA 119), belotecano, bendamustina, bevacizumab, bexaroteno, bicalutamida, bisantreno, bleomicina, bortezomib, buserelina, busulfán, cabazitaxel, folinato de calcio, levofolinato de calcio, capecitabina, carboplatino, carmofur, carmustina, catumaxomab, celecoxib, celmoleuquina cetuximab, clorambucilo, clormadinona, clormetina, cisplatino, cladribina, ácido clodrónico, clofarabina, crisantaspasa, ciclofosfamida, ciproterona, citarabina, dacarbazina, dactinomicina, darbepoyetina alfa, dasatinib, daunorubicina, decitabina, deforolimus, degarelix, denileuquina diftitox, denosumab, deslorelina, cloruro de dibrospidio, docetaxel, doxifluridina, doxorubicina, doxorubicina + estrona, eculizumab, edrecolomab, acetato de eliptinio, eltrombopag, endostatina, enocitabina, enzastaurina, epirubicina, epitioestanol, epoyetina alfa, epoyetina beta, eptaplatino, eribulina, erlotinib, estradiol, estramustina, etopósido, everolimus, exemestano, fadrozol, filgrastim, fludarabina, fluorouracilo, flutamida, formestano, fotemustina, fulvestrant, nitrato de galio, ganirelix, gefitinib, gemcitabina,

gemtuzumab, glutoxim, goserelina, diclorhidrato de histamina, histrelina, hidroxicarbamida, semillas de I-^{125}, ácido ibandrónico, ibritumomab tiuxetano, idarubicina, ifosfamida, imatinib, imiquimod, improsulfán, interferón alfa, interferón beta, interferón gamma, ipilimumab, irinotecano, ixabepilona, lanreotide, lapatinib, larotaxel, lenalidomide, lenograstim, lentinan, letrozol, leuprorelina, levamisole, lisuride, lobaplatino, lomustina, lonidamina, masoprocol, medroxiprogesterona, megestrol, melfalán, mepitioestano, mercaptopurina, metotrexato, metoxsalén, aminolevulinato de metilo, metiltestosterona, mifamurtide, miltefosina, miriplatino, mitobronitol, mitoguazona, mitolactol, mitomicina, mitotane, mitoxantrona, nedaplatino, nelarabina, nilotinib, nilutamida, nimotuzumab, nimustina, nitracrina, novolimus, ofatumumab, omeprazol, oprelvekin, oxaliplatino, terapia con el gen p53, paclitaxel, palifermina, semilla de paladio-^{103}, ácido pamidrónico, panitumumab, pazopanib, pegaspargasa, PEG-epoyetina beta (metoxi PEG-epoyetina beta), pegfilgrastim, peginterferón alfa-2b, pemetrexed, pentazocina, pentostatina, peplomicina, perfosfamida, perifosina, picibanilo, pirarubicina, plerixafor, plicamicina, poliglusam, fosfato de

poliestradiol, polisacárido-K, porfímero sódico, pralatrexato, prednimustina, procarbazina, quinagolida, raloxifeno, raltitrexed, ranimustina, rapamicina, razoxano, regorafenib, ácido risedrónico, rituximab, romidepsina, romiplostim, sagopilona, sargramostim, selumetinib, sipuleucel-T, sizofirano, sobuzoxano, glicididazol sodio, sorafenib, estreptozocina, sunitinib, talaporfina, tamibaroteno, tamoxifeno, tasonermino, teceleuquina tegafur, tegafur + gimeracilo + oteracilo, temoporfina, temozolomida, temsirolimus, tenipósido, testosterona, tetrofosmina, talidomida, tiotepa, timalfasina, tioguanina, tocilizumab, topotecano, toremifeno, tositumomab, trabectedina, trametinib, trastuzumab, treosulfano, tretinoína, triciribina, trilostano, triptorelina, trofosfamida, triptofano, ubenimex, valrubicina, vandetanib, vapreotida, vemurafenib, vinblastina, vincristina, vindesina, vinflunina, vinorelbina, vorinostat, vorozol, itrio-^{90} microesferas de vidrio, zinostatina, zinostatina estimalámero, ácido zoledrónico, zorubicina, zotarolimus, ARRY-162, ARRY-300, ARRY-704, AS-703026, AZD-5363, AZD-8055, BEZ-235, BGT-226, BKM-120, BYL-719, CAL-101, CC-223, CH-5132799, E-6201, GDC-0032, GDC-0068, GDC-0623, GDC-0941, GDC-0973, GDC-0980, GSK-2110183, GSK-2126458, GSK-2141795,

INK128, MK-2206, OSI-027, PF-04691502, PF-05212384, PX-866, RG-7167, RO-4987655, RO-5126766, TAK-733, UCN-01, WX-554, XL-147, XL-765, ZSTK-474.

Los términos “agente quimioterapúetico” y “agente anticancer” también incluyen compuestos terapéuticos de proteínas tales como un interferón (por ejemplo, interferón alfa, beta, o gamma) anticuerpos monoclonales supraagonista, Tuebingen, vacuna de la proteína TRP-1, Colostrinina, anticuerpo anti-FAP, YH-16, gemtuzumab, infliximab, cetuximab, trastuzumab, denileuquina diftitox, rituximab, timosina alfa 1, bevacizumab, mecasermina, mecasermina rinfabato, oprelvequina, natalizumab, rhMBL, MFE-CP1 + ZD-2767-P, ABT-828, inmunotoxina específica de ErbB2, SGN-35, MT-103, rinfabato, AS-1402, B43-genisteína, compuestos radioinmunoterapéuticos basados en L-19, AC-9301, vacuna NY-ESO-1, IMC-1C11, CT-322, rhCC10, r(m)CRP, MORAb-009, aviscumina, MDX-1307, vacuna Her-2, APC-8024, NGR-hTNF, rhH1,3, IGN-311, Endostatina, volociximab, PRO-1762, lexatumumab, SGN-40, pertuzumab, EMD-273063, proteína de fusión L19-IL-2, PRX-321, CNTO-328, MDX-214, tigapotide, CAT-3888, labetuzumab, lintuzumab ligado a radioisótopos emisores de partículas alfa, EM-1421, vacuna HiperAcute, tucotuzumab celmoleuquina, galiximab, HPV-16-E7,

Javelin: cáncer de próstata, Javelin: melanoma, vacuna NY-ESO-1, vacuna EGF, CYT-004-MelQbG10, péptido WT1, oregovomab, ofatumumab, zalutumumab, cintredequina besudotox, WX-G250, Albuferón, aflibercept, denosumab, vacuna, CTP-37, efungumab o 131I-chTNT-1/B.

Los términos “agente quimioterapúetico” y “agente anticancer” también incluyen anticuerpos monoclonales de utilidad como compuestos terapéuticos de proteínas tales como muromonab-CD3, abciximab, edrecolomab, daclizumab, gentuzumab, alemtuzumab, ibritumomab, cetuximab, bevicizumab, efalizumab, adalimumab, omalizumab, muromomab-CD3, rituximab, daclizumab, trastuzumab, palivizumab, basiliximab e infliximab.

En general, el uso de agentes citotóxicos y/o citostáticos en combinación con un compuesto o una composición de la presente invención contribuirá a:

(1) obtener una mayor eficacia en la reducción del crecimiento de un tumor, o aún permitirá eliminar el tumor, en comparación con la administración de cada agente por separado,

(2) poder administrar menores cantidades de los agentes quimioterapéuticos empleados,

(3) proporcionar un tratamiento quimioterapéutico que sea bien tolerado en el paciente, con menos complicaciones farmacológicas perjudiciales que las

observadas con quimioterapias con agentes individuales y otras terapias de combinación,

(4) poder tratar un espectro más amplio de distintos tipos de cáncer en mamíferos, especialmente humanos,

(5) obtener una tasa de respuesta más elevada entre los pacientes tratados,

(6) obtener un tiempo de supervivencia más largo entre los pacientes tratados, en comparación con los tratamientos quimioterapéuticos convencionales,

(7) lograr un tiempo de progresión tumoral más prolongado, y/u

(8) obtener resultados de eficacia y tolerabilidad al menos tan buenos como los obtenidos con el uso de los agentes por separado, en comparación con las instancias conocidas donde otras combinaciones de agentes anti-cáncer produzcan efectos de antagonismo.

Métodos para sensibilizar células a la radiación

En una forma de realización distinta de la presente invención, se puede usar un compuesto de acuerdo con la presente invención para sensibilizar una célula a la radiación. Es decir, el tratamiento de una célula con un compuesto de acuerdo con la presente invención antes de tratar la célula con radiación vuelve a la célula más susceptible a los daños del ADN y a la muerte celular de lo que sería en ausencia de

cualquier tratamiento con un compuesto de acuerdo con la invención. En un aspecto, la célula es tratada con al menos un compuesto de acuerdo con la invención.

Por consiguiente, la presente invención también provee un método para matar una célula, donde a dicha célula se le administra uno o más compuestos de acuerdo con la invención en combinación con una terapia convencional de radiación.

La presente invención también provee un método para volver una célula más susceptible a la muerte celular, donde la célula es tratada con uno o más compuestos de acuerdo con la invención antes de tratar la célula para causar o inducir muerte celular. En un aspecto, después de tratar la célula con uno o más compuestos de acuerdo con la invención, la célula es tratada con al menos un compuesto, o mediante al menos un método, o una combinación de ambos, con el fin de causar daño en el ADN con el propósito de inhibir la función de la célula normal o de matar la célula.

En una forma de realización, se mata una célula mediante tratamiento de dicha célula con al menos un agente perjudicial para el ADN. Es decir, después de tratar una célula con uno o más compuestos de acuerdo con la invención para sensibilizar la célula a la muerte celular, la célula es tratada con al menos un

agente perjudicial para el ADN para matar a la célula. Los agentes perjudiciales para el ADN de utilidad en la presente invención incluyen, pero en un sentido no limitativo, agentes quimioterapéuticos (por ejemplo, cisplatino), radiación ionizante (rayos X, radiación ultravioleta), agentes carcinogénicos y agentes mutagénicos.

En otra realización, se mata una célula mediante tratamiento de la célula con al menos un método que causa o induce daño en el ADN. Dichos métodos incluyen, pero en un sentido no limitativo, activación de una vía de señalización celular que da como resultado daños en el ADN cuando la vía es activada, inhibición de una vía de señalización celular que da como resultado daños en el ADN cuando la vía es inhibida e inducción de un cambio bioquímico en una célula, donde dicho cambio da como resultado daños en el ADN. A modo de ejemplo no limitativo, se puede inhibir una vía de reparación de ADN en una célula, impidiendo de esa manera la reparación del daño en el ADN y dando como resultado una acumulación anormal de daños en el ADN en una célula.

En un aspecto de la invención, se administra un compuesto de acuerdo con la invención a una célula antes de aplicar radiación u otra inducción de daño del

ADN en la célula. En otro aspecto de la invención, se administra un compuesto de acuerdo con la invención a una célula de manera concomitante con una radiación u otra inducción de daño del ADN en la célula. En aún otro aspecto de la invención, se administra un compuesto de acuerdo con la invención a una célula de manera inmediatamente después que ha comenzado una radiación u otra inducción de daño del ADN en la célula.

En otro aspecto, la célula es in vitro. En otra realización, la célula es in vivo.

Tal como se mencionó con anterioridad, sorprendentemente se ha descubierto que los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden inhibir de manera efectiva la quinasa MKNK, por lo que pueden ser apropiados en el tratamiento o la profilaxis de aquellas enfermedades que están relacionadas con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada, particularmente donde el crecimiento, la proliferación y/o la supervivencia sin control de las células, la respuesta inmune celular inapropiada o la respuesta inflamatoria inapropiada están mediados por la vía MKNK, más particularmente donde las enfermedades

que están relacionadas con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada abarcan los tumores hematológicos, los tumores sólidos o las metástasis de éstos, por ejemplo, la leucemia, el síndrome mielodisplástico, el linfoma maligno, los tumores en la cabeza o en el cuello, lo que abarca los tumores y las metástasis en el cerebro, los tumores en el tórax, lo que abarca los tumores que afectan a las células pulmonares no pequeñas o pequeñas, los tumores gastrointestinales, los tumores endocrinos, los tumores mamarios, los tumores ginecológicos de otro tipo, los tumores urológicos, lo que abarca los tumores en los riñones, en la vejiga y en la próstata, los tumores en la piel, los sarcomas y las metástasis de éstos.

Por lo tanto, de acuerdo con otro aspecto, la presente invención está relacionada con un compuesto de la fórmula general (I) que es como se lo describe y se lo define en la presente, con un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal de éste, particularmente con una sal farmacéuticamente aceptable de éste, o con una mezcla que lo comprende, que es de utilidad en el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad como las que se mencionaron con

anterioridad.

Otro aspecto particular de la presente invención está relacionado con el uso de un compuesto de la fórmula general (I) que es como se lo describió con anterioridad, de un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal de éste, particularmente de una sal farmacéuticamente aceptable de éste, o de una mezcla que lo comprende, en la profilaxis o el tratamiento de una enfermedad.

Otro aspecto particular de la presente invención está relacionado con el uso de un compuesto de la fórmula general (I), que es como se lo describió con anterioridad, en la manufactura de una composición farmacéutica que es de utilidad en el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad.

Las enfermedades que se mencionaron en dos párrafos precedentes son enfermedades que están relacionadas con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada, o bien son enfermedades que están acompañadas por un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, por una respuesta inmune celular inapropiada o por una respuesta inflamatoria

inapropiada, particularmente donde el crecimiento, la proliferación y/o la supervivencia sin control de las células, el crecimiento, la proliferación y/o la supervivencia sin control de las células, la respuesta inmune celular inapropiada o la respuesta inflamatoria inapropiada están mediados por la vía MKNK, lo que abarca, por ejemplo, los tumores hematológicos, los tumores sólidos o las metástasis de éstos, por ejemplo, la leucemia, el síndrome mielodisplástico, el linfoma maligno, los tumores en la cabeza o en el cuello, lo que abarca los tumores y las metástasis en el cerebro, los tumores en el tórax, lo que abarca los tumores que afectan a las células pulmonares no pequeñas o pequeñas, los tumores gastrointestinales, los tumores endocrinos, los tumores mamarios, los tumores ginecológicos de otro tipo, los tumores urológicos, lo que abarca los tumores en los riñones, en la vejiga y en la próstata, los tumores en la piel, los sarcomas y las metástasis de éstos.

Tal como se lo emplea en la presente, el término “inapropiado”, particularmente en el contexto de una “respuesta inmune celular inapropiada o una respuesta inflamatoria inapropiada”, preferiblemente hace referencia a una respuesta que es menor o mayor que la normal, que está asociada a la patología de una

enfermedad como las que se mencionan en la presente, que es responsable de dicha patología o que da como resultado patología.

Preferiblemente, el uso es en el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad, donde dicha enfermedad es un tumor hematológico, un tumor sólido o una metástasis de éstos.

Método para tratar trastornos de hiperproliferación

La presente invención está relacionada con un método para usar los compuestos de acuerdo con la presente invención y composiciones con los mismos, en el tratamiento de trastornos hiperproliferativos de mamífero. Los compuestos se pueden utilizar para inhibir, bloquear, reducir, disminuir, etc., la proliferación celular y/o división celular y/o produce apoptosis. Este método comprende administrarle a un mamífero que lo necesita, incluyendo un ser humano, una cantidad de un compuesto de esta invención, o una sal farmacéuticamente aceptable, isómero, forma polimórfica, metabolito, hidrato, solvato o éster de ésta; etc. que sea eficaz para tratar el trastorno. Los trastornos hiperproliferativos incluyen, pero sin limitaciones, por ejemplo, psoriasis, queloides y otras hiperplasias que afectan a la piel, hiperplasia de próstata benigna (BPH), tumores sólidos, tales como

cáncer de mama, del tracto respiratorio, cerebro, órganos reproductores, tracto digestivo, tracto urinario, ojos, hígado, piel, cabeza y cuello, tiroides, paratiroides y sus metástasis distantes. Estos trastornos también incluyen linfoma, sarcomas y leucemias.

Los ejemplos de cáncer de mama incluyen, sin limitaciones, carcinoma ductal invasivo, carcinoma lobular invasivo, carcinoma ductal in situ y carcinoma lobular in situ.

Los ejemplos de cánceres del tracto respiratorio incluyen, sin limitaciones, carcinomas de las células pulmonares pequeñas y no pequeñas, así como adenomas bronquiales y blastomas pleuropulmonares.

Los ejemplos de cánceres de cerebro incluyen, sin limitaciones gliomas del tallo cerebral y el hipotálamo, astrocitoma cerebelar y cerebral, meduloblastoma, ependimoma, así como tumores neuroectodermales y pineales.

Los tumores de los órganos reproductivos masculinos incluyen, sin limitaciones, cáncer de próstata y testicular. Los tumores de los órganos reproductivos femeninos incluyen, sin limitaciones, cáncer del endometrio, cervical, ovárico, vaginal y vulvar, así como sarcoma de útero.

Los tumores del tracto digestivo incluyen, sin limitaciones, cánceres anales, de colon, colorrectales, esofágico, de vejiga, gástricos, pancreáticos, rectales, del intestino delgado y de las glándulas salivales.

Los tumores del tracto urinario incluyen, pero en un sentido no limitativo, cáncer de vejiga, pene, riñón, pelvis renal, uréter, uretral y papilar renal humano.

Los cánceres oculares incluyen, sin limitaciones, melanoma intraocular y retinoblastoma.

Los ejemplos de cánceres hepáticos incluyen, sin limitaciones, carcinoma hepatocelular (carcinomas de células hepáticas con o sin variantes fibrolamelares), colangiocarcinoma (carcinoma del conducto biliar intrahepático) y colangiocarcinoma hepatocelular mixto.

Los cánceres de piel incluyen, sin limitaciones, carcinoma de células escamosas, sarcoma de Kaposi, melanoma maligno, cáncer de células cutáneas de Merkel y cáncer cutáneo distinto del melanoma.

Los distintos tipos de cáncer de cabeza y cuello incluyen, pero en un sentido no limitativo, de laringe, de hipofaringe, nasofaringeo, orofaringeo, labio y de la cavidad oral y de células escamosas. Los linfomas incluyen, pero en un sentido no limitativo, linfoma

relacionado con SIDA, linfoma no Hodgkin, linfoma de linfocitos T cutáneo, linfoma de Burkitt, enfermedad de Hodgkin y linfoma del sistema nervioso central.

Los sarcomas incluyen, sin limitaciones, sarcoma de los tejidos blandos, osteosarcoma, histiocitoma fibroso maligno, linfosarcoma y rabdomiosarcoma.

Las leucemias incluyen, sin limitaciones, leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crónica, leucemia mielógena crónica y leucemia de las células pilosas.

Estos trastornos han sido todos bien caracterizados en humanos, pero también existen con una etiología similar en otros mamíferos, y pueden tratarse administrando las composiciones farmacéuticas de la presente invención.

El término “tratando” o “tratamiento”, según se estableció en todo este documento de usa de la manera convencional, por ejemplo, el manejo o cuidado de un sujeto con el propósito de combatir, aminorar, reducir, aliviar, mejorar la condición, etc., de una enfermedad o trastorno, tal como un carcinoma.

Métodos de tratamiento de trastornos por quinasas

La presente invención también provee métodos para el tratamiento de los trastornos asociados con una actividad de quinasa extracelular regulada por

mitógenos aberrante, incluyendo, pero sin limitaciones, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, cardiomegalia, diabetes, mal de Alzheimer, fibrosis quística, síntomas de rechazo de xenoinjerto, shock séptico o asma.

Las cantidades eficaces de los compuestos de acuerdo con la presente invención se pueden usar para tratar dichos trastornos, incluyendo las enfermedades (por ejemplo, cáncer) mencionadas antes en la sección de Antecedentes. Sin embargo, dichos tipos de cáncer y otras enfermedades se pueden tratar con los compuestos de acuerdo con la presente invención, independientemente del mecanismo de acción y/o la relación entre la quinasa y el trastorno.

La frase “actividad de quinasa aberrante” o “actividad serintreonina quinasa aberrante” incluye cualquier expresión o actividad anormal del gen que codifica la quinasa o del polipéptido codificado por el mismo. Los ejemplos de dicha actividad aberrante incluyen, pero en un sentido no limitativo, la sobreexpresión del gen o polipéptido; la amplificación del gen; mutaciones que producen una actividad de quinasa constitutivamente activa o hiperactiva; mutaciones de genes, supresiones, sustituciones, adiciones, etc.

La presente invención también provee métodos para inhibir una actividad de quinasa, en especial de una quinasa extracelular regulada por mitógenos, que comprende administrar una cantidad eficaz de un compuesto de acuerdo con la presente invención, incluyendo sales, formas polimórficas, metabolitos, hidratos, solvatos, prodrogas (por ejemplo: ésteres) de éste, y formas diaestereoisoméricas de éste. La actividad de quinasa se puede inhibir en células (por ejemplo, *in vitro*), o en las células de un sujeto mamífero, en especial un paciente humano que necesita de dicho tratamiento.

Dosis y administración

Sobre la base de las técnicas de laboratorio estándar conocidas para evaluar los compuestos de utilidad en el tratamiento de trastornos hiperproliferativos y trastornos angiogénicos, mediante pruebas de toxicidad estándar y mediante ensayos farmacológicos estándar para determinar el tratamiento de las condiciones identificadas previamente en mamíferos, y por comparación de estos resultados con los resultados de los medicamentos conocidos que se usan para tratar estas condiciones, la dosificación eficaz de los compuestos de esta invención puede determinarse fácilmente para el tratamiento de cada

indicación deseada. La cantidad de ingrediente activo a administrar en el tratamiento de una de estas condiciones puede variar ampliamente de acuerdo con dichas consideraciones, tales como el compuesto particular y la unidad de dosificación empleada, el modo de administración, el período de tratamiento, la edad y el sexo del paciente tratado, y la naturaleza y la extensión de la condición a tratar.

La cantidad total de ingrediente activo que será administrada varía en general en el rango entre aproximadamente 0,001 mg/kg y aproximadamente 200 mg/kg de peso corporal por día y preferentemente entre aproximadamente 0,01 mg/kg y aproximadamente 20 mg/kg de peso corporal por día. Los programas de dosificación clínicamente útiles varían en un rango entre una dosificación de una a tres veces por día y una dosificación una vez cada cuatro semanas. Además, el “descanso de la droga" durante el cual un paciente no recibe dosis de la droga por un período de tiempo determinado, puede ser beneficioso para el balance global entre efecto farmacológico y la capacidad de tolerancia. Una dosificación unitaria puede contener entre aproximadamente 0,5 mg y aproximadamente 1500 mg de ingrediente activo, y puede ser administrada una o más veces por día o menos que una vez por día. La

dosificación diaria promedio para una administración por inyección, incluyendo inyecciones intravenosas, intramusculares, subcutáneas y parenterales, y el uso de técnicas de infusión, será preferiblemente de entre 0,01 y 200 mg/kg de peso corporal total. El régimen de dosificación diaria rectal promedio será preferiblemente de entre 0,01 y 200 mg/kg de peso corporal total. El régimen de dosificación diaria vaginal promedio será preferiblemente de entre 0,01 y 200 mg/kg de peso corporal total. El régimen de dosificación diaria tópica promedio será preferiblemente de entre 0,1 y 200 mg, donde las dosis se administran entre una y cuatro veces por día. La concentración transdérmica será preferentemente la que se requiere para mantener una dosis diaria entre 0,01 y 200 mg/kg. El régimen de dosificación diaria promedio por inhalación comprenderá preferentemente entre 0,01 y 100 mg/kg de peso corporal total.

Por supuesto, el régimen de dosificación inicial y continuo específico para cada paciente varía de acuerdo con la naturaleza y severidad de la afección como lo podrá determinar el médico a cargo del paciente, con la actividad del compuesto específico empleado, la edad y condición general del paciente, el tiempo de administración, la ruta de administración, la velocidad

de excreción de la droga, las combinaciones de droga y semejantes. El modo de tratamiento deseado y la cantidad de dosis de un compuesto de acuerdo con la presente invención, o una sal, un éster o una composición farmacéuticamente aceptable de éste, pueden ser evaluados por aquellos versados en la técnica, usando pruebas de tratamiento convencionales.

Preferiblemente, la enfermedad que puede tratarse con el método mencionado es un tumor hematológico, un tumor sólido o una metástasis de éstos.

Los compuestos de acuerdo con la presente invención se pueden usar en particular en terapias y prevención, es decir, profilaxis, del crecimiento y metástasis de tumores, especialmente de los tumores sólidos de todas las indicaciones y etapas con o sin pretratamiento del crecimiento tumoral.

Aquellos versados en la técnica han de conocer métodos apropiados para analizar una propiedad farmacológica o farmacéutica particular.

Los experimentos de ensayo de ejemplos descritos en la presente sirven para ilustrar la presente invención y la invención no está limitada a los ejemplos dados.

Ensayos biológicos

Se analizaron ejemplos de los compuestos en una o

más ocasiones mediante el uso de ensayos biológicos seleccionados. Cuando el análisis se realizó más de una vez, los datos se informan como el promedio o la mediana de los valores, donde

- el valor del promedio, que también se conoce como la media aritmética, representa la suma de los valores obtenidos, dividida por la cantidad de ocasiones en las que se efectuó el análisis, y
- el valor de la mediana representa la cifra que se encuentra en el medio del grupo de valores ordenados de manera ascendiente o descendiente: si la cantidad de valores en el conjunto de datos es impar, la mediana es el valor del medio, mientras que si es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores del medio.

Los compuestos de los ejemplos fuero sintetizados en una o más ocasiones. Cuando se los sintetizó más de una vez, los datos de los análisis biológicos representan los valores de los promedios o de las medianas, que se calcularon sobre la base de los conjuntos de datos que se obtuvieron al analizar los diversos lotes de síntesis.

Análisis de la quinasa MKNK1

La actividad inhibidora de MKNK1 de los compuestos de acuerdo con la presente invención se cuantificó empleando el ensayo MKNK1 TR-FRET que se describe en

los siguientes párrafos.

Como enzima, se usó una proteína de fusión recombinante que comprendió la glutatión-S-transferasa (el extremo N de la GST) y la quinasa MKNK1 humana completa (los aminoácidos 1-424, T344D, número de acceso BAA 19885.1), que habían sido expresadas en células de insectos mediante el uso de un sistema de expresión en baculovirus y que habían sido purificadas por medio de una cromatografía de afinidad en sefarosa con glutatión, de Carna Biosciences (producto Nº 02-145). Como sustrato para la reacción de la quinasa, se usó el péptido biotinilado biotina-Ahx-IKKRKLTRRKSLKG (con el extremo C en forma de amida), que puede adquirirse, por ejemplo, en la compañía Biosyntan (Berlin-Buch, Alemania).

En el análisis, se colocaron con una pipeta 50 nl de una solución concentrada 100 veces del compuesto de prueba en DMSO en cada cavidad de una placa de microtitulación que comprendió 384 cavidades negras con un volumen bajo (de Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de la quinasa MKNK1 en un amortiguador de ensayo acuoso (que comprendió HEPES 50 mM, pH 7,5, cloruro de magnesio 5 mM, ditiotreitol 1,0 mM y 0,005% (v/v) de Nonidet-P40, de Sigma) y se incubó la mezcla durante 15 minutos a

22ºC, de manera tal de posibilitar la unión preliminar entre los compuestos de prueba y la enzima, antes del inicio de la reacción de la quinasa. Luego se inició la reacción de la quinasa agregando 3 µl de una solución que comprendió trifosfato de adenosina (ATP 16,7 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 10 µM) y el sustrato (0,1 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 0,06 µM) en el amortiguador del ensayo, y se incubó la mezcla resultante a 22ºC durante un período de reacción de 45 minutos. La concentración de la quinasa MKNK1 en el análisis se ajustó en función de la actividad que presentó cada lote de la enzima, y fue apropiada para mantener los resultados del análisis en el rango lineal. La concentración típica fue de aproximadamente 0,05 µg/ml. La reacción se detuvo agregando 5 µl de una solución que comprendió los reactivos de detección para el proceso de TR-FRET (estreptavidina-XL665 5 nM, de Cisbio Bioassays, Codolet, Francia, un anticuerpo contra la proteína ribosomal S6 (pSer236) 1 nM, de Invitrogen, Nº 44921G, y una proteína G marcada con EU-W1024 LANCE 1 nM, de Perkin-Elmer, producto Nº AD0071), en una solución acuosa que comprendió EDTA (más precisamente, comprendió EDTA 100 mM y 0,1 % (p/v) de albúmina de

suero bovino en un amortiguador de HEPES/NaOH 50 mM que presentó un pH de 7,5).

La mezcla resultante se incubó a 1 hora a 22ºC, de manera tal de posibilitar la formación de un complejo entre el péptido biotinilado y los reactivos que se emplearían para la detección. Luego se analizó la cantidad del sustrato que se fosforiló por medio de una determinación de la transferencia de energía de resonancia desde el quelato de Eu hasta la estreptavidina-XL. Por consiguiente, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm, después de una excitación a 350 nm, en un lector de TR-FRET, por ejemplo, un dispositivo Rubystar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). Se tomó la relación entre las emisiones a 665 nm y 622 nm como medida de la cantidad de sustrato peptídico fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de enzima sin inhibidor = 0% de inhibición, todos los demás componentes del ensayo pero sin enzima = 100% de inhibición). Usualmente, los compuestos de prueba se analizaron en la misma placa de microtitulación, en 11 concentraciones diferentes que variaron entre 20 µM y 0,1 nM (20 µM, 5,9 µM, 1,7 µM, 0,51 µM, 0,15 µM, 44 nM, 13 nM, 3,8 nM, 1,1 nM, 0,33 nM y 0,1 nM, la serie de diluciones se preparó por

separado, antes llevar a cabo el análisis con soluciones concentradas 100 veces en DMSO, sobre la base de diluciones en serie de 1:3,4), con cada concentración por duplicado, y el valor de la IC_{50} se determinó sobre la base de un ajuste con 4 parámetros usando un software local.

Análisis de la quinasa MKNK1 en presencia de un nivel elevado de ATP

La actividad de inhibición de los compuestos de acuerdo con la presente invención sobre MKNK1 se determinó después de llevar a cabo una preincubación con MKNK1, en presencia de un nivel elevado de ATP, sobre la base de un análisis de TR-FRET, según se describe a continuación.

Como enzima, se usó una proteína de fusión recombinante que comprendió la glutatión-S-transferasa (el extremo N de la GST) y la quinasa MKNK1 humana completa (los aminoácidos 1-424, T344D, número de acceso BAA 19885.1), que habían sido expresadas en células de insectos mediante el uso de un sistema de expresión en baculovirus y que habían sido purificadas por medio de una cromatografía de afinidad en sefarosa con glutatión, de Carna Biosciences (producto Nº 02-145). Como sustrato para la reacción de la quinasa, se usó el péptido biotinilado biotina-Ahx-IKKRKLTRRKSLKG

(con el extremo C en forma de amida), que puede adquirirse, por ejemplo, en la compañía Biosyntan (Berlin-Buch, Alemania).

En el análisis, se colocaron con una pipeta 50 nl de una solución concentrada 100 veces del compuesto de prueba en DMSO en cada cavidad de una placa de microtitulación que comprendió 384 cavidades negras con un volumen bajo (de Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de la quinasa MKNK1 en un amortiguador de ensayo acuoso (que comprendió HEPES 50 mM, pH 7,5, cloruro de magnesio 5 mM, ditiotreitol 1,0 mM y 0,005% (v/v) de Nonidet-P40, de Sigma) y se incubó la mezcla durante 15 minutos a 22ºC, de manera tal de posibilitar la unión preliminar entre los compuestos de prueba y la enzima, antes del inicio de la reacción de la quinasa. Luego se inició la reacción de la quinasa agregando 3 µl de una solución que comprendió trifosfato de adenosina (ATP 3,3 mM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 2 mM) y el sustrato (0,1 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 0,06 µM) en el amortiguador del ensayo, y se incubó la mezcla resultante a 22ºC durante un período de reacción de 25 minutos. La concentración de la quinasa MKNK1 en el análisis se ajustó en función

de la actividad que presentó cada lote de la enzima, y fue apropiada para mantener los resultados del análisis en el rango lineal. La concentración típica fue de aproximadamente 0,003 µg/ml. La reacción se detuvo agregando 5 µl de una solución que comprendió los reactivos de detección para el proceso de TR-FRET (estreptavidina-XL665 5 nM, de Cisbio Bioassays, Codolet, Francia, un anticuerpo contra la proteína ribosomal S6 (pSer236) 1 nM, de Invitrogen, Nº 44921G, y una proteína G marcada con EU-W1024 LANCE 1 nM, de Perkin-Elmer, producto Nº AD0071), en una solución acuosa que comprendió EDTA (más precisamente, comprendió EDTA 100 mM y 0,1 % (p/v) de albúmina de suero bovino en un amortiguador de HEPES/NaOH 50 mM que presentó un pH de 7,5).

La mezcla resultante se incubó a 1 hora a 22ºC, de manera tal de posibilitar la formación de un complejo entre el péptido biotinilado y los reactivos que se emplearían para la detección. Luego se analizó la cantidad del sustrato que se fosforiló por medio de una determinación de la transferencia de energía de resonancia desde el quelato de Eu hasta la estreptavidina-XL. Por consiguiente, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm, después de una excitación a 350 nm, en un lector de TR-FRET,

por ejemplo, un dispositivo Rubystar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). Se tomó la relación entre las emisiones a 665 nm y 622 nm como medida de la cantidad de sustrato peptídico fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de enzima sin inhibidor = 0% de inhibición, todos los demás componentes del ensayo pero sin enzima = 100% de inhibición). Usualmente, los compuestos de prueba se analizaron en la misma placa de microtitulación, en 11 concentraciones diferentes que variaron entre 20 µM y 0,1 nM (20 µM, 5,9 µM, 1,7 µM, 0,51 µM, 0,15 µM, 44 nM, 13 nM, 3,8 nM, 1,1 nM, 0,33 nM y 0,1 nM, la serie de diluciones se preparó por separado, antes llevar a cabo el análisis con soluciones concentradas 100 veces en DMSO, sobre la base de diluciones en serie, aunque la concentración exacta varió en función de las pipetas que se emplearon), con cada concentración por duplicado, y el valor de la IC_{50} se determinó. Los datos se ilustran en la Tabla 1.

Tabla 1

Ejemplo	**MKNK1 IC_{50} [nM]**	**Ejemplo**	**MKNK1 IC_{50} [nM]**
1	28,1	18	11,1

2	23,8		19	5,8
3	25,9		20	7,8
4	4,2		21	4,2
5	12,2		22	5,4
6	7,3		23	10,4
7	28,9		24	10,7
8	11,5		25	13,8
9	3,0		26	38,2
10	6,6		27	20,3
11	24,1		28	9,8
12	5,0		29	24,7
13	nd		30	50,7
14	2,8		31	59,1
15	28,8		32	49,0
16	52,9		33	90,4
17	32,2		34	2,5

Tabla 1 (continuación,)

Ejemplo	MKNK1 IC_{50} [nM]	Ejemplo	MKNK1 IC_{50} [nM]
35	2,2	71	43,2
36	0,8	72	16,0
37	4,2	73	144,0
38	1,4	74	140,0

39	1,0
40	2,5
41	1,6
42	2,1
43	1,6
44	0,9
45	0,7
46	4,9
47	11,1
48	6,2
49	0,3
50	2,6
51	0,5
52	6,0
53	0,5
54	6,9
55	9,7
56	8,1
57	15,0
58	17,3
59	2,3
60	7,7
61	120,0
62	12,0
63	14,6

75	61,0
76	71,5
77	23,1
78	7,4
79	1350,0
80	23,9
81	16,1
82	3,2
83	6,9
84	3,6
85	4,5
86	7,1
87	10,5
88	8,0
89	5,9
90	5,2
91	3,1
92	15,4
93	13,5
94	8,2
95	18,0
96	18,8
97	47,6
98	15,8
99	14,5

64	4,2		100	3,7
65	2,8		101	4,6
66	8,3		102	27,0
67	15,2		103	35,8
68	10,1		104	28,7
69	19,8		105	18,1
70	40,7		106	20,4

Tabla 1 (continuación)

Ejemplo	MKNK1 IC_{50} [nM]		Ejemplo	MKNK1 IC_{50} [nM]
107	13,3		126	171,0
108	0,7		127	76,8
109	0,7		128	621,0
110	0,4		129	4290,0
111	1,3		130	212,0
112	4,6		131	6,7
113	3,3		132	23,4
114	4,6		133	150,0
115	6,9		134	10,8
116	2,1		135	7,3
117	1,4		136	0,5
118	8,1		137	203,0
119	67,7		138	114,0

120	14,5
121	30,1
122	237,0
123	230,0
124	65,9
125	29,2

139	4,7
140	2,4
141	1,2
142	11,8
143	0,7

Ensayo de quinasa MKNK con alto contenido de ATP

Se cuantificó la actividad inhibidora de MKNK con alto contenido de ATP de compuestos de la presente invención después de su preincubación con MKNK empleando el ensayo de MKNK con alto contenido de ATP basado en TR-FRET según se describe en los siguientes párrafos.

Se adquirió de Invitrogen (producto Nº PV5608) una proteína de fusión recombinante de Glutationa-S-Transferasa (GST, N-terminal) y MKNK humana de longitud completa (número de acceso de Genbank NP_ 060042,2), expresada en células de insecto usando un sistema de expresión de baculovirus, purificada por cromatografía por afinidad en glutationa sefarosa, y activada *in vitro* con MAPK12, y se utilizó como enzima. Como sustrato para la reacción con quinasa se utilizó el péptido biotinilado biotina-Ahx-IKKRKLTRRKSLKG (C terminal en forma de amida) que se puede adquirir por

ejemplo de la compañía Biosyntan (Berlin-Buch, Alemania).

Para el ensayo, se pipetearon 50 nl de una solución concentrada 100x del compuesto de prueba en DMSO en una placa de microtítulo negra de bajo volumen, de 384 pocillos (Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de MKNK en solución acuosa amortiguadora de pH de ensayo [HEPES 50 mM pH 7,5, $MgCl_2$ 5 mM, ditiotreitol 1,0 mM, 0,005% (v/v) Nonidet-P40 (G-Biosciences, St. Louis, EE.UU.)] y la mezcla se incubó durante 15 min a 22ºC para permitir la pre-unión de los compuestos de prueba a la enzima antes del inicio de la reacción con quinasa. Luego, la reacción con quinasa se inició por agregado de 3 µl de una solución de adenosina-tri-fosfato (ATP, 3,3 mM => la concentración final en el volumen de ensayo de 5 µl era 2 mM) y sustrato (0,1 µM => la concentración final en el volumen de ensayo de 5 µl era 0,06 µM) en solución amortiguadora de pH de ensayo y la mezcla resultante se incubó durante un tiempo de reacción de 30 min a 22ºC. Se ajustó la concentración de MKNK, dependiendo de la actividad del lote de enzima y se seleccionó de manera que fuese apropiada para conservar al ensayo en el rango lineal, las concentraciones típicas estuvieron dentro del rango de 0,0045 µg/ml. La

reacción se detuvo por agregado de 5 µl de una solución de reactivos de detección para TR-FRET (estreptavidina-XL665 5 nM [Cisbio Bioassays, Codolet, Francia] y anticuerpo anti-proteína ribosómica S6 (pSer236) 1 nM de Invitrogen [# 44921G] y ProteínaG marcada LANCE EU-W1024 1 nM [Perkin-Elmer, producto Nº AD0071]) en un solución acuosa de EDTA (EDTA 100 mM, 0,1 % (p/v) albúmina de suero bovino en HEPES 50 mM pH 7,5).

La mezcla resultante se incubó durante 1 h a 22ºC para permitir la formación del complejo entre el péptido biotinilado fosforilado y los reactivos de detección. Subsiguientemente, se evaluó la cantidad de sustrato fosforilado por medición de la transferencia de la energía de resonancia del quelato con Eu a la estreptavidina-XL665. Por lo tanto, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm después de la excitación a 350 nm en n lector de TR-FRET, por ejemplo un aparato Ferastar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). La proporción entre las emisiones a 665 nm y a 622 nm se tomó como la medida de la cantidad de sustrato fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de la enzima sin inhibidor = 0 % de inhibición, de todos los otros componentes del ensayo pero sin enzima = 100 % de inhibición). Usualmente los compuestos de prueba se

probaron en la misma placa de microtítulo a 11 diferentes concentraciones en el rango de entre 20 µM y 0,1 nM (por ejemplo 20 µM, 5,9 µM, 1,7 µM, 0,51 µM, 0,15 µM, 44 nM, 13 nM, 3,8 nM, 1,1 nM, 0,33 nM y 0,1 nM, preparando las series de dilución por separado antes del ensayo desde el nivel de las soluciones concentradas 100x en DMSO por diluciones en serie, las concentraciones exactas pueden variar, dependiendo de la pipeta que se utilice) en valores por duplicado para cada concentración y se calcularon los valores IC_{50}.

Ensayo de EGFR quinasa

La actividad inhibidora de EGFR de los compuestos de la presente invención se cuantificó empleando el ensayo de EGFR basado en TR-FRET según se describe en los siguientes párrafos.

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) purificado por afinidad por las células A431 de carcinoma humano (Sigma-Aldrich, # E3641) se usó como quinasa. Como sustrato para la reacción con quinasa se usó el péptido biotinilado biotina-Ahx-AEEEEYFELVAKKK (C terminal en forma de amida) que se puede adquirir por ejemplo de la compañía Biosynthan GmbH (Berlin-Buch, Alemania).

Para el ensayo se pipetearon 50 nL de una solución concentrada 100x del compuesto de prueba en DMSO en una

placa de microtítulo negra de bajo volumen, de 384 pocillos (Greiner Bio-one, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µL de una solución acuosa para el ensayo de EGFR [HEPES 50 mM /HCl pH 7,0, $MgCl_2$ 1 mM, $MnCl_2$ 5 mM, orto-vanadato de sodio activado 0,5 mM, 0,005% (v/v) de Tween-20] y la mezcla se incubó durante 15 min a 22ºC para permitir la pre-unión de los compuestos de prueba a la enzima antes del inicio de la reacción con quinasa. Luego, la reacción con quinasa se inició por el agregado de 3 µL de una solución de adenosina-tri-fosfato (ATP, 16,7 µM => la concentración final en el volumen de ensayo de 5 µl era 10 µM) y sustrato (1,67 µM => la concentración final en el volumen de ensayo de 5 µl era 1 µM) en solución amortiguadora de ensayo y la mezcla resultante se incubó durante un tiempo de reacción de 30 min a 22ºC. La concentración de EGFR se ajustó dependiendo de la actividad del lote de enzima y se seleccionó la apropiada para mantener al ensayo en el rango lineal, las concentraciones típicas estuvieron en el rango de 3 U/ml. La reacción se detuvo por agregado de 5 µl de una solución de reactivos de detección de HTRF (estreptavidina-XL665 0,1 µM [Cis Biointernational] y Quelato PT66-Tb 1 nM, un anticuerpo anti-fosfo-tirosina marcado con quelato de terbio de Cis Biointernational [en lugar del quelato PT66-Tb,

también se puede usar criptato PT66-Eu de Perkin Elmer]) en una solución acuosa de EDTA (EDTA 80 mM, albúmina de suero bovino al 0,2 % (p/v) en HEPES 50 mM pH 7,5).

La mezcla resultante se incubó 1 h a 22ºC para permitir la unión del péptido fosforilado biotinilado a la estreptavidina-XL665 y al Quelato de PT66-Eu. Subsiguientemente se evaluó la cantidad de sustrato fosforilado por medición de la transferencia de la energía de resonancia desde el quelato de PT66-Eu a la estreptavidina-XL665. Luego, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm después de la excitación a 337 nm en un lector de HTRF, por ejemplo un aparato Ferastar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). La proporción entre las emisiones a 665 nm y a 622 nm se usó como la medida de la cantidad de sustrato fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de la enzima sin inhibidor = 0 % de inhibición, de todos los otros componentes del ensayo pero sin enzima = 100 % de inhibición). Usualmente los compuestos de prueba se probaron en la misma placa de microtítulo a 11 diferentes concentraciones en el rango de 20 µM a 0,1 nM (por ejemplo 20 µM, 5,9 µM, 1,7 µM, 0,51 µM, 0,15 µM, 44 nM, 13 nM, 3,8 nM, 1,1 nM, 0,33 nM y 0,1 nM, preparando las

series de dilución por separado antes del ensayo en base al nivel de las soluciones concentradas 100x en DMSO por diluciones en serie, las concentraciones exactas pueden variar dependiendo de la pipeta que se use) se calcularon valores por duplicado para cada concentración y los valores IC_{50}.

Análisis de la quinasa CDK2/CycE

La actividad inhibidora de CDK2/CycE de los compuestos de acuerdo con la presente invención se cuantificó empleando el ensayo CDK2/CycE TR-FRET que se describe en los siguientes párrafos.

Las proteínas de fusión recombinantes GST, CDK2 humana, GST y CicE humana se adquirieron en ProQinase GmbH (Freiburg, Alemania). En particular, se trató de proteínas que habían sido expresadas en células de insectos (Sf9) y que habían sido purificadas por medio de una cromatografía de afinidad en sefarosa con glutatión. Como sustrato para la reacción de la quinasa, se usó el péptido biotinilado biotina-Ttds-YISPLKSPYKISEG (con el extremo C en forma de amida), que puede adquirirse, por ejemplo, en la compañía JERINI Peptide Technologies (Berlin, Alemania).

En el análisis, se colocaron con una pipeta 50 nl de una solución concentrada 100 veces del compuesto de prueba en DMSO en cada cavidad de una placa de

microtitulación que comprendió 384 cavidades negras con un volumen bajo (de Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de la quinasa CDK2/CycE en un amortiguador de ensayo acuoso (que comprendió HEPES 50 mM, pH 8,0, cloruro de magnesio 10 mM, ditiotreitol 1,0 mM, ortovanadato de sodio 0,1 mM y 0,01% (v/v) de Nonidet-P40, de Sigma) y se incubó la mezcla durante 15 minutos a 22ºC, de manera tal de posibilitar la unión preliminar entre los compuestos de prueba y la enzima, antes del inicio de la reacción de la quinasa. Luego se inició la reacción de la quinasa agregando 3 µl de una solución que comprendió trifosfato de adenosina (ATP 16,7 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 10 µM) y el sustrato (1,25 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 0,75 µM) en el amortiguador del ensayo, y se incubó la mezcla resultante a 22ºC durante un período de reacción de 25 minutos. La concentración de la quinasa PDGFRß en el análisis se ajustó en función de la actividad que presentó cada lote de la enzima, y fue apropiada para mantener los resultados del análisis en el rango lineal. La concentración típica fue de aproximadamente 130 ng/ml. La reacción se detuvo agregando 5 µl de una solución

que comprendió los reactivos de detección para el proceso de TR-FRET (estreptavidina-XL665 0,2 µM, de Cisbio Bioassays, Codolet, Francia, un anticuerpo anti-RB(pSer807/pSer811) 1 nM, de BD Pharmingen, Nº 558389, y un anticuerpo anti-ratón del tipo de la IgG LANCE 1,2 nM, que había sido marcado con EU-W1024, de Perkin-Elmer, producto Nº AD0077, aunque en su lugar también puede usarse un anticuerpo anti-ratón del tipo de la IgG marcado con un criptato de terbio de Cisbio Bioassays), en una solución acuosa que comprendió EDTA (más precisamente, comprendió EDTA 100 mM y 0,2 % (p/v) de albúmina de suero bovino en un amortiguador de HEPES/NaOH 100 mM que presentó un pH de 7).

La mezcla resultante se incubó a 1 hora a 22ºC, de manera tal de posibilitar la formación de un complejo entre el péptido biotinilado y los reactivos que se emplearían para la detección. Luego se analizó la cantidad del sustrato que se fosforiló por medio de una determinación de la transferencia de energía de resonancia desde el quelato de Eu hasta la estreptavidina-XL. Por consiguiente, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm, después de una excitación a 350 nm, en un lector de TR-FRET, por ejemplo, un dispositivo Rubystar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux

(Perkin-Elmer). Se tomó la relación entre las emisiones a 665 nm y 622 nm como medida de la cantidad de sustrato peptídico fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de enzima sin inhibidor = 0% de inhibición, todos los demás componentes del ensayo pero sin enzima = 100% de inhibición). Usualmente, los compuestos de prueba se analizaron en la misma placa de microtitulación, en 11 concentraciones diferentes que variaron entre 20 µM y 0,1 nM (20 µM, 5,9 µM, 1,7 µM, 0,51 µM, 0,15 µM, 44 nM, 13 nM, 3,8 nM, 1,1 nM, 0,33 nM y 0,1 nM, la serie de diluciones se preparó por separado, antes llevar a cabo el análisis con soluciones concentradas 100 veces en DMSO, sobre la base de diluciones en serie de 1:3,4), con cada concentración por duplicado, y el valor de la IC_{50} se determinó.

Análisis de la quinasa PDGFRß

La actividad inhibidora de PDGFRß de los compuestos de acuerdo con la presente invención se cuantificó empleando el ensayo PDGFRß HTRF que se describe en los siguientes párrafos.

Como quinasa, se usó una proteína de fusión GST-His, que comprendió un fragmento del extremo C la quinasa PDGFRß humana (los aminoácidos 561-1106), que había sido expresada en células de insectos (SF9) y

había sido purificada sobre la base de una cromatografía de afinidad, de Proqinase (Friburgo, Alemania). Como sustrato para la reacción de la quinasa, se usó el copolímero biotinilado poli-Glu,Tyr (4:1) (Nº 61GT0BLA), de Cis Biointernational (Marcoule, Francia).

En el análisis, se colocaron con una pipeta 50 nl de una solución concentrada 100 veces del compuesto de prueba en DMSO en cada cavidad de una placa de microtitulación que comprendió 384 cavidades negras con un volumen bajo (de Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de la quinasa PDGFRß en un amortiguador de ensayo acuoso (que comprendió HEPES 50 mM, pH 7,5, cloruro de magnesio 10 mM, ditiotreitol 2,5 mM y 0,01% (v/v) de Triton-X100, de Sigma) y se incubó la mezcla durante 15 minutos a 22ºC, de manera tal de posibilitar la unión preliminar entre los compuestos de prueba y la enzima, antes del inicio de la reacción de la quinasa. Luego se inició la reacción de la quinasa agregando 3 µl de una solución que comprendió trifosfato de adenosina (ATP 16,7 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 10 µM) y el sustrato (2,67 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 1 µM) en el amortiguador del

ensayo, y se incubó la mezcla resultante a 22ºC durante un período de reacción de 45 minutos. La concentración de la quinasa PDGFRß en el análisis se ajustó en función de la actividad que presentó cada lote de la enzima, y fue apropiada para mantener los resultados del análisis en el rango lineal. La concentración típica de la enzima (es decir, la concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl) fue de aproximadamente 125 pg/µl. La reacción se detuvo agregando 5 µl de una solución que comprendió los reactivos de detección para el proceso de HTRF (estreptavidina-XLent 200 nM, de Cis Biointernational, y un quelato de PT66-Eu 1,4 nM, un anticuerpo anti-fosfo-tirosina marcado con un quelato de europio de Perkin Elmer, aunque en su lugar también puede usarse el criptato de Pt66-Tb marcado con un quelato de PT66-Eu, de Cis Biointernational), en una solución acuosa que comprendió EDTA (más precisamente, comprendió EDTA 100 mM y 0,2 % (p/v) de albúmina de suero bovino en un amortiguador de HEPES/NaOH 50 mM que presentó un pH de 7,5).

La mezcla resultante se incubó por 1 hora a 22ºC para permitir la unión del péptido biotinilado a la estreptavidina- XLent y el quelato de PT66-Eu. Después se evaluó la cantidad de sustrato fosforilado midiendo

la transferencia de energía de resonancia desde el quelato de PT66-Eu hacia la estreptavidina-XLent. Por consiguiente, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm, después de una excitación a 350 nm, en un lector de HTRF, por ejemplo, un dispositivo Rubystar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). Se tomó la relación entre las emisiones a 665 nm y 622 nm como medida de la cantidad de sustrato peptídico fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de enzima sin inhibidor = 0% de inhibición, todos los demás componentes del ensayo pero sin enzima = 100% de inhibición). Normalmente, los compuestos de prueba eran evaluados en la misma placa para microtitulación a 10 concentraciones diferentes en el rango entre 20 µM y 1 nM (20 µM, 6,7 µM, 2,2 µM, 0,74 µM, 0,25 µM, 82 nM, 27 nM, 9,2 nM, 3,1 nM y 1 nM, series de dilución preparadas antes del ensayo a nivel de soluciones madre 100x con diluciones en serie 1:3) con valores por duplicado para cada concentración y los valores de IC_{50} se calcularon.

Análisis de la quinasa Fyn

Como quinasa, se usó el dominio de la quinasa recombinante de la quinasa T-Fyn humana, que comprendía una marca de His6 en el extremo C, que había sido

expresado en células de insectos que habían sido infectadas con un baculovirus (de Invitrogen, P3042). Como sustrato para la reacción de la quinasa, se usó el péptido biotinilado biotina-KVEKIGEGTYGVV (con el extremo C en forma de amida), que puede adquirirse, por ejemplo, en la compañía Biosynthan GmbH (Berlin-Buch, Alemania).

En el análisis, se colocaron con una pipeta 50 nl de una solución concentrada 100 veces del compuesto de prueba en DMSO en cada cavidad de una placa de microtitulación que comprendió 384 cavidades negras con un volumen bajo (de Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de la quinasa T-Fyn en un amortiguador de ensayo acuoso (que comprendió HEPES 25 mM, pH 7,5, cloruro de magnesio 25 mM, ditiotreitol 2 mM, 0,1% (p/v) de albúmina de suero bovino y 0,03% (v/v) de Nonidet-P40, de Sigma) y se incubó la mezcla durante 15 minutos a 22ºC, de manera tal de posibilitar la unión preliminar entre los compuestos de prueba y la enzima, antes del inicio de la reacción de la quinasa. Luego se inició la reacción de la quinasa agregando 3 µl de una solución que comprendió trifosfato de adenosina (ATP 16,7 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 10 µM) y el sustrato (2 µM, su

concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 1,2 µM) en el amortiguador del ensayo, y se incubó la mezcla resultante a 22ºC durante un período de reacción de 45 minutos. La concentración de la quinasa Fyn en el análisis se ajustó en función de la actividad que presentó cada lote de la enzima, y fue apropiada para mantener los resultados del análisis en el rango lineal. La concentración típica fue de 0,13 nM. La reacción se detuvo agregando 5 µl de una solución que comprendió los reactivos de detección para el proceso de HTRF (estreptavidina-XL 0,2 µM, de Cisbio Bioassays, Codolet, Francia, y un quelato de PT66-Eu 0,66 nM, un anticuerpo anti-fosfo-tirosina marcado con un quelato de europio de Perkin Elmer, aunque en su lugar también puede usarse el criptato de Pt66-Tb marcado con un quelato de PT66-Eu, de Cis Biointernational), en una solución acuosa que comprendió EDTA (más precisamente, comprendió EDTA 125 mM y 0,2 % (p/v) de albúmina de suero bovino en un amortiguador de HEPES/NaOH 50 mM que presentó un pH de 7,5).

La mezcla resultante se incubó por 1 hora a 22ºC para permitir la unión del péptido biotinilado a la estreptavidina- XL y el quelato de PT66-Eu. Después se evaluó la cantidad de sustrato fosforilado midiendo la

transferencia de energía de resonancia desde el quelato de PT66-Eu hacia la estreptavidina-XL. Por consiguiente, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm, después de una excitación a 350 nm, en un lector de HTRF, por ejemplo, un dispositivo Rubystar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). Se tomó la relación entre las emisiones a 665 nm y 622 nm como medida de la cantidad de sustrato peptídico fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de enzima sin inhibidor = 0% de inhibición, todos los demás componentes del ensayo pero sin enzima = 100% de inhibición). Normalmente, los compuestos de prueba eran evaluados en la misma placa para microtitulación a 10 concentraciones diferentes en el rango entre 20 µM y 1 nM (20 µM, 6,7 µM, 2,2 µM, 0,74 µM, 0,25 µM, 82 nM, 27 nM, 9,2 nM, 3,1 nM y 1 nM, series de dilución preparadas antes del ensayo a nivel de soluciones madre 100x con diluciones en serie 1:3) con valores por duplicado para cada concentración y los valores de IC_{50} se calcularon.

Análisis de la quinasa Flt4

La actividad inhibidora de Flt4 de los compuestos de acuerdo con la presente invención se cuantificó empleando el ensayo Flt4 TR-FRET que se describe en los

siguientes párrafos.

Como quinasa, se usó una proteína de fusión GST-His, que comprendió un fragmento del extremo C la quinasa Flt4 humana (los aminoácidos 799-1298), que había sido expresada en células de insectos (SF9) y había sido purificada sobre la base de una cromatografía de afinidad, de Proqinase (Friburgo, Alemania). Como sustrato para la reacción de la quinasa, se usó el péptido biotinilado biotina-Ahx-GGEEEEYFELVKKKK (con el extremo C en forma de amida, de Biosyntan, Berlin-Buch, Alemania).

En el análisis, se colocaron con una pipeta 50 nl de una solución concentrada 100 veces del compuesto de prueba en DMSO en cada cavidad de una placa de microtitulación que comprendió 384 cavidades negras con un volumen bajo (de Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de la quinasa Flt4 en un amortiguador de ensayo acuoso (que comprendió HEPES 25 mM, pH 7,5, cloruro de magnesio 10 mM, ditiotreitol 2 mM, 0,01% (v/v) de Triton-X100 (Sigma), EGTA 0,5 mM y ß-fosfo-glicerol 5 mM) y se incubó la mezcla durante 15 minutos a 22ºC, de manera tal de posibilitar la unión preliminar entre los compuestos de prueba y la enzima, antes del inicio de la reacción de la quinasa. Luego se inició la reacción

de la quinasa agregando 3 µl de una solución que comprendió trifosfato de adenosina (ATP 16,7 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 10 µM) y el sustrato (2,67 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 1 µM) en el amortiguador del ensayo, y se incubó la mezcla resultante a 22ºC durante un período de reacción de 45 minutos. La concentración de la quinasa Flt4 en el análisis se ajustó en función de la actividad que presentó cada lote de la enzima, y fue apropiada para mantener los resultados del análisis en el rango lineal. La concentración típica de la enzima (es decir, la concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl) fue de aproximadamente 120 pg/µl. La reacción se detuvo agregando 5 µl de una solución que comprendió los reactivos de detección para el proceso de HTRF (estreptavidina-XL665 30 nM, de Cis Biointernational, y un criptato de PT66-Tb 1 nM, un anticuerpo anti-fosfo-tirosina marcado con un criptato de terbio, de Cisbio Bioassays, Codolet, Francia), en una solución acuosa que comprendió EDTA (más precisamente, comprendió EDTA 100 mM y 0,2 % (p/v) de albúmina de suero bovino en un amortiguador de HEPES/NaOH 50 mM que presentó un pH de 7,5).

La mezcla resultante se incubó por 1 hora a 22ºC para permitir la unión del péptido biotinilado a la estreptavidina- XL665 y el criptato de PT66-Tb. Después se evaluó la cantidad de sustrato fosforilado midiendo la transferencia de energía de resonancia desde el criptato de PT66-Tb hacia la estreptavidina-XL665. Por consiguiente, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm, después de una excitación a 350 nm, en un lector de HTRF, por ejemplo, un dispositivo Rubystar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). Se tomó la relación entre las emisiones a 665 nm y 622 nm como medida de la cantidad de sustrato peptídico fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de enzima sin inhibidor = 0% de inhibición, todos los demás componentes del ensayo pero sin enzima = 100% de inhibición). Normalmente, los compuestos de prueba eran evaluados en la misma placa para microtitulación a 10 concentraciones diferentes en el rango entre 20 µM y 1 nM (20 µM, 6,7 µM, 2,2 µM, 0,74 µM, 0,25 µM, 82 nM, 27 nM, 9,2 nM, 3,1 nM y 1 nM, series de dilución preparadas antes del ensayo a nivel de soluciones madre 100x con diluciones en serie 1:3) con valores por duplicado para cada concentración y los valores de IC_{50}.

Análisis de la quinasa TrkA

La actividad inhibidora de TrkA de los compuestos de acuerdo con la presente invención se cuantificó empleando el ensayo TrkA HTRF que se describe en los siguientes párrafos.

Como quinasa, se usó una proteína de fusión GST-His, que comprendió un fragmento del extremo C la quinasa TrkA humana (los aminoácidos 443-796), que había sido expresada en células de insectos (SF9) y había sido purificada sobre la base de una cromatografía de afinidad, de Proqinase (Friburgo, Alemania). Como sustrato para la reacción de la quinasa, se usó el copolímero biotinilado poli-Glu,Tyr (4:1) (Nº 61GT0BLA), de Cis Biointernational (Marcoule, Francia).

En el análisis, se colocaron con una pipeta 50 nl de una solución concentrada 100 veces del compuesto de prueba en DMSO en cada cavidad de una placa de microtitulación que comprendió 384 cavidades negras con un volumen bajo (de Greiner Bio-One, Frickenhausen, Alemania), se agregaron 2 µl de una solución de la quinasa TrkA en un amortiguador de ensayo acuoso (que comprendió MOPS/HCl 8 mM, pH 7,0, cloruro de magnesio 10 mM, ditiotreitol 1 mM, 0,01% (v/v) de NP-40 (de Sigma) y EDTA 0,2 mM) y se incubó la mezcla durante 15

minutos a 22ºC, de manera tal de posibilitar la unión preliminar entre los compuestos de prueba y la enzima, antes del inicio de la reacción de la quinasa. Luego se inició la reacción de la quinasa agregando 3 µl de una solución que comprendió trifosfato de adenosina (ATP 16,7 µM, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 10 µM) y el sustrato (2,27 µg/ml, su concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl, fue de 1,36 µg/ml, es decir, aproximadamente 30 nM) en el amortiguador del ensayo, y se incubó la mezcla resultante a 22ºC durante un período de reacción de 60 minutos. La concentración de la quinasa TrkA en el análisis se ajustó en función de la actividad que presentó cada lote de la enzima, y fue apropiada para mantener los resultados del análisis en el rango lineal. La concentración típica de la enzima (es decir, la concentración final en el volumen que se empleó en el análisis, 5 µl) fue de aproximadamente 20 pg/µl. La reacción se detuvo agregando 5 µl de una solución que comprendió los reactivos de detección para el proceso de HTRF (estreptavidina-XL665 30 nM, de Cis Biointernational, y un quelato de PT66-Eu 1,4 nM, un anticuerpo anti-fosfo-tirosina marcado con un quelato de europio de Perkin Elmer, aunque en su lugar también

puede usarse el criptato de Pt66-Tb marcado con un quelato de PT66-Eu, de Cis Biointernational), en una solución acuosa que comprendió EDTA (más precisamente, comprendió EDTA 100 mM y 0,2 % (p/v) de albúmina de suero bovino en un amortiguador de HEPES/NaOH 50 mM que presentó un pH de 7,5).

La mezcla resultante se incubó por 1 hora a 22ºC para permitir la unión del péptido biotinilado a la estreptavidina-XL665 y el quelato de PT66-Eu. Después se evaluó la cantidad de sustrato fosforilado midiendo la transferencia de energía de resonancia desde el quelato de PT66-Eu hacia la estreptavidina-XL665. Por consiguiente, se midieron las emisiones de fluorescencia a 620 nm y 665 nm, después de una excitación a 350 nm, en un lector de HTRF, por ejemplo, un dispositivo Rubystar (BMG Labtechnologies, Offenburg, Alemania) o Viewlux (Perkin-Elmer). Se tomó la relación entre las emisiones a 665 nm y 622 nm como medida de la cantidad de sustrato peptídico fosforilado. Los datos se normalizaron (reacción de enzima sin inhibidor = 0% de inhibición, todos los demás componentes del ensayo pero sin enzima = 100% de inhibición). Normalmente, los compuestos de prueba eran evaluados en la misma placa para microtitulación a 10 concentraciones diferentes en el rango entre 20 µM y 1

nM (20 µM, 6,7 µM, 2,2 µM, 0,74 µM, 0,25 µM, 82 nM, 27 nM, 9,2 nM, 3,1 nM y 1 nM, series de dilución preparadas antes del ensayo a nivel de soluciones madre 100x con diluciones en serie 1:3) con valores por duplicado para cada concentración y los valores de IC_{50} se calcularon.

Análisis de la fosforilación AlphaScreen SureFire eIF4E Ser209

El análisis de la fosforilación AlphaScreen SureFire eIF4E Ser209 se emplea para determinar la fosforilación endógena en los lisados celulares eIF4E. Con la tecnología AlphaScreen SureFire, es posible detectar las proteínas fosforiladas en los lisados celulares. En este análisis, se capturan complejos de anticuerpos en forma de sándwich, que solamente pueden formarse en presencia del analito (p-eIF4E Ser209), con las esferas donantes y aceptoras de AlphaScreen, de manera tal que se localizan prácticamente en el mismo sitio. La excitación de las esferas donante da como resultado la liberación de moléculas de oxígeno individuales, lo a su vez que desencadena una cascada de transferencia de energía en las esferas aceptoras que se traduce en la emisión de luz a 520-620 nm.

Análisis Surefire EIF4e AlphaScreen en células A549, con una estimulación con 20% de FCS

En este análisis, se emplearon los conjuntos de elementos de análisis AlphaScreen SureFire p-eIF4E Ser209 10K y AlphaScreen ProteinA (para determinar las proteínas de 10 K), de Perkin Elmer.

El primer día, se sembraron 50000 células A549 en una placa de 96 cavidades, con 100 µl del medio de cultivo por cavidad (se trató de un medio F12 de DMEM/Hams, con glutamina estable y 10% de FCS), y se realizó una incubación a 37ºC. Una vez fijadas las células, el medio se cambió por un medio de privación (que fue un medio DMEM con 0,1% de FCS, sin glucosa, con glutamina y con el agregado de 5 g/l de maltosa). El segundo día, los compuestos de prueba fueron sometidos a una serie de diluciones en 50 µl del medio de privación, con una concentración final DMSO de 1%, para luego aplicarlos sobre las células A549 en las placas de prueba, en una concentración final que varió entre 10 nM y 10 µM, en función de su actividad. Las células tratadas fueron incubadas a 37ºC durante 2 horas. Se agregaron 37 µl de FCS a las cavidades (de manera tal de obtener una concentración final de FCS de 20%) durante 20 minutos. Posteriormente, se removió el medio y se lisaron las células mediante el agregado de 50 µl del amortiguador de lisis. Las placas se agitaron nuevamente en un agitador para placas durante 10

minutos. Después de llevar a cabo la lisis durante 10 minutos, se transfirieron 4 µl del lisado a una placa de 384 cavidades (que fue una placa Proxiplate, de Perkin Elmer) y se agregaron 5 µl de un amortiguador de reacción que estuvo combinado con una mezcla que comprendió el amortiguador de activación y las esferas aceptoras de AlphaScreen. Las placas se sellaron con una película adhesiva TopSeal-A y se agitaron suavemente en un agitador para placas durante 2 horas a temperatura ambiente. Luego se agregaron 2 µl de un amortiguador de dilución que comprendió las esferas donantes de AlphaScreen bajo una iluminación tenue, se sellaron las placas nuevamente con una película adhesiva TopSeal-A y se las cubrió con papel de aluminio. Se llevó a cabo una incubación adicional durante 2 horas, con agitación suave a temperatura ambiente. Las placas se analizaron con un lector EnVision (de Perkin Elmer), mediante el uso del programa de AlphaScreen. Cada punto de datos (cada dilución de los compuestos) se analizó por triplicado.

Ensayos de proliferación

El ensayo de proliferación de células tumorales que se puede utilizar para probar los compuestos de la presente invención incluye una lectura que se denomina ensayo de viabilidad de células por luminiscencia

CellTiter-Glow® desarrollado por Promega® (B.A. Cunningham, “A Growing Issue: Cell Proliferation Assays, Modern kits ease quantification of cell growth”, *The Scientist* **2001**, 15(13), 26; S.P. Crouch et al., “The use of ATP bioluminiscencia as a measure of cell proliferation and cytotoxicity", *Journal of Immunological Methods* **1993**, 160, 81-88), que mide la inhibición de la proliferación celular. La generación de una señal de luminiscencia corresponde a la cantidad de ATP presente, que es directamente proporcional al número de células metabólicamente activas (en proliferación).

Ensayo *in vitro* de proliferación de células tumorales:

Se ponen en placas células tumorales cultivadas (MOLM-13 (células humanas de leucemia mieloide aguda que se obtienen de DSMZ # ACC 554), JJN-3 (células humanas de leucemia de células plasmáticas que se obtienen de DSMZ # ACC 541), Ramos (RA1) (células humanas de linfoma de Burkitt que se obtienen de ATCC # CRL-159)) con una densidad de 2.500 células/pocillo (JJN-3), 3.000 células/pocillo (MOLM-13), 4.000 células/pocillo (Ramos (RA1)), en una placa de multitítulo de 96 pocillos (Costar 3603 fondo negro/transparente) en 100 µL de su respectivo medio de

cultivo suplementado con 10% de suero fetal bovino. Después de 24 horas, se mide la viabilidad de las células de una placa (placa del punto cero). Luego, se agregan a placa del punto cero 70 µL/pocillo de solución CTG (solución Cell Titer Glo de Promega (Nº de catálogo G755B y G756B)). Las placas se mezclan durante dos minutos en una sacudidora orbital para asegurar la lisis de las células y se incuban durante diez minutos a temperatura ambiente en la oscuridad para estabilizar la señal de luminiscencia. Las muestras se leen en un lector de placas VICTOR 3. En paralelo, se diluyen en medio de cultivo en series los compuestos de prueba, y se pipetean en las placas de prueba 50 µL de 3x diluciones/pocillo (concentraciones finales: 0 µM, así como también en el rango de 0,001-30 µM). La concentración final del solvente dimetil sulfóxido es 0,3-0,4%. Las células se incuban durante 3 días en presencia de sustancias de prueba. A los pocillos de prueba se les agregan 105 µL/pocillo de solución CTG (Solución Cell Titer Glo de Promega (Nº de catálogo G755B y G756B)). Las placas se mezclan durante 2 minutos en una sacudidora orbital para asegurar la lisis de las células y se incuban durante 10 min a temperatura ambiente en la oscuridad para estabilizar la señal de luminiscencia. Las muestras se leen en un

lector de placas VICTOR 3. El cambio en el número de células, como porcentaje, se calcula por normalización de los valores medidos a los valores de extinción de la placa del punto cero (= 0%) y la extinción de las células sin tratar (0 µm) (= 100%).

Resumen de líneas celulares para los ensayos de proliferación

Línea celular	**Origen**	**Número de células/pocillo**	**Medio de cultivo**
MOLM-13 (que se obtienen de DSMZ # ACC 554)	leucemia mieloide aguda humana	3000	RPMI 1640 con glutamina estable con 10% de Suero Fetal Bovino
JJN-3 (que se obtienen de DSMZ # ACC 541)	leucemia de células plasmáticas humana	2500	45% de medio Eagle modificado de Dulbecco con glutamina estable, 45% de medios Iscove modificados de Dulbecco con


			glutamina estable y 10% de Suero Fetal Bovino
Ramos (RA1) (que se obtienen de ATCC # CRL-159)	linfoma de Burkitt humano	4000	Medios RPMI 1640 con glutamina estable con 10% de Suero Fetal Bovino

De esta manera, puede concluirse que los compuestos de acuerdo con la presente invención inhiben de manera eficaz una o más quinasas, por lo que son apropiados en el tratamiento o la profilaxis de aquellas enfermedades que están relacionadas con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada, particularmente donde el crecimiento, la proliferación y/o la supervivencia sin control de las células, la respuesta inmune celular inapropiada o la respuesta inflamatoria inapropiada están mediados por la vía MKNK, más particularmente donde las enfermedades

que están relacionadas con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada abarcan los tumores hematológicos, los tumores sólidos o las metástasis de éstos, por ejemplo, la leucemia, el síndrome mielodisplástico, el linfoma maligno, los tumores en la cabeza o en el cuello, lo que abarca los tumores y las metástasis en el cerebro, los tumores en el tórax, lo que abarca los tumores que afectan a las células pulmonares no pequeñas o pequeñas, los tumores gastrointestinales, los tumores endocrinos, los tumores mamarios, los tumores ginecológicos de otro tipo, los tumores urológicos, lo que abarca los tumores en los riñones, en la vejiga y en la próstata, los tumores en la piel, los sarcomas y las metástasis de éstos.

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO porque es de fórmula general **I:**










I

en donde:

Q-V representa un grupo seleccionado entre: $C(R^{1a})$-N, N-$C(R^{1a})$;

A representa un grupo seleccionado entre:


,

,

,

,

,

,

;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo

de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -N(R^{5b})R^{5c}, -SCF_3, -SF_5;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -N(R^{5b})R^{5c}, -SCF_3, -SF_5;

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -N(R^{5b})R^{5c}, -SCF_3, -SF_5;

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, ciano, -$(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3

y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre:

C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, ciano, $-(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan $-(CH_2)_r$-T-$(CH_2)_s$-;

T representa un grupo seleccionado entre: U, $-C[R^{6a}][(C(R^{6b})(R^{6c}))_t$-U-$R^{3a}]$-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -O-, -S-, -S(=O)-, $-S(=O)_2$-, $-S(=O)-N(R^{3b})$-, $-N(R^{3c})-S(=O)$-, $-S(=O)_2-N(R^{3b})$-, $-N(R^{3c})-S(=O)_2$-,-C(=O)-, $-N(R^{3b})$-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, -O-C(=S)-, -C(=O)-

$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -O-C(=O)-$N(R^{3b})$-, -$N(R^{3c})$-C(=O)-O-;

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo

seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo, heteroarilo, donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros, donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros o heterocicloalquenilo de entre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R^4;

R^4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo, halo-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, halo-C_1-C_6-alcoxi, hidroxi-C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_6-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -N(R^{5b})-C(=O)-R^{5c}, -

$N(R^{5c})$-C(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, -$N(R^{5a})R^{5b}$, -C(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, R^{5c}-S-, R^{5c}-S(=O)-, R^{5c}-$S(=O)_2$-, -$N(R^{5c})$-S(=O)-R^{5b}, -S(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, -$N(R^{5c})$-$S(=O)_2$-R^{5b}, -$S(=O)_2$-$N(R^{5a})R^{5b}$, -S(=O)=$N(R^{5c})R^{5b}$, -S(=O)=$N(R^{5c})R^{5b}$ o -N=S(=O)$(R^{5c})R^{5b}$;

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, fenilo o heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido una vez con fenilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno, un C_1-C_6-alquilo, un C_3-C_6-cicloalquilo o un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros;

o

$N(R^{5a})R^{5b}$ juntos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 7 miembros;

R^{6a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo, C_2-C_6-alquinilo; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_2-C_6-alquenilo o C_2-C_6-alquinilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{6b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

R^{6c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_3-alquilo;

p representa el entero 0, 1, 2 o 3;

q representa el entero 0, 1, 2 o 3;

r representa el entero 1, 2 o 3;


s representa el entero 1, 2 o 3; y


t representa el entero 0 o 1;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque:

A representa un grupo seleccionado entre:



,


;

donde * indica el punto de unión de dichos grupos al resto de la molécula;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

3. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, CARACTERIZADO porque:

Q-V representa $C(R^{1a})$-N y R^{1a} representa un átomo de hidrógeno;

o

Q-V representa N-C(R^{1a}) y R^{1a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, ciano, C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, -$N(R^{5b})R^{5c}$;

R^{1b} representa un átomo de hidrógeno;

y

R^{1c} representa un átomo de hidrógeno;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADO porque:

R^{2a} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, $-CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{2b} representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, $-(CH_2)_q$-U-$(CH_2)_p$-R^{3a}; donde dicho grupo C_1-C_6 alquilo está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o

diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4,

con la condición de que dicho grupo halo-C_1-C_3-alquilo no contiene más que 5 átomos de halógeno;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan -$(CH_2)_2$-T-CH_2-;

o

R^{2a} y R^{2b} juntos representan -CH_2-T-$(CH_2)_2$-;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, CARACTERIZADO porque:

T representa -C(H)(U-R^{3a})-;

U representa una unión simple o un grupo bivalente seleccionado entre: -C(=O)-, -N(R^{3b})-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=O)-N(R^{3b})-, -N(R^{3c})-C(=O)-;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, CARACTERIZADO porque:

R^{3a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; donde dicho grupo C_1-C_6-alquilo, C_3-C_6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en

forma idéntica o diferente, con 1, 2 o 3 grupos R^4;

R^{3b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo;

o

$N(R^{3b})R^{3a}$ juntos forman un heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, donde dicho grupo heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1 grupo R^4;

y

R^{3c} representa un átomo de hidrógeno o un C_1-C_6-alquilo;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, CARACTERIZADO porque:

R^4 representa halo, hidroxi, ciano, nitro, C_1-C_3-alquilo, halo-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi, halo-C_1-C_3-alcoxi, hidroxi-C_1-C_3-alquilo, C_1-C_3-alcoxi-C_1-C_3-alquilo, R^{5c}-O-, -C(=O)-R^{5c}, -C(=O)-O-R^{5c}, -O-C(=O)-R^{5c}, -$N(R^{5a})R^{5b}$, -C(=O)-$N(R^{5a})R^{5b}$, R^{5c}-$S(=O)_2$-, -$N(R^{5c})$-$S(=O)_2R^{5b}$ o -$S(=O)_2$-$N(R^{5a})R^{5b}$;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o

una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, CARACTERIZADO porque:

R^{5a} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6-alquilo o bencilo;

R^{5b} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo;

R^{5c} representa un átomo de hidrógeno o un grupo C_1-C_6 alquilo;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque:

p representa el entero 0 o 1;

q representa el entero 0 o 1;

r representa el entero 1 o 2;

s representa el entero 1 o 2; y

t representa el entero 0 o 1;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

10. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque se selecciona entre el grupo que consiste en:

N-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina,

N-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina,

N-(5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina,

N-(5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina,

N-(5-etil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina,

N-(5-etil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina,

N-(6-etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina,

N-(6-etil-5-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina,

4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo,

4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo,

ácido 4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico,

5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo,

5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato de etilo,

ácido 5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-

7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxílico,
N-[5-(trifluorometil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-amina,
N-[5-(trifluorometil)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il]-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-amina,
[4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il]metanol,
N,N-dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](pirrolidin-1-il)metanona,
piperidin-1-il[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]metanona,
morfolin-4-il[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il]metanona,
N-[2-(dimetilamino)etil]-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
(RS)-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(RS)-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(RS)-(4-metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
(RS)-(4-metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
(RS)-N,N-dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(RS)-N,N-dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(RS)-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida,
(RS)-N,N-dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida,
(RS)-N,N-dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-carboxamida,
(RS)-(4-metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-il]metanona,
(RS)-(4-metilpiperazin-1-il)[4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirimido[4,5-b]indol-6-il]metanona,

(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
N-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida,
N-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]-7-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida,
(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
[3-(dimetilamino)azetidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
[3-(dimetilamino)azetidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona,
[3-(dimetilamino)azetidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(2-oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-il)metanona,

{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(morfolin-4-il)metanona, azetidin-1-il{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona, [(2R,6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona, (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(propan-2-il)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida, (7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida, (7S)-N-etil-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida, {(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(1S,4S)-2-oxa-5-azabiciclo[2.2.1]hept-5-il]metanona, {(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(1R,4R)-2-oxa-5-

azabiciclo[2.2.1]hept-5-il]metanona, {(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(4-metilpiperazin-1-il)metanona, [4-(dimetilamino)piperidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona, {(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona, {(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(3S)-3-metilmorfolin-4-il]metanona, (7S)-N-etil-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida, (7S)-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida, (7S)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida, (7S)-N-(2-metoxietil)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,

(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-(2-metoxietil)-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-butil-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-butil-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N,N-dimetil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
azetidin-1-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
(7S)-N,N-bis(2-metoxietil)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-(2-metoxietil)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-etil-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-

ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N,N-dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N,N-dimetil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](piperidin-1-il)metanona,
5-bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
5-bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
{5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona,
{5-Bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona,
{5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona,

{5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}(morfolin-4-il)metanona,

{5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}(morfolin-4-il)metanona,

[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona,

[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona,

[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](morfolin-4-il)metanona,

[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](piperidin-1-il)metanona,

[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3R)-3-metilmorfolin-4-il]metanona,

[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il](morfolin-4-il)metanona,

[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3S)-3-metilmorfolin-4-il]metanona,

N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-4-(1H-pirazolo[3,4-

c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
N-[2-(dimetilamino)etil]-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
N-{2-[bencil(metil)amino]etil}-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
2-(2-feniletil)-N-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-il)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-amina,
(7S)-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-metil-N-propil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
1-{[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]carbonil}azetidin-3-carbonitrilo,
2-oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
[(3R)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,

[(3S)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, morfolin-4-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [(3S)-3-metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [(3R)-3-metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [(2R,6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, (4-metilpiperazin-1-il)[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [4-(dimetilamino)piperidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, (7S)-N-etil-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida, (7S)-N-metil-N-propil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-

ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-N-(3,3,3-trifluoropropil)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-metil-N-(propan-2-il)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-N-(2-metoxietil)-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
azetidin-1-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
2-oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
1-{[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]carbonil}azetidin-3-carbonitrilo,
[(3S)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona,
[(3R)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, morfolin-4-il[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [(3R)-3-metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [(3S)-3-metilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [(2R,6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, (4-metilpiperazin-1-il)[(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, [4-(dimetilamino)piperidin-1-il][(7S)-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il]metanona, 1-({(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}carbonil)azetidin-3-carbonitrilo, {(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(2-oxa-6-azaespiro[3.3]hept-6-

il)metanona,
[(3R)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona,
[(3S)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il]{(7S)-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona,
(7S)-N-etil-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-propil-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-N-(propan-2-il)-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-carboxamida,
{(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}[(1S,4S)-2-oxa-5-azabiciclo[2.2.1]hept-5-il]metanona,
{(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}(4-metilpiperazin-1-il)metanona,
[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]{(7S)-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-5,6,7,8-

tetrahidro[1]benzotieno[2,3-d]pirimidin-7-il}metanona,
5-bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
5-bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-N-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
5-bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][(3S)-3-metilmorfolin-4-il]metanona,
N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida,
N,N-dimetil-7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida,
5-bromo-N-[2-(dimetilamino)etil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
5-bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
piperidin-1-il[7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-

ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]metanona,
[5-bromo-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il][4-(dimetilamino)piperidin-1-il]metanona,
N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida,
N-[3-(dimetilamino)-3-oxopropil]-N-metil-7-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilamino)[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida,
N-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-7-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil[1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-carboxamida,
5-bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
5-bromo-N-[3-(dimetilamino)propil]-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-N-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-carboxamida,
{7-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino][1,3]tiazolo[5,4-d]pirimidin-2-il}(piperidin-1-il)metanona,
{5-bromo-4-[(6-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}(piperidin-1-il)metanona,

{5-bromo-4-[(6-metoxi-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-6-il}[(3S)-3-metilmorfolin-4-il]metanona;

o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.


11. Un método para preparar un compuesto de fórmula general **I** de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, CARACTERIZADO porque un compuesto intermediario de fórmula general **II**:



II

en donde A es como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y LG representa un grupo saliente;


se hace reaccionar con un compuesto intermediario de fórmula general **IV**:




IV

en donde R^{1b}, R^{1c}, y Q-V son como se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y PG representa un grupo protector o un átomo de hidrógeno;

dando así un compuesto de fórmula general **I'** o **I**:



I'



I

en donde R^{1b}, R^{1c}, Q-V, y A son como se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, y PG representa un grupo protector o un átomo de hidrógeno.

12. Un compuesto de fórmula general **I**, o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, en particular una sal del mismo aceptable farmacéuticamente, o una mezcla de los mismos, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, CARACTERIZADO porque es para utilizar en el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad.

13. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA porque comprende un compuesto de fórmula general **I**, o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, en particular una sal del mismo aceptable farmacéuticamente, o una mezcla de los mismos, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, y un diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

14. Una combinación farmacéutica CARACTERIZADA porque comprende:

- uno o más primeros ingredientes activos que se seleccionan entre un compuesto de fórmula general **I** de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, y

- uno o más segundos ingredientes activos que se seleccionan entre agentes quimioterapéuticos anticáncer.

15. El uso de un compuesto de fórmula general **I**, o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, en particular una sal del mismo aceptable farmacéuticamente, o una mezcla de los mismos, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, CARACTERIZADO porque es para la profilaxis o el tratamiento de una enfermedad.


16. El uso de un compuesto de fórmula general **I**, o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal de los mismos, en particular una sal del mismo aceptable farmacéuticamente, o una mezcla de los mismos, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, CARACTERIZADO porque es para la preparación de un medicamento para la profilaxis o el tratamiento de una enfermedad.

17. El uso de acuerdo con la reivindicación 12, 15

ó 16, CARACTERIZADO porque dicha enfermedad es una enfermedad que está relacionada con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada, particularmente donde el crecimiento, la proliferación y/o la supervivencia sin control de las células, la respuesta inmune celular inapropiada o la respuesta inflamatoria inapropiada están mediados por la vía MKNK, más particularmente donde la enfermedad que está relacionada con un crecimiento, una proliferación y/o una supervivencia sin control de las células, con una respuesta inmune celular inapropiada o con una respuesta inflamatoria inapropiada es un tumor hematológico, un tumor sólido o una metástasis de éstos, por ejemplo, una leucemia, un síndrome mielodisplástico, un linfoma maligno, un tumor en la cabeza o en el cuello, lo que abarca los tumores y las metástasis en el cerebro, un tumor en el tórax, lo que abarca los tumores que afectan a las células pulmonares no pequeñas o pequeñas, un tumor gastrointestinal, un tumor endocrino, un tumor mamario, un tumor ginecológico de otro tipo, un tumor urológico, lo que abarca los tumores en los riñones, en la vejiga y en la próstata, un tumor en la piel, un sarcoma o una

metástasis de éstos.

18. El compuesto intermediario CARACTERIZADO porque es de fórmula **IV**:



IV

en donde R^{1b}, R^{1c}, y Q-V son como se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y PG representa un grupo protector o un átomo de hidrógeno.

19. El uso de un compuesto de fórmula **II** o **IV** como se define en la reivindicación 11 CARACTERIZADO porque es para la preparación de un compuesto de fórmula **I** como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

PCT

Print Out (Original in Electronic Form)

VIII-2-1	**Declaration: Entitlement to apply for and be granted a patent** Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate: Name (LAST, First)	In relation to this international application Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following:
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, KLAR, Ulrich
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, WORTMANN, Lars
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, KETTSCHAU, Georg
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, GRAHAM, Keith
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, RICHTER, Anja
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, LIENAU, Philip
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, PUEHLER, Florian
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, PETERSEN, Kirstin
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, SIEGEL, Franziska
VIII-2-1(ii)		Bayer Pharma Aktiengesellschaft is entitled as employer of the inventor, SÜLZLE, Detlev

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE

(PCT Rule 92*bis*.1 and Administrative Instructions, Section 422)

To:

BIP PATENTS
c/o Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
ALLEMAGNE

Date of mailing *(day/month/year)*
28 December 2015 (28.12.2015)

Applicant's or agent's file reference
BHC133048-WO

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.
PCT/EP2014/064347

International filing date *(day/month/year)*
04 July 2014 (04.07.2014)

1. The following indications appeared on record concerning:

☐ the applicant ☒ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address
PETERSEN, Kirstin
Kufsteiner Str. 10
10825 Berlin
Germany

State of Nationality | State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person ☐ the name ☒ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address
PETERSEN, Kirstin
Stolzingstr. 45
13465 Berlin
Germany

State of Nationality | State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address
☐ Notifications by e-mail authorized

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office
☐ the International Searching Authority
☐ the Authority(ies) specified for supplementary search
☐ the International Preliminary Examining Authority
☒ the designated Offices concerned
☐ the elected Offices concerned
☐ other:

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 89 75

Authorized officer
Bouvier Alexandre
e-mail pt05.pct@wipo.int
Telephone No. +41 22 338 74 05

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE

(PCT Rule 92*bis*.1 and Administrative Instructions, Section 422)

To:

BIP PATENTS
c/o Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
ALLEMAGNE

Date of mailing *(day/month/year)*
28 December 2015 (28.12.2015)

Applicant's or agent's file reference
BHC133048-WO

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.
PCT/EP2014/064347

International filing date *(day/month/year)*
04 July 2014 (04.07.2014)

1. The following indications appeared on record concerning:

☐ the applicant ☒ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address
PUEHLER, Florian
28 Croton St.
Wellesley, Massachusetts 02148
United States of America

State of Nationality | State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person ☐ the name ☒ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address
PUEHLER, Florian
28 Croton St.
Wellesley, MA 02481
United States of America

State of Nationality | State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address
☐ Notifications by e-mail authorized

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office
☐ the International Searching Authority
☐ the Authority(ies) specified for supplementary search
☐ the International Preliminary Examining Authority
☒ the designated Offices concerned
☐ the elected Offices concerned
☐ other:

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 89 75

Authorized officer
Bouvier Alexandre
e-mail pt05.pct@wipo.int
Telephone No. +41 22 338 74 05

CAVELIER
ABOGADOS
EDIFICIO SISKI
CARRERA 4a N° 72-35
BOGOTA, 8 – COLOMBIA

19587-1

REPRESENTACION

REPRESENTATION

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/I (we), the undersigned

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

domiciliado (s) Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, Alemania
en/of

Por el presente nombramos a CAVELIER ABOGADOS, sociedad colectiva constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, mediante Escritura Pública No. 6233 del 10 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, domiciliada en Bogotá D.C., con matrícula mercantil No. 00820237 y NIT 860041367-3, domiciliada en la Carrera 4a N° 72-35, Bogotá, Colombia, como nuestra representante en todos los asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual, con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales.

CAVELIER ABOGADOS también podrá representarnos, con las mismas facultades arriba indicadas, ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, autoridades administrativas o jurisdiccionales, tribunales de arbitramento, en asuntos de naturaleza civil, comercial, penal, constitucional, competencia, competencia desleal, administrativa, contencioso administrativa, protección del consumidor, variedades vegetales, nombres de dominio, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, acciones de tutela, la protección de secretos industriales, derecho regulatorio y en general para que nos represente en cualesquiera acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan.

La representante podrá, en nuestro nombre, designar apoderados para actuar ante autoridades administrativas y judiciales, por vía extrajudicial y también procesalmente en nuestro nombre, como demandantes,

Do hereby appoint CAVELIER ABOGADOS, a general partnership organized under the laws of the Republic of Colombia by means of Public Deed No. 6233 of September 10, 1974, granted at Notary Sixth of the Bogota Circuit, domiciled in Bogota D.C., with Mercantile Registration No. 00820237 and Taxpayer Identification Number 860041367-3, domiciled at Carrera 4a N° 72-35, Bogota, Colombia, as our representative for all Industrial and Intellectual Property matters with faculty to receive notifications and appoint attorneys in and out of Court.

CAVELIER ABOGADOS may also represent us, with the same faculties stated above, before any entities or persons, with or without jurisdiction, administrative or jurisdictional authorities, courts of arbitration, in civil, commercial, criminal, constitutional, competition, unfair competition, administrative, administrative contentious, consumer protection, plant varieties, domain names, opposition or observation matters, administrative and Court cancellation, nullity, precautionary measures, licensing, action for writ mandamus, protection of trade secrets, regulatory law and in general represent us in any actions and suits instituted by us or against us.

The representative may, in our name, designate attorneys to act before administrative and judicial authorities, through out-of-court channels, and also procedurally in our name as plaintiff, defendant, joint

© CAVELIER ABOGADOS

como demandados, como litisconsortes, como agentes oficiosos, como terceros, por llamamiento en garantía o como intervinientes *ad excludendum*. Dentro de esta autorización, la representante podrá facultar a los apoderados que ella designe para transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar y sustituir el poder que se le otorgue. Así mismo, la representante tendrá la facultad para revocar el poder así otorgado en el momento que considere pertinente. La representante en todo caso podrá ratificar los actos de agentes oficiosos.


litigant, representative without power of attorney, third party, when summoned to appear in court or as intervener *ad excludendum*. Under this authorization, the representative may empower the attorneys appointed thereby to compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign and substitute the power of attorney granted thereto. Likewise, the representative shall have the faculty of revoking the power of attorney thus granted at any time it may deem convenient. The representative may in any case ratify the acts of representatives without a power of attorney.

Dado y firmado hoy/Given and signed this 21 de abril de 2015

En/in .Buenos Aires, Argentina

Por/by Dagmar Messerer

Firma/Signature



WPC21703/ID.276907

© CAVELIER ABOGADOS

CAVELIER
ABOGADOS

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Asunto : Solicitud de patente para **PIRAZOLPIRIDINAS SUSTITUIDAS PCT/EP2014/064347**

Solicitante : **BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**

Yo, ADRIANA ZAPATA GIRALDO mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.680.061 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la sociedad CAVELIER ABOGADOS domiciliada en la Carrera 4 No. 72-35, en desarrollo de la representación que le fue otorgada por **BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, confiero poder a los doctores LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 de Usaquén, portadora de la Tarjeta Profesional No. 23.555, JORGE CHAVARRO ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.209.380 de Cartago (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 40.119, y EDNA DARMELY SARMIENTO CHARRY identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.006.265 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional No. 65.794, para presentar la solicitud de registro de la patente indicada en la referencia.

Los apoderados quedan facultados para interponer recursos, transigir, conciliar, desistir, cancelar, recibir, renunciar, sustituir y revocar las sustituciones, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

ADRIANA ZAPATA GIRALDO
C.C. No. 51.680.061 de Bogotá

Acepto:

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
T.P.A. N° 23.555 del C.S. de la J
C.C. N° 35.456.344

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0769 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

PIRAZOLPIRIDINAS SUSTITUIDAS

RESUMEN

Compuestos de pirazolpiridina sustituidas de fórmula general **I** según se los describe y define aquí, métodos para preparar dichos compuestos, compuestos intermediarios útiles para preparar dichos compuestos, composiciones farmacéuticas y combinaciones que comprenden a dichos compuestos y el uso de dichos compuestos para elaborar una composición farmacéutica para el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad, en particular de un trastorno hiperproliferativo y/o de angiogénesis, como único agente o en combinación con otros ingredientes activos.