



No. 14-117726- -00004-0000

Fecha: 2015-02-18 16:15:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 74

No de radicación

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIADIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Tramite

- ☐ Error material ☒ Modificación a una Solicitud en trámite
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del Solicitante:

Persona Natural ☐Persona Jurídica ☒**GLAXOSMITHKLINE LLC**

Nombre o Denominación / Nombre o Razón Social Completa

ALICIA LLOREDA RICAURTE

Nombre Representante Legal

Tipo de Empresa

Micro ☐Pequeña ☐Mediana ☐Otra ☒

Documento de Identificación

☒ C.C.☐ C.E.☐ NIT☐ Otro Número**39.690.713**

Nacionalidad / País de Constitución

Dirección y Domicilio del Titular

Ciudad

Estado de Delaware, Estados
Unidos de América5 Crescent Drive, Philadelphia, Pennsylvania
19112, Estados Unidos de América.

Philadelphia

Dirección Electrónica

Fax

Número Telefónico

Notificaciones patentes@lloredacamacho.com

6069701

3264270

- ☒ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del Apoderado:

LLOREDA RICAURTE ALICIA

Apellidos y Nombre

C.C. 39.690.713

Documento de Identificación

53.215

Tarjeta Profesional

Dirección y Domicilio

Ciudad

Calle 72 No. 5-83 Piso 5º

Bogotá D.C.

Dirección Electrónica

No. Fax

Número Telefónico

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

6069701

3264270

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del Trámite

Corrección:

Expediente No. 14-117.726

Aparece _____

Debe ser _____


Modificación:

- ☒ Modificación al Capítulo Reivindicatorio.
- _____
- ☐ Modificación al Capítulo Descriptivo.
- _____
- ☐ Modificación al Resumen.
- _____
- ☐ Modificación a los Dibujos.
- _____
- ☐ Modificación al Solicitante.
- _____

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos		 Firma
ALICIA LLOREDA RICAURTE	Representante Apoderado	
C.C. 39.690.713		Tarjeta Profesional 53.215

LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: PI.-GLAXOSMITHKLINE LLC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE BETULINA".-Clase C07C 69/753.-Expediente número 14-117.726-

1. Me refiero a mi memorial presentado el pasado 17 de diciembre de 2014.
2. Debidamente autorizada por mi Representado, me permito manifestar a ese Despacho que es deseo del solicitante realizar de manera voluntaria una modificación sobre el capítulo reivindicatorio originalmente presentado, de manera tal que el nuevo capítulo pasa a estar conformado por **70 reivindicaciones** como se explica a continuación:

Nueva Reivindicación	Sustento
1-68	Corresponden a las reivindicaciones 1 a 68 de la solicitud originalmente presentada.
69	Corresponde a la reivindicación 129 de la solicitud originalmente presentada.
70	Corresponde a la reivindicación 130 de la solicitud originalmente presentada.

Me permito señalar que las reivindicaciones **69, 70 y 71 a 128** del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud original fueron **eliminadas** del documento modificado.

Asimismo, me permito aclarar que la enumeración y dependencias de las nuevas reivindicaciones se han reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De acuerdo con lo anterior, me permito manifestar a ese Despacho que la anterior modificación **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

3. Por otra parte, atentamente me permito allegar los recibos de pago de la tasa establecida para las reivindicaciones adicionales de la solicitud arriba mencionada.

Me permito aclarar que dicho pago corresponde a las reivindicaciones **11 a 70** del capítulo reivindicatorio, el cual se adjunta al presente memorial y deberá ser estudiado junto con la presente solicitud.

4. Anexo me permito presentar:

- (a) Formulario único de correcciones y modificaciones,
- (b) Recibo número 15-007197, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas,
- (c) Recibo número 15-0018670, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las reivindicaciones adicionales **11 a 70**; y
- (d) Copia de las páginas **456 a 525** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado que consta de 70 reivindicaciones y que reemplaza al originalmente presentado.

5. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,




ALICIA LLOREDA RICAURTE


T.P. 53.215

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




L₁ y L₂ se seleccionan independientemente a partir de un enlace o [C(R⁶R^{6'})]_q;

cada Q se selecciona independientemente a partir de -CH₂- o -C(=O)-;

W se selecciona a partir de un enlace u O;


R¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 12 átomos de carbono), -C(O)R⁵, -CH₂-O-alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), 2-



R² se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 12 átomos de carbono), -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)-OR⁴, -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)-O-alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), -C(O)R⁵, -(CH₂)_rNR⁷R⁸, y -(CH₂)_rN⁺(R⁴)₃, en donde, cuando W es O, R¹ y R² se pueden tomar opcionalmente junto con los O y N con los que están respectivamente unidos, para formar un anillo de heterociclilo de 4 a 8 miembros, en donde el anillo de heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a dos grupos R¹¹;

R^3 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo

(de 1 a 12 átomos de carbono), $-NR^1R^2$, $-OR^5$, , ,

, y , en donde:

X es un arilo (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico,

Y se selecciona a partir de un heterociclilo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico o un heteroarilo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico, cada uno teniendo de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de S, N u O, y

Z es un cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico;

R^2 y R^3 se pueden tomar opcionalmente junto con el nitrógeno y L_2 con los que están respectivamente unidos, para formar un anillo de heterociclilo de 4 a 8 miembros, en donde el anillo de heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a dos grupos R^{11} ;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H y alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono);

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-R^3$, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, y $-(CH_2)_rOR^7$.

R^6 y $R^{6'}$ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), halo-alquilo, -Y, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, $-C(O)OH$, y $-C(O)NH_2$, en donde los grupos R^6 y $R^{6'}$ se pueden tomar opcionalmente junto con el átomo de carbono con el que están unidos, para formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 8 miembros, y en donde el anillo de cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R^{11} ;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), -Q-aril- $(R^4)_n$, $-NR^{14}R^{15}$, $-C(O)CH_3$, en donde R^7 y R^8 se pueden tomar opcionalmente junto con el nitrógeno con el que están unidos, para formar un anillo de heterociclilo o heteroarilo de 4 a 8 miembros que contiene de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de $-NR^5$ -, -O-, -S-, -S(O)-, o $-SO_2$ -, en donde el anillo de heterociclilo o heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R^{11} ;

R^9 es halógeno;

R^{10} es $-N(R^{16})_2$;

R^{11} , R^{12} , y R^{13} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, halógeno, alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^{10}$, $-R^4YR^6$, $-CO(O)R^4$, y $-CO(O)R^5$, en donde cualesquiera dos grupos R^{11} , R^{12} ó R^{13} se pueden unir opcionalmente para formar un anillo de cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo de 3 a 8 miembros, en donde el anillo de heterociclilo o heteroarilo puede contener de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de $-NR^5$ -, -O-, -S-, -S(O)-, o $-SO_2$ -, y en donde el anillo de cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R^{16} ;

R^{14} y R^{15} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-[C(R^6)_2]_r$ -, $-O[C(R^6)_2]_r$ -, oxo, hidroxilo, halógeno, $-C(O)R^7$, $-R^{10}$, y $-CO(O)R^2$, en donde R^{14} y R^{15} se pueden tomar opcionalmente junto con el átomo de carbono con el que están unidos, para formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 8 miembros o un anillo de heterociclilo de 4 a 8 miembros que contiene de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de $-NR^5$ -, -O-, -S-, -S(O)-, o $-SO_2$ -, en donde el anillo de cicloalquilo o el anillo de heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por

uno a tres grupos R^{16} ;

R^{16} se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en -H, halógeno, oxo, hidroxilo, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, $-N(R^4)_2$, $-(CH_2)_r$ -heterociclilo, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-R^5(R^9)_q$, $-OR^5(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, $-C(O)R^{10}$, y $-CO(O)R^4$;

m y n son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4;


p es independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4; y

r y q son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde L_1 y L_2 son ambos $[C(R^6R^{6'})]_q$.
3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde L_1 y L_2 son ambos $-CH_2-$.
4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde q es independientemente 1, 2, ó 3.
5. El compuesto de la reivindicación 1, en donde q es 1.
6. El compuesto de la reivindicación 1, en donde W es O.
7. El compuesto de la reivindicación 1, en donde W es un enlace.
8. El compuesto de la reivindicación 1, en donde, cuando W es un enlace, entonces R^1 es -H.
9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde, cuando W es O, entonces R^1 es -H.
10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde cada Q en el grupo A es $-CH_2-$, y Q en la estructura de la fórmula I es $-C(=O)-$.
11. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es -H.
12. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^2 es $-(CH_2)_rNR^7R^8$.
13. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^2 es (dimetil-amino)-etilo.

14. El compuesto de la reivindicación 1, en donde r es independientemente 0, 1, 2, ó 3.

15. El compuesto de la reivindicación 1, en donde r es 2.

16. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^3 es 

17. El compuesto de la reivindicación 1, en donde X es un arilo (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico.

18. El compuesto de la reivindicación 1, en donde X es fenilo.

19. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^4 es $-H$.

20. El compuesto de la reivindicación 1, en donde m es 0 ó 1.

21. El compuesto de la reivindicación 1, en donde m es 0.

22. El compuesto de la reivindicación 1, en donde m es 1.

23. El compuesto de la reivindicación 1, en donde n es 1.

24. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^6 y $R^{6'}$ son ambos $-H$.

25. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^7 y R^8 son ambos alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono).

26. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^7 es metilo.

27. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^8 es metilo.

28. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^7 y R^8 son ambos metilo.

29. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{11} es halógeno.

30. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{11} se selecciona a partir de cloro, bromo, o flúor.

31. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{11} es cloro.


32. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{11} está ausente.

33. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{14} y R^{15} son ambos alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono).


34. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^{14} y R^{15} son ambos

metilo.


35. El compuesto de la reivindicación 1, en donde A es




36. El compuesto de la reivindicación 1, en donde A es




37. El compuesto de la reivindicación 1, en donde A es




38. El compuesto de la reivindicación 1, en donde A es



39. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



L_1 y L_2 son $[C(R^6R^{6'})]_q$;

cada Q se selecciona independientemente a partir de $-CH_2-$ o $-C(=O)-$;

W se selecciona a partir de un enlace u O;


R^1 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a


6 átomos de carbono), $-C(O)R^4$, y $R_4-O-C(=O)-C(R^{14})(R^{15})-C(=O)-R^5$;

R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)- OR^4 , -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)-O-alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^5$, y -

$(\text{CH}_2)_r\text{NR}^7\text{R}^8$, y $-(\text{CH}_2)_r\text{N}^+(\text{R}^4)_3$;

R^3 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a

12 átomos de carbono), $-\text{NR}^1\text{R}^2$, $-\text{OR}^5$, , , y

, en donde:

X es un arilo (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico,

Y se selecciona a partir de un heterociclo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico o un heteroarilo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico, cada uno teniendo de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de S, N u O, y

Z es un cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H y alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono);

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-(\text{CH}_2)_r\text{NR}^7\text{R}^8$, y $-(\text{CH}_2)_r\text{OR}^7$;

R^6 y $\text{R}^{6'}$ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), halo-alquilo, $-(\text{CH}_2)_r\text{NR}^7\text{R}^8$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, y $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, en donde los grupos R^6 y $\text{R}^{6'}$ se pueden tomar opcionalmente junto con el átomo de carbono con el que están unidos, para formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 8 miembros, y en donde el anillo de cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R^{11} ;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-\text{NR}^{14}\text{R}^{15}$, y $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$;

R^9 es halógeno;

R^{10} es $-N(R^{16})_2$;

R^{11} , R^{12} , y R^{13} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, halógeno, alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^{10}$, $-R^4YR^6$, $-CO(O)R^4$, y $-CO(O)R^5$;

R^{14} y R^{15} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en $-H$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-[C(R^6)_2]_r$, $-O[C(R^6)_2]_r$, oxo, hidroxilo, halógeno, $-C(O)R^7$, $-R^{10}$, y $-CO(O)R^2$;


R^{16} se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en $-H$, oxo, halógeno, hidroxilo, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, $-N(R^4)_2$, $-(CH_2)_r$ -heterociclo, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-R^5(R^9)_q$, $-OR^5(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, $-C(O)R^{10}$, y $-CO(O)R^4$;

m y n son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4;


p es independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4; y

r y q son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4.

40. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



L_1 y L_2 son ambos $(-\text{CH}_2-)$;


Q es $-\text{C}(=\text{O})-$;

W es O ;

R^1 es $-\text{H}$;

R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en $-\text{H}$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-\text{alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)}-\text{OR}^4$, $-\text{alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)}-\text{O-alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$, y $-(\text{CH}_2)_r\text{NR}^7\text{R}^8$;

R^3 se selecciona a partir del grupo que consiste en $-\text{H}$, alquilo (de 1 a 12 átomos de carbono), $-\text{NR}^1\text{R}^2$, $-\text{OR}^5$, , , y



, en donde:

X es un aro (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico,

Y se selecciona a partir de un heterociclo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico o un heteroarilo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico, cada uno teniendo de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de S , N u O , y

Z es un cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en $-\text{H}$ y alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono);

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-(\text{CH}_2)_r\text{NR}^7\text{R}^8$, y $-(\text{CH}_2)_r\text{OR}^7$;

R^6 y $R^{6'}$ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en $-\text{H}$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), halo-alquilo, $-(\text{CH}_2)_r\text{NR}^7\text{R}^8$, -

C(O)OH , y $-\text{C(O)NH}_2$;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en $-\text{H}$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-\text{NR}^{14}\text{R}^{15}$, y $-\text{C(O)CH}_3$;

R^9 es halógeno;

R^{10} es $-\text{N(R}^{16})_2$;

R^{11} , R^{12} , y R^{13} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, halógeno, alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-\text{R}^6(\text{R}^9)_q$, $-\text{OR}^6(\text{R}^9)_q$, nitro, $-\text{SO}_2\text{R}^6$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-\text{C(O)R}^{10}$, $-\text{R}^4\text{YR}^6$, $-\text{CO(O)R}^4$, y $-\text{CO(O)R}^5$;

R^{14} y R^{15} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en $-\text{H}$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-\text{[C(R}^6)_2]_r$, $-\text{O[C(R}^6)_2]_r$, oxo, hidroxilo, halógeno, $-\text{C(O)R}^7$, $-\text{R}^{10}$, y $-\text{CO(O)R}^2$;

R^{16} se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en $-\text{H}$, oxo, halógeno, hidroxilo, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-\text{R}^6(\text{R}^9)_q$, $-\text{OR}^6(\text{R}^9)_q$, $-\text{N(R}^4)_2$, $-(\text{CH}_2)_r$ -heterociclo, $-\text{C(O)OH}$, $-\text{C(O)NH}_2$, $-\text{R}^5(\text{R}^9)_q$, $-\text{OR}^5(\text{R}^9)_q$, nitro, $-\text{SO}_2\text{R}^6$, $-\text{C(O)R}^{10}$, y $-\text{CO(O)R}^4$;


m y n son independientemente 0, 1, ó 2;

p es independientemente 0, 1, ó 2; y


r y q son independientemente 0, 1, 2, ó 3.

41. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula I:

466



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



L_1 y L_2 son ambos $(-CH_2-)$;

Q es $-C(=O)-$;

W es O;

R^1 es $-H$;

R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en $-H$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^5$, y $-(CH_2)_rNR^7R^8$;

R^3 es

, en donde X es un arilo (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en $-H$ y alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono);

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-(CH_2)_rNR^7R^8$, y $-(CH_2)_rOR^7$;

R^6 se selecciona a partir del grupo que consiste en $-H$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), halo-alquilo, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, $-C(O)OH$, y $-C(O)NH_2$;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que

consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-NR^{14}R^{15}$, y $-C(O)CH_3$;

R^9 es halógeno;

R^{10} es $-N(R^{16})_2$;

R^{11} , R^{12} , y R^{13} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, halógeno, alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^{10}$, $-CO(O)R^4$, y $-CO(O)R^5$;

R^{14} y R^{15} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-[C(R^6)_2]_r$, $-O[C(R^6)_2]_r$, oxo, hidroxilo, halógeno, $-C(O)R^7$, $-R^{10}$, y $-CO(O)R^2$;


R^{16} se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en -H, oxo, halógeno, hidroxilo, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, $-N(R^4)_2$, $-(CH_2)_r$ -heterociclo, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-R^5(R^9)_q$, $-OR^5(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, $-C(O)R^{10}$, y $-CO(O)R^4$;

m y n son independientemente 0, 1, ó 2;


p es independientemente 0, 1, ó 2; y

r y q son independientemente 0, 1, 2, ó 3.

42. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



L_1 y L_2 son ambos $(-CH_2-)$;

Q es $-C(=O)-$;

W es O;

R¹ es -H;

$$R^2 \text{ es } -(CH_2)_rNR^7R^8;$$

R^3 es , en donde X es fenilo;

R⁷ y R⁸ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H y metilo;


R⁹ se selecciona a partir del grupo que consiste en cloro, bromo, y flúor;

R¹¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en cloro, bromo, y flúor;


m es 0, 1, ó 2; y

res 1, 2, ó 3.

43. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (II):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



L_1 y L_2 se seleccionan independientemente a partir de un enlace o

$[C(R^6R^{6'})]_q$;

cada Q se selecciona independientemente a partir de $-CH_2-$ o $-$

$C(=O)-$;


W se selecciona a partir de un enlace u O;


R^1 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 12 átomos de carbono), $-C(O)R^5$, $-CH_2-O$ -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), 2-

tetrahidro-2H-pirano, y

R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 12 átomos de carbono), -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)- OR^4 , -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)-O-alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^5$, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, y $-(CH_2)_rN^+(R^4)_3$, en donde, cuando W es O, R^1 y R^2 se pueden tomar opcionalmente junto con los O y N con los que están respectivamente unidos, para formar un anillo de heterociclilo de 4 a 8 miembros, en donde el anillo de heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a dos grupos R^{11} ;

R^3 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a

12 átomos de carbono), $-NR^1R^2$, $-OR^5$, , , y



, en donde:

X es un arilo (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico,

Y se selecciona a partir de un heterociclo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico o un heteroarilo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico, cada uno teniendo de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de S, N u O, y

Z es un cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico;

R^2 y R^3 se pueden tomar opcionalmente junto con el nitrógeno y L_2 con los que están respectivamente unidos, para formar un anillo de heterociclilo de 4 a 8 miembros, en donde el anillo de heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a dos grupos R^{11} ;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H y alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono);

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-R^3$, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, y $-(CH_2)_rOR^7$.

R^6 y $R^{6'}$ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), halo-alquilo, -Y, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, $-C(O)OH$, y $-C(O)NH_2$, en donde los grupos R^6 y $R^{6'}$ se pueden tomar opcionalmente junto con el átomo de carbono con el que están unidos, para formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 8 miembros, y en donde el anillo de cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R^{11} ;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que

consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), -Q-aril-(R⁴)_n, -NR¹⁴R¹⁵, -C(O)CH₃, en donde R⁷ y R⁸ se pueden tomar opcionalmente junto con el nitrógeno con el que están unidos, para formar un anillo de heterociclilo o heteroarilo de 4 a 8 miembros que contiene de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de -NR⁵-, -O-, -S-, -S(O)-, o -SO₂-, en donde el anillo de heterociclilo o heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R¹¹;

R⁹ es halógeno;

R¹⁰ es -N(R¹⁶)₂;

R¹¹, R¹², y R¹³ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, halógeno, alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), -R⁶(R⁹)_q, -OR⁶(R⁹)_q, nitro, -SO₂R⁶, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), -C(O)R¹⁰, -R⁴YR⁶, -CO(O)R⁴, y -CO(O)R⁵, en donde cualesquiera dos grupos R¹¹, R¹² ó R¹³ se pueden unir opcionalmente para formar un anillo de cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo de 3 a 8 miembros, en donde el anillo de heterociclilo o heteroarilo puede contener de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de -NR⁵-, -O-, -S-, -S(O)-, o -SO₂-, y en donde el anillo de cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R¹⁶;

R¹⁴ y R¹⁵ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), -[C(R⁶)₂]_r-, -O[C(R⁶)₂]_r-, oxo, hidroxilo, halógeno, -C(O)R⁷, -R¹⁰, y -CO(O)R², en donde R¹⁴ y R¹⁵ se pueden tomar opcionalmente junto con el átomo de carbono con el que están unidos, para formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 8 miembros o un anillo de heterociclilo de 4 a 8 miembros que contiene de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de -NR⁵-, -O-, -S-, -S(O)-, o -SO₂-, en donde el anillo de cicloalquilo o el anillo de heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R¹⁶;


R¹⁶ se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en -H, halógeno, oxo, hidroxilo, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), -R⁶(R⁹)_q, -OR⁶(R⁹)_q, -N(R⁴)₂, -(CH₂)_r-heterociclo, -C(O)OH, -C(O)NH₂, -R⁵(R⁹)_q, -OR⁵(R⁹)_q, nitro, -SO₂R⁶, -C(O)R¹⁰, y -CO(O)R⁴;

m y n son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4;


p es independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4; y

r y q son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4.

44. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (II):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




L₁ y L₂ son [C(R⁶R^{6'})]_q;

cada Q se selecciona independientemente a partir de -CH₂- o -C(=O)-;



W se selecciona a partir de un enlace u O;


R¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a



R² se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)-OR⁴, -alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono)-O-alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), -C(O)R⁵, -(CH₂)_rNR⁷R⁸, y -(CH₂)_rN⁺(R⁴)₃;

R^3 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a

12 átomos de carbono), $-NR^1R^2$, $-OR^5$, , , y

, en donde:

X es un arilo (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico,

Y se selecciona a partir de un heterociclo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico o un heteroarilo (de 2 a 9 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico, cada uno teniendo de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de S, N u O, y

Z es un cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H y alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono);

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-(CH_2)_rNR^7R^8$, y $-(CH_2)_rOR^7$;

R^6 y $R^{6'}$ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), halo-alquilo, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, $-C(O)OH$, y $-C(O)NH_2$, en donde los grupos R^6 y $R^{6'}$ se pueden tomar opcionalmente junto con el átomo de carbono con el que están unidos, para formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 8 miembros, y en donde el anillo de cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido por uno a tres grupos R^{11} ;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-NR^{14}R^{15}$, y $-C(O)CH_3$;

R^9 es halógeno;

R^{10} es $-N(R^{16})_2$;

R^{11} , R^{12} , y R^{13} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en oxo, hidroxilo, halógeno, alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^{10}$, $-R^4YR^6$, $-CO(O)R^4$, y $-CO(O)R^5$;

R^{14} y R^{15} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en $-H$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-[C(R^6)_2]_r$, $-O[C(R^6)_2]_r$, oxo, hidroxilo, halógeno, $-C(O)R^7$, $-R^{10}$, y $-CO(O)R^2$;


R^{16} se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en $-H$, oxo, halógeno, hidroxilo, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, $-N(R^4)_2$, $-(CH_2)_r$ -heterociclo, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-R^5(R^9)_q$, $-OR^5(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, $-C(O)R^{10}$, y $-CO(O)R^4$;

m y n son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4;


p es independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4; y

r y q son independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4.

45. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (II):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




L_1 y L_2 son ambos $(-CH_2-)$;

Q es $-C(=O)-$;

W es O;

R^1 es -H;

R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^5$, y $-(CH_2)_rNR^7R^8$;

R^3 es , en donde X es un aro (de 5 a 14 átomos de carbono) monocíclico o bicíclico;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H y alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono);

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-(CH_2)_rNR^7R^8$, y $-(CH_2)_rOR^7$;

R^6 se selecciona a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcóxido (de 1 a 6 átomos de carbono), halo-alquilo, $-(CH_2)_rNR^7R^8$, $-C(O)OH$, y $-C(O)NH_2$;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-NR^{14}R^{15}$, y $-C(O)CH_3$;

R^9 es halógeno;

R^{10} es $-N(R^{16})_2$;

R^{11} , R^{12} , y R^{13} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en oxo, hidróxido, halógeno, alcóxido (de 1 a 6 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, nitrógeno, $-SO_2R^6$, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), $-C(O)R^{10}$, $-CO(O)R^4$, y $-CO(O)R^5$;

R^{14} y R^{15} se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), alcóxido (de 1 a 6 átomos de carbono), $-[C(R^6)_2]_r$, $-O[C(R^6)_2]_r$, oxo, hidróxido, halógeno, $-C(O)R^7$, $-R^{10}$, y $-CO(O)R^2$;


R^{16} se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en -H, oxo, halógeno, hidroxilo, alquilo (de 1 a 6 átomos de carbono), alcoxilo (de 1 a 6 átomos de carbono), cicloalquilo (de 3 a 8 átomos de carbono), $-R^6(R^9)_q$, $-OR^6(R^9)_q$, $-N(R^4)_2$, $-(CH_2)_r$ -heterociclo, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-R^5(R^9)_q$, $-OR^5(R^9)_q$, nitro, $-SO_2R^6$, $-C(O)R^{10}$, y $-CO(O)R^4$;

m y n son independientemente 0, 1, ó 2;


p es independientemente 0, 1, ó 2; y

r y q son independientemente 0, 1, 2, ó 3.

46. Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (II):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



L_1 y L_2 son ambos $-(CH_2)-$;

Q es $-C(=O)-$;

W es O;

R^1 es -H;

R^2 es $-(CH_2)_rNR^7R^8$;

R^3 es , en donde X es fenilo;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -H y metilo;


R⁹ se selecciona a partir del grupo que consiste en cloro, bromo, y flúor;

R¹¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en cloro, bromo, y flúor;

m es 0, 1, ó 2; y


res 1, 2, ó 3.

47. Un compuesto que tiene la estructura:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

48. Un compuesto que tiene la estructura:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

49. Un compuesto que tiene la estructura:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.




50. Un compuesto que tiene la estructura:







o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.



51. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo
seleccionado a partir del grupo que consiste en:



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[(1R)-1- [(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-17-[(3-carboxi-3,3-dimetil- propanoil)-oxi]-1,2,14, 18,18- pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)- pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-5-il]-2- {[(4-cloro-fenil)-metil]-amino}- etoxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[(1R)-1-[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-17-[(3-carboxi-3,3-dimetil-propanoil)-oxi]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 [^] {2,10}.0 [^] {5,9}.0 [^] {14,19}]-henicos-8-en-5-il]-2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-etoxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[(1S)-1-[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-17-[(3-carboxi-3,3-dimetil-propanoil)-oxi]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 [^] {2,10}.0 [^] {5,9}.0 [^] {14,19}]-henicos-8-en-5-il]-2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-amino}-etoxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[(1S)-1-[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-17-[(3-carboxi-3,3-dimetil-propanoil)-oxi]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 [^]



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-5-il]-2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-etoxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-amino]-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[2-(bencil-amino)-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico




Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-{[(3-cloro-fenil)-metil]-amino}-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-{[(3-cloro-2-fluoro-fenil)-metil]-amino}-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-[[1-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-amino]-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-{[1-(4-cloro-fenil)-ciclopropil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-{[(4-cloro-fenil)-metil]-(metil)-amino}-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-{N-[(4-cloro-fenil)-metil]-acetamido}-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[(4-cloro-fenil)-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-([(1S)-2-([(4-cloro-fenil)-metil]-amino)-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-([(1S)-2-([(4-cloro-fenil)-metil]-amino)-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-1-(acetiloxi)-2-{[(4-cloro-fenil)-metil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-{[(4-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-{[(4-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	(propan-2-il)-pentaciclo- [11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en- 17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo- butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R, 10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-1- (acetiloxi)-2-{[(4-cloro-fenil)-metil]- [2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-etil]- 1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8- (propan-2-il)-pentaciclo- [11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en- 17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo- butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R, 10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-1- (acetiloxi)-2-{[(4-cloro-fenil)-metil]- [2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-etil]- 1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8- (propan-2-il)-pentaciclo- [11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en- 17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo- butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 5-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[[[(1R)-2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{{5,9}.0^{14,19}}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-3,3-dimetil-5-oxo-pentanoico}
	Ácido 5-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[[[(1S)-2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{{5,9}.0^{14,19}}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-3,3-dimetil-5-oxo-pentanoico}



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[[(2-cloro-fenil)-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[[(2-cloro-fenil)-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-1-(acetiloxi)-2-[[[(4-fluoro-fenil)-metil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-1-(acetiloxi)-2-[[[(4-fluoro-fenil)-metil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-1-acetoxi-2-((4-cloro-bencil)-(metil)-amino)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8, 11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[4-cloro-fenil)-metil]-(metil)-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-1-acetoxi-2-((4-cloro-bencil)-(metil)-amino)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-(metil)-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-1-acetoxi-2-(N-(4-cloro-bencil)-acetamido)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-{N-[(4-cloro-fenil)-metil]-acetamido}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-(N-(4-cloro-bencil)-acetamido)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-2-(N-(4-cloro-bencil)-acetamido)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-(N-(2-cloro-bencil)-acetamido)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-1-(acetiloxi)-2-{[(2-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[[(3-cloro-fenil)-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[[(3-cloro-fenil)-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[[(3-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[[(3-cloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-1-(acetiloxi)-2-{[(3-cloro-fenil)-metil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-1-(acetiloxi)-2-{[(3-cloro-fenil)-metil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-1-acetoxi-2-((3-cloro-bencil)-(2-(dimetil-amino)-etil)-amino)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-1-acetoxi-2-((3-cloro-bencil)-(2-(dimetil-amino)-etil)-amino)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-2-((3-cloro-bencil)-(etil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-((3-cloro-bencil)-(2-(dimetil-amino)-etil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-2-((3-cloro-bencil)-(2-(dimetil-amino)-etil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-{N-[(3-cloro-fenil)-metil]-acetamido}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-{N-[(3-cloro-fenil)-metil]-acetamido}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-1-acetoxi-2-((2-cloro-bencil)-(2-(dimetil-amino)-etil)-amino)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-2-((2-cloro-bencil)-(etil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-(((2-cloro-fenil)-metil)-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino)-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[2-cloro-fenil]-metil]-2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-1-(acetiloxi)-2-(bencil-amino)-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-1-(acetiloxi)-2-(bencil-amino)-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo[11.8.0.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-2-((3-cloro-2-fluoro-bencil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico

Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-((3-cloro-2-fluoro-bencil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[3-cloro-2-fluoro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-{[(3-cloro-2-fluoro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-1-hidroxi-2-[(propan-2-il)-amino]-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-(ciclohexil-amino)-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5S,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[1-hidroxi-2-(4-metil-piperazin-1-il)-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-{[(4-cloro-fenil)-metil]-amino}-etil)-1,2,14,18,18-pentametil-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il)-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5S,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-{[(4-cloro-fenil)-metil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il)-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5S,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[(ciclohexil-metil)-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-(ciclohexil-amino)-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-([(1R)-1-hidroxi-2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-il)-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-([(1S)-1-hidroxi-2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-il)-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(5S)-3-[1-(5-cloro-pirimidin-2-il)-ciclopropil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(5R)-3-[1-(5-cloro-pirimidin-2-il)-ciclopropil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi]-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico




Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 5-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[(4-cloro-fenil)-metil]-amino)-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0^{2,10}.0^{5,9}.0^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-3,3-dimetil-5-oxo-pentanoico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-2-(3,4-dihidro-isoquinolin-2(1H)-il)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-(3,4-dihidro-isoquinolin-2(1H)-il)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((R)-1-hidroxi-2-(4-metil-piperazin-1-il)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-(2-((4-cloro-bencil)-amino)-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-((ciclohexil-metil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-(ciclohexil-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-(bencil-(2-(dimetil-amino)-etil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico



Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-1-(acetiloxi)-2-{[2-(dimetil-amino)-etil]-[(4-fluoro-fenil)-metil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-1-(acetiloxi)-2-{[2-(dimetil-amino)-etil]-[(4-fluoro-fenil)-metil]-amino}-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico


Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 5-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[[(4-cloro-fenil)-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi)-3,3-dimetil-5-oxo-pentanoico
	Ácido 5-(((3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aS)-3a-((S)-2-((4-cloro-bencil)-amino)-1-hidroxi-etil)-1-isopropil-5a,5b,8,8,11a-pentametil-2-oxo-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,7a,8,9,10,11,11a,11b,12,13,13a-octadecahidro-2H-ciclopenta-[a]-crisen-9-il)-oxi)-3,3-dimetil-5-oxo-pentanoico
	Ácido 4-([(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[[(2,4-dicloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-

Estructura Progenitora	Nombre Químico
	pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-{bencil-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-{[2-(dimetil-amino)-etil]-[(4-fluoro-fenil)-metil]-amino}-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico

Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[[4-fluorophenil]-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[2-(dimetil-amino)-etil]-[[4-fluorophenil]-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico

Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1S)-2-[[[(4-fluoro-fenil)-metil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-[[[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[[[(2,4-dicloro-fenil)-metil]-[2-(dimetil-amino)-etil]-amino]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico


Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-[(1R)-2-[1-(4-cloro-fenil)-N-[2-(dimetil-amino)-etil]-formamido]-1-hidroxi-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico
	Ácido 4-{[(1R,2R,5R,10S,13R,14R,17S,19R)-5-(2-[(2-cloro-fenil)-metil]-amino)-etil]-1,2,14,18,18-pentametil-7-oxo-8-(propan-2-il)-pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en-17-il]-oxi}-2,2-dimetil-4-oxo-butanoico

Estructura Progenitora	Nombre Químico
	Ácido 2,2-dimetil-4-oxo-4- {[(1R,2R,5R,10S,13R, 14R,17S,19R)-1,2,14,18,18- pentametil-7-oxo-5-[2-(fenil- formamido)-etil]-8-(propan-2-il)- pentaciclo-[11.8.0.0 ^{2,10} .0 ^{5,9} .0 ^{14,19}]-henicos-8-en- 17-il]-oxi}-butanoico


52. El compuesto de las reivindicaciones 1 a 51, en donde la sal farmacéuticamente aceptable es una sal de base.

53. El compuesto de la reivindicación 52, en donde la sal farmacéuticamente aceptable es una sal de Lisina.


54. Un compuesto que tiene la estructura:




55. Un compuesto que tiene la estructura:



56. Un compuesto que tiene la estructura:



57. Un compuesto que tiene la estructura:



58. Una composición farmacéutica, la cual comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 57, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

59. La composición de la reivindicación 58, en donde el compuesto está presente en una forma amorfa.

60. La composición de la reivindicación 58, en donde la composición está en una forma de tableta.

61. La composición de la reivindicación 58, en donde el compuesto está presente como una dispersión secada por aspersión.

62. Un método para el tratamiento de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en un sujeto, el cual comprende administrar al sujeto, un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 57, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

63. Un método para el tratamiento de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en un sujeto, el cual comprende administrar al sujeto, una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 58.

64. Un método para prevenir una infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en un sujeto en riesgo de desarrollar una infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual comprende administrar al sujeto, un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 57, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

65. Un método para prevenir una infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en un sujeto en riesgo de desarrollar una infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual comprende

administrar al sujeto, una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 58.

66. El método de las reivindicaciones 62 a 65, el cual comprende además la administración de uno o más agentes adicionales activos contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

67. El método de la reivindicación 66, en donde el uno o más agentes adicionales activos contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se selecciona a partir del grupo que consiste en zidovudina, didanosina, lamivudina, zalcitabina, abacavir, estavudina, adefovir, adefovir dipivoxil, fozivudina, todoxil, emtricitabina, alovudina, amdoxovir, elvucitabina, nevirapina, delavirdina, efavirenz, lovirida, immunocal, oltipraz, capravirina, lersivirina, GSK2248761, TMC-278, TMC-125, etravirina, saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir, fosamprenavir, brecanavir, darunavir, atazanavir, tipranavir, palinavir, lasinavir, enfuvirtida, T-20, T-1249, PRO-542, PRO-140, TNX-355, BMS-806, BMS-663068 y BMS-626529, 5-Hélice, raltegravir, elvitegravir, GSK1349572, GSK1265744, vicriviroc (Sch-C), Sch-D, TAK779, maraviroc, TAK449, didanosina, tenofovir, lopinavir, y darunavir.

68. El uso de un compuesto o de una sal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 57, en la elaboración de un medicamento para utilizarse en el tratamiento de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en un ser humano.

69. El uso de un compuesto o de una sal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 57, en la elaboración de un medicamento para utilizarse en terapia.

70. El método de acuerdo con las reivindicaciones 62 a 67, en donde el sujeto es un ser humano.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
-/-



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 007197

Bogotá D.C., Enero 20 de 2015 - 16:43:10

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A. NI 830.022.145

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	5875	20/01/2015		24.945.000.00
RECIBO DE CA	999999999	7174	20/01/2015		1.054.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
				<u>\$132.000.00</u>

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-117726- -00004-0000

Fecha: 2015-02-18 16:15:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 74

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0018670

Bogotá D.C., Febrero 16 de 2015 - 17:35:23

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	18668	16/02/2015		4.288.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
60 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	32.000.00	1.920.000.00
			\$1.920.000.00

SON: **UN MILL&OACUTE;N NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-117726- -00004-0000

Fecha: 2015-02-18 16:15:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 74

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Febrero 16 de 2015 - 17:35:23