



No. 14-223487- -00000-0000

Fecha: 2014-10-08 16:08:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 5



No. 13-134124- -00003-0000

Fecha: 2014-10-08 16:08:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 851 DIVISIONAL Folios: 5

T = F = 4

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

SOLICITUD PATENTE DE INVENCION

21. EXPEDIENTE No. _____

54. TÍTULO COMPOSICIONES ÚTILES PARA
LA RECUPERACIÓN MEJORADA DE
PETRÓLEO QUE COMPRENDE
PSEUDOMONAS STUTZERI.

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL _____

71. SOLICITANTE E.I. DU PONT DE N.DOMICILIO WILMINGTON, ESTADOS UNIDOS74. APODERADO AVARO CORREA.22. BOGOTÁ, D.C., 8 DE OCTUBRE 2014

**DIRECCIÓN DE NUEVA
CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES**

1. Identificación del Trámite

- ☐ Conversión ☒ División ☐ Fusión
- ☒ Patente de Invención
☐ Patente de Modelo de Utilidad
☐ Registro de Diseño Industrial
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Nombre o denominación / Nombre o razón social

Nombre del representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro

Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898	Wilmington
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Correa Ordoñez, Alvaro

79.143.366

20.281

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
AV. 82 No. 10 62 Piso 6		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite		
CONVERSION Expediente _____ _____ _____ De: _____ A: _____	DIVISIÓN Expediente <u>13.134.124</u> De: _____ A: _____	FUSION Expediente _____ _____ _____ De: _____ A: _____
5. Comprobante de Pago No. 14-0084514 Fecha 05/08/2014		
6. Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación ☒ Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación ☐ Número de documento que ordena la comisión o fusión o división ☒ Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud ☒ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético		
7. Firma Alvaro Correa Ordoñez Nombre y apellidos C.C. 79.143.366	 Firma Tarjeta Profesional 20.281	

2014/0513

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0084515

Bogotá D.C., Agosto 05 de 2014 - 17:21:36

RECIBIDO DE : BAKER

NI 900.532.339

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	84496	05/08/2014		33.825.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1603 INVOCAR LA NOTORIEDAD DENTRO DE UN TRAMITE DE OPOSICION	464.000.00	464.000.00
				\$464.000.00

SON: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-223487- -00000-0000

Fecha: 2014-10-08 16:08:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-134124- -00003-0000

Fecha: 2014-10-08 16:08:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 851 DIVISIONAL Folios: 5

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Agosto 5 de 2014 - 17:22:01

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	PLANILLA DE RADICACIÓN - DIGITALIZACIÓN DIARIA RELACIÓN DE ANEXOS
Dependencia: 2020	Fecha: 14/10/8 AAAA MM DD
Recorrido:	
Tipo de Radicación: Entrada: ☐ Salida: ☐ Traslado: ☐ Convenio: ☐	
Radicador:	Planilla:

ID	No. Radicación	Consecutivo	Item
1	13-134124	03	
2	14-223487	0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Item	Unidad de Conservación
1	Bolsa
2	Caja
3	Libro
4	Sobre
5	Tomo
6	Otro
Item	Soporte Documental
7	CD <i>X</i>
8	Disquete
9	DVD
10	Folleto
11	Foto
12	Periódico
13	Plano
14	Publicación Periódica
15	USB
16	Otro

Observaciones: El cd anexo contiene: 10 archivos en formato PDF, los cuales son procesados y subidos al sistema 1. archivo en formato de texto el cual no fue procesado <i>Chadla</i>



No. 14-223487-00000-0000

Fecha: 2014-10-08 16:08:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 411 PRESENTACION Folios: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-134124-00003-0000

Fecha: 2014-10-08 16:08:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 851 DIVISIONAL Folios: 5



ADMIS

PATENTE DE INVENCION ☐MODELO DE UTILIDAD ☐☐

Indicación que se solicita una patente.

☐

Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud

☐

Descripción de la invención

☐

Dibujos de ser estos pertinentes

☐

Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento)

Completa ☐Incompleta ☐PATENTE DE INVENCION PCT ☒MODELO DE UTILIDAD PCT ☐

Art.33 Decisión 486/00, Circular Única

☐

Indicación que se solicita una PCT

☒

Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada inicialmente (capítulo descriptivo, reivindicatorio, resumen)

☒

Dibujos de ser estos pertinentes

☒

Comprobante de pago de las tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)

Completa ☒Incompleta ☐DISEÑO INDUSTRIAL ☐

(Art. 119 Decisión 486/00)

☐

Indicación que se solicita Diseño industrial

☐

Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud

☐

Representación gráfica y fotográfica del Diseño industrial o muestra del material que incorpora el diseño

☐

Comprobante de pago de las tasas establecidas

Completa ☐Incompleta ☐ESQUEMA DE TRAZADO ☐

(Art. 92 Decisión 486/00)

☐

Indicación que se solicita un esquema de trazado

☐

Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud

☐

Representación gráfica de un esquema de trazado

☐

Comprobante de pago de las tasas establecidas

Completa ☐Incompleta ☐

**"COMPOSICIONES ÚTILES PARA LA RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO
QUE COMPRENDE PSEUDOMONAS STUTZERI"**

Esta solicitud reivindica el beneficio de la solicitud
5 provisional de los Estados Unidos núm. 61/408734, presentada
el 1.º de noviembre de 2010, y se incorpora como referencia
en su totalidad.

CAMPO DE LA INVENCION

10 Esta descripción se relaciona con el campo de la
microbiología ambiental y la modificación de las propiedades
de pozos de petróleo crudo mediante el uso de
microorganismos. Más específicamente, se presentan métodos
para mejorar la recuperación de petróleo de un yacimiento
15 subterráneo, y se identifican nuevos microorganismos que
pueden usarse para la recuperación de petróleo.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Durante la recuperación de petróleo de yacimientos
20 petroleros, típicamente, solamente se recupera una porción
menor del petróleo original en los estratos que contienen
petróleo por métodos de recuperación primaria que usan solo las
fuerzas naturales presentes en un yacimiento de petróleo. Para
mejorar la recuperación de petróleo, se ha usado una variedad
25 de técnicas de recuperación complementarias, tales como la

inundación con agua, que involucra la inyección de agua a través de orificios en el pozo hacia el interior del yacimiento de petróleo. A medida que el agua entra en el yacimiento desde un pozo de inyección y se mueve a través de los estratos del yacimiento, el agua desplaza el petróleo a uno o más pozos de producción en donde se recupera el petróleo. Un problema que se presenta comúnmente en las operaciones de inundación con agua es la eficacia de barrido deficiente del agua de inyección. La eficacia de barrido deficiente se produce cuando el agua se canaliza, preferentemente, a través de zonas sumamente permeables del yacimiento petrolero a medida que se desplaza desde uno o más pozos de inyección hacia uno o más pozos de producción y pasa por alto, de este modo, estratos que tienen petróleo que son menos permeables. Por lo tanto, el petróleo de zonas menos permeables no se recupera. La eficacia de barrido deficiente puede deberse, además, a diferencias en la movilidad del agua en comparación con la del petróleo.

Se han usado microorganismos para mejorar la recuperación de petróleo de formaciones subterráneas mediante el uso de varios procesos que pueden mejorar la eficacia de barrido y/o la liberación de petróleo. Por ejemplo, pueden inyectarse microorganismos viables en un yacimiento petrolero, en donde estos organismos pueden crecer y adherirse a las superficies de poros y canales en las matrices de roca o arena en las zonas permeables para reducir la canalización del agua y, de este

modo, dirigir el flujo del agua de inyección hacia estratos menos permeables que tienen petróleo. Los procesos para promover el crecimiento de microbios autóctonos al inyectar soluciones nutrientes en formaciones subterráneas se describen en las patentes de los Estados Unidos núms. 4.558.739 y 5.083.611. La inyección de microorganismos aislados de sitios de recuperación de petróleo en formaciones subterráneas junto con soluciones nutrientes se ha descrito, incluso para *Pseudomonas putida* y *Klebsiella pneumoniae* (patente de los Estados Unidos núm. 4.800.959), para una cepa de *Bacillus* o cepa I-2 de *Pseudomonas* (ATCC 30304) aislada de agua de grifo (patente de los Estados Unidos núm. 4.558.739), y para *Pseudomonas putida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Corynebacterium lepus*, *Mycobacterium rhodochrous*, y *Mycobacterium vaccae* (patente de los Estados Unidos núm. 5.163.510). La inyección de microorganismos aislados y un surfactante se describe en la patente de los Estados Unidos núm. 5.174.378.

La publicación de solicitud de patente copendiente y de propiedad mancomunada de los Estados Unidos núm. 2009/0263887 describe un microorganismo identificado como cepa LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823), que se aisló de muestras combinadas de petróleo/agua de la cabeza de pozos de producción. Se describieron composiciones y métodos para mejorar la recuperación de petróleo con esta cepa. La patente de los Estados Unidos núm. 7.776.795 describe un microorganismo

identificado como cepa LH4:18 de *Shewanella putrefaciens*, que se aisló de muestras combinadas de petróleo/agua de la cabeza de pozos de producción. Se describieron composiciones y métodos para mejorar la recuperación de petróleo con esta cepa. La
5 publicación de solicitud de patente copendiente y de propiedad mancomunada de los Estados Unidos núm. 2011/0030956 describe una superficie recubierta con hidrocarburos que se pone en contacto con un medio que comprende *Shewanella* sp. Para alterar la humectabilidad de una superficie recubierta con
10 hidrocarburos y mejorar la recuperación de petróleo.

Se necesitan otras cepas microbianas y métodos útiles para mejorar la recuperación de petróleo y mejorar aún más la recuperación de petróleo de yacimientos petroleros.

15 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La invención se relaciona con métodos para mejorar la recuperación de petróleo de un yacimiento petrolero así como con microorganismos aislados y composiciones que pueden usarse para mejorar la recuperación de petróleo.

20 Consecuentemente, la invención proporciona un método para mejorar la recuperación de petróleo de un yacimiento petrolero; el método comprende:

a) proporcionar una composición que comprende:

i) al menos una cepa de *Pseudomonas stutzeri*: y

- ii) un medio de crecimiento mínimo que comprende por lo menos un aceptor de electrones;
- b) proporcionar un yacimiento petrolero;
- c) inocular el yacimiento petrolero con la composición de (a) para que la *Pseudomonas stutzeri* se reproduzca y crezca en el yacimiento petrolero; y
- d) recuperar petróleo del yacimiento petrolero; en donde el crecimiento de la *Pseudomonas stutzeri* en el yacimiento petrolero mejora la recuperación de petróleo.

En otra modalidad, la invención proporciona un microorganismo aislado seleccionado del grupo que consiste en BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA 11283) y 89AC1-3 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-11284).

En aún otra modalidad, la invención proporciona una composición que mejora la recuperación de petróleo; la composición comprende:

- a) por lo menos un microorganismo aislado de los mencionados anteriormente;
- b) uno o más aceptores de electrones; y
- c) por lo menos una fuente de carbono.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS Y SECUENCIAS

La presente invención se comprenderá más fácilmente a partir de la siguiente descripción detallada, las figuras y descripciones de secuencias que se acompañan, las cuales
5 forman parte de esta solicitud.

La Figura 1 muestra un árbol filogenético para *Pseudomonas stutzeri* y especies relacionadas con *Pseudomonas* que está basado en diferencias en las secuencias génicas del ARNr 16S (ADNr).

10 La Figura 2 muestra un análisis de ribotipado automático, RIBOPRINTER®, de varias cepas de *Pseudomonas stutzeri*.

La Figura 3 muestra secuencias distintivas dominantes y degeneradas para la especie *Shewanella* en las regiones variables 2 (A), 5 (B) y 8 (C) del ADNr. Las posiciones
15 variables están subrayadas. En la leyenda se dan nucleótidos alternativos para cada designación de posiciones variables.

La Figura 4 muestra un diagrama esquemático de la configuración experimental de tubos delgados usados para medir la obturación de paquetes de arena permeable.

20 La Figura 5 muestra gráficas de cambios observados en la concentración de nitratos (ppm) como una medida del crecimiento de BR5311 y *Vibrio harveyi* en mezclas de agua de producción (A) o agua de inyección (B) del pozo petrolero núm. 2 que incluyen nutrientes.

La Figura 6 muestra una gráfica de cambios observados en la concentración de nitratos (ppm) como una medida del crecimiento de BR5311 en agua de producción del pozo petrolero núm. 2 con adiciones limitadas de nutrientes.

5 La Figura 7 muestra una gráfica de la caída de presión a través de un tubo delgado de control (9a) sin inóculo o alimentación de nutrientes en él, medida por más de 50 días.

La Figura 8 muestra una gráfica de la caída de presión a través de un tubo delgado (9b) que fue inoculado con LH
10 4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823) y que, después, fue alimentado con nutrientes continuamente, medida por más de 50 días.

La Figura 9 muestra una gráfica de la caída de presión a través de un tubo delgado (9c) que fue inoculado con LH
15 4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823) y que, después, se alimentó por lotes periódicamente con nutrientes concentrados, medida por más de 50 días.

La Figura 10 muestra una gráfica de la caída de presión a través de un tubo delgado (9a-2) antes de la inoculación,
20 medida durante 12 días.

La Figura 11 muestra una gráfica de la caída de presión a través de un tubo delgado (9a-2) que fue inoculado con BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-11283) y que, después, se alimentó por lotes periódicamente con
25 nutrientes, medida por más de 46 días.

La Figura 12 muestra una gráfica de la caída de presión a través de un tubo delgado (9b-2) que fue inoculado con BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-11283) y que, después, se alimentó continuamente con nutrientes, medida
5 por más de 46 días.

Las siguientes secuencias cumplen con el Título 37 del C.F.R., §§1.821-1.825 (“Requisitos para solicitudes de patentes que contienen descripciones de secuencias de nucleótidos y/o de secuencias de aminoácidos - reglas de las
10 secuencias”) según la norma ST.25 (2009) de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) y los requisitos para listados de secuencias de la EPO y el PCT (Reglas 5.2 y 49.5(a-bis), y Sección 208 y Anexo C de las Instrucciones Administrativas. Los símbolos y
15 el formato que se usan para los datos de las secuencias de nucleótidos y de aminoácidos cumplen con las reglas que se exponen en el Título 37 del C.F.R., §1.822.

Las sec. con núms. de ident.:1 - 4 son iniciadoras.

La sec. con núm. de ident.:5 es la secuencia del ADNr
20 16S secuenciado de la cepa BR5311.

La sec. con núm. de ident.:6 es la secuencia del ADNr 16S secuenciado de la cepa 89AC1-3.

La sec. con núm. de ident.:7 es una secuencia consenso dominante del ADNr 16S para *Pseudomonas stutzeri*

La sec. con núm. de ident.:8 es una secuencia consenso degenerada del ADNr 16S para *Pseudomonas stutzeri*.

Tabla 1. Secuencias del ADNr 16S de cepas de *Pseudomonas* que incluyen las coordenadas 60 a 1400 en la secuencia del ADNr 16S de *E. coli*, incluidas como referencia.

	ADNr 16S: coordenadas 60 a 1400	Genomovar o tipo*	Sec. con núm. de ident.
10	<i>Escherichia coli</i> K-12 W3110	NA ^{núm.}	9
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> BR5311	NA	10
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> 89AC1-3	NA	11
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> LH4:15	NA	12
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> DSM 50227	g3	13
15	<i>Pseudomonas stutzeri</i> AN10	g3	14
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> ATCC 17591	g2	15
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> ZoBell ATCC 14405	g2	16
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> ATCC 17588	g1	17
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> A1501	g1	18
20	<i>Pseudomonas stutzeri</i> 19smn4 DSM 6084	g4	19
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> DNSP21 DSM 6082	g5	20
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> DSM 50238	g7	21
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> JM300	g8	22
25	<i>Pseudomonas stutzeri</i> KC ATCC 55595	g9	23

	<i>Pseudomonas stutzeri</i> CLN100	g10	24
	<i>Pseudomonas stutzeri</i> CCUG 11256	g1	25
	<i>Pseudomonas balearica</i> SP1402	Tipo g6	26
	<i>Pseudomonas balearica</i> LS401	g6	27
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 10145	Tipo	28
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> UCBPP-PA14	NA	29
	<i>Pseudomonas citronellolis</i> DSM 50332	NA	30
	<i>Pseudomonas alcaligenes</i> ATCC 14909	Tipo	31
	<i>Pseudomonas nitroreducens</i> DSM 14399	Tipo	32
10	<i>Pseudomonas mendocina</i> ymp	Tipo	33
	<i>Pseudomonas agarici</i> ATCC 25941	Tipo	34
	<i>Pseudomonas pseudoalcaligenes</i> PR51	NA	35
	<i>Pseudomonas fluorescens</i> Pf5	NA	36
15	<i>Pseudomonas putida</i> KT2440	NA	37

* Tipo: una cepa Tipo para esa especie
 NA: no aplicable

La sec. con núm. de ident.:38 es la secuencia distintiva dominante de *Shewanella* para la región variable 2 del ADNr 16S.

La sec. con núm. de ident.:39 es la secuencia distintiva degenerada de *Shewanella* para la región variable 2 del ADNr 16S.

La sec. con núm. de ident.:40 es la secuencia distintiva dominante de *Shewanella* para la región variable 5 del ADNr 16S.

La sec. con núm. de ident.:41 es la secuencia distintiva degenerada de *Shewanella* para la región variable 5 del ADNr 16S.

La sec. con núm. de ident.:42 es la secuencia distintiva dominante de *Shewanella* para la región variable 8 del ADNr 16S.

La sec. con núm. de ident.:43 es la secuencia distintiva degenerada de *Shewanella* para la región variable 8 del ADNr 16S.

La sec. con núm. de ident.:44 es la secuencia del ADNr 16S secuenciado de la cepa LH4:15.

Los solicitantes han hecho los siguientes depósitos biológicos de conformidad con los términos del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos para los fines del procedimiento en materia de patentes:

Tabla 2

Información sobre las cepas depositadas

Identificación del depositante Referencia	Designación de depósito internacional	Fecha de depósito
<i>Pseudomonas stutzeri</i> BR5311	núm. ATCC: PTA-11283	9/9/10

<i>Pseudomonas stutzeri</i> 89AC1-3	núm. ATCC: PTA-11284	9/9/10
--	----------------------	--------

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

Los solicitantes incorporan específicamente todo el contenido de todas las referencias citadas en esta descripción. A menos que se establezca de cualquier otra forma, todos los porcentajes, partes, relaciones, etc., se expresan en peso. Las marcas registradas se muestran en mayúsculas. Adicionalmente, cuando una cantidad, concentración, u otro valor o parámetro se da ya sea como un intervalo, intervalo preferido o una lista de valores preferibles superiores y valores preferibles inferiores, esto se entenderá como que específicamente describe todos los intervalos formados a partir de cualquier par de cualquier límite de intervalo superior o valor preferido y cualquier límite de intervalo inferior o valor preferido, sin considerar si los intervalos se describen separadamente. Cuando en la presente descripción se menciona un intervalo de valores numéricos, a menos que se establezca de cualquier otra forma, el intervalo pretende incluir los límites de este y todos los números enteros y fracciones comprendidos dentro del intervalo. No está previsto que el alcance de la invención esté limitado a los valores específicos mencionados al definir un intervalo.

La invención se relaciona con métodos para mejorar la recuperación de petróleo de un yacimiento petrolero al inocular el yacimiento petrolero con una cepa de *Pseudomonas stutzeri*: y un medio mínimo de crecimiento que ayuda al crecimiento de *Pseudomonas stutzeri* en condiciones desnitrificantes en la

ubicación subterránea. El crecimiento de *Pseudomonas stutzeri* en el yacimiento de petróleo puede formar biopelículas que obturan zonas más permeables en capas de arena o arenisca, lo que vuelve a dirigir el agua hacia áreas más ricas en petróleo
5 que son menos permeables. De este modo, se mejora la eficacia de barrido y se incrementa la recuperación de petróleo.

Adicionalmente, la invención se relaciona con microorganismos anteriormente desconocidos aislados de muestras de agua de producción obtenidas de un yacimiento
10 petrolero y con composiciones que contienen estos microorganismos, que son útiles en métodos de recuperación de petróleo. Mejorar la recuperación de petróleo mediante el uso de los métodos y microorganismos descritos incrementará el rendimiento de los pozos de petróleo activos.

15 Se proporcionan las siguientes definiciones para los términos y abreviaturas que se usan en esta solicitud:

El término “PCR” se refiere a la reacción en cadena de la polimerasa.

El término “dNTP” se refiere a los
20 desoxirribonucleótidos trifosfato.

El término “ASTM” se refiere, por sus siglas en inglés, a la “American Society for Testing and Materials” (Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales).

La abreviatura “NCBI” se refiere, por sus siglas en inglés, al “National Center for Biotechnology Information” (Centro Nacional de Información en Biotecnología).

La abreviatura “ARN” se refiere al ácido ribonucleico.

5 La abreviatura “ADN” se refiere al ácido desoxirribonucleico.

La abreviatura “ATCC” se refiere, por sus siglas en inglés, al “American Type Culture Collection International Depository” (Depósito Internacional de la Colección Estadounidense de Cultivos Tipo), Manassas, VA, EE. UU. “Núm. ATCC” se refiere al número de acceso a cultivos depositados en la ATCC.

La abreviatura “CCUG” se refiere a la “Culture Collection of the University of Göteborg” (Colección de Cultivos de la Universidad de Göteborg), Suecia, que es una colección de microorganismos.

La abreviatura “DSM” o “DSMZ” se refiere a “Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH”, que es una colección alemana de microorganismos y cultivos celulares (Braunschweig, Alemania).

Los términos “yacimiento de petróleo/petrolero” y “estrato que tiene petróleo” pueden usarse intercambiabilmente en la presente descripción, y se refieren a una formación subterránea o del lecho marino a partir de la cual puede recuperarse el

petróleo. La formación es, generalmente, un cuerpo de rocas y suelo que tienen la porosidad y permeabilidad suficientes para almacenar y transmitir petróleo.

El término “orificio de pozo” se refiere a un canal
5 desde la superficie hacia un estrato que tiene petróleo y que tiene el tamaño suficiente para permitir el bombeo de fluidos ya sea desde la superficie hacia el estrato que tiene petróleo (pozo de inyección) o a partir del estrato que tiene petróleo hacia la superficie (pozo de producción).

10 Los términos “desnitrificante” y “desnitrificación” significan reducir nitrato para uso en generación de energía respiratoria.

El término “eficacia de barrido” se refiere a la fracción de un estrato que tiene petróleo a través de la
15 cual pasan fluidos o agua para mover el petróleo a los pozos de producción. Un problema que puede surgir con el proceso de inundación con agua es la eficacia de barrido relativamente ineficiente del agua, es decir, el agua puede canalizarse a través de ciertas porciones de un yacimiento a
20 medida que se desplaza desde uno o más pozos de inyección hacia uno o más pozos de producción y pasar por alto, de este modo, otras porciones del yacimiento. La eficacia de barrido deficiente puede deberse, por ejemplo, a diferencias en la movilidad del agua en comparación con la movilidad del

petróleo, así como a variaciones en la permeabilidad dentro del yacimiento que promueven el flujo a través de algunas porciones del yacimiento y no a través de otras.

El término “cultivo puro” significa un cultivo derivado de un aislado de una sola célula de una especie microbiana. Los cultivos puros específicamente mencionados en la presente descripción incluyen los que se encuentran disponibles públicamente en un depósito y los que se identifican en la presente descripción.

El término “biopelícula” significa una película o “capa de biomasa” de microorganismos. Frecuentemente, las biopelículas se incrustan en polímeros extracelulares, que se adhieren a las superficies sumergidas en, o sometidas a, ambientes acuáticos. Las biopelículas consisten de una matriz de una masa compacta de microorganismos con heterogeneidad estructural, que pueden tener diversidad genética, interacciones comunitarias complejas y una matriz extracelular de sustancias poliméricas.

El término “biopelícula obturadora” significa una biopelícula que tiene la capacidad de alterar la permeabilidad de un material poroso y retardar, de este modo, el movimiento de un fluido a través de un material poroso que está asociado con la biopelícula.

Los términos “nitratos simples” y “nitritos simples” se refieren a nitrato (NO_3^-) y nitrito (NO_2^-), respectivamente,

cuando aparecen en sales iónicas, tales como nitrato de potasio.

El término “agua de inyección” se refiere al fluido inyectado en yacimientos de petróleo para la recuperación secundaria de petróleo. El agua de inyección puede 5 suministrarse desde cualquier fuente adecuada y puede incluir, por ejemplo, agua de mar, salmuera, agua de producción, agua recuperada de un acuífero subterráneo, que incluyen los acuíferos en contacto con el petróleo, o agua 10 de la superficie de un arroyo, río, lago o laguna. Como se conoce en la técnica, puede ser necesario eliminar el material particulado que incluye polvo, trozos de roca o arena y subproductos de corrosión, tales como óxido del agua, antes de la inyección en uno o más orificios de pozos. 15 Los métodos para eliminar este material particulado incluyen filtración, sedimentación y centrifugación.

El término “agua de producción” significa agua recuperada de los fluidos de producción extraídos de un yacimiento de petróleo. Los fluidos de producción contienen tanto agua usada 20 en la recuperación secundaria de petróleo como petróleo crudo producido a partir del yacimiento de petróleo.

El término “inocular un pozo de petróleo” significa inyectar uno o más microorganismos o poblaciones microbianas o un consorcio microbiano en un pozo petrolero o yacimiento

de petróleo de manera que los microorganismos se suministren al pozo o yacimiento sin pérdida de viabilidad.

Los términos “tipificación filogenética”, “cartografía filogenética” o “clasificación filogenética” pueden usarse
5 intercambiabilmente en la presente descripción y se refieren a una forma de clasificación en la que los microorganismos se agrupan según su linaje genético evolutivo. La tipificación filogenética de la presente descripción es de cepas de microorganismos aislados de muestras ambientales y
10 está basada en secuencias del gen que codifica el ARN ribosómico (ARNr) 16S (ADNr).

El término “regiones hipervariables”, como se usa en la presente descripción, se refiere a regiones de secuencias en el gen del ARNr 16S, en donde la secuencia de nucleótidos es
15 muy variable. En la mayoría de los microbios, la secuencia del ADNr 16S consiste en nueve regiones hipervariables que demuestran una diversidad considerable de secuencias entre géneros y especies diferentes de bacterias y que pueden usarse para identificar el género y la especie.

20 El término “secuencias distintivas”, como se usa en la presente descripción, se refiere a nucleótidos específicos en posiciones específicas (posiciones distintivas) del gen que codifica el ARNr 16S (ADNr) que aparecen, usualmente, dentro de las regiones hipervariables, que son distintivas

para microorganismos en niveles diferentes. En las posiciones distintivas, los nucleótidos distintivos entre especies pueden ser una o más sustituciones, inserciones o delecciones de bases específicas. Tomadas en conjunto, las
5 secuencias distintivas del ADNr 16S son útiles para describir microbios en el nivel de especies, cepas o aislados y pueden usarse para identificar un microbio.

El término “posición de base degenerada o degeneración” se refiere al caso en el que más de un nucleótido (A, G, C,
10 o T) es posible en una posición particular en una secuencia. Una posición es un sitio “dos veces degenerado” si solo dos de cuatro nucleótidos posibles pueden estar en esa posición. Una posición es un sitio “tres veces degenerado” si tres de cuatro nucleótidos posibles pueden estar en esa posición.
15 Una posición es un sitio “cuatro veces degenerado” si los cuatro nucleótidos pueden estar en esa posición.

El término “secuencia distintiva degenerada” se refiere a una secuencia distintiva que puede tener una o más posiciones posibles de bases degeneradas en la secuencia distintiva.

20 El término “filogenética” se refiere al campo de la biología que trata con la identificación y comprensión de las relaciones evolutivas entre organismos y, particularmente, la filogenética molecular usa las homologías de secuencias del ADN en este análisis. Particularmente, las similitudes o

diferencias en las secuencias del ADNr 16S, que incluyen secuencias distintivas, identificadas al usar algoritmos de similitud sirven para definir relaciones filogenéticas.

El término “árbol filogenético” se refiere a un diagrama
5 ramificado que representa las relaciones evolutivas entre organismos. El árbol filogenético de la presente descripción está basado en las homologías de secuencias del ADN de los ADNr 16S, que incluyen las secuencias distintivas en el ADNr 16S, y muestra relaciones de las presentes cepas con cepas y
10 especies relacionadas.

El término “clado filogenético” o “clado” se refiere a una rama en un árbol filogenético. Un clado incluye todos los organismos relacionados que se localizan en la rama, según el punto de la rama que se seleccione.

15 El término “genomovar” se usa para describir una clasificación de subespecies que se usa cuando un grupo de cepas de una especie puede diferenciarse por la secuencia del ADN, pero no puede distinguirse fenotípicamente. Los genomovares se definen e identifican por hibridación de ADN-ADN
20 y/o por secuencias distintivas del ADNr 16S. Esta terminología ha sido usada para describir *Pseudomonas stutzeri* por Bennasar et al. ((1996) Int. J. of Syst. Bacteriol.46:200-205).

El término “ribotipificación” significa obtener la huella dactilar de los fragmentos de restricción del ADN genómico que

contienen la totalidad o parte de los genes que codifican para los ARN ribosómicos 16S y 23S. La ribotipificación se realiza por medio del uso del sistema RIBOPRINTER® de DuPont.

El término “RIBOPRINT™” se refiere a la huella dactilar genómica única de un aislado o cepa microbiana específica
5 generada con el sistema RIBOPRINTER® de DuPont.

El término “cepa tipo” se refiere a la cepa de referencia para una especie particular, cuya descripción se usa para definir y caracterizar una especie particular.

10 El término “programa de análisis de secuencias” se refiere a cualquier programa informático o algoritmo computacional que sea útil para el análisis de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos. El “programa de análisis de secuencias” puede estar disponible comercialmente o
15 desarrollado de manera independiente. Los programas informáticos típicos para análisis de secuencias incluyen, pero no se limitan a: el conjunto de programas GCG (Wisconsin Package, Versión 9.0, Genetics Computer Group (GCG), Madison, WI), BLASTP, BLASTN, BLASTX (Altschul et al., *J. Mol. Biol.* 215, 403-410.1990), DNASTAR (DNASTAR, Inc., Madison, WI), y
20 el programa FASTA que incorpora el algoritmo de Smith-Waterman (Pearson, W. R., *Comput. Methods Genome Res.*, Proc. Int. Symp, Meeting Date 1992, 111-120, Eds: Suhai, Sandor, Plenum Publishing, New York, NY, 1994). En el contexto de

esta solicitud, se entenderá que cuando el análisis se realiza con un programa de análisis de secuencias, los resultados del análisis estarán basados en los “valores predeterminados” del programa que se use, a menos que se
5 especifique de cualquier otra forma. Como se usa en la presente descripción, “valor predeterminado” significa cualquier conjunto de valores o parámetros que se cargan originalmente con el programa la primera vez que se inicia.

El término “aceptor de electrones” se refiere a un
10 compuesto que recibe o acepta uno o más electrones durante la respiración celular. Los microorganismos obtienen energía para crecer al transferir electrones de un “donante de electrones” a un aceptor de electrones. Durante este proceso, el aceptor de electrones se reduce y el donante de electrones se oxida. Los
15 ejemplos de aceptores de electrones incluyen oxígeno, nitrato, fumarato, hierro (III), manganeso (IV), sulfato y dióxido de carbono. Los azúcares, ácidos orgánicos de peso molecular bajo, carbohidratos, ácidos grasos, el hidrógeno, y el petróleo crudo o sus componentes, tales como hidrocarburos de petróleo o
20 hidrocarburos aromáticos policíclicos, son ejemplos de compuestos que pueden actuar como donantes de electrones.

“Darcy” es una unidad de permeabilidad. Un medio con una permeabilidad de 1 darcy permite un flujo de $1 \text{ cm}^3/\text{s}$ de un fluido con una viscosidad de 1 cP (1 mPa·s) con un gradiente

de presión de 0,1 Mpa/cm (1 atm/cm) que actúa a través de un área de 1 cm². Un milidarcy (mD) es igual a 0,001 darcy.

Microorganismos aislados

Los microorganismos capaces de crecer en interfases de agua/petróleo en condiciones desnitrificantes se aislaron de
5 aguas de producción y de inyección del Pozo núm. 1 que se ubica en el campo Senlac en la frontera de las provincias de Saskatchewan y Alberta en Canadá central. El Pozo núm. 1 tiene una salinidad de entre 30-35 partes por mil (ppt, por
10 sus siglas en inglés) tanto en aguas de producción como de inyección, lo cual es equivalente a la salinidad del agua de mar. El proceso de aislamiento incluyó enriquecer el crecimiento de microorganismos mediante el uso de lactato como fuente de carbono y nitrato como aceptor de electrones.

15 Los microorganismos aislados se clasificaron por análisis de sus secuencias de ADN ribosómico 16S (ADNr) y por la huella dactilar de sus fragmentos de restricción del ADN genómico que contienen la totalidad o parte de los genes que codifican para los ARN ribosómicos 16S y 23S (ARNr;
20 ribotipificación). Se identificaron dos cepas aisladas como cepas nuevas de *Pseudomonas stutzeri*.

En la presente descripción, los microorganismos que pertenecen a la especie *Pseudomonas stutzeri* se identificaron por secuencias distintivas halladas en sus ADNr 16S, que
25 están presentes en la secuencia consenso degenerada para el

ADNr 16S de *Pseudomonas stutzeri* (sec. con núm. de ident.:8). Como se describe en el Ejemplo 3 de la presente descripción, las posiciones específicas en la secuencia del ADNr 16S se identifican en la presente descripción por tener nucleótidos

5 que son característicos para *Pseudomonas stutzeri*, que pueden ser fijos o tener alguna degeneración, como se presenta en la Tabla 5. El conjunto (todas las posiciones juntas) de secuencias distintivas para *Pseudomonas stutzeri* que se presenta en la Tabla 5 difiere de cada conjunto de secuencias

10 distintivas para las especies estrechamente relacionadas *Pseudomonas balearica*, *Pseudomonas nitroreducens* y *Pseudomonas agarici*, que se presenta, además, en la Tabla 5. La secuencia consenso dominante (más preponderante) del ADNr 16S de *Pseudomonas stutzeri* (que puede no ser de longitud

15 completa), se proporciona como sec. con núm. de ident.:7. La secuencia consenso del ADNr 16S de *Pseudomonas stutzeri* (que puede no ser de longitud completa), que incluye degeneración, se proporciona como sec. con núm. de ident.:8. Los microorganismos que pertenecen a la especie *Pseudomonas*

20 *stutzeri*, como se usan en la presente descripción, pueden identificarse por tener la secuencia consenso degenerada para el ADNr 16S de *Pseudomonas stutzeri* (sec. con núm. de ident.:8). Las secuencias del ADNr 16S de las dos cepas aisladas identificadas en la presente descripción tienen la

25 secuencia consenso degenerada del ADNr 16S de *Pseudomonas* de

sec. con núm. de ident.:8 que incluye las secuencias distintivas identificadas en la presente descripción, lo que confirma su identidad como cepas de *Pseudomonas stutzeri*.

En una modalidad, es la cepa BR5311 de *Pseudomonas*
5 *stutzeri* depositada en ATCC, conforme el tratado de Budapest, como ATCC PTA-11283. El gen del ARNr 16S (ADNr) secuenciado de la cepa BR5311 (sec. con núm. de ident.:5) tiene las secuencias distintivas, enumeradas en la Tabla 5, que son iguales a las secuencias distintivas consenso degeneradas de *Pseudomonas*
10 *stutzeri* que se describieron anteriormente y se presentan en la Tabla 5. La secuencia del ADNr 16S de BR5311 tiene identidades de secuencia de entre 97,9 % y 99,9 % con secuencias del ADNr 16S de otras cepas conocidas de *Pseudomonas stutzeri* con sec. con núms. de ident.:13-25. Como se muestra en un árbol
15 filogenético (Figura 1) descrito en el Ejemplo 3 en la presente descripción y preparado por alineamiento de secuencias del ADNr 16S de longitud casi completa de cepas representativas de *Pseudomonas stutzeri* y otras *Pseudomonads* (sec. con núms. de ident.:10 -37) con el alineamiento Clustal W, árbol
20 filogenético y funciones de prueba de inicio del programa MegAlign del paquete de programas LaserGene de DNASTAR (DNASTAR, Inc Madison, WI), según las secuencias del ADNr 16S, BR5311 es la más estrechamente relacionada con las siguientes cepas de *Pseudomonas stutzeri*: LH4:15 (núm. ATCC: PTA-8823;
25 publicación de patente de los Estados Unidos núm. 20090263887;

ADNr 16S, sec. con núm. de ident.:12), DSM 50227 (ADNr 16S, sec. con núm. de ident.:13), y AN10 (ADNr 16S, sec. con núm. de ident.:14). Las cuatro cepas son miembros del agrupamiento filogenético conocido como genomovar 3 de *Pseudomonas stutzeri* (g3, Figura 1). El genomovar 3 incluye estas cepas mencionadas, así como cualquier otra cepa que se coloque en el mismo agrupamiento con estas cepas al usar el análisis filogenético como se describe en el Ejemplo 3 de la presente descripción.

Hay un nucleótido de diferencia entre los genes del ARNr 16S secuenciados de las cepas LH4:15 (sec. con núm. de ident.:44) y BR5311 (sec. con núm. de ident.:5), que está en la posición 265, como se presenta en la Tabla 5. LH4:15 se aisló de un pozo de petróleo de una zona mesotérmica en Alaska. BR5311 difiere fenotípicamente de LH4:15 en la capacidad para hidrolizar almidón y crecer en etilenglicol, según lo demostrado en la presente descripción en el Ejemplo 5. Adicionalmente, la ribotipificación de BR5311, en el Ejemplo 4 de la presente descripción, mostró que esta cepa tenía un patrón de RiboPrint™ diferente según lo comparado con otras cepas conocidas de *Pseudomonas stutzeri* sometidas a prueba: LH4:15, DSM 50227, KC (ATCC 55595), Zobell (ATCC 14405), ATCC 17588, y DSM 6082. Así, el análisis genómico y fenotípico de la presente descripción para BR5311 identificó esta cepa como una nueva cepa de *Pseudomonas stutzeri*.

En otra modalidad, es la cepa 89AC1-3 de *Pseudomonas stutzeri* depositada en ATCC, conforme el tratado de Budapest, como ATCC PTA-11284. El ADNr 16S secuenciado de la cepa 89AC1-3 (sec. con núm. de ident.:6) tiene secuencias distintivas, presentadas en la Tabla 5, que son iguales a las secuencias distintivas consenso degeneradas de *Pseudomonas stutzeri* que se describieron anteriormente y se presentan en la Tabla 5. En el árbol filogenético descrito anteriormente en la Figura 1, 89AC1-3 se relaciona más estrechamente con las siguientes cepas de *Pseudomonas stutzeri*: A1501 (ADNr 16S, sec. con núm. de ident.:18), ATCC 17588 (ADNr 16S, sec. con núm. de ident.:17), y CCUG11256 (ADNr 16S, sec. con núm. de ident.:25). El ADNr 16S secuenciado de 89AC1-3 tiene identidades de secuencia de entre 98,2 % y 100 % con las secuencias del ADNr 16S de otras cepas conocidas de *Pseudomonas stutzeri* con sec. con núms. de ident.:13-25. Si bien la identidad de secuencia es del 100 % entre las secuencias del ADNr 16S de las cepas 89AC1-3 y ATCC 17588, los patrones RiboPrint™ para estas dos cepas son diferentes, como se muestra en la Figura 2, lo que indica diferencias en el ADN genómico entre las dos cepas. Adicionalmente, el patrón RiboPrint™ de 89AC1-3 es diferente a los patrones de otras cepas conocidas de *Pseudomonas stutzeri* sometidas a prueba: LH4:15, DSM 50227, KC (ATCC 55595), Zobell (ATCC 14405), y DSM 6082. Así, el análisis genómico de la presente descripción

para 89AC1-3 identificó esta cepa como una nueva cepa de *Pseudomonas stutzeri*. Las cepas 89AC1-3 y ATCC 17588 son miembros del grupo filogenético conocido como genomovar 1 de *Pseudomonas stutzeri* (g1, Figura 1), que incluye, además, las
5 cepas CCUG11256 y A1501, como se muestra en el diagrama de la Figura 1. El genomovar 1 incluye estas cepas mencionadas, así como cualquier otra cepa que se coloque en el mismo agrupamiento con estas cepas al usar el análisis filogenético, como se describe en el Ejemplo 3 de la presente descripción.

10 Como se muestra en los ejemplos de la presente descripción, se comprobó que las cepas BR5311 y 89AC1-3 de *Pseudomonas stutzeri* tienen propiedades que indican su capacidad para mejorar la recuperación de petróleo al crecer para formar biopelículas obturadoras. BR5311 creció en
15 presencia de petróleo y demostró ser particularmente útil en condiciones de salinidad alta, al crecer bien en medios con salinidad de agua de mar (por ejemplo, 34 partes por mil (ppt) y de salinidad más alta (por ejemplo, una salinidad de 67 ppt) en condiciones anaerobias desnitrificantes. En condiciones de
20 salinidad muy altas (por ejemplo, 67-70 ppt, usadas en los Ejemplos 7 y 9), BR5311 fue capaz de obturar filtros de vidrio al usar acetato como fuente de carbono en condiciones anaerobias desnitrificantes. En medio de salinidad baja (por ejemplo, 20 ppt, usado en el Ejemplo 8), BR5311 fue capaz de
25 obturar filtros de vidrio al usar o bien acetato o lactato como

fuelle de carbono en condiciones anaerobias desnitrificantes. La cepa 89AC1-3 fue capaz de obturar filtros de vidrio en condiciones de salinidad alta (por ejemplo, 35 ppt, usadas en el Ejemplo 10) al usar o bien acetato o lactato como fuente de carbono en condiciones anaerobias desnitrificantes. Adicionalmente, se demostró que la cepa 89AC1-3 aglomera granos de sílice cristalina en medio de salinidad alta (35 ppt) en condiciones anaerobias desnitrificantes al usar o bien lactato o acetato como fuente de carbono.

Además, se demostró que la cepa BR5311 reduce la permeabilidad de tubos llenos de arena y sílice que tienen una permeabilidad inicial alta de aproximadamente 1 darcy. La presión incrementada en los tubos se produjo en condiciones desnitrificantes de salinidad alta al usar condiciones de alimentación continua o discontinua.

Estas propiedades de las cepas aisladas BR5311 y 89AC1-3 de *Pseudomonas stutzeri* demuestran su uso para formar biopelículas y obturar zonas hiperpermeables en la arena o roca permeable de yacimientos de petróleo. Obturar las zonas hiperpermeables puede volver a dirigir el agua hacia áreas más ricas en petróleo que son menos permeables y mejorar, de este modo, la eficacia de barrido e incrementar la recuperación de petróleo.

Composiciones que mejoran la recuperación de petróleo

Las cepas BR5311 (ATCC PTA-11283) y 89AC1-3 (ATCC PTA-11284) de *Pseudomonas stutzeri* descritas anteriormente pueden incluirse como componentes en composiciones que
5 mejoran la recuperación de petróleo, que son una modalidad de la presente invención. Las dos cepas pueden estar, cada una, en composiciones separadas que mejoran la recuperación de petróleo, o las dos cepas pueden combinarse en la misma composición.

10 Adicionalmente a una o ambas cepas, BR5311 y 89AC1-3, la presente composición que mejora la recuperación de petróleo incluye uno o más aceptores de electrones y por lo menos una fuente de carbono. En una modalidad, el aceptor de electrones es nitrato. El nitrato se reduce a nitrito y/o a
15 nitrógeno durante el crecimiento de las cepas BR5311 y 89AC1-3. El nitrito puede servir, además, de aceptor de electrones en la composición. En varias modalidades, el aceptor de electrones es una o más sales iónicas de nitrato, una o más sales iónicas de nitrito o cualquier combinación
20 de sales iónicas de nitrato y nitrito.

La fuente de carbono puede ser un compuesto simple o complejo que contiene carbono. La fuente de carbono puede ser una materia orgánica compleja, tal como peptona, licor de maceración del maíz o extracto de levadura. En otra

modalidad, la fuente de carbono es un compuesto simple, tal como succinato, acetato o lactato.

Las composiciones que mejoran la recuperación de petróleo pueden incluir componentes adicionales que
5 promueven el crecimiento y/o formación de biopelículas a través de las cepas microbianas de la composición. Estos componentes pueden incluir, por ejemplo, vitaminas, metales traza, sales, nitrógeno, fósforo, magnesio, sustancias químicas como soluciones tampón, y/o extracto de levadura.

10 En una modalidad, las composiciones que mejoran la recuperación de petróleo incluyen uno o más microorganismos adicionales que crecen en presencia de petróleo. Los microorganismos pueden usar un componente de petróleo como fuente de carbono o, cuando se usa una fuente de carbono
15 alternativa, su crecimiento no se inhibe en presencia de petróleo. Son particularmente útiles otros microorganismos que tienen propiedades que mejoran la recuperación de petróleo, tales como microorganismos que forman biopelículas o que liberan petróleo de las superficies. En una modalidad, un
20 microorganismo adicional en la presente composición es un microorganismo de la especie *Shewanella*. *Shewanella* es un género bacteriano establecido, en parte, a través de la clasificación filogenética por ADNr y se describe detalladamente en la literatura (ver, por ejemplo, Fredrickson
25 et al., Towards Environmental Systems Biology Of Shewanella,

Nature Reviews Microbiology (2008), 6(8), 592-603; Hau et al., Ecology And Biotechnology Of The Genus Shewanella, Annual Review of Microbiology (2007), 61, 237-258).

Hay al menos aproximadamente 89 % de identidad de
 5 secuencia de secuencias del ADNr 16S entre especies
Shewanella. Las especies *Shewanella* tienen el ADNr 16S que
 tiene las secuencias distintivas de las regiones
 hipervariables 2 (las sec. con núms. de ident.:38 y 39 son
 secuencias dominantes y degeneradas, respectivamente), 5 (las
 10 sec. con núms. de ident.:40 y 41 son secuencias dominantes y
 degeneradas, respectivamente) y 8 (las sec. con núms. de
 ident.: 42 y 43 son secuencias dominantes y degeneradas,
 respectivamente) como se muestra en la Figura 3. La
 combinación de las secuencias distintivas degeneradas para
 15 cada región define especies *Shewanella* que incluyen algunas
 variaciones de posición, como se muestra en la Figura 3. Así,
 las *Shewanella* sp. útiles en la presente invención son las
 que comprenden dentro del ADNr 16S las secuencias distintivas
 degeneradas como se expone en las sec. con núms. de
 20 ident.:39, 41 y 43. En una modalidad, las *Shewanella* sp.
 útiles en la presente invención son las que comprenden dentro
 del ADNr 16S las secuencias distintivas dominantes, como se
 expone en las sec. con núms. de ident.:38, 40 y 42.

Las secuencias distintivas dominantes en la Figura 3
 25 son aquellas con las posiciones variables designadas como

los nucleótidos encontrados más frecuentemente en la especie *Shewanella*. Las *Shewanella* son proteobacterias gamma gram negativas que tienen la capacidad de reducir metales y son capaces de reducir, adicionalmente, una amplia variedad de
5 aceptores terminales de electrones. Estos microorganismos obtienen energía para soportar el crecimiento anaerobio al acoplar la oxidación de H₂ o materia orgánica a la reducción de una variedad de metales multivalentes, lo que conduce a la precipitación, transformación o disolución de minerales.

10 La capacidad de la especie *Shewanella* para alterar la humectabilidad de una superficie recubierta con hidrocarburos que conduce a la recuperación mejorada de petróleo se describe en la publicación de la solicitud de patente copendiente y de propiedad mancomunada de los Estados Unidos núm. 2011/0030956,
15 que se incorpora en la presente descripción como referencia. En una modalidad, un microorganismo adicional es *Shewanella putrefaciens*, *Shewanella sp*, LH4:18 (núm. ATCC: PTA-8822; descrita en la patente de propiedad mancomunada de los Estados Unidos núm. 7,776.795 o *Shewanella sp* L3:3 (núm. ATCC: PTA-
20 10980; descrita en la publicación de solicitud de patente copendiente y de propiedad mancomunada de los Estados Unidos núm. 2011/0030956).

Métodos para mejorar la recuperación de petróleo

Las presentes composiciones que mejoran la recuperación
25 de petróleo pueden usarse para inocular un yacimiento de

petróleo con el fin de mejorar la recuperación de petróleo. Adicionalmente, las composiciones que incluyen por lo menos una cepa de *Pseudomonas stutzeri* y un medio mínimo de crecimiento que incluye por lo menos un aceptor de electrones pueden usarse para inocular un yacimiento de petróleo y mejorar la recuperación de petróleo. Típicamente, se usa una o más sales iónicas de nitrato y/o nitrito como aceptor de electrones. La cepa de *Pseudomonas stutzeri* en la composición incluye células viables que se reproducen y crecen en el yacimiento de petróleo.

Un medio mínimo de crecimiento incluye por lo menos una fuente de carbono y puede incluir otros componentes, tales como vitaminas, metales traza, sales, nitrógeno, fósforo, magnesio y sustancias químicas como soluciones tampón. La fuente de carbono puede ser un compuesto simple o complejo que contiene carbono, por ejemplo, 1) petróleo o un componente de petróleo, 2) materia orgánica compleja, tal como peptona, licor de maceración del maíz o extracto de levadura; o 3) compuestos simples, tales como succinato, acetato o lactato.

Puede usarse cualquier cepa de *Pseudomonas stutzeri* que forme biopelículas obturadoras en condiciones anaerobias desnitrificantes en presencia de aceite de petróleo. La *Pseudomonas stutzeri* pertenece a una categoría amplia de bacterias desnitrificantes y se encuentra en, y puede adaptarse a, muchos ambientes. Las cepas de microorganismos que son

Pseudomonas stutzeri que pueden usarse en los presentes métodos pueden identificarse por sus secuencias del ADNr 16S, que tienen las secuencias distintivas descritas anteriormente y que se presentan en la Tabla 5. En una modalidad, las cepas de *Pseudomonas stutzeri* usadas en los presentes métodos son las que tienen la secuencia del ADNr 16S de sec. con núm. de ident.:8, como se describió anteriormente. En otra modalidad, las cepas de *Pseudomonas stutzeri* usadas en los presentes métodos son las que pertenecen al genomovar 1 o 3, como se describió anteriormente. En aún otra modalidad, las cepas de *Pseudomonas stutzeri* usadas en los presentes métodos son cualquiera de BR5311 (núm. ATCC: PTA-11283), 89AC1-3 (núm. ATCC: PTA-11284), y LH4:15 (núm. ATCC: PTA-8823).

Adicionalmente, las cepas de *Pseudomonas stutzeri* útiles en los presentes métodos pueden ser identificadas por una persona con experiencia en la técnica mediante ensayos de formación de biopelículas, aglomeración de sílice y/o reducción de permeabilidad, tales como los descritos en los ejemplos de la presente descripción. Como ejemplos de cepas de *Pseudomonas stutzeri* capaces de formar biopelículas obturadoras, se demuestran estas propiedades de las cepas LH4:15 (núm. ATCC: PTA-8823), BR5311 (ATCC PTA-11283), y AC1-3 (ATCC PTA-11284) en la presente descripción. En una modalidad, cualquiera de estas cepas se usan en los presentes métodos. En una modalidad, la

cepa LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* no está incluida en las cepas de *Pseudomonas stutzeri* usadas en los presentes métodos.

En otra modalidad, uno o más microorganismos además de las cepas de *Pseudomonas stutzeri*, que crecen en presencia
5 de petróleo en condiciones desnitrificantes, se incluyen en una composición usada en el presente método. Los microorganismos de la especie *Shewanella*, que se describieron anteriormente, son particularmente útiles.

En ciertos yacimientos de petróleo que tienen propiedades
10 específicas, puede ser más adecuado usar cepas específicas de *Pseudomonas stutzeri* en los presentes métodos. Por ejemplo, en yacimientos de petróleo en donde por lo menos un fluido, tal como agua de inyección y/o agua de producción, tiene una concentración alta de sal, las cepas de *Pseudomonas stutzeri*
15 que crecen y forman biopelículas obturadoras en medios de salinidad alta son particularmente adecuadas. Específicamente, las cepas de *Pseudomonas stutzeri* BR5311 (núm. ATCC: PTA-11283) y 89AC1-3 (núm. ATCC: PTA-11284) son particularmente adecuadas para yacimientos de petróleo con por lo menos un
20 fluido que tiene salinidad alta, particularmente, una concentración de sal de aproximadamente 30 ppt o mayor.

Los yacimientos de petróleo pueden inocularse con composiciones que incluyen *Pseudomonas stutzeri* y un medio mínimo de crecimiento al usar cualquier método de introducción
25 conocido para una persona con experiencia en la técnica.

Típicamente, la inoculación es por inyección de una composición en un yacimiento de petróleo. Los métodos de inyección son comunes y muy conocidos en la técnica, y puede usarse cualquier método adecuado (ver, por ejemplo,

5 Nontechnical guide to petroleum geology, exploration, drilling, and production, 2.º edición. N. J. Hyne, PennWell Corp. Tulsa, OK, EE. UU., Freethey, G.W., Naftz, D.L., Rowland, R.C., & Davis, J.A. (2002); Deep aquifer remediation tools: Theory, design, and performance modeling, In: D.L.

10 Naftz, S.J. Morrison, J.A. Davis, & C.C. Fuller (Eds.); y Handbook of groundwater remediation using permeable reactive barriers (págs. 133-161), Amsterdam: Academic Press). La inyección es, típicamente, a través de uno o más pozos de inyección, que están en comunicación subterránea con uno o más

15 pozos de producción de los cuales se recupera el petróleo.

Recuperación mejorada de petróleo de un yacimiento de petróleo

En este contexto, la recuperación mejorada de petróleo puede incluir la recuperación secundaria o terciaria de hidrocarburos de petróleo de formaciones subterráneas.

20 Específicamente, se recuperan hidrocarburos que no se recuperan fácilmente de un pozo de producción por inundación con agua u otras técnicas tradicionales de recuperación secundaria de petróleo.

Los métodos de recuperación primaria de petróleo, que usan

25 solo las fuerzas naturales presentes en un yacimiento de

petróleo, obtienen, típicamente, solo una porción menor del petróleo original en los estratos que tienen petróleo de un yacimiento petrolero. Los métodos secundarios de recuperación de petróleo, tales como la inundación con agua, pueden
5 mejorarse al usar métodos de la presente descripción que proporcionan microorganismos y medios de crecimiento para formación de biopelículas obturadoras en áreas de formaciones subterráneas en donde hay variaciones altas en la permeabilidad. La obturación con películas de las regiones
10 sumamente permeables de un yacimiento redirige el agua usada en la inundación hacia áreas más ricas en petróleo que son menos permeables. Así, la recuperación mejorada de petróleo se obtiene, particularmente, de yacimientos de petróleo en donde la eficacia de barrido es baja debido a, por ejemplo, la
15 intercalación en el estrato que tiene petróleo de capas rocosas que tienen una permeabilidad sustancialmente más alta en comparación con el resto de las capas rocosas. Las capas de permeabilidad más alta canalizarán el agua y evitarán que el agua penetre en otras partes del estrato que tiene petróleo. La
20 formación de biopelículas obturadoras por parte de microorganismos reducirá esta canalización.

EJEMPLOS

La presente invención se define más detalladamente a
25 través de los siguientes ejemplos. Debe entenderse que si

bien estos ejemplos indican modalidades preferidas de la invención, estos se proporcionan con fines ilustrativos únicamente. A partir de la descripción anterior y de estos ejemplos, una persona con experiencia en la técnica podrá
5 determinar las características esenciales de esta invención y, sin apartarse del espíritu ni del alcance de ella, podrá introducir varios cambios y modificaciones en la invención para adaptarla a diversos usos y condiciones.

Métodos generales

10 Los significados de las abreviaturas usadas en esta solicitud son los siguientes: “h” significa hora(s), “min” significa minuto(s), “día” significa día(s), “ml” significa mililitro(s), “mg/ml” significa miligramo(s) por mililitro, “l” significa litro(s), “ μ l” significa microlitro(s), “mM”
15 significa milimolar, “ μ M” significa micromolar, “nM” significa nano molar, “ μ g/l” significa microgramo(s) por litro, “pmol” significa picomol(es), “°C” significa grados centígrados, “°F” significa grados Fahrenheit, “pb” significa par(es) de bases, “mm” significa mililitro(s), “ppm”
20 significa partes por millón, “g/l” significa gramo(s) por litro, “ml/min” significa mililitro(s) por minuto, “ml/h” significa mililitro(s) por hora, “ufc/ml” significa unidades formadoras de colonias por mililitro, “g” significa gramo(s), “mg/l” significa miligramo(s) por litro, “Kev” significa kilo

o miles de voltios eléctricos, “psi” significa libras (de fuerza) por pulgada cuadrada, “LB” significa medio de cultivo caldo Luria, “rpm” significa revoluciones por minuto, “ppt” es partes por mil, “ppm” es partes por millón, “DO600”
5 significa densidad óptica a 600 nanómetros (nm), “IC” es cromatografía iónica, “MPN” es número más probable.

Crecimiento de microorganismos

Las técnicas de crecimiento y mantenimiento de cultivos anaerobios se describen en “Isolation of Biotechnological
10 Organisms from Nature”, (Labeda, D. P. ed. 117-140, McGraw-Hill Publishers, 1990). El crecimiento anaerobio se mide por el agotamiento de nitrato del medio de crecimiento en el tiempo. El nitrato se usa como aceptor de electrones primario en las condiciones de crecimiento usadas en la presente descripción.
15 La reducción de nitrato a nitrógeno se ha descrito anteriormente (Moreno-Vivian, C., et al., *J. Bacteriol.*, 181, 6573 - 6584, 1999). En algunos casos, los procesos de reducción de nitrato conducen a la acumulación de nitrito, que se reduce posteriormente aún más en nitrógeno. Por lo tanto, se considera
20 que la acumulación de nitritos es, además, una prueba del metabolismo y crecimiento activo de microorganismos.

Medios comprados

Medio LB de Miller (MediTech, Inc, Manassas, VA)

Determinación del título de células viables (número más probable)

Con el fin de determinar el título de células viables, las muestras de cultivos o tubos delgados se diluyeron por dilución en serie de 1:10 en 8 filas por muestra de una placa de 96 pocillos con caldo Luria estándar o caldo Luria de Miller con la adición de 3,5 % de NaCl. La titulación se realizó con un pipetor robótico automatizado Biomek 2000. El crecimiento se determinó por turbidez visual y se registró para cada una de las 8 filas. Se usó el algoritmo del número más probable de Cochran (Biometrics (1950) 6:105-116) para determinar las células/ml viables y los límites de confianza de 95 % para este número en la muestra original.

Se usó la siembra en placas con el método de dilución en serie para determinar la titulación bacteriana de estos cultivos. Una serie de diluciones de 1:10 de estas muestras se sembró en placas, y se realizó el recuento de las colonias resultantes. Después, el número de colonias en una placa se multiplicó por el factor de dilución (el número de veces que se realizó la dilución de 1:10) para esa placa para obtener el recuento bacteriano en la muestra original.

Cromatografía iónica

Para cuantificar los iones de nitrato y nitrito en medios acuosos, se usó una unidad cromatográfica ICS2000 (Dionex, Banockburn, IL). Se realizó el intercambio iónico

en una columna de intercambio aniónico AS15 con un gradiente de 2 a 50 mM de hidróxido de potasio. Se generaron curvas estándar con las cantidades conocidas de las soluciones de nitrito de sodio o nitrato de sodio y se usaron para
5 calibrar las concentraciones de nitratos y nitritos.

Muestras de aguas de inyección y de producción de
yacimientos de petróleo

En este estudio, se tomaron muestras de dos sistemas de pozos de petróleo: El Pozo núm. 1 se localizó en el campo
10 Senlac en la frontera de las provincias de Saskatchewan y Alberta, Canadá. El Pozo núm. 1 tiene una salinidad de 30-35 ppt tanto en aguas de inyección como de producción, que es la salinidad del agua de mar. El Pozo núm. 2 está en el campo Wainwright en la provincia de Alberta, Canadá. Este
15 pozo tiene una salinidad de aproximadamente el doble del agua de mar, que está en el intervalo de 65 ppt. Se obtuvieron muestras de agua de cabezas de pozos de inyección y de producción como líquidos combinados de petróleo/agua en botellas de vidrio color café de 1,0 l, llenas hasta arriba,
20 tapadas y selladas con cinta para evitar la fuga de gas. El gas de procesos inherentes anaerobios fue suficiente para mantener las condiciones anaerobias durante el transporte. Las botellas se transportaron en enfriadores plásticos grandes llenos de bloques de hielo hacia las instalaciones
25 de prueba dentro de las 48 horas de tomadas las muestras.

Determinación del total de sales disueltas (salinidad)
por refractómetro

El total de sales disueltas se determinó por medio del uso de un refractómetro manual (Modelo RHS 10ATC, Huake Instrument Co., Ltd, Shenzhen, China).

Preparación del ADN para análisis de secuencias

Se aisló el ADN genómico de colonias bacterianas al diluir colonias bacterianas en 50 µl de agua o solución tampón Tris-HCL con un pH de 7-8. Se amplificaron los ADN de las colonias diluidas con ADN polimerasa Phi 29 antes de la secuenciación (GenomiPHI Amplification Kit GE Life Sciences, New Brunswick, NJ). Se adicionó una alícuota (1,0 µl) de una colonia diluida a 9,0 µl del reactivo de Lysis (del kit de amplificación GenomiPHI) y se calentó a 95 °C durante 3 min seguido de enfriamiento inmediato a 4 °C. Se agregó 9,0 µl de la solución tampón de enzimas y 1,0 µl de la enzima Phi 29 a cada muestra lisada y, después, se incubó a 30 °C por 18 h. La polimerasa se inactivó por calentamiento a 65 °C durante 10 min seguido de enfriamiento a 4 °C.

Análisis de secuencias de ADN

Las reacciones de secuenciación de ADN se prepararon de la siguiente manera: Se agregó 8,0 µl de la muestra amplificada con GenomiPHI a 8,0 µl de reactivo de secuenciación BigDye v3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA) seguido de 3,0 µl de 10 µM de iniciadores de sec. con

núms. de ident.:1, 2, 3 o 4 (preparados por Sigma Genosys, Woodlands, TX), 4,0 µl de solución tampón BigDye, dilución 5X, (Applied Biosystems) y 17 µl de agua grado biología molecular (Mediatech, Inc., Herndon, VA).

5 Las reacciones de secuenciación se sometieron a calentamiento durante 3,0 min a 96 °C seguido de 200 termociclos (de 95 °C por 30 s; 55 °C por 20 s; 60 °C por 2 min) y se almacenaron a 4 °C. Los dNTP no incorporados se eliminaron con placas de depuración Edge Biosystems
10 (Gaithersburg, MD). Las reacciones amplificadas se pipetearon en un pocillo de una placa de depuración de 96 pocillos previamente centrifugada. La placa se centrifugó durante 5,0 min a 5,000x g en un equipo Sorvall RT-7 (Sorvall, Newtown, CT) a 25 °C. Después, las reacciones depuradas se colocaron
15 directamente sobre un secuenciador de ADN 3730 de Applied Biosystems y se secuenciaron con llamada automática de bases.

Cada una de las secuencias ensambladas del ADNr se comparó con la base de datos de ADNr del NCBI (~260,000 secuencias de ADNr) con el algoritmo de BLAST (Altschul et
20 al., *supra*). El acierto de identidad de secuencia de mayor puntaje se usó como un identificador de la especie conocida más estrechamente relacionada para la identificación de cepas.

Alternativamente, para generar fragmentos amplificados del ADNr de cepas individuales, se seleccionan conjuntos de
25 iniciadores de Grabowski et al. (FEMS Microbiology Ecology,

(2005) 3:427-443). Se seleccionó la combinación de iniciador de sec. con núm. de ident.: 1 e iniciador de sec. con núm. de ident.: 2 para amplificar específicamente las secuencias del ADNr de bacterias.

5 La mezcla de amplificación para PCR incluyó: solución tampón de PCR, 1,0X, GoTaq (Promega), 0,25 mM de dNTP, 25 pmol de cada iniciador, en un volumen de reacción de 50 µl. Se agregó 0,5 µl de polimerasa GoTaq (Promega) y 1,0 µl (20 ng) del ADN de la muestra. El protocolo de termociclado para la
10 reacción de PCR fue de 5,0 min a 95 °C seguido de 30 ciclos de: 1,5 min a 95 °C, 1,5 min a 53 °C, 2,5 min a 72 °C y una extensión final durante 8 min a 72 °C en un termociclador Perkin Elmer 9600 (Waltham, MA). Los productos de amplificación de 1400 pares de bases se visualizaron sobre geles de agarosa
15 al 1,0 %. La mezcla de reacción de PCR se usó directamente para clonación en el vector pCR -TOPO4 al usar el sistema de clonación TOPO TA (Invitrogen) según las recomendaciones del fabricante. El ADN se transformó en células TOP10 químicamente competentes seleccionadas por su resistencia a la ampicilina.
20 Se seleccionaron colonias individuales (~48-96 colonias) y se cultivaron en placas de microtitulación para análisis de secuencias. La secuenciación de los fragmentos amplificados y la identificación de cepas fue como se describió anteriormente.

Ribotipificación automatizada

Se usó ribotipificación automatizada para la identificación concluyente de cepas seleccionadas con características filogenéticas de secuencias de ARNr 16S
5 similares (Webster, John A (1988), patente de los Estados Unidos núm. 4,717,653; Bruce, J. L. (1996) *Food Technology*, 50:77-81; y Sethi, M. R. (1997) *Am. Lab.* 5: 31-35). La ribotipificación se realizó según las recomendaciones del fabricante (DuPont Qualicon Inc., Wilmington, DE). Para estos
10 análisis, se tomó una colonia nueva, se resuspendió en la solución tampón de la muestra y se adicionó al módulo de procesamiento para la etapa de tratamiento térmico a 80 °C durante 10 min para inhibir las enzimas que degradan el ADN endógeno. Después, se redujo la temperatura y se agregaron dos
15 enzimas líticas (lisostafina y N-acetilmuramidasa; provistas por el fabricante) a la muestra. Después, el portador de muestras se cargó en el sistema Riboprinter™ con los otros reactivos comerciales. Las etapas de digestión con enzimas de restricción del ADN cromosómico de la muestra con la enzima
20 *EcoRI*, electroforesis en gel y transferencia estuvieron totalmente automatizadas. Brevemente, el ADN genómico bacteriano se digirió con la enzima de restricción *EcoRI* y se cargó sobre un gel de agarosa. Los fragmentos de restricción se separaron por electroforesis y se transfirieron
25 simultáneamente a una membrana de nailon. Después de una etapa

de desnaturalización, los ácidos nucleicos se hibridaron con una sonda de ADN sulfonado que alojaba el operón del ARNr de *E. coli*, que incluye genes para las subunidades grandes y pequeñas del ARNr, el gen ARNr 5S y los separadores internos transcritos. La sonda hibridada se detectó por la captura de emisión de luz de un sustrato quimioluminiscente con una cámara con dispositivo de carga acoplada. La salida consistió en una exploración densitométrica de la huella que representa la distribución de los fragmentos de restricción genómicos de *EcoRI* que contienen secuencias de uno o más operones ribosómicos en el genoma, que se separaron electroforéticamente por sus pesos moleculares.

Selección de cepas por su capacidad para formar biopelículas sobre filtros de vidrio sinterizado

Se desarrolló un ensayo para seleccionar las cepas que podían formar biopelículas sobre superficies de sílice y evitar el flujo de agua a través de espacios con poros de ~10 micras (obturación) mediante el uso de filtros de vidrio sinterizado. Los filtros de vidrio sinterizado de 25 mm de grosor promedio (stock núm. 15254, Adams and Chittenden Scientific Glass, Berkeley CA) se pegaron en la base de soportes plásticos diseñados para filtración por membrana. Después del curado, las unidades de filtro se esterilizaron en un autoclave. Los filtros individuales en los soportes se colocaron en placas Petri estériles, y se agregó un medio de

crecimiento que contenía un inóculo de cultivos de toda la noche de varias cepas sobre los filtros de vidrio. Los cultivos de toda la noche se prepararon al hacer crecer los inóculos de microorganismos en medio LB de Miller durante toda la noche a 30 °C, aerobiamente, con vibración a 200 rpm. El medio de crecimiento para este ensayo de formación de biopelícula/obturación fue o bien un medio mínimo salino (Tabla 4 a continuación) o muestras de agua de producción o de inyección, que se complementan con nitrógeno, fosfato, elementos traza, vitaminas, fuente de carbono y nitrato como aceptor de electrones. Las fuentes de nitrato y carbono varían con los experimentos. Las placas se recubrieron e incubaron a temperatura ambiente en condiciones anaerobias por una a dos semanas. Después, se retiraron los filtros del medio de cultivo, y la pieza superior del soporte plástico se atornilló en su lugar. Una jeringa de 1 ml acoplada al puerto de entrada del soporte del filtro se llenó con 1,0 ml de agua y se midió el tiempo (en segundos) para drenar el agua en el tubo. Los filtros del control sin inoculación tardaron alrededor de 10 segundos para drenar. Los filtros que tardaron más de 10 segundos para drenar se consideraron obturados.

En un ensayo de obturación alternativo, los filtros de vidrio sinterizado se infiltraron con fluido antes del uso, se preseleccionaron para la velocidad de flujo antes de la incubación con el cultivo, y se determinó el cambio

porcentual en la velocidad de flujo después de la incubación al final del experimento.

Selección de cepas para aglomeración de sílice

Se sometieron a prueba cepas de *Pseudomonas stutzeri* para determinar su capacidad para aglomerar granos de sílice cristalina. La sílice cristalina representa un sustituto de los granos de arena comunes en muchas formaciones geológicas subterráneas. En cada tubo de muestra, se agregó una alícuota de 100 µl de 220 g/l de sílice cristalina (tamaño de grano en el intervalo de aproximadamente 2-20 micras; Sil-co-Sil 125 preparado por U.S. Silica, Berkeley Springs, WV). Adicionalmente, se agregó 8 ml de medio, y se taparon los tubos para restringir la entrada de oxígeno al medio.

Los tratamientos de prueba en vivo (inoculados) duplicados recibieron 200 µl de muestra de inoculación de varias cepas. Además, se prepararon tubos de control sin inocular que contenían todos los componentes, excepto el inóculo microbiano. Los tubos se incubaron estáticamente a 30 °C. Los tubos de prueba que contenían microorganismos se mezclaron vigorosamente durante 10 segundos con un mezclador de vórtice. La turbidez se incrementó drásticamente debido a la resuspensión de la sílice cristalina, que se había depositado en el fondo de los tubos durante la incubación. La disminución de la turbidez debido a la sedimentación de la sílice cristalina se controló en el tiempo después del mezclado por densidad celular óptica

(DO600). El comportamiento de sedimentación de las partículas de sílice demostró que algunas cepas formaban una interacción adhesiva fuerte con las partículas de sílice cristalinas adyacentes, lo que hizo que sedimentaran más rápidamente. En el campo de petróleo, el hacer que los granos de arena se adhieran entre sí aumenta la resistencia al flujo de líquido a través de la arena. Esto permite controlar la eficacia de barrido que conduce a una recuperación más eficaz del petróleo por vía de la inundación con agua.

10 Aparato de tubos delgados para el ensayo de reducción de permeabilidad

Se diseñó un aparato para medir la obturación de paquetes de arena permeable mediante el uso de tubos delgados. En la Figura 4 se muestra un diagrama esquemático de la configuración experimental de tubos delgados. Todos los números que aparecen en negrita a continuación se refieren a la Figura 4.

Una muestra de arena de la formación Schrader Bluff en la unidad Milne Point de la región de la Pendiente Norte de Alaska se depuró mediante el lavado con un solvente compuesto de una mezcla 50/50 (volumen/volumen) de metanol y tolueno. Posteriormente, se drenó el solvente y se eliminó por evaporación de la arena para producir arena limpia, seca y fluida. Se tamizó esta arena para eliminar las partículas de un tamaño menor que una micra. Esta arena sola, o una mezcla de esta arena combinada con la sílice lavada Sil-co-

Sil 125 (U.S. Silica, Berkeley Springs, WV) en una relación de 4:1, se envasó herméticamente en tubos delgados flexibles separados (**9a, 9b, 9c**) de cuatro pies de largo (121,92 cm) de aproximadamente 1 cm de diámetro interno y se compactó
5 por vibración con un grabador de laboratorio.

Ambos extremos de cada tubo delgado se taparon con conectores del tipo de compresión comunes para mantener la arena en el tubo. A estos conectores se acoplaron tuberías flexibles de 1/8 de pulgada (0,32 cm) capaces de soportar las
10 presiones usadas en la prueba. Los tubos delgados se montaron en un recipiente de presión, (**10**) con la tubería que pasa a través de los extremos del recipiente de presión (**11 y 12**) al usar conectores de presión comúnmente disponibles (tabique de unión de 1/8 de pulgada (0,32 cm)) (**18a, 18b, 18c y 21a, 21b,**
15 **21c**). Se usaron conectores y tuberías adicionales para conectar la entrada a cada tubo delgado a una bomba de presión (**13a, 13b, 13c**) y depósito de alimentación (**14a, 14b, 14c**). Otros conectores de compresión comunes, que incluyen juntas acodadas y adaptadores en T, y la tubería conectaron
20 la entrada de cada tubo delgado a un transductor que midió la presión por encima de la presión atmosférica (medidor de presión absoluta) (**20a, 20b, 20c**). Además, la entrada del tubo delgado se conectó con los mismos tipos de tuberías y conectores al lado de alta presión de un transductor de
25 presión diferencial comúnmente disponible (**19a, 19b, 19c**).

Salmuera núm. 1: (salmuera sin nutrientes) - gramos por litro (g/l) de agua desionizada

25

	MgCl ₂ *6H ₂ O	0,220	
	KCl	0,090	
	NaCl	11,60	
	Metales traza	1,0 ml	(Tabla 4)
5	Vitaminas traza	1,0 ml	(Tabla 4)
	Na ₂ HPO ₄	0,015	(=10 ppm PO ₄)
	NH ₄ Cl	0,029	(=10 ppm NH ₄)
	Acetato de sodio	0,278	(200 ppm de acetato)

10 El pH se ajustó a 7,0 con HCl o NaOH, y la solución se esterilizó por filtración.

Salmuera núm. 2 (alimentación continua de nutrientes):

Salmuera núm. 1 + 100 ppm de nitrato

Salmuera núm. 3 (alimentación de nutrientes por pulsos):

15 Salmuera núm.1 + 1400 ppm de nitrato + 2600 ppm de acetato

Determinación de la caída de presión

La caída de presión en los tubos delgados se determinó con el transductor de presión diferencial descrito anteriormente. La caída de presión se determinó a través de cada tubo delgado a varias velocidades de fluido. Esta caída de presión fue aproximadamente proporcional a la velocidad de flujo. Para cada caída de presión determinada en cada velocidad de fluido, se calculó la permeabilidad base del paquete de arena.

20

La caída de presión sola puede compararse y usarse como una medida del cambio en la permeabilidad entre tubos

25

delgados, ya que todos los tubos fueron de dimensiones similares y recibieron las mismas velocidades de flujo de salmuera durante las pruebas.

El volumen vacío en los tubos delgados, denominado
 5 volumen de poro, fue de 40-50 ml. Este volumen de poro se calculó a partir del producto del volumen total del tubo delgado y un cálculo aproximado de la porosidad (~40 %).

Cálculo de la permeabilidad base

La permeabilidad base de cada tubo se determinó al usar
 10 la salmuera que fluye a presión máxima: aproximadamente 0,665 megapascuales (95 psi) en el tubo delgado (controlado en el extremo de salida con el regulador de contrapresión) y aproximadamente 0,758 megapascuales (110 psi) en el recipiente de presión (fuera del tubo delgado). La
 15 permeabilidad base se calculó con la ecuación de Darcy:

$$k = \frac{4,08 * Q * \mu * L}{A_x * \Delta P}$$

20 ΔP = La caída de presión a través de una roca o paquete poroso, [=]psi
 Q = Velocidad de flujo volumétrico a través del paquete, [=]cc/h

μ = Viscosidad de fluido (una sola fase) a través del paquete [=] centipoise

L = Longitud del paquete (paralela al flujo), [=] cm

A_x = Área de sección transversal (perpendicular al flujo) [=] cm^2

k = Permeabilidad [=] milidarcy

4,08 = una constante de conversión para compatibilizar las unidades [=] mD-h-psi/cp/cc^2

La permeabilidad base y otras propiedades de cada tubo delgado compactado se dan en la Tabla 3.

Tabla 3. Propiedades de tubos delgados compactados

Tubo Núm.	Ejemplo núm.	DI del tubo, cm	Longitud, cm	Sil-co- Sil 125	Masa de arena, g	Permeabilidad, darcy
9a	12	0,980	121,92	0	187,5	13
9b	13	0,993	121,92	0	182	11
9c	14	0,975	121,92	0	176,3	13
9a -2	15, 16	0,978	121,9	20 % en peso	179,0	1,2
9b -2	15, 17	0,978	121,9	20 % en peso	177,9	0,8

Ejemplo 1

Aislamiento de microorganismos del agua de inyección de un pozo de petróleo a través del crecimiento en una interfase de petróleo/agua

Para enriquecer las especies que pueden interactuar en una interfase hidrófoba/acuosa que simula una interfase de petróleo/agua, se inoculó agua de las muestras de agua de producción o de inyección del Pozo núm. 1, según se describe en la sección de Métodos generales, en 18 ml de medios mínimos salinos (Tabla 4) en viales de 20 ml de suero anaerobio con 1,6 g/l de nitrato de sodio adicionado como aceptor de electrones, 0,1 % de extracto de levadura y con 2 ml de aceite de maíz esterilizado como fuente primaria de carbono. El medio se desoxigenó al inyectar gas en forma de microburbujas con una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono en los viales llenos seguido de esterilización en autoclave. Todas las manipulaciones de microorganismos se realizaron en una cámara anaerobia (Coy Laboratories Products, Inc., Grass Lake, MI), y los cultivos se incubaron a temperatura ambiente con vibración moderada (100 rpm) de varias semanas a varios meses, y se controló la presencia de nitrato, nitrito, la turbidez visible y modificaciones visibles en el petróleo. Cuando se agotó el nitrato en un cultivo, se agregó nitrato de sodio (solución de 50 g/l) al medio hasta la concentración final de 1,6 g/l.

Para poder tener acceso al aceite de maíz, las células deben poder ser capaces de interactuar en la interfase de

petróleo/agua. Con el tiempo, pudo visualizarse el crecimiento de limo microbiano en la capa de aceite de maíz. Se derivaron colonias aisladas por subcultivo de los medios líquidos o la capa de aceite de maíz sobre medio LB y agar con 2 g/l de nitrato de sodio. Los cultivos de colonias aisladas se mantuvieron anaerobiamente y se identificaron al usar marcadores de PCR del ARNr 16S, como se describió anteriormente.

10 Tabla 4. Medio mínimo salino

	g/l	Sustancia química
	1,0	NH ₄ Cl
	0,5	KH ₂ PO ₄
	0,4	MgCl ₂ .6H ₂ O
15	0,2	CaCl ₂ .2H ₂ O
	10	NaCl
	0,69	NaH ₂ PO ₄
	2,5	NaHCO ₃
	0,073	KSO ₄
20	1000X g/l	Elementos traza
	1,5	FeCl ₂ .4H ₂ O
	0,002	CuCl ₂ .2H ₂ O
	0,1	MnCl ₂ .4H ₂ O
25	0,19	CoCl ₂ .6H ₂ O

5	0,07	ZnCl ₂
	0,006	H ₃ BO ₃
	0,036	Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O
	0,024	NiCl ₂ .6H ₂ O
	0,277	HCl
10	1000x g/l	Selenio/tungstato
	0,006	Na ₂ SeO ₃ .5H ₂ O
	0,008	Na ₂ WO ₄ .2H ₂ O
	0,5	NaOH
	1000X mg/l	Mezcla vitamínica
15	100	Vitamina B12
	80	Ácido p-aminobenzoico
	20	D(+)-biotina
	200	Ácido nicotínico
	100	Pantotenato de calcio
20	300	Clorhidrato de piridoxina
	200	Tiamina-HCL.2H ₂ O
	50	Ácido alfa-lipoico

El pH del medio se ajustó a 7,3.

Una cepa aislada de la muestra de agua de inyección al usar este enriquecimiento se denominó BR5311. El ARNr 16S de la cepa BR5311 se analizó como se describe en la sección de

Métodos generales y se identificó como una cepa de *Pseudomonas stutzeri*, como se describe en el Ejemplo 3.

Ejemplo 2

5 Aislamiento de la cepa 89AC1-3 de *pseudomonas stutzeri* de las aguas del pozo núm. 1

En este ejemplo, se muestra un proceso mediante el cual se aislaron microorganismos al usar enriquecimientos con nutrientes específicos de muestras de agua de producción y
10 de inyección obtenidas del Pozo Núm. 1, según se describe en la sección de Métodos generales. Las cepas aisladas se obtuvieron por enriquecimientos anaerobios de muestras de agua de procesamiento de recuperación de petróleo crudo obtenidas del Pozo núm. 1. Se usó un medio mínimo salino
15 (Tabla 4) como medio base en los enriquecimientos iniciales.

El medio mínimo salino se había desoxigenado al inyectar gas en forma de microburbujas con una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno (20 % y 80 %, respectivamente) en estos reactivos seguido de esterilización en autoclave. Todas las
20 manipulaciones de microorganismos se realizaron en una cámara anaerobia (Coy Laboratories Products, Inc., Grass Lake, MI) (mezcla de gas: 5 % de hidrógeno, 10 % de dióxido de carbono y 85 % de nitrógeno). Se prepararon réplicas de las muestras enriquecidas mediante la adición de 10 ml del medio mínimo
25 salino anaerobio estéril en botellas de suero estériles de

20 ml. Se agregó lactato (1000 ppm) como fuente de carbono y se agregó nitrato (2000 ppm) como aceptor de electrones. Cada uno de los enriquecimientos se inoculó con un fluido de procesamiento específico del crudo, ya sea emulsión oleosa de arena-agua de producción, recolectada en la base del pozo de producción, o agua de inyección, que es agua inyectada en el yacimiento para presurizar y desplazar hidrocarburos hacia los pozos de producción. Los cultivos se incubaron a temperatura ambiente durante dos semanas.

Después de una incubación de siete días, se siembran por estriado muestras de 100 µl de cada uno de los enriquecimientos sobre placas con agar y caldo Marino (preparado por receta, Difco 2216, Becton-Dickenson, Sparks, MD) y se incuban a temperatura ambiente durante dos días. Se aislaron colonias representativas con morfologías únicas. Las muestras de estas colonias aisladas se seleccionaron para identificación por amplificación por PCR al usar el análisis directo de ADNr de colonias descrito en la sección de Métodos generales, con el iniciador inverso de PCR 1492R (sec. con núm. de ident.:1) y el iniciador directo de PCR 8F(sec. con núm. de ident.:2). Se usó la secuenciación de ADN y el análisis descrito para obtener la secuencia del ADNr 16S para identificación microbiana. Un aislado del primer enriquecimiento, 89AC1-3, y un aislado del segundo enriquecimiento, 89AF1-5, se identificaron por tener

similitud del ARNr 16S con la cepa A1501 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. de acceso al GenBank: AF143245) y se confirmaron posteriormente como cepas de *Pseudomonas stutzeri*, como se describe en el Ejemplo 3.

5

Ejemplo 3

Análisis de cepas de *pseudomonas stutzeri* mediante el uso de secuencias distintivas identificadas

Para determinar la secuencia completa del ADNr 16S de las
10 cepas BR5311 (Ejemplo 1), 89AC1-3, y 89AF1-5 (Ejemplo 2), se tomó una sola colonia pura de cada uno de los aislados, se aisló el ADN, y se amplificó por PCR el gen del ARNr 16S con el procedimiento de la sección de Métodos generales. Se clonaron las secuencias amplificadas y, después, se
15 secuenciaron muchas veces para obtener la secuencia completa. Cada secuencia del ADNr 16S de la cepa se consultó contra la base de datos del NCBI (Centro Nacional de Información Biotecnológica, por sus siglas en inglés) por medio del uso del algoritmo del programa BLAST (Herramienta de Búsqueda
20 Básica para Alineamientos Locales) provisto por el NCBI (Altschul, et al. (1990) J. Mol. Biol. 215:403-410) para identificar las secuencias de nucleótidos más similares. Esto se ejecutó al comparar la secuencia de consulta con secuencias similares del ADNr 16S en la base de datos y determinar un
25 puntaje de porcentaje de identidad relativa. Todas las

secuencias de consulta, una de cada BR5311, 89AC1-3, y 89AF1-5, devolvieron aciertos máximos como *Pseudomonas stutzeri* con un porcentaje igual o mayor que 98 %. Las secuencias del ADNr 16S de los aislados 89AC1-3 y 89AF1-5 fueron idénticas.

5 En función de la identidad inicial de *Pseudomonas stutzeri*, se seleccionaron 26 secuencias de referencia del ADNr 16S en la base de datos del NCBI del género *Pseudomonas*. Estas secuencias se presentan en la Tabla 1 con sus números de identificación de secuencia. Estas secuencias de referencia
10 incluyeron 13 de *Pseudomonas stutzeri* (sec. con núms. de ident.:13-25), todas ellas fueron de cepas tipo para *Pseudomonas stutzeri* e incluyeron por lo menos una cepa que representaba cada uno de los 10 genomovares. El genomovar 6 de *Pseudomonas stutzeri* se ha reasignado como *Pseudomonas*
15 *balearica*. Otras secuencias de referencia incluyeron 12 de cepas de *Pseudomonas* (sec. con núms. de ident.:26-37) que representaron 10 especies diferentes de *Pseudomonas* reconocidas por el “International Committee on Systematics of Prokaryotes” (Comité Internacional de Sistemática de Procariotas).
20 Adicionalmente, la secuencia B del ADNr 16S de *E. coli* K12 (sec. con núm. de ident.:9) se usó para anclar un alineamiento de secuencias y para proporcionar el sistema de coordenadas de bases, reconocido como la posición de base estándar (Brosius, J., et al. (1981) J. of Molecular Biology, 148(2):107-127; 25 Woese, (1987) *Bacterial Evolution*. Microbial Rev. 51: 221-271).

Las secuencias de prueba fueron las de las cepas BR5311 (sec. con núm. de ident.:10), 89AC1-3 (sec. con núm. de ident.:11), y la cepa LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823; publicación de solicitud de patente de los Estados Unidos núm. 5 20090263887; sec. con núm. de ident.:12), que se aisló de un pozo de petróleo de una zona mesotérmica en Alaska.

Se creó un árbol filogenético al alinear secuencias del ARNr 16S de longitud casi completa (posición 60 a 1400) de sec. con núms. de ident.:9 -37 con un alineamiento Clustal W, 10 el árbol filogenético y las funciones de inicio del programa MegAlign del paquete de programas LaserGene de DNASTAR (DNASTAR, Inc Madison, WI). El árbol filogenético mostrado en la Figura 1 muestra todas las cepas de *P. stutzeri*, que incluyen las cepas BR5311 y 89AC1-3, agrupadas en tres clados 15 que están separados de las otras *Pseudomonads*. La cepa 89AC1-3 es parte del clado filogenético que contiene la cepa A1501 de *Pseudomonas stutzeri* (Genoma completo: núm. de acceso al GenBank: CP000304). La cepa BR5311 y la cepa LH4:15 son parte del clado filogenético que contiene la cepa CLN100 de 20 *Pseudomonas stutzeri* (ADNr 16S: núm. de acceso al GenBank AJ544240.1)

Con el alineamiento de secuencias global múltiple de la serie de programas Clustal, Clustal W (DNASTAR, paquete de programas MegAlign, Madison WI; Chenna, R., (2003) Nucl. Acids 25 Res. 31(13):3497-3500), se preparó un alineamiento global de

las secuencias del ADNr 16s de las cepas BR5311, 89AC1-3 y LH4:15, junto con las 13 *Pseudomonas stutzeri* (sec. con núms. de ident.:13-25) y 12 secuencias representativas que no son *stutzeri Pseudomonad* (sec. con núms. de ident.:26-37). A

5 partir del análisis de este alineamiento, se identificaron las posiciones distintivas en las secuencias del ADNr 16S que pueden usarse para distinguir las *Pseudomonas stutzeri* de otras *Pseudomonas* por las secuencias distintivas en estas posiciones. Estas posiciones distintivas se presentan en la

10 Tabla 5, con números de coordenadas de posición del alelo rrB de *E. coli* K12 W3110 para la secuencia del ADNr 16S. Se presenta la secuencia consenso para *Pseudomonas stutzeri* en cada una de las posiciones distintivas. En algunas posiciones distintivas aparece un solo nucleótido, en tanto que en otras

15 posiciones hay degeneración, en donde S puede ser C o G, Y puede ser C o T, M puede ser A o C, K puede ser G o T, R puede ser A o G, D puede ser A, G o T y W puede ser A o T.

En la Tabla 5, los nucleótidos consenso de *Pseudomonas stutzeri* en cada posición distintiva se comparan con los

20 nucleótidos consenso de cada *Pseudomonas balearica*, *Pseudomonas nitroreducens* y *Pseudomonas agarici*, que son especies estrechamente relacionadas con *Pseudomonas stutzeri*. Adicionalmente, en la Tabla 5 se muestran los nucleótidos presentes en cada posición distintiva en las

25 cepas BR5311, 89AC1-3 y LH4:15. Los nucleótidos en todas las

posiciones distintivas en conjunto, para cada una de estas cepas, identifican estas cepas como *Pseudomonas stutzeri*, en tanto que hay diferencias de los nucleótidos consenso de *Pseudomonas stutzeri* entre las posiciones distintivas para
 5 especies que nos son *stutzeri*.

La mayoría de las posiciones distintivas identificadas se localizaron en las regiones hipervariables del ADNr 16S, con posiciones aproximadas designadas por nucleótidos de la secuencia del ADNr 16S de *E. coli*:

- 10 región hipervariable 1 entre posiciones 60 y 99;
- región hipervariable 2 entre posiciones 118 y 290;
- región hipervariable 3 entre posiciones 410 y 520;
- región hipervariable 4 entre posiciones 578 y 760;
- región hipervariable 5 entre posiciones 820 y 888;
- 15 región hipervariable 6 entre posiciones 980 y 1048;
- región hipervariable 7 entre posiciones 1071 y 1179;
- región hipervariable 8 entre posiciones 1215 y 1335;
- región hipervariable 9 entre posiciones 1350 y 1480.

Las secuencias distintivas identificadas en la
 20 secuencia del ADNr 16S pueden usarse para identificar cepas de microorganismos como pertenecientes a *Pseudomonas stutzeri*. Las cepas aisladas BR5311 y 89AC1-3 tienen, ambas, las secuencias distintivas del ADNr 16S de *Pseudomonas stutzeri*, como se muestra en la Tabla 5. Las secuencias del
 25 ADNr 16S de las cepas BR5311 y 89AC1-3 tienen, ambas, la

secuencia consenso degenerada del ADNr 16S de *Pseudomonas stutzeri* (sec. con núm. de ident.:8). La secuencia del ADNr 16S más preponderante, o dominante, para el ADNr 16S de *Pseudomonas stutzeri* es la sec. con núm. de ident.:7.

Tabla 5. Secuencias distintivas del ADNr 16S para distinguir *Pseudomonas stutzeri* de otras *Pseudomonads* relacionadas, que incluyen nucleótidos para consenso de *Ps. stutzeri* y cepas para BR5311, LH4:15, y 89AC1-3 en las posiciones distintivas al usar las coordenadas del ADNr 16S de *E. coli*

5	E. coli ¹ ,				Ps.	Ps.	Ps.	
	Núm. de				stutzeri	balearica	nitroreducens	Ps. agarici
	coord.	BR5311	LH4:15	89AC3-1	Consenso	Consenso	Consenso	Consenso
		Delección	Delección	Delección	Delección de	Delección de	Delección de	Delección de
10	70-80	de 3 nt	de 3 nt	de 3 nt	3 nt	3 nt	3 nt	3 nt
	72-73	AT	AT	AT	AT	CA	AT	AT
	75-83	AAGAGAGC	AAGAGAGC	AGTAGAGC	ARKRGAGC	CGGGTCCT	AGAGGAGC	AAGAGGGC
		Delección	Delección	Delección	Delección de	Delección de	Delección de	Delección de
	89-100	de 3 nt	de 3 nt	de 3 nt	3 nt	3 nt	3 nt	3 nt
15		CTCTCTGAT	CTCTCTGATT	CTCCATGAT				
	90-103	TC	C	TC	CTSYMKGATTC	GGATGCCGGCG	CTCCTTGATTT	CCCTCGGATTC
	122-123	GC	GC	GC	RC	GC	GC	GC

5	126	A	A	A	A	A	A	A
	131	T	T	T	T	T	T	T
	138-139	GA	GA	GG	RD	GG	GG	GG
	141	A	A	A	A	A	A	A
	143	T	T	T	T	T	T	T
	150	C	C	C	C	T	T	C
	154-158	GTTTC	GTTTC	GTTCC	GTTTC	TCGGG	GTTCC	GTCCG
10	164-168	GGAAC	GGAAC	GGAAC	GGAAC	CTCGA	GGAAC	GGAAC
		Delección	Delección	Delección	Delección de	Delección de	Delección de	Delección de
	182	de 1 nt	de 1 nt	de 1 nt	1 nt	1 nt	1 nt	1 nt
	188-195	ACGGGAG	ACGGGAG	ACGGGAG	AMGGGAG	ACGGGAG	ACGGGAG	ACGGGAG
		Inserción	Inserción	Inserción	Inserción	Inserción	Inserción de	Inserción de
15	189	de 1 nt C	de 1 nt C	de 1 nt C	de 1 nt M	de 1 nt C	1 nt C	1 nt C
		YR (CA o						
	199-200	CA	CA	TG	TG)	CG	CA	CA
	207	C	C	T	Y	T	C	C
	213	G	G	A	R	A	G	G

	217-219	TGC	TGC	CAC	YRC	CGC	TGC	TGC
	224-226	TCA	TCA	TCA	WYA	CCA	TCA	TCA
	231	A	A	A	A	A	A	A
5	235	T	T	T	T	T	T	T
	238-240	GTC	GTC	GTC	GTC	GTC	GTC	GTC
	253	T	T	T	T	T	T	T
	256	T	T	T	Y	T	T	T
	258	A	A	A	A	A	A	A
10	263-265	AAC	AAT*	AAA	AAH	AAA	AAT	AAA
	268-269	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
	273	A	A	A	A	A	A	A
	278	G	G	G	D	G	G	G
	286	G	G	G	G	G	G	G
15	289	A	A	A	A	G	A	A
	311	T	T	T	T	C	T	T
	370	G	G	G	G	G	G	G
	381	A	A	A	A	A	A	A

5	391	C	C	C	C	C	C	C
	408	G	G	G	G	G	G	G
	418	T	T	T	T	T	T	T
	425	A	A	A	A	A	A	A
	434	T	T	T	T	T	T	T
10	440-444	CAGCG	CAGCG	CAGCG	CAGCG	CAGCG	CAGCG	CAGCG
	456-463	CATTAACC	CATTAACC	CAGTAAGT	CAKTAASY	CAGTAAGT	CATTAACC	CATTAACC
		CGTTAGTGT		CCTTGCTGT				
	469-478	T	CGTTAGTGTT	T	CSTTRSTGTT	CCTTGCTGTT	CGTTAGTGTT	CGTTAGTGTT
	490-491	GA	GA	AA	RA	GA	GA	GA
15	497	T	T	T	T	T	T	T
	513-514	TC	TC	TC	TC	TC	TC	CT
	537-538	GA	GA	GA	GA	GA	GA	AG
	579	G	G	G	G	G	G	G
	582	T	T	T	T	T	T	T
15	587	T	T	T	T	T	T	T
	591-594	TTGTT	TTGTT	TCGTT	TYGTT	TTGAT	TCGTT	TGGTT

	599-601	TGA	TGA	TGG	TGR	TGG	TGG	TGG
	610	G	G	G	G	G	G	T
	638-641	CAAA	CAAA	CAAA	CAAA	CAAA	CAAA	CAAA
	644-650	GGCAAG	GGCAAG	GGCGAG	GGCRAG	GTCTGA	GGCGAG	GGCCAG
5	653	A	A	A	A	A	A	A
	658-662	ATGGC	ATGGC	ATGGC	ATGGC	ATGGC	ACGGT	AGGGT
	669-673	TGGTG	TGGTG	TGGTG	TGGTG	TGGTG	TGGTG	TGGTG
	679-682	TCCT	TCCT	TCCT	TCCT	TCCT	TCCT	TCCT
	705-711	TATAGGA	TATAGGA	TATAGGA	TATAGGA	TATAGGA	TATAGGA	TATAGGA
10	717-721	CACCA	CACCA	CACCA	CACCA	CACCA	CACCA	CACCA
	734-737	ACCA	ACCA	ACCA	ACCA	ACCA	ACCA	ACCA
	743-748	GCTAAT	GCTAAT	GCTAAT	GCTAAT	GCTAAT	ACTGAT	ACTGAT
	755	A	A	A	A	A	A	A
	758	G	G	G	G	G	G	G
15	824	G	G	G	G	G	A	A
	AGCCGTTGG AGCCGTTGGG AGCCGTTGG AGCCGTTGGGA AGCCGTTGGGA							
	828-839	GAT	AT	GAT	T	T	AGCCGTTGGGTT	AGCCGTTGGGAA

		ATCTTAGTG		ATCTTAGTG				
	847-856	G	ATCTTAGTGG	G	ATCTTAGTGG	ATCTTAGTGG	ATTTTAGTGG	TTCTTAGTGG
	859	C	C	C	C	C	C	C
	865	A	A	A	A	A	G	A
5	869-870	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT
	876	C	C	C	C	C	T	T
	960	T	T	T	T	T	C	T
	965	A	A	A	A	A	A	A
	986	A	A	A	A	A	T	A
10	989	C	C	C	C	C	C	C
	998-	GCAGAGAAC	GCAGAGAACT	GCAGAGAAC	GCWGAGAACYT	GCAGAGAACTT		CCAATGAATCTT
	1011	TTTCC	TTCC	TTTCC	KCC	TCC	GCTGAGAACTTTCC	CC
	1019-							
	1024	GGATTG	GGATTG	GGATTG	GGMKKG	GATTG	GATTG	GAGGA
15	1036-							
	1043	ACTCTGAC	ACTCTGAC	ACTCTGAC	RCTCWGAC	ACTCTGAC	ACTCAGAC	ACATTGAG
	1076	C	C	C	C	C	C	C

5	1081	G	G	G	G	G	G	G
	1100	T	T	T	T	T	T	T
	1117	G	G	G	G	G	G	G
	1123	A	A	A	A	A	A	A
	1127	A	A	A	A	A	A	A
10	1133-	ACGTTAAGG		ACGTTAAGG				
	1141	T	ACGTTAAGGT	T	ACRTTAWGGT	ACGTTAAGGT	ACGTTATGGT	ACGTGATGGT
		Inserción	Inserción	Inserción	Inserción	Inserción	Inserción de	Inserción de
	1134	de 1 nt C	de 1 nt C	de 1 nt C	de 1 nt C	de 1 nt C	1 nt C	1 nt C
	1145	C	C	C	C	C	C	C
	1150	T	T	T	T	T	T	T
	1163	G	G	G	G	G	G	G
	1168	C	C	C	C	C	C	C
	1173	C	C	C	C	C	C	C
	1216	G	G	G	G	G	G	G
15	1219	T	T	T	T	T	A	T

5	1243-							
	1246	TCGG	TCGG	TCGG	TCGG	TCGG	TCGG	TCGG
	1254-							
	1257	A	A	A	A	A	A	A
	1260-							
10	1264	CAAGC	CAAGC	CAAGC	CAAGC	CAAGC	CAAGC	CAAGC
	1271-							
	1274	GTGG	GTGG	GTGG	GTGG	GTGG	GTGG	GTGG
	1278-							
	1286	TAATCCCAT	TAATCCCAT	TAATCCCAT	TAATCCCAT	TAATCCCAT	TAATCCCAT	TAATCCCAT
15	1290-							
	1294	ACCGA	ACCGA	ACCGA	ACCGA	ACCGA	ACCGA	ACCGA
	1308-							
	1310	CGC	CGC	CGC	CGC	CGC	CGC	CGC
	1327-							
	1329	GCG	GCG	GCG	GCG	GCG	GCG	GCG
	1354	T	T	T	T	T	T	T

5	1356	A	A	A	A	A	A	A
	1366	T	T	T	T	T	T	T
	1368	A	A	A	A	A	A	G
	1381	T	T	T	Y	T	T	T
	1393	C*	T	T	Y	T	T	T
10	1428-							
	1430	TCC	TCC	TCC	TCC	TCC	TCC	ACC
	1439	C	C	C	C	C	C	C
	1443-							
	1444	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
15	1450-							
	1453	TTCG	TTCG	TTCG	TTCG	TTCG	TTCG	TTCG
	1456	G	G	G	G	G	G	G
	1459	A	A	A	A	A	A	A
	1462	G	G	G	G	G	G	G
15	1470-							
	1472	GGA	GGA	GGA	GGA	GGA	GGA	GGT

1475	A	A	G	R	G	G	G
1484	C	C	C	C	C	C	S
R= A/G; K=G/T; S=C/G; Y=C/T; M=A/C; W=A/T; D =A/G/T/ no C; H=A/C/T/ no G; B=C/G/T no A;							
V = A/C/G no T							
* La posición distintiva distingue BR5311 de LH4:15							

5

¹ Alelo rrB de K12 W3110

Ejemplo 4

Técnica de ribotipificación (Riboprinting) para determinar la unicidad de la especie

La secuencia del ARNr 16S usada para determinar la taxonomía del aislado de BR5311 fue homólogo a un número de cepas de *Pseudomonas stutzeri* aisladas ambientalmente. Con el fin de determinar si las cepas BR5311 y 89AC1-3 de *Pseudomonas stutzeri* eran aislados nuevos, muchas cepas de *Pseudomonas stutzeri* se sometieron a un análisis automatizado RIBOPRINTER® como se describió anteriormente. Las cepas usadas para comparación fueron LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (descrita en la publicación de la solicitud de patente copendiente y de propiedad mancomunada de los Estados Unidos núm. 20090263887), *Pseudomonas stutzeri* DSM 50227, *Pseudomonas stutzeri* Zobell ATCC 14405, *Pseudomonas stutzeri* ATCC 17588, y *Pseudomonas stutzeri* DSM 6082. Como se muestra en la Figura 2, al usar el protocolo de ribotipificación, fue evidente que el patrón de fragmentos de restricción de *EcoRI* que se hibridaron a sondas del ADNr 16S y 23S fue diferente para BR5311 y EH89AC1-3 en comparación con cualquiera de las demás cepas sometidas a prueba, así como entre sí. Este análisis confirmó que las secuencias genómicas que rodean los genes del ARNr 16S y 23 en estas cepas son sustancialmente diferentes a las seis cepas del comparador probadas.

Ejemplo 5

Diferencias fenotípicas entre cepas BR5311, 89AC1-3 Y LH4:15 de *P. stutzeri*

Las cepas recién aisladas BR5311 y AC1-3 se sometieron a
 5 prueba en ensayos fenotípicos comparándolas entre sí y con
 LH4:15 de *P. stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823; descrita en la
 publicación de patente de los Estados Unidos núm.
 20090263887). Estas cepas se sometieron a prueba para
 hidrólisis de almidón en Agar R2A (Difco Laboratories,
 10 Detroit, MI) con 1 % de almidón sobre agar. Las cepas LH4:15 y
 89AC1-3 dieron positivo para la hidrólisis de almidón, no así
 la cepa BR5311. Estas cepas se sometieron a prueba para
 crecimiento aerobio en medio de etilenglicol al 0,02 % (NaCl,
 10 g/l, HEPES, 2,4 g/l, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 1,4 g/l, KH_2PO_4 ,
 15 0,69 g/l, NH_4Cl , 0,5 g/l, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 0,1 g/l, vitaminas, como
 en la Tabla 4, solución de selenio y tungsteno, como en la
 Tabla 4, 1 ml/l de solución de elementos traza [25 % HCl,
 10 ml/l, $\text{FeCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$, 1,50 g/l, ZnCl_2 , 70 mg/l, $\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$,
 100 mg/l, H_3BO_3 , 6 mg/l, $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$, 190 mg/l, $\text{CuCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$,
 20 2 mg/l, $\text{NiCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$, 24 mg/l, $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$, 36 mg/l], 0,2 ml/l
 de etilenglicol). Las cepas BR5311 y 89AC1-3 dieron positivo
 para crecimiento en este medio, no así la cepa LH4:15. En
 resumen (Tabla 6), solo 89AC1-3 mostró ambos rasgos
 metabólicos característicos de la especie del tipo *P. stutzeri*
 25 (Order IX. Pseudomonadales, Bergey's Manual of Systematic

Bacteriology, págs. 323-444, V. 2, The Proteobacteria Part B
The Gammaproteobacteria, Springer - Verlag, 2005).

Tabla 6. Comparación fenotípica de cepas de *P. stutzeri*

5	Cepa/característica	Crecimiento, etilenglicol	Hidrólisis de almidón
	<i>P. stutzeri</i> típica	+	+
	BR5311	+	-
	LH4:15	-	+
10	AC1-3	+	+

Adicionalmente, la cepa BR5311 fue muy tolerante a la
salinidad alta durante el crecimiento. La cepa LH4:15 no
creció en salmuera con nutrientes a más de 35 ppt, en tanto
15 que la BR5311 creció bien en salmuera con nutrientes con una
salinidad de 60 ppt. La salmuera con nutrientes consistió de
medio LB de Miller, 1/10 X, (Mediatech, Inc., Manassas, VA) +
NaCl adicionado para lograr la salinidad deseada, 35 g/l
(35 ppt) y 60 g/l (60 ppt).

20

Ejemplo 6

Selección de aislado bacteriano de BR5311 para crecimiento
en condiciones de salinidad alta de pozos canadienses

Crecimiento en agua de inyección del Pozo núm. 1

Se analizó el agua de inyección del sitio del Pozo núm. 1
5 para determinar el contenido químico. La salinidad fue de
34 ppt (aproximadamente equivalente al agua de mar) con
625 ppm de cationes divalentes en total, principalmente, Ca^{++} .
Debido a la alta salinidad de esta agua de inyección en
comparación con los medios mínimos salinos (15 ppt), la cepa
10 BR5311 se sometió a prueba para determinar su capacidad para
crecer en agua de inyección filtrada del Pozo núm. 1 con una
fuente de carbono simple, nitrato como aceptor de electrones y
aditivos de crecimiento mínimo. El agua de inyección del Pozo
núm. 1 se esterilizó por filtración y se adicionaron los
15 siguientes componentes: vitaminas y metales traza, como se
describe en la Tabla 4; 3 g/l de acetato de sodio y 1 g/l de
nitrato de sodio. Adicionalmente, 0,5 g/l de NH_4Cl ; 0,69 g/l
de NaH_2PO_4 ; y 1,4 g/l de KH_2PO_4 se agregaron a la mezcla. Este
medio se desgasificó con una mezcla de dióxido de
20 carbono/nitrógeno. A viales de suero anaerobios de 20 ml, se
agregó 18 ml del medio y 160 μl de cultivo aerobio de toda una
noche. Los viales se incubaron a 30° , ya sea de manera
estática o con mezclado moderado (225 rpm). El crecimiento de
BR5311 se analizó por observaciones de turbidez y desarrollo
25 de biopelícula/aglomeración de células. La cepa BR5311 creció

bien en la mezcla de agua de inyección y formó un sedimento de coagulación pegajoso que se depositó rápidamente en el fondo de los viales. El nitrato se consumió en el día 3, lo que indicó un crecimiento anaerobio sustancial de los cultivos.

5 Crecimiento en el agua de inyección/producción del Pozo
 núm. 2

Se diseñó un experimento de crecimiento anaerobio similar por separado al usar agua de inyección y agua de producción del Pozo núm. 2, descrito en la sección de Métodos generales. Estas
10 muestras de agua contenían concentraciones sustancialmente más altas de cationes divalentes (~2500 ppm), principalmente, Ca^{++} , que el agua del Pozo núm. 1 (anterior). La salinidad total fue de 67 ppt, que es aproximadamente el doble de la salinidad del agua de mar. Debido a esta alta salinidad, no fue evidente si
15 los microorganismos aislados del Pozo núm. 1 serían capaces de crecer en las aguas del Pozo núm. 2.

Las aguas de producción y de inyección del Pozo núm. 2 se esterilizaron separadamente por filtración, y se agregaron los siguientes componentes a cada una de ellas: 0,5 g/l de NH_4Cl ;
20 0,69 g/l de NaH_2PO_4 ; 1,4 g/l de KH_2PO_4 ; vitaminas y metales traza, como en la Tabla 4; 3 g/l de acetato de sodio, 1 g/l de nitrato de sodio. Se desgasificó cada medio, y se agregó 10 ml de medio a viales de vidrio de 20 ml con suero que se
inocularon con BR5311 o *Vibrio harveyi*, núm. ATCC: 14126, que
25 es una cepa halofílica conocida usada para comparación. Las

muestras se colocaron a 30 °C de manera inmóvil durante 3 días. Se observaron los niveles de nitrato para monitorear el crecimiento. La cepa BR5311 redujo el nitrato a 0 ppm en 10 días en medio de agua de producción (Figura 5A) y en cuatro
 5 días en medio de agua de inyección (Figura 5B). La cepa *Vibrio* no creció bien en estas mezclas de agua, lo que sugiere que las características halofílicas no son suficientes para establecer un crecimiento adecuado en estas aguas de pozos.

Un tercer experimento de crecimiento, realizado en
 10 duplicado, usó agua de producción y componentes similares, pero limitó el NH_4Cl a 0,1 g/l y el KH_2PO_4 a 0,02 g/l para evitar la precipitación de Ca^{++} de las aguas del Pozo núm. 2. En esta prueba, la cepa BR5311 redujo drásticamente el nitrato de 800 ppm a <200 ppm en 4 días (Figura 6).

15

Ejemplo 7

Selección de aislado bacteriano de BR5311 para crecimiento en presencia de petróleo del pozo núm. 1

Los cultivos de aislados que incluyen BR5311 se
 20 cultivaron en los medios mínimos salinos descritos en la Tabla 4, con los aditivos: 0,5 g/l de NH_4Cl ; 0,69 g/l de NaH_2PO_4 ; 1,4 g/l de KH_2PO_4 ; vitaminas y metales traza, como en la Tabla 4; (29,75 g/l de NaCl ; 0,31 g/l de KCl ; 0,05 g/l de Na_2SO_4 ; 1,6 g/l de $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; 1,08 g/l de $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$);
 25 1,4 g/l de NaHCO_3 ; 0,6 g/l de nitrato de sodio y 2,0 g/l de

acetato de sodio con un pH de 6.6 para simular el agua de inyección del Pozo núm. 1. Se desgasificaron los medios y se agregó 18 ml a viales de suero de 20 ml. A cada vial se agregó 1,0 ml de aceite de petróleo del Pozo núm 1, esterilizado en autoclave y desgasificado. Se agregó como inóculo 0,1 ml de un cultivo de toda la noche de BR5311. El nitrato se analizó por IC para observar el crecimiento en estos medios. BR5311 redujo el nitrato a nitrógeno dentro de los dos 2 días de incubación a 25 °C. La reducción de nitrato indica que la presencia de petróleo del Pozo núm. 1 no inhibió el crecimiento de este cultivo.

Ejemplo 8

Selección de aislados bacterianos por su capacidad para formar biopelículas

Se analizaron aislados individuales de los enriquecimientos con aceite de maíz del Ejemplo 1 para determinar su capacidad de formar biopelículas en filtros de vidrio sinterizado, como se describe en la sección de Métodos generales. Los medios que contienen inóculos fueron medios mínimos salinos (Tabla 4) complementados con acetato o lactato como única fuente de carbono y nitrato como aceptor de electrones, como se presenta en la Tabla 7. La mezcla se hizo anaerobia al colocarla en una cámara de plástico que contiene un sistema de depuración de oxígeno por ascorbato

(Becton, Dickinson Co, Sparks, Maryland). En función de esta selección, la cepa BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* se seleccionó como positiva para obturación y, después, se seleccionó por su preferencia por fuentes de carbono.

5 El agua de inyección del Pozo núm. 2 (67 ppt) se esterilizó por filtración, y se agregaron los siguientes nutrientes adicionales: 0,5 g/l de NH_4Cl ; 0,69 g/l de NaH_2PO_4 ; 1,4 g/l de KH_2PO_4 ; vitaminas y metales traza, como en la Tabla 4. Se agregó nitrato de sodio y o bien acetato
10 de sodio o lactato de sodio a muestras de prueba diferentes para dar las relaciones disponibles de donante/aceptor de electrones mostrada en la columna e de la Tabla 7. Se agregó 25 ml de los medios y 1 ml de cultivo de toda la noche a cada soporte con el filtro de vidrio. Después de una semana
15 de incubación en cajas anaerobias, se retiraron los filtros y se analizaron para determinar la capacidad de obturación, como se describe en la sección de Métodos generales. Cada filtro se midió tres veces. Los resultados de los tiempos de flujo para cada muestra de prueba se dan en la Tabla 7.

20

Tabla 7. Aditivos del ensayo para biopelículas y resultados de flujo

25

5

Prueba	Acetato de sodio	Nitrato de sodio	Lactato de sodio	e-	Flujo de agua, s
Núm. 1	1 g/l	2,66 g/l		1:2	16,7+/- 3,5
Núm. 2		2,66 g/l	0,66 g/l	1:2	8,7+/- 1,0
Núm. 3	2,07 g/l	0,66 g/l		4:1	17,7 +/- 2,8
Núm. 4		0,66 g/l	1,33 g/l	4:1	11,7 +/- 2,0

Los resultados mostraron que se observó una obturación significativa cuando se usó acetato como fuente de carbono independientemente de la relación de electrones. Se observó una obturación mínima con lactato con una relación de donante/aceptor de electrones de 4:1.

Ejemplo 9

15 Ensayo de biopelículas para la cepa BR5311 en medio de salinidad baja con acetato o lactato como fuente de carbono

Se analizó la cepa BR5311 para determinar la capacidad de formar biopelículas en filtros de vidrio sinterizado, como se describe en la sección de Métodos generales, por medio del uso de un medio de salinidad baja. BR5311 se inoculó en medio LB de Miller y se incubó aerobiamente durante toda la noche a 30 °C con vibración a 200 rpm. Para iniciar el experimento, se agregó 1 ml de un inóculo de toda la noche a 25 ml del medio a continuación por triplicado y se agregó a un soporte con filtro de vidrio. Estos cultivos

se cultivaron anaerobiamente en un incubador/agitador a 28 °C/100 rpm durante 2 semanas. Adicionalmente, se prepararon controles sin inocular por triplicado con un medio de igual formulación, pero sin el inóculo de la cepa, paralelamente con los tratamientos de prueba no inoculados.

Composición del medio de crecimiento de salinidad baja: NaCl, 10 g/l, NaHCO₃, 0,25 g/l, NaNO₃, 2 g/l, solución vitamínica, 1 ml/l B12, 100 mg/l, ácido p-aminobenzoico, 80 mg/l, D(+)-Biotina, 20 mg/l, ácido nicotínico, 200 mg/l, pantotenato de calcio, 100 mg/l, clorhidrato de piridoxina, 300 mg/l, tiamina-HCl. 2 H₂O, 200 mg/l, ácido alfa-lipoico, 50 mg/l], solución de selenita/tungstato, 1 ml/l [NaOH, 0,5 g/l, Na₂SeO₃.5H₂O, 6,0 mg/l, Na₂WO₄.2H₂O, 8,0 mg/l], metales traza SL-10, 1 ml/l [25 % HCl, 10 ml/l, FeCl₂.4 H₂O, 1,5 g/l, ZnCl₂, 70 mg/l, MnCl₂.4 H₂O, 100 mg/l, H₃BO₃, 6 mg/l, CoCl₂.6 H₂O, 190 mg/l, CuCl₂.2 H₂O, 2 mg/l, NiCl₂.6 H₂O, 24 mg/l, Na₂MoO₄.2 H₂O, 36 mg/l], KH₂PO₄, 0,02 g/l, NH₄Cl, 0,1 g/l, MgSO₄.7H₂O, 0,1 g/l, y 0,1 g/l de extracto de levadura.

La fuente de carbono en el medio fue o bien acetato de sodio o lactato de sodio (a 1,0 g/l). La salinidad fue de 20 ppt. Se sellaron individualmente filtros de prueba por triplicado en recipientes de incubación de 125 ml en condiciones anaerobias y se colocaron en un incubador/vibrador a 28 °C y 100 rpm durante 2 semanas.

Después de dos semanas, se verificaron las velocidades de flujo, como se describe en la sección de Métodos generales. Se registró el tiempo para el paso de agua de cada uno de los filtros de prueba y de control, y cada filtro se sometió a prueba 3 veces. Se calcularon las velocidades de flujo, y los valores posteriores a la incubación se compararon con los valores anteriores a la incubación para cada filtro. Los resultados de la Tabla 8 demuestran que la cepa BR 5311 causó una disminución significativa en la velocidad de flujo en comparación con los tratamientos de control después de dos semanas de incubación. En los tratamientos de control con acetato y lactato, las velocidades de flujo se incrementaron. El incremento de la velocidad de flujo fue el resultado de una mejor saturación de agua de los poros del filtro después de dos semanas de incubación sumergida. Los tratamientos de prueba que contenían el inóculo de BR 5311 mostraron disminuciones en la velocidad de flujo. En el tratamiento de prueba con acetato, la velocidad de flujo disminuyó en aproximadamente 42 %. En el tratamiento de prueba con lactato, las velocidades de flujo disminuyeron aproximadamente 27 %.

Tabla 8. Cambios en la velocidad de flujo a través de los filtros de vidrio de porosidad media después de dos semanas de incubación

5	Tratamiento	Flujo, ml/s					
		Valor anterior a la incubación	Valores* posteriores a la incubación			Media	% de cambio en la velocidad de flujo ¹
			Núm. 1	Núm. 2	Núm. 3		
10	Control 1 con acetato	0,083	0,100	0,100	0,100	0,100	+ 20
	Control 2 con acetato	0,091	0,125	0,111	0,111	0,116	+ 27
	Control 3 con acetato	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0
15	Prueba 1 con acetato	0,100	0,067	0,067	0,067	0,067	- 33
	Prueba 2 con acetato	0,100	0,043	0,042	0,038	0,041	- 59
	Prueba 3 con acetato	0,091	0,059	0,059	0,063	0,060	- 34
15	Control 1 con lactato	0,083	0,100	0,100	0,100	0,100	+20
	Control 2 con lactato	0,091	0,100	0,091	0,100	0,097	+7
	Control 3 con lactato	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0

Prueba 1 con lactato	0,111	0,125	0,111	0,111	0,116	+ 4	- 27
Prueba 2 con lactato	0,091	0,048	0,045	0,045	0,046	- 49	
Prueba 3 con lactato	0,100	0,067	0,067	0,063	0,065	- 35	

* 3 mediciones/réplicas sucesivas.

- 5 1 Se calcula como $((\text{media de valores posteriores a la incubación, ml/s} / \text{valores anteriores a la incubación, ml/s}) - 1) \times 100$

Ejemplo 10Ensayo de biopelícula para la cepa BR5311 en medio de salinidad alta con acetato como fuente de carbono

Se analizó la cepa BR5311 para determinar la capacidad de
 5 formar biopelículas en filtros de vidrio sinterizado, como se describe en la sección de Métodos generales, por medio del uso de un medio de salinidad alta. La salinidad del medio fue de 70 ppt. La cepa BR5311 se cultivó anaerobiamente en un medio de crecimiento con la siguiente composición: NaCl, 40,5 g/l,
 10 NH₄Cl, 0,1 g/l, KH₂PO₄, 0,02 g/l, Na₂SO₄, 0,1 g/l, solución de selenita-tungstato [NaOH, 0,5 g/l, Na₂SeO₃.5H₂O, 6,0 mg/l, Na₂WO₄.2H₂O, 8,0 mg/l], 1 ml/l, NaHCO₃, 0,2 g/l, solución vitamínica [vitamina B12, 100 mg/l, ácido p-aminobenzoico, 80 mg/l, D(+)-Biotina, 20 mg/l, ácido nicotínico, 200 mg/l,
 15 pantotenato de calcio, 100 mg/l, clorhidrato de piridoxina, 300 mg/l, tiamina-HCl. 2 H₂O, 200 mg/l, ácido alfa lipoico, 50 mg/l], 1 ml/l, solución de metales traza SL-10 [25 % HCl, 10 ml/l, FeCl₂.4 H₂O, 1,50 g/l, ZnCl₂, 70 mg/l, MnCl₂.4 H₂O, 100 mg/l, H₃BO₃, 6 mg/l, CoCl₂.6 H₂O, 190 mg/l, CuCl₂.2 H₂O,
 20 2 mg/l, NiCl₂.6 H₂O, 24 mg/l, Na₂MoO₄.2 H₂O, 36 mg/l], 1 ml/l, CaCl₂.2H₂O, 8,8 g/l, extracto de levadura, 0,025 g/l, NaNO₃, 2,4 g/l, acetato de sodio, 1,2 g/l, KCl, 0,86 g/l, MgCl₂.6H₂O, 6,4 g/l, solución azul de bromotimol, 0,4 %, 3 ml.

El experimento y las pruebas de velocidad de flujo después
 25 de dos semanas de incubación se realizaron como se describe en

el Ejemplo 9. Si bien la velocidad de flujo se incrementó en los controles, como en el Ejemplo 9, la cepa BR5311 causó una disminución significativa en la velocidad de flujo (Tabla 9). Las velocidades de flujo en los tratamientos de control se
5 incrementaron en un promedio de 20 %. Los tratamientos de prueba que contenían el inóculo de BR5311 mostraron una disminución promedio de 55 % en la velocidad de flujo.

Tabla 9. Cambios en la velocidad de flujo a través de los filtros de vidrio de porosidad media después de dos semanas de incubación.

5	Tratamiento	Flujo, ml/s					
		Valor anterior a la incubación	Valores* posteriores a la incubación			Media	% de cambio en la velocidad de flujo ¹
			Núm. 1	Núm. 2	Núm. 3		
10	Control 1	0,083	0,091	0,091	0,091	0,091	+10
	Control 2	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0
	Control 3	0,111	0,167	0,167	0,167	0,167	+50
	PRUEBA 1	0,125	0,071	0,071	0,071	0,071	- 43
	PRUEBA 2	0,083	0,048	0,048	0,048	0,048	- 42
	PRUEBA 3	0,083	0,015	0,016	0,017	0,016	- 81
							+20
							- 55

* 3 mediciones sucesivas

15 1 Se calcula como ((media de valores posteriores a la incubación, ml/s / valores anteriores a la incubación, ml/s)-1) x 100

Ejemplo 11

Ensayo de biopelícula para la cepa 89AC1-3 en salmuera que simula el pozo núm. 1

Se analizó la cepa 89AC1-3 para determinar la capacidad de
5 formar biopelículas en filtros de vidrio sinterizado, como se
describe en la sección de Métodos generales y el Ejemplo 8 al
usar salmuera que simula el Pozo núm. 1. La cepa 89AC1-3 se
inoculó en medio LB de Miller y se incubó a 30 °C aerobiamente
durante toda la noche (225 rpm). Se diluyó 500 µl del cultivo
10 de toda la noche en 25 ml de los medios mínimos descritos en la
Tabla 4 con 3,0 % en peso de NaCl para dar una salinidad que se
aproxima a la salinidad del Pozo núm. 1 (35 ppt). Se agregó
acetato de sodio o lactato de sodio para dar una concentración
final de 2000 ppm. Se agregó nitrato de sodio a 500 ppm como
15 aceptor de electrones para crecimiento anaerobio.

Las unidades de filtro se incubaron anaerobiamente a
temperatura ambiente durante dos semanas y se analizó el flujo
como se describe en la sección de Métodos generales y el
Ejemplo 3. La cepa 89AC1-3 mostró obturación con lactato (flujo
20 en $s = 30,0 \pm 7,0$) o acetato (flujo en $s = 20 \pm 13,0$) en
esta concentración de salinidad de agua de mar (35 ppt).

Ejemplo 12

Aglomeración de partículas de sílice con la cepa 89AC1-3

La cepa 89AC1-3 de *Pseudomonas stutzeri* se sometió a prueba para determinar su capacidad para aglomerar granos de sílice cristalina, como se describe en la sección de Métodos
 5 generales. El medio usado en esta prueba contenía acetato como fuente de carbono y tenía una salinidad de aproximadamente 32 ppt.

Medio de prueba:

NaCl, 27 g/l, NH₄Cl, 0,05 g/l, KH₂PO₄, 0,025 g/l, Na₂SO₄,
 10 0,05 g/l, solución de selenita-tungstato [NaOH, 0,5 g/l, Na₂SeO₃.5H₂O, 6,0 mg/l, Na₂WO₄.2H₂O, 8,0 mg/l], 0,5 ml/l, NaHCO₃, 0,1 g/l, solución vitamínica [vitamina B12, 100 mg/l, ácido p-aminobenzoico, 80 mg/l, D(+)-Biotina, 20 mg/l, ácido nicotínico, 200 mg/l, pantotenato de calcio,
 15 100 mg/l, clorhidrato de piridoxina, 300 mg/l, tiamina-HCl. 2 H₂O, 200 mg/l, ácido alfa-lipoico, 50 mg/l], 0,5 ml/l, solución de metales traza SL-10 [25 % HCl, 10 ml/l, FeCl₂.4 H₂O, 1,50 g/l, ZnCl₂, 70 mg/l, MnCl₂.4 H₂O, 100 mg/l, H₃BO₃, 6 mg/l, CoCl₂.6 H₂O, 190 mg/l, CuCl₂.2 H₂O, 2 mg/l, NiCl₂.6
 20 H₂O, 24 mg/l, Na₂MoO₄.2 H₂O, 36 mg/l], 0,5 ml/l, CaCl₂.2H₂O, 4,4 g/l, 0,25 g/l de extracto de levadura, 0,5 g/l de peptona de caseína, KCl, 0,86 g/l, MgCl₂.6H₂O, 6,4 g/l, NaNO₃, 2 g/l, acetato de sodio, 1 g/l.

Después de siete días, la DO600 media de los tubos
 25 duplicados inoculados con la cepa 89AC1-3 y de los tubos de

control duplicados sin inocular fue de aproximadamente 0,04. Cuando los tubos de tratamiento se mezclaron vigorosamente por 10 segundos de mezclado en vórtice, la turbidez se incrementó drásticamente debido a la resuspensión de la sílice cristalina que se había depositado en el fondo de los tubos durante siete días de incubación (Tabla 10). La disminución de la turbidez debido a la sedimentación de la sílice cristalina se controló en el tiempo después del mezclado por densidad celular óptica (DO600). La turbidez disminuyó mucho más rápidamente en los tratamientos inoculados que en los de control, según lo indicado por la reducción porcentual en la OD600 para el cultivo inoculado frente al control a 1 min y 10 min después del mezclado (Tabla 10).

Esto resulta de las partículas de sílice que forman aglomeraciones grandes, de hasta 100 micras de diámetro, según lo determinado por examen microscópico, en los tratamientos inoculados, que se sedimentan rápidamente en comparación con las partículas dispersas no aglomeradas de 2-20 μm en los tubos de control sin inocular. El comportamiento contrastante de las partículas de sílice demostró que la cepa 89AC1-3 formó una interacción adhesiva fuerte con las partículas de sílice cristalinas y produjo la aglomeración de las partículas.

Tabla 10. Sedimentación de granos de sílice debido a la aglomeración de partículas inducida microbianamente por la cepa 89AC1-3 en medio con acetato

5	Tratamiento	DO600 nm, antes del mezclado	DO600 nm, 1 minuto después del mezclado	DO600 nm, 10 minutos después del mezclado
	Control no inoculado	0,047	6,311	5,954
	núm. 1			
10	Control no inoculado	0,034	6,152	5,412
	núm. 2			
	Media	0,04	6,23	5,68
	Prueba inoculada núm. 1	0,07	2,767	2,742
	Prueba inoculada núm. 2	0,005	3,841	3,622
15	Media	0,04	3,3	3,18
	% de reducción en la DO	No aplicable	48 %	44 %

20 La cepa 89AC1-3 de *Pseudomonas stutzeri* se sometió a prueba para determinar su capacidad para aglomerar granos de sílice cristalina en el siguiente medio que contiene lactato de sodio (g/l) en lugar de acetato de sodio:

NaCl, 27 g/l, NH₄Cl, 0,05 g/l, KH₂PO₄, 0,025 g/l,
25 Na₂SO₄, 0,05 g/l, solución de selenita-tungsteno [NaOH,

0,5 g/l, $\text{Na}_2\text{SeO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 6,0 mg/l, $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 8,0 mg/l],
 0,5 ml/l, NaHCO_3 , 0,1 g/l, solución vitamínica [Vitamina
 B12, 100,00 mg/l, ácido p-aminobenzoico, 80 mg/l, D(+)-
 Biotina, 20 mg/l, ácido nicotínico, 200,00 mg/l, pantotenato
 5 de calcio, 100 mg/l, clorhidrato de piridoxina, 300 mg/l,
 tiamina-HCl. $2 \text{ H}_2\text{O}$, 200 mg/l, ácido alfa-lipoico, 50 mg/l],
 0,5 ml/l, solución de metales traza SL-10 [25 % HCl,
 10 ml/l, $\text{FeCl}_2 \cdot 4 \text{ H}_2\text{O}$, 1,50 g/l, ZnCl_2 , 70 mg/l, $\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{ H}_2\text{O}$,
 100 mg/L, H_3BO_3 , 6 mg/l, $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{ H}_2\text{O}$, 190 mg/l, $\text{CuCl}_2 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O}$,
 10 2 mg/l, $\text{NiCl}_2 \cdot 6 \text{ H}_2\text{O}$, 24 mg/l, $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O}$, 36 mg/l],
 0,5 ml/l, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 4,4 g/l, 0,25 g/l de extracto de
 levadura, 0,5 g/l de peptona de caseína, KCl, 0,86 g/l,
 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 6,4 g/l, NaNO_3 , 4 g/l, lactato de sodio, 2 g/l.

Después de siete días, la DO600 promedio de los tubos
 15 inoculados duplicados y de los tubos de control duplicados
 sin inocular fue de 0 y 0,07, respectivamente. Los
 resultados de la sedimentación después del mezclado fueron
 similares a los del medio que contenía acetato que se
 mencionó anteriormente (Tabla 11).

20

Tabla 11. Sedimentación de granos de sílice debido a la
 aglomeración de partículas inducida microbianamente por la
 cepa 89AC1-3 en medio con lactato

25

	Tratamiento	DO600 nm, antes del mezclado	DO600 nm, 1 minuto después del mezclado	DO600 nm, 10 minutos después del mezclado
5	Control no inoculado núm. 1	0,045	5,419	5,113
	Control no inoculado núm. 2	0,094	5,197	4,829
	Media	0,07	5,31	4,97
10	Prueba inoculada núm. 1	0	2,665	2,609
	Prueba inoculada núm. 2	0	3,133	3,188
	Media	0	2,90	2,90
15	% de reducción en la DO	No aplicable	45 %	42 %

Ejemplo 13

Caída de presión medida en tubo delgado de control que contiene petróleo/arena

20 Se usó la configuración de tubos delgados descrita en la
sección de Métodos generales para medir los cambios de presión
en el tiempo de una muestra de arena/petróleo como control. Un
tubo delgado (Figura 4, 9a) se llenó de arena de la formación
de Schrader Bluff en la unidad de Milne Point de la región de
25 la Pendiente Norte de Alaska, como se describe en la sección de

Métodos generales. El tubo se inundó bajo una presión de aproximadamente 0,66 megapascals (95 psi) con la Salmuera núm. 1 (Métodos generales), con 0,74 megapascals (107 psi) de presión en el recipiente de presión. Después de reducir la presión a aproximadamente 0,14 megapascals (20 psi), se inundó el tubo delgado con aproximadamente 50 cc o aproximadamente 1 volumen de poro de petróleo crudo obtenido de un yacimiento de petróleo de la unidad Milne Point de la región de la Pendiente Norte de Alaska. Se dejó que la mezcla de petróleo y arena del tubo delgado se depositara o madurara por aproximadamente 2 semanas sin que ningún fluido fluyera a través del tubo.

Después, se alimentó la Salmuera núm. 1 (Métodos generales) continuamente durante 55 días en el tubo delgado y se comenzó con una velocidad de flujo de 0,06 ml/min, lo que da un tiempo de permanencia de aproximadamente 0,5 días en el tubo. La caída de presión a través del tubo delgado se midió en el tiempo (Figura 7). En varios puntos de tiempo, tuvieron que usarse velocidades de flujo más altas debido a problemas de funcionamiento del sistema. En esos momentos, la caída de presión se ajustó por la relación de las velocidades de flujo para que esta caída de presión pudiera seguirse comparando con la caída de presión medida en otros tubos delgados. Inicialmente, la caída de presión fue de 0,0069 a 0,0137 megapascals (de 1 a 2 psi), que disminuyó posteriormente cuando el tubo delgado se inundó con la

Salmuera núm. 1. La caída observada en la presión se debió al hecho de que el petróleo se estaba eliminando del tubo delgado, según lo demostrado por el hecho de que el petróleo apareció en el efluente del tubo delgado. Después de 40 días, la presión había continuado cayendo a aproximadamente 0,69 kiloPascuales (0,1 psi), a lo que siguió un ligero incremento en la presión. Se tomó una muestra del efluente, y se determinaron los títulos de células viables (el número más probable o MPN), como se describe en la sección de Métodos generales. Los resultados de los análisis se muestran a continuación en la Tabla 12. El incremento ligero en la presión se debió, probablemente, al metabolismo del acetato, presente en la Salmuera núm. 1, a través de la microflora natural presente en la arena dentro del tubo delgado.

15

Ejemplo 14

Tubo delgado inoculado alimentado continuamente y mediciones de la caída de presión

Se preparó un tubo delgado como en el Ejemplo 13, excepto que después de la maduración de la muestra de arena y petróleo en el tubo y la inundación con varios volúmenes de poro de la Salmuera núm. 1 a 0,6 ml/min, el tubo (muestra 9b) se inoculó con la cepa LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823). Esta es una cepa aislada de muestras de agua de producción de un yacimiento de petróleo, como se

25

describe en la publicación de patente copendiente y de propiedad mancomunada de los Estados Unidos núm. 20090263887. Para inocular el tubo delgado, se diluyó 1,0 ml de una muestra congelada de la cepa LH4:15 de *Pseudomonas* 5 *stutzeri* en una relación de 1:20 en la Salmuera núm. 3 (Métodos generales) y se agitó. La solución con el inóculo diluido se diluyó aún más, 200:1, (2,5 ml adicionados a 497,5 ml) en la Salmuera núm. 1, se tomó una muestra de esto y se determinaron los títulos de células viables (número más 10 probable o MPN), como se describe en la sección de Métodos generales. Este valor de MPN se presenta en la Tabla 12 como “inoculación de MPN”. Se cargó una jeringa de 50 ml con esta solución de inóculo diluido, y la solución se bombeó con una bomba de jeringa dentro del tubo delgado a una velocidad de 15 aproximadamente 0,2 ml/min. El proceso de inoculación del tubo delgado tardó aproximadamente 4 horas para completarse.

Después de la inoculación, se tomó una muestra del efluente y se determinaron los títulos de células viables (número más probable o MPN), como se describe en la sección 20 de Métodos generales. Los resultados de los análisis se muestran a continuación en la Tabla 12 identificados como los “MPN en el efluente”.

La Salmuera núm. 2 se alimentó continuamente a través del tubo delgado 9b a 0,06 ml/min durante 55 días mientras se medía

la caída de presión a través del tubo (Figura 8). Inicialmente, la caída de presión fue de 0,0069 a 0,0137 megapascuales (de 1 a 2 psi) y cayó por debajo de 0,0069 megapascuales (1 psi) en aproximadamente 8 días. A los 10 días, hubo un incremento
5 definitivo en la caída de presión. A los 20 días, el sistema experimentó un pico de presión seguido por una caída inexplicable y muy marcada en la presión. El pico de presión a los 22 días (Figura 8) fue una perturbación debido a un problema de funcionamiento del sistema. Otro pico inexplicable
10 de presión se produjo a los 35 días. Más drásticamente, se produjo un incremento en la presión a los 45 días seguido de otra caída de presión inexplicable a aproximadamente 47 días. El incremento en la presión a través del tubo delgado, en comparación con el control del Ejemplo 13, demuestra el
15 potencial de LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC:PTA-8823) para modificar la permeabilidad de rocas porosas.

Ejemplo 15

Tubo delgado inoculado alimentado por lotes y mediciones de
20 la caída de presión

Se preparó un tubo delgado como en el Ejemplo 14, con la inoculación de la cepa LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823). Después de la inoculación, se tomó una muestra del efluente y se determinaron los títulos de
25 células viables (número más probable o MPN), como se

describe en la sección de Métodos generales. Los resultados de los análisis se muestran a continuación en la Tabla 12.

Inmediatamente después de inocular el tubo delgado, se alimentó la Salmuera núm. 1 durante toda la noche a 0,06 ml/min. A la mañana siguiente, se alimentó la Salmuera núm. 3 (Métodos generales) durante 6 h a una velocidad de 0,06 ml/min. Después, se alimentó la Salmuera núm. 1 a 0,06 ml/min. Típicamente, se alimentó un lote de Salmuera núm. 3 durante 6 horas cada tercer o cuarto día por la duración de la prueba, y se alimentó la Salmuera núm. 1 continuamente entre lotes. La cantidad total de nutrientes alimentados en el tubo delgado 9c fue igual que la alimentada en el tubo delgado 9b del Ejemplo 14.

Inicialmente, la caída de presión fue de 0,0069 a 0,0137 megapascuales (de 1 a 2 psi) y, después, disminuyó a aproximadamente 0,0069 megapascuales (1 psi) en 8 días. A los 10 días, hubo un incremento en la caída de presión, y este se incrementó consistente y linealmente en el tiempo (Figura 9). Los picos observados a los 22 y 29 días fueron perturbaciones debido a un problema de funcionamiento del sistema. Notablemente, al término del día 55, la caída de presión fue de un orden de magnitud mayor que el control en el Ejemplo 13. Esto demuestra el potencial de LH4:15 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-8823) para modificar eficazmente la permeabilidad de rocas porosas.

Tabla 12. Análisis del MPN de tubos delgados después de la inoculación

5

Análisis	Tubo delgado 9a	Tubo delgado 9b	Tubo delgado 9c
Inoculación de MPN	Sin inóculo	$\sim 1 \times 10^8$ UFC/ml	$\sim 1 \times 10^8$ UFC/ml
MPN en el efluente	$4,2 \times 10^5$	$1,1 \times 10^7$ UFC/ml	$7,9 \times 10^6$ UFC/ml

MPN = números más probables

10

Ejemplo 16

Caída de presión medida en el tubo delgado de control que contiene arena en medio de salinidad alta

Se usó la configuración de tubos delgados descrita en la sección de Métodos generales para medir los cambios de presión en el tiempo de muestras de arena en agua de salinidad alta (70 ppt) como control. Se llenaron dos tubos delgados (tubos 9a-2 y 9b-2) con una mezcla de arena más Sil-co-Sil 125 (U.S. Silica, Berkeley Springs, WV) en una relación de 4:1 en peso (20 % en peso). Cada tubo delgado se inundó, con una presión de aproximadamente 0,66 megapascals (95 psi), con la Salmuera núm. 4 (a continuación), con 0,74 megapascals (107 psi) de presión en el recipiente de presión.

Salmuera núm. 4: Se usó agua de inyección esterilizada por filtración en un pozo petrolero de Alberta, Canadá. El

25

contenido total de sal disuelta fue de 70 ppt. El pH de esta solución se ajustó de ~6,2 a 6,4 con HCl o NaOH.

Con solamente la Salmuera núm. 4 que fluye en los tubos (sin petróleo presente), se realizaron mediciones y se
5 calculó la permeabilidad base de aproximadamente 1 darcy, según lo informado en la sección Métodos generales.

Los tubos delgados 9a-2 y 9b-2 se inocularon previamente con 60 ml de inyección en vivo de salmuera (Salmuera núm. 4 que no se esterilizó por filtración) a una velocidad de
10 15 ml/hora durante 4 horas. Después de esta inoculación previa, se tomó una muestra del efluente y se realizaron los recuentos de células, como se describe en la sección de Métodos generales, y se proporcionan en la Tabla 13.

La Salmuera núm. 4 se alimentó continuamente a una
15 velocidad de 3,6 ml/h durante 11 días en los tubos delgados 9a y 9b mientras se determinaba la caída de presión a través del tubo delgado. Los resultados para el tubo 9a-2 se muestran en la Figura 10. Los resultados fueron similares para ambos tubos. La caída de presión permaneció entre
20 0,0069 y 0,0137 megapascals (de 1 a 2 psi). Esto ilustra la estabilidad de la arena compactada en el tubo delgado mientras se inundaba con la salmuera de la inyección.

Ejemplo 17

Caída de presión medida en el tubo delgado inoculado alimentado por lotes que contiene arena en medio de salinidad alta

Un día después, el tubo delgado 9a-2 del Ejemplo 16 se inoculó con BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-
5 11283). Para inoculación, una muestra congelada de BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* se diluyó 1:20 en la Salmuera núm. 7 (a continuación), se agitó y, después, se dejó reposar durante toda la noche. Se tomó una muestra del inóculo, se realizaron los recuentos de células, como se describe en la
10 sección de Métodos generales, y se presentan en la Tabla 13. Se cargó una jeringa con la solución del inóculo y se bombeó en el tubo delgado con una bomba de jeringa a una velocidad de aproximadamente 0,25 ml/min. El proceso de inoculación del tubo delgado tardó aproximadamente 4 horas para
15 completarse. Después de completada la inoculación, el tubo delgado se dejó madurar durante 5 días.

Al finalizar el período de maduración, se alimentó la Salmuera núm. 6 (a continuación) en el tubo delgado 9a-2 a una velocidad de 3,6 ml/h durante 4 h. En este punto, se tomó
20 una muestra del efluente y se determinaron los recuentos de células, como se describe en la sección de Métodos generales, y se presentan en la Tabla 13. Se continuó el bombeo de la Salmuera núm. 4 a una velocidad de 3,6 ml/h en este tubo delgado. Se tomó una muestra del efluente después de un total

de 46 días, y se realizó el recuento de células. Los resultados del análisis se muestran en la Tabla 13.

La Salmuera núm. 6 se alimentó en el tubo delgado 9a-2 en pulsos de 4 a 8 horas dos veces por semana (una vez cada 3 o 4 días) durante aproximadamente 30 días, y se midió la caída de presión a través del tubo delgado. La Salmuera núm. 6 se alimentó en pulsos de 4 horas en el día 17, 20 y 24. La Salmuera núm. 6 se alimentó en pulsos de 8 horas en el día 27, 32, 34, 38, 41 y 44. Inicialmente, la caída de presión fue de 0,0069 a 0,0137 megapascuales (de 1 a 2 psi). Después de 10 días, hubo un aumento apreciable en la caída de presión que se hizo más pronunciado con el tiempo (Figura 11). La caída de presión fue casi 6 veces mayor que el control (Ejemplo 16). Esto demuestra el potencial de BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA11283) para modificar eficazmente la permeabilidad de rocas porosas aun cuando se alimente de manera discontinua en un medio acuoso de salinidad alta.

Salmuera núm. 6: alimentación discontinua de nutrientes

	Cantidad por litro	
20	NaNO ₃	300,5 g
	Acetato de sodio	152,5 g
	NH ₄ Cl	3,6 g
	KH ₂ PO ₄	0,72 g
	Extracto de levadura	18 g

pH=6,5

Se diluye 1 parte en 36 partes de Salmuera núm. 4

Salmuera núm. 7:

en agua de grifo,

5		Cantidad por litro
	NaCl	10 mg
	Lactato y NH ₄	1 g
	Na NO ₃	2 g
	NH ₄ Cl	0,1 g
10	KH ₂ PO ₄	0,02 g
	Extracto de levadura	0,1 g

Se ajusta el pH de ~6,2 a 6,4 con HCl.

15 Ejemplo 18

Caída de presión determinada en el tubo delgado inoculado
alimentado continuamente que contiene arena en medio de
salinidad alta

El tubo delgado 9b-2 del Ejemplo 16 se inoculó con
20 BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-11283), se
dejó madurar, y se tomaron muestras como se describe en el
Ejemplo 17. Al finalizar el período de maduración, se
alimentó continuamente la Salmuera núm. 5 en el tubo delgado
9b-2 a una velocidad de 3,6 ml/hora, se tomó una muestra del
25 efluente, y se determinaron los recuentos de células, que se

presentan en la Tabla 13. La Salmuera núm. 5 tiene la misma concentración de componentes por litro que la dada para la Salmuera núm. 6 mencionada anteriormente, pero se diluyó 1 parte en 327 partes de la Salmuera núm. 4. Se continuó la alimentación de la Salmuera núm. 5 por la duración del experimento mientras se medía la caída de presión en este experimento (Figura 12). Se tomó una muestra del efluente después de 46 días, y se determinó el recuento de células. Los resultados del análisis se muestran en la Tabla 13.

10 Inicialmente, la caída de presión fue de 0,0137 a 0,0274 megapascals (de 2 a 4 psi). Para el día 32, la caída de presión observada se había incrementado en aproximadamente un factor de 4 en comparación con la caída de presión inicial en el día 17. En el día 32,8, se detuvo la alimentación de la Salmuera núm. 5 que contiene nutrientes, y se alimentó en su lugar la Salmuera núm. 4 (agua de inyección esterilizada por filtración usada en un pozo petrolero en Alberta) hasta el día 38,7. Durante este período de 6 días, hubo una disminución en la caída de presión, aunque la presión permaneció significativamente mayor que la caída de presión inicial en el día 17. En el día 38,7, se alimentó nuevamente la Salmuera núm. 5 en el tubo delgado 9b. Entre los días 45 y 46, la caída de presión volvió a subir nuevamente, por lo que tuvo aproximadamente un factor de 6 más alto en comparación con la caída de presión inicial en el día 17. El pico de

15

20

25

presión a aproximadamente 44 días (Figura 12) fue una perturbación debido a un problema de funcionamiento del sistema. Esto demuestra el potencial de BR5311 de *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-11283) para modificar eficazmente la permeabilidad de rocas porosas cuando se alimenta continuamente en un medio acuoso de salinidad alta.

Tabla 13. Análisis de células en vivo del inóculo y muestras de tubos delgados

10	Recuentos de células	Tubo delgado 9a-2	Tubo delgado 9b-2
15	Después de la inoculación previa con salmuera de inyección en vivo	$8,1 \times 10^4$ ufc/ml	$1,1 \times 10^4$ UFC/ml
	Inóculo de BR5311 de P. stutzeri	4×10^6 ufc/ml	$9,8 \times 10^5$ ufc/ml
	Efluente después de una maduración de 5 días	$2,2 \times 10^6$ ufc/ml	$7,2 \times 10^5$ ufc/ml
20	Efluente después de 46 días	$4,2 \times 10^5$ ufc/ml	$1,1 \times 10^7$ UFC/ml

Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica

la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

**Reivindicaciones solicitud divisional de la solicitud
de patente No. 13.134.124**

5 1. Una composición que mejora la recuperación de
petróleo; la composición comprende:

 a) un microorganismo aislado seleccionado del
 grupo que consiste en BR5311 de *Pseudomonas*
 stutzeri (núm. ATCC: PTA-11283) y 97AC1-3 de
10 *Pseudomonas stutzeri* (núm. ATCC: PTA-11284);
 que comprende además uno o mas microorganismos
 adicionales, donde dichos microorganismos
 adicionales crecen en presencia de petróleo en
 condiciones desnitrificantes;

15 b) aceptores de electrones; en donde el
 aceptor de electrones es una sal iónica de
 nitrato; y

 c) una fuente de carbono, donde dicha fuente de
 carbono se selecciona del grupo que consiste en
20 lactato, acetato y succinato .

2. La composición de conformidad con la
reivindicación 1, en donde el microorganismo aislado produce
una biopelícula obturadora.

3. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde dichos microorganismos adicionales comprenden una especie *Shewanella*.
- 5 4. La composición de conformidad con la reivindicación 3, en donde la especie *Shewanella* comprende un ADNr 16S que comprende las secuencias distintivas degeneradas de sec. con núms. de ident.:39, 41 y 43.

RESUMEN DE LA INVENCIÓN

Se proporcionan métodos, microorganismos y composiciones que se caracterizan porque los yacimientos de petróleo se inoculan con microorganismos que pertenecen a

5 *Pseudomonas stutzeri* y un medio que incluye un aceptor de electrones. La *Pseudomonas stutzeri* crece en el yacimiento de petróleo para formar biopelículas obturadoras que reducen la permeabilidad en áreas de formaciones subterráneas e incrementan, de este modo, la eficacia de barrido y mejoran,

10 por lo tanto, la recuperación de petróleo.

Figura 1




Figura 2




Figura 3

A

Sec. con núm. de ident.:
*38 Distintiva dominante de *Shewanella*
39 Distintiva degenerada de *Shewanella*

170	180	190	200	203
+	+	+	+	+
GCATACGCCCTACGGGGGAAAGAGGGGGACTTTC				203
GCATACGCCCTACGGGGGAAARRRGGGGMNYTMM				203

B

Sec. con núm. de ident.:
40 Distintiva dominante de *Shewanella*
41 Distintiva degenerada de *Shewanella*

820	830	840	850	860
+	+	+	+	+
TCGGAGTTTGGTGTCTTGAACACTGGGTCTCAAGCTAACG				860
TCGGARTTTGGTIVHCTTTRACACTGGKYTYMYMAAGCTAACG				860

C

Sec. con núm. de ident.:
42 Distintiva dominante de *Shewanella*
43 Distintiva degenerada de *Shewanella*

1230	1240	1250	1260	1270
+	+	+	+	+
ACAAATGGCGAGTACAGAGGGTTTGCAAGCCGCGAGGTGGAGCTAAATCTCA				
ACAAATGGBVDDTACAGAGGGTTGCRAGCCGCRAGGTSDAGCTAATCYCA				

1280	1290	1300	1310	1320
+	+	+	+	+
CAAAAGTCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATG				
BAAAGHBGTCGTAGTCCGGATYGGAGTCTGCAACTCGACTCCRTG				

Distintiva dominante de *Shewanella* cont'd.
Distintiva degenerada de *Shewanella* cont'd.

Leyenda
R=A/G; Y=T/C; M=A/C; S=G/C; N=A/C/G/T; H=A/C/T/ No G; V=A/C/G/ No T B=C/G/T/ No A;
D=A/G/T/ No C; K=G/T

Figura 4




Figura 5A




Figura 5B




Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10




Figura 11





Figura 12



LISTA DE SECUENCIAS

<110> DuPont Company

Hendrickson, Edwin

Jackson, Scott

Fallon, Robert

Keeler, Sharon

Rees, Bethany

<120> MÉTODOS, CEPAS Y COMPOSICIONES ÚTILES PARA LA RECUPERACIÓN MEJORADA
DE PETRÓLEO POR VÍA MICROBIANA: PSEUDOMONAS STUTZERI

<130> CL5094

<160> 44

<170> PatentIn versión 3.5

<210> 1

<211> 20

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Iniciador

<400> 1

cgggttacctt gttacgactt

<210> 2

<211> 20

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Iniciador

<400> 2

agagtttgat ymtggctcag

20

<210> 3

<211> 16

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Iniciador

<400> 3

aacagctatg accatg

16

<210> 4

<211> 17

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Iniciador

<400> 4

gtaaaacgac ggccagt

17

<210> 5

<211> 1436

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 5

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggaacgggtg agtaatgcct

60

aggaatctgc ctgatagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatcacgc

120

ctacgggaga aagcagggga ctttcggggc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt

180

agctagttgg tgaggtaacg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg

240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat

300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga

360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaaccta atacgttagt gttttgacgt

420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc

480

aagcgттаат cggaaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgтта agttgaatgt

540

gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtgg	1080
cactctaagg agactgccg tgacaaaccg gaggaagggt gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtcgg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgca cacaccgcc gtcacaccat gggagtgggt tgctccagaa gtagctagtc	1380
taaccttcgg ggggacggtt accacggagt aattcatgac tggggtgaag tcgtaa	1436

<210> 6

<211> 1436

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 6

agtcgagcgg atgagtggag cttgctccat gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagtggggga tcttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttagg tgaggtaaag gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt 420

taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc 480

aagcgттаат cggaaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt 540

gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga 600

gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg 660

cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgctgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacaccgccc gtcacaccat gggagtgggt tgctccagaa gtagctagtc	1380
taaccttcgg ggggacggtt accacggagt gattcatgac tggggtgaag tcgtaa	1436

<210> 7

<211> 1435

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 7

agtcgagcgg atgagtggag cttgctccat gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctatacc gcatacgtcc	120
tacgggagaa agtgggggat cttcggacct cacgctatca gatgagccta ggtcggatta	180
gctagttagt gaggtaaagg ctcaccaagg cgacgatccg taactgggtct gagaggatga	240
tcagtcacac tggaactgag acacggtcca gactcctacg ggaggcagca gtggggaata	300
ttggacaatg ggcgaaagcc tgatccagcc atgccgcgtg tgtgaagaag gtcttcggat	360
tgtaaagcac ttttaagttgg gaggaagggc agtaagttaa taccttgctg ttttgacgtt	420
accaacagaa taagcaccgg ctaacttcgt gccagcagcc gcggtatac gaagggtgca	480
agcgттаатс ggaattactg ggcgtaaagc gcgcgtaggt ggttcgttaa gttggatgtg	540
aaagccccgg gctcaacctg ggaactgcat ccaaaactgg cgagctagag tatggcagag	600
ggtggtggaa tttcctgtgt agcggtgaaa tgcgtagata taggaaggaa caccagtggc	660
gaaggcgacc acctgggcta atactgacac tgaggtgcga aagcgtgggg agcaaacagg	720
attagatacc ctggtagtcc acgccgtaaa cgatgtcgac tagccgttgg gatccttgag	780
atcttagtgg cgcagctaac gcattaagtc gaccgcctgg ggagtacggc cgcaaggtta	840

aaactcaa	at	gaattgacgg	gggccccg	cac aagcgg	tgga gcatgt	ggtt taattc	gaag	900
caacgc	gaag	aaccttac	ca ggccttg	aca tgcagag	aac tttccag	aga tggatt	gg	960
ccttcg	ggaa	ctctgac	aca ggtgct	gcat ggctg	tcgtc agctc	gtgtc	gtgagat	1020
gggtta	agtc	ccgtaac	gag cgcaacc	ctt gtcctta	gtagt accagc	acgt taaggt	gggc	1080
actcta	agga	gactgcc	ggt gacaa	accgg aggaagg	tgg ggatg	acgtc aagtc	atcat	1140
ggccct	tacg	gcctggg	cta cacacg	tgt acaatg	gtcg gtacaa	aggg ttgcca	aagcc	1200
gcgagg	tgga	gctaata	ccca taaaac	cgat cgtagt	cgg atcgcag	tct gcaact	cgcac	1260
tgcgtg	aagt	cggaatc	gct agtaat	cgtg aatcaga	atg tcacgg	tga tacgtt	ccccg	1320
ggcctt	gtac	acaccg	ccccg tcacacc	atg ggagt	gggtt gctcc	agaag tagct	agtct	1380
aaccttc	ggg	ggacgg	tta ccacgg	agtg attcat	gact ggggt	gaagt cgtaa		1435

<210> 8

<211> 1435

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 8

agtcgag	cgg	atgarkr	gag cttgct	symk gattcag	cgg	cggacgg	gtg agtaatr	cct	60
---------	-----	---------	------------	--------------	-----	---------	-------------	-----	----

aggaatctgc ctrdtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctatacc gcatacgtcc	120
tacggggagaa agyrggggay cttcggrcct yrcgctahya gatgagccta ggtcggatta	180
gctagttagt gaggtaahgg ctcaccaagg cdacgatccg taactgggtct gagaggatga	240
tcagtcacac tggaactgag acacggtcca gactcctacg ggaggcagca gtggggaata	300
ttggacaatg ggcgaaagcc tgatccagcc atgccgcgtg tgtgaagaag gtcttcggat	360
tgtaaagcac tttaagttgg gaggaagggc agtaasytaa tacsttrstg ttttgacgtt	420
accracagaa taagcaccgg ctaacttcgt gccagcagcc gcggtatac gaagggtgca	480
agcgttaatc ggaattactg ggcgtaaagc gcgcgtaggt ggttygttaa gttgratgtg	540
aaagccccgg gctcaacctg ggaactgcat ccaaaactgg cragctagag tatggcagag	600
ggtggtggaa tttcctgtgt agcggtgaaa tgcgtagata taggaaggaa caccagtggc	660
gaaggcgacc acctgggcta atactgacac tgaggtgcga aagcgtgggg agcaaacagg	720
attagatacc ctggtagtcc acgccgtaaa cgatgtcgac tagccgttgg gatccttgag	780
atcttagtgg cgcagctaac gcattaagtc gaccgcctgg ggagtacggc cgcaaggtta	840
aaactcaaat gaattgacgg gggcccgcac aagcggtgga gcatgtggtt taattcgaag	900
caacgcgaag aaccttacca ggccttgaca tgcwgagaac ytkccagaga tggmkkggtg	960

ccttcgggar ctcwgacaca ggtgctgcat ggctgtcgtc agctcgtgtc gtgagatggt	1020
gggttaagtc ccgtaacgag cgcaaccctt gtccttagtt accagcacrt tawggtgggc	1080
actctaagga gactgccggt gacaaaccgg aggaaggtgg ggatgacgtc aagtcacat	1140
ggcccttacg gcctgggcta cacacgtgct acaatggtcg gtacaaaggg ttgccaagcc	1200
gcgaggtgga gctaattcca taaaaccgat cgtagtccgg atcgagtcct gcaactcgac	1260
tgcgtgaagt cggaatcgct agtaatcgtg aatcagaatg tcacggtgaa tacgtycccg	1320
ggccttgyac acaccgcccg tcacaccatg ggagtgggtt gctccagaag tagctagtct	1380
aaccttcggg gggacggtta ccacggagtg attcatgact ggggtgaagt cgtaa	1435

<210> 9

<211> 1341

<212> ADN

<213> Escherichia coli

<400> 9

agtcgaacgg taacaggaag aagcttgctt ctttgtcgtc gaggggcgga cgggtgagta	60
atgtctggga aactgctga tggaggggga taactactgg aaacggtagc taataccgca	120
taacgtcgca agaccaaaga gggggacctt cgggcctctt gccatcgat gtgccagat	180
gggattagct agtaggtggg gtaacggctc acctaggcga cgatccctag ctggtctgag	240

aggatgacca gccacactgg aactgagaca cgggccagac tcctacggga ggcagcagtg	300
gggaatattg cacaatgggc gcaagcctga tgcagccatg ccgcgtgtat gaagaaggcc	360
ttcgggttgt aaagtacttt cagcggggag gaagggagta aagttaatac ctttgctcat	420
tgacgttacc cgcagaagaa gcaccggcta actccgtgcc agcagccgcg gtaatacgga	480
gggtgcaagc gttaatcgga attactgggc gtaaagcgca cgcaggcggg ttgttaagtc	540
agatgtgaaa tccccgggct caacctggga actgcatctg atactggcaa gcttgagtct	600
cgtagagggg ggtagaattc caggtgtagc ggtgaaatgc gtagagatct ggaggaatac	660
cgggtggcgaa ggcgggcccc tggacgaaga ctgacgctca ggtgcgaaag cgtggggagc	720
aaacaggatt agataccctg gtagtccacg ccgtaaacga tgtcgacttg gaggttgtgc	780
ccttgaggcg tggcttccgg agctaacgcg ttaagtcgac cgctgggga gtacggccgc	840
aagggtaaaa ctcaaagaa ttgacggggg cccgcacaag cgggtggagca tgtggtttaa	900
ttcgatgcaa cgcgaagaac cttacctggt cttgacatcc acggaagttt tcagagatga	960
gaatgtgcct tcgggaaccg tgagacaggt gctgcatggc tgtcgtcagc tcgtgttgtg	1020
aaatgttggg ttaagtcccg caacgagcgc aacccttata ctttgttgcc agcgggccgg	1080
ccgggaactc aaaggagact gccagtgata aactggagga aggtggggat gacgtcaagt	1140

catcatggcc cttacgacca gggctacaca cgtgctacaa tggcgcatac aaagagaagc	1200
gacctcgca gagcaagcgg acctcataaa gtgcgtcgta gtccggattg gagtctgcaa	1260
ctcgactcca tgaagtcgga atcgctagta atcgtggatc agaatgccac ggtgaatacg	1320
ttcccgggcc ttgtacacac c	1341

<210> 10

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 10

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctgatagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttagg tgaggtaacg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaaccta atacgttagt gttttgacgt	420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaaggggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgta agttgaatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cagccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtagcg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg gggggccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaaggtggg	1080
cactctaagg agactgccg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtcg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320

gggccttgca cacacc 1336

<210> 11

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 11

agtcgagcgg atgagtggag cttgctccat gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagtggggga tcttcggacc tcacgtatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttgg tgaggtaaag gtcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacgggcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt 420

taccaacaga ataagcacg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc 480

aagcgtaaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt 540

gaaagccccg ggctcaacct ggggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga 600

gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg 660

cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatccttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaaggtggg	1080
cactctaagg agactgccg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgacgtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 12

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 12

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctgatatggg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcggggc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttagg tgaggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaaccta atacgttagt gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgta agttgaatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgagggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtagcg ccgcaaggtt	840

aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtgg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 13

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 13

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctgatagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcggggc ttgcgtatc agatgagcct aggtcggatt	180

agctagttgg tgaggtaacg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacgggcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaaccta atacgttagt gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaaggggtgc	480
aagcgtaaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgta agttgaatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgagggtgcg aaagcggtgg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaagggt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtggg	1080

cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcttgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgagggtgg agctaattccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacgggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 14

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 14

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctgatagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatagtc	120
ctaagggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttgg tgaggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacgggtc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaaccta atacgttagt gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgta agttgaatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgagggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatccttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg gggggccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtgg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260

ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacgggtga atacgttccc 1320

gggccttgta cacacc 1336

<210> 15

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 15

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctattagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagcagggga ctttcgggcc ttgcgctaatac agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttagg tgaggtaaag gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttggt gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaaggggtgc 480

aagcgtaaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt 540

gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga 600

gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaagggt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga gctctgacac aggtgctgca tggtgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgagggtg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtcgg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcg tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 16

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 16

agtcgagcgg atgaagagag cttgctgtct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctattagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgctaatac agatgagcct aggtcggatt	180
agctagtgtg tgaggtaaag gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc	480
aagcgtaaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780

gatccttagtg ggcgagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaagggt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccga caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga gctctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggt gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 17

<211> 1340

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 17

atccagtcga gcggatgagt ggagcttget ccatgattca gcggcggacg ggtgagtaat	60
gcctaggaat ctgcctggta gtgggggaca acgtttcgaa aggaacgcta ataccgcata	120

cgtcctacgg gagaaagtgg gggatcttcg gacctcacgc tatcagatga gcctaggtcg	180
gattagctag ttggtgaggt aaaggctcac caaggcgacg atccgtaact ggtctgagag	240
gatgatcagt cacactggaa ctgagacacg gtccagactc ctacgggagg cagcagtggg	300
gaatattgga caatgggcga aagcctgatc cagccatgcc gcgtgtgtga agaaggtctt	360
cggattgtaa agcactttaa gttgggagga agggcagtaa gttaatacct tgctgttttg	420
acgttaccaa cagaataagc accggctaac ttcgtgccag cagccgcggt aatacgaagg	480
gtgcaagcgt taatcggaat tactgggcgt aaagcgcgcg taggtggttc gttaagttgg	540
atgtgaaagc cccgggctca acctgggaac tgcattccaaa actggcgagc tagagtatgg	600
cagagggtagg tggaatttcc tgtgtagcgg tgaaatgcgt agatatagga aggaacacca	660
gtggcgaagg cgaccacctg ggctaatact gacctgagg tgcgaaagcg tggggagcaa	720
acaggattag ataccttgt agtcacgcc gtaaacgatg tcgactagcc gttgggatcc	780
ttgagatctt agtggcgag ctaacgcatt aagtcgaccg cctggggagt acggccgcaa	840
ggttaaaact caaatgaatt gacgggggcc cgcacaagcg gtggagcatg tggtttaatt	900
cgaagcaacg cgaagaacct taccaggcct tgacatgcag agaactttcc agagatggat	960
tggtgccttc gggaactctg acacaggtgc tgcattggctg tcgtcagctc gtgtcgtgag	1020

atgttgggtt aagtcccgta acgagcgcaa cccttgctct tagttaccag cacgttaagg	1080
tgggcactct aaggagactg ccggtgacaa accggaggaa ggtggggatg acgtcaagtc	1140
atcatggccc ttacggcctg ggctacacac gtgctacaat ggtcgggtaca aagggttgcc	1200
aagccgcgag gtggagctaa tcccataaaa ccgatcgtag tccggatcgc agtctgcaac	1260
tcgactgcgt gaagtcggaa tcgctagtaa tcgtgaatca gaatgtcacg gtgaatacgt	1320
tcccgggcct tgtacacacc	1340

<210> 18

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 18

agtcgagcgg atgagtggag cttgctccat gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagtggggga tcttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttgg tgaggtaaag gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacgggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgta agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcgtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtagcg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgcg caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtgg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggt gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200

cgcgagggtgg agctaattccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga 1260

ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc 1320

gggccttgta cacacc 1336

<210> 19

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 19

agtcgagcgg atgaaggag cttgctctct gattcagcgg cgacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctattagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatagtc 120

ctacgggaga aagcagggga cttcggggc ttgcgctaata agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttgg tgaggtaaag gtcaccaag gcaacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacgtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaagggtgc 480

aagcgtaaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgta agttggatgt 540

gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg ggcgagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaagggt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggccccga caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccg tgacaaaccg gaggaagggt gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 20

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 20

agtcgagcgg atgagtggag cttgctccat gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagtggggga tcttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttgg tgaggtaaag gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaagggtgc 480

aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt 540

gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga 600

gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg 660

cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag 720

gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaagggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccga caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 21

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 21

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
---	----

aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagtggggga ttttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttagg cgaggtaaag gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgta agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgagggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaagggt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcggtagg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgctgagaa cctgccagag atggcggggg	960

gccttcggga actcagacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tggtgtaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcaca ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctggggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgagggtg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtcgg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 22

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 22

agtcgagcgg atgaaggag cttgctccct gattcagcgg cggacgggtg agtaatrcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ctcgaaaggg acgctaatac cgcatagtc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttgg tgaggtaatg gtcaccaag gctgcgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttggtta agttggaagt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgct ttcaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgagggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggctccttga	780
gagcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaaggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140

tggcccttac ggcctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc 1200

cgcgagggtgg agctaattccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga 1260

ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacgggtga atacgttccc 1320

gggccttgta cacacc 1336

<210> 23

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 23

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctgatatggg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatagtc 120

ctacgggaga aagcagggga cttcggggcc ttgcgtatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttgg tgaggtaaag gtcaccaag gctacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacgggcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagcta ataccttgct gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc 480

aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgta agttgaatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggccccgca caagcgggtgg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggtgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg taatggtggg	1080
cactctaagg agactgccg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgtcccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 24

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 24

agtcgaacgg atgaagggag cttgctcccg gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctgatagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctggtttg tgaggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagcta ataccttact gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc 480

aagcgттаат cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgтта agttgaatgt 540

gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga 600

gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg 660

cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatccttagtg gcgcacgtaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggatgggt	960
gccttcgga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg tcatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggt gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgctgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 25

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas stutzeri*

<400> 25

agtcgagcgg atgagtggag cttgctccat gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagtggggga tcttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttgg tgaggtaaag gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaaggggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaagggt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgcg caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900

gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcttgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgagggtg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtcgg gatcgacgtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 26

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas balearica

<400> 26

agtcgagcgg cagcgggtcc ttcgggatgc cggcgagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggataactc ggggaaactc gagctaatac cgcatagctc	120
ctacgggaga aagcggggga tcttcggacc tcgcgctacc agatgagcct aggtcggatt	180

agctagttgg tgaggtaaag gtcaccaag gcgacgatcc gtagctggtc tgagaggatg	240
atcagccaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgata agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg tctggctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgagggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgagctaa cgcatthaagt cgaccgcctg gggagtagcg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtgg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaagggtgg	1080

cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggcctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgagggtgg agctaattccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacgggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 27

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas balearica*

<400> 27

agtcgagcgg cagcgggtcc ttcgggatgc cggcgagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggataactc ggggaaactc gagctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagcggggga tcttcggacc tcgcgtacc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttag tgaggtaaag gtcaccaag gcgacgatcc gtagctggtc tgagaggatg	240
atcagccaca ctggaactga gacacgggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaaggggtgc	480
aagcgттаат cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgata agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg tctgactaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgaggtgcg aaagcgthgg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg ggcagctaa cgcattaagt cgaccgctg gggagtacgg ccgcaaggth	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcggtgg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggtctgctg cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaaggtggg	1080
cactctaagg agactgccg tgacaaaccg gaggaaggth gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggth ggtacaaagg gthgccaagc	1200
cgcgaggthg agctaatccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgacgtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320

gggccttgta cacacc 1336

<210> 28

<211> 1335

<212> ADN

<213> Pseudomonas aeruginosa

<400> 28

agtcgagcgg atgaaggag ctgctcctg gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctggtagtgg gggataacgt ccggaacgg gcgctaatac cgcatcacgtc 120

ctgagggaga aagtggggga tcttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttgg tggggtaaag gcctaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacgggcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt 420

taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc 480

aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcagca agttggatgt 540

gaaatccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaacta ctgagctaga gtacggtaga 600

gggtggtgga atttcctgtg tagcgtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctggact gatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatccttagtg gcgcagctaa cgcgataagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgcg caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc tggccttgac atgctgagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actcagacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacc tcgggtgggc	1080
actctaagga gactgccggt gacaaaccgg aggaagggtg ggatgacgtc aagtcatcat	1140
ggcccttacg gccagggcta cacacgtgct acaatggtcg gtacaaaggg ttgccaagcc	1200
gcgaggtgga gctaattcca taaaaccgat cgtagtccgg atcgcagtct gcaactcgac	1260
tgcgtgaagt cggaatcgct agtaatcgtg aatcagaatg tcacggtgaa tacgttcccg	1320
ggccttgtac acacc	1335

<210> 29

<211> 1335

<212> ADN

<213> Pseudomonas aeruginosa

<400> 29

agtcgagcgg atgaagggag cttgctcctg gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggataacgt ccggaacgg gcgctaatac cgcatacgtc	120
ctgagggaga aagtggggga ttttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttagg tggggtaaag gcctaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaaggggtc	480
aagcgттаат cgggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcagca agttggatgt	540
gaaatccccg ggctcaacct gggaaactgca tccaaaacta ctgagctaga gtacggtaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctggact gatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcgataagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840

aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgcg caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc tggccttgac atgctgagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actcagacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacc tcgggtgggc	1080
actctaagga gactgccggt gacaaaccgg aggaagggtg ggatgacgtc aagtcatcat	1140
ggcccttacg gccagggcta cacacgtgct acaatggctg gtacaaaggg ttgccaagcc	1200
gcgagggtga gctaattcca taaaaccgat cgtagtcggg atcgagctct gcaactcgac	1260
tgcgtgaagt cggaatcgct agtaatcgtg aatcagaatg tcacggtgaa tacgttcccg	1320
ggccttgtag acacc	1335

<210> 30

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas citronellolis*

<400> 30

agtcgagcgg atgtagggag cttgcttctg gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt tccgaaagga gcgctaatac cgcatagctc	120

ctacgggaga aagtggggga tcttcggacc tcacgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagtagg tggggtaatg gctcacctag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttggtg agatggatgt	540
gaaatccccg ggctcaacct gggaactgca tccataactg cctgactaga gtacggtaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcgtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctggact gatactgaca ctgagggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg gcgcagctaa cgcgataagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc tggccttgac atgtccggaa ttctgcagag atgcgggagt	960
gccttcggga atcggaacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020

tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccarcacg ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggccagggtt acacacgtgc tacaatggtc ggtacagagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc agaaaaccga tcgtagtccg gatcgacgtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 31

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas alcaligenes

<400> 31

agtcgagcgg atgagtggag cttgctccat gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatcacgtc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcggggc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagtagg tgaggtaatg gctcacctag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaaggggtgc	480
aagcgттаат cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcagca agttggaggt	540
gaaatccccg ggctcaacct gggaactgcc tccaaaacta ctgagctaga gtacggtaga	600
gggtagtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac tacctggact gatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gascaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttga	780
gatcttagtg ggcgagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgcа caagcgggtgg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc tggccttgac atgctgagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actcagacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggccagggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaатcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260

ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc 1320

gggccttgta cacacc 1336

<210> 32

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas nitroreducens

<400> 32

agtcgagcgg atgagaggag cttgctcctt gatttagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctggtagtgg gggataacgt tccgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttagg tgaggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaaccta atacgttagt gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaagggtgc 480

aagcgттаат cggaaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt 540

gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtacggtaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctggact gatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcaa ctagccgttg ggttccttga	780
gaacttagtg gcgcagctag cgcattaagt tgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaactcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc tggccttgac atgctgagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actcagacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg taatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggccagggt acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<211> 1335

<212> ADN

<213> *Pseudomonas mendocina*

<400> 33

agtcgagcgg atgaggggag cttgctccct gatttagcgg cggacgggtg agtaatgtct 60

aggaatctgc ctggtagtgg gggataacgt tccgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgtatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttgg tgaggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaacctatacgttagt gttttgacgt 420

taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggtaata cgaaggggtgc 480

aagcgттаат cgggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgтта agttggatgt 540

gaaagccccg ggcтcaacct gggaactgca тсcaaaactg gcgagctaga gtacggtaga 600

gggtggtgga atttctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg 660

cgaaggcgac cacctggact gatactgaca ctgaggtgcg aaagcgтggg gagcaaacag 720

gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcaa ctagccgttg gaatccttga 780

gatttttagtg ggcgagctaa cgcattaagt tgaccgctg gggagtacgg ccgcaagggt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccga caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc tggccttgac atgctgagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcgga actcagacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacc tcgggtgggc	1080
actctaagga gactgccggt gacaaaccgg aggaagggtg ggatgacgtc aagtcatcat	1140
ggcccttacg gccagggcta cacacgtgct acaatggctg gtacaaaggg ttgccaagcc	1200
gcgaggtgga gctaattcca taaaaccgat cgtagtcgg atcgcagtct gcaactcgac	1260
tgcgtgaagt cggaatcgct agtaatcgtg aatcagaatg tcacggtgaa tacgttcccg	1320
ggccttgtag acacc	1335

<210> 34

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas agarici

<220>

<221> misc_feature

<222> (452)..(452)

<223> n is a, c, g, o t

<220>

<221> misc_feature

<222> (1199)..(1199)

<223> n is a, c, g, o t

<400> 34

agtcgagcgg atgaagggag cttgctcccg gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagcagggga cttcggggcc ttgcgtatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttagg tgaggtaaag gtcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaaccta atacgttagt gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaactctg tnccagcagc cgcggtaata cagagggtagc 480

aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttgggta agttggatgt 540

gaaatccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gccagctaga gtagggtaga 600

gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg 660

cgaaggcgac cacctggact catactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcaa ctagccgttg ggaaccttga	780
gttcttagtg ggcgagctaa cgcattaagt tgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccgca caagcggtagg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atccaatgaa tcttcagag atggaggagt	960
gccttcggga acattgagac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg tgatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaaggtag gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaanc	1200
cgcgaggtgg agctaattcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgacgtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgc gaatcagaat gtcgcggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 35

<211> 1336

<212> ADN

<213> *Pseudomonas pseudoalcaligenes*

<400> 35

agtcgagcgg atgaagggag cttgctcctg gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggataacgt tccgaaagga acgctaatac cgcgtagctc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcggggc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttagg tgaggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360
ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg ctgtaggcta atatcctgcg gttttgacgt	420
taccaacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaagggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggttcgtta agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcgagctaga gtacggtaga	600
gggtagtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac tacctggact gatactgaca ctgagggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcaa ctagccgttg gaatccttga	780
gatttttagtg gcgcagctaa cgcattaagt tgaccgcctg gggagtagcg ccgcaaggtt	840

aaaactcaaa tgaattgacg ggggcccga caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc tggccttgac atgctgagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actcagacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggccagggt acacacgtgc tacaatggtc ggtacaaagg gttgccaagc	1200
cgcgagggtg agctaattccc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgttccc	1320
gggccttgta cacacc	1336

<210> 36

<211> 1338

<212> ADN

<213> Pseudomonas fluorescens

<400> 36

agtcgagcgg cagcacgggt acttgtagct ggtggcgagc ggcggacggg tgagtaatgc	60
ctaggaatct gcctagtagt gggggataac gtccggaaac gggcgctaat accgcatacg	120
tcctacggga gaaagtgggg gatcttcgga cctcacgcta ttagatgagc ctaggtcgga	180

ttagctagtt ggtgaggtaa tggctcacca aggcgacgat ccgtaactgg tctgagagga	240
tgatcagtca cactggaact gagacacggt ccagactcct acgggaggca gcagtgggga	300
atattggaca atgggcgaaa gcctgatcca gccatgccgc gtgtgtgaag aaggtcttcg	360
gattgtaaag cactttaagt tgggaggaag ggcagttacc taatacgtga ttgttttgac	420
gttaccgaca gaataagcac cggctaactc tgtgccagca gccgcggtaa tacagagggt	480
gcaagcgta atcggaatta ctgggcgtaa agcgcgcgta ggtggtttgt taagttggat	540
gtgaaagccc cgggctcaac ctgggaactg catccaaaac tggcaagcta gagtatggta	600
gagggtggtg gaatttcctg tgtagcgtg aaatgcgtag atataggaag gaacaccagt	660
ggcgaaggcg accacctgga ctgatactga cactgagggt cgaaagcgtg gggagcaaac	720
aggattagat accctggtag tccacgccgt aaacgatgtc aactagccgt tgggagcctt	780
gagctcttag tggcgcagct aacgcattaa gttgaccgcc tggggagtac ggccgcaagg	840
ttaaaaactca aatgaattga cgggggcccg cacaagcggg ggagcatgtg gtttaattcg	900
aagcaacgcg aagaacctta ccaggccttg acatccaatg aactttctag agatagattg	960
gtgccttcgg gaacattgag acaggtgctg catggctgtc gtcagctcgt gtcgtgagat	1020
gttgggttaa gtcccgtaac gagcgcaacc cttgtcctta gttaccagca cgttatgggtg	1080

ggcactctaa ggagactgcc ggtgacaaac cggaggaagg tggggatgac gtcaagtcat	1140
catggccctt acggcctggg ctacacacgt gctacaatgg tcggtacaaa gggttgccaa	1200
gccgcgaggt ggagctaata ccataaaacc gatcgtagtc cggatcgag tctgcaactc	1260
gactgcgtga agtcggaatc gctagtaatc gcgaatcaga atgtcgcggt gaatacgttc	1320
ccgggccttg tacacacc	1338

<210> 37

<211> 1336

<212> ADN

<213> Pseudomonas putida

<400> 37

agtcgagcgg atgacgggag cttgctcctt gattcagcgg cggacgggtg agtaatgcct	60
aggaatctgc ctggtagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc	120
ctacgggaga aagcagggga ccttcgggcc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt	180
agctagttgg tggggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg	240
atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat	300
attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga	360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cagtaagtta ataccttgct gttttgacgt	420
taccgacaga ataagcaccg gctaactctg tgccagcagc cgcggtaata cagaggggtgc	480
aagcgttaat cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttggtta agttggatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtacggtaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctggact gatactgaca ctgaggtgcg aaagcgtggg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcaa ctagccgttg gaatccttga	780
gatttttagtg gcgcagctaa cgcattaagt tgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggtt	840
aaaactcaaa tgaattgacg gggggccgca caagcgggtg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttcagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttatggtggg	1080
cactctaagg agactgccgg tgacaaaccg gaggaagggtg gggatgacgt caagtcatca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggtc ggtacagagg gttgccaagc	1200
cgcgaggtgg agctaattctc acaaaaccga tcgtagtccg gatcgagtc tgcaactcga	1260

ctgcgtgaag tcggaatcgc tagtaatcgc gaatcagaat gtcgcggtga atacgttccc 1320

gggccttgta cacacc 1336

<210> 38

<211> 34

<212> ADN

<213> *Shewanella oneidensis*

<400> 38

gcatacgccc tacgggggaa agagggggac tttc 34

<210> 39

<211> 34

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Secuencia distintiva degenerada del ADNr 16S de
Shewanella con posiciones variables en la región 2

<220>

<221> misc_feature

<222> (22)..(24)

<223> n=a o g

<220>

<221> misc_feature

<222> (29)..(29)

<223> n=a o c

<220>

<221> misc_feature

<222> (30)..(30)

<223> n=a,,c, g, o t

<220>

<221> misc_feature

<222> (30)..(30)

<223> n=a, c, g, o t

<220>

<221> misc_feature

<222> (31)..(32)

<223> n=t o c

<220>

<221> misc_feature

<222> (34)..(34)

<223> n=a o c

<400> 39

gcatacgccc tacgggggaa annngggggn nntn

34

<210> 40

<211> 41

<212> ADN

<213> *Shewanella oneidensis*

<400> 40

tcggagtttg gtgtcttgaa cactgggctc tcaagctaac g

41

<210> 41

<211> 41

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Secuencia distintiva degenerada del ADNr 16S de
Shewanella con posiciones variables en la región 5

<220>

<221> misc_feature

<222> (6)..(6)

<223> n=a o g

<220>

<221> misc_feature

<222> (13)..(13)

<223> n=a , c o g

<220>

<221> misc_feature

<222> (14)..(14)

<223> n=a , c o t

<220>

<221> misc_feature

<222> (18)..(19)

<223> n=a o g

<220>

<221> misc_feature

<222> (27)..(27)

<223> n=g o t

<220>

<221> misc_feature

<222> (28)..(28)

<223> n=t o c

<220>

<221> misc_feature

<222> (30)..(31)

<223> n=t o c

<220>

<221> misc_feature

<222> (32)..(32)

<223> n=a o c

<400> 41

tcggantttg gtnncttnna cactggnntn nnaagctaac g 41

<210> 42

<211> 96

<212> ADN

<213> *Shewanella oneidensis*

<400> 42

acaatggcga gtacagaggg ttgcaaagcc gcgaggtgga gctaattctca caaagctcgt 60

cgtagtccgg attggagtct gcaactcgac tccatg 96

<210> 43

<211> 96

<212> ADN

<213> Secuencia artificial

<220>

<223> Secuencia distintiva degenerada del ADNr 16S de
Shewanella con posiciones variables en la región 8

<220>

<221> misc_feature

<222> (8)..(8)

<223> n=c, g, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (9)..(9)
<223> n=a, c, o g

<220>
<221> misc_feature
<222> (10)..(11)
<223> n=a, g, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (25)..(25)
<223> n=a o g

<220>
<221> misc_feature
<222> (33)..(33)
<223> n=a o g

<220>
<221> misc_feature
<222> (38)..(38)
<223> n=g o c

<220>
<221> misc_feature
<222> (39)..(39)
<223> n=a, g, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (48)..(48)
<223> n=t o c

<220>
<221> misc_feature
<222> (51)..(51)
<223> n=c, g, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (56)..(56)
<223> n=c, g, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (57)..(57)
<223> n=a, c, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (58)..(58)
<223> n=c, g, o t

<220>
<221> misc_feature
<222> (73)..(73)
<223> n=t o c

<220>

<221> misc_feature

<222> (94)..(94)

<223> n=a o g

<400> 43

acaatggnnn ntacagaggg ttgcnaagcc gcnaggttna gctaatchca naaagnnngt 60

cgtagtccgg atnggagtct gcaactcgac tccntg 96

<210> 44

<211> 1436

<212> ADN

<213> Pseudomonas stutzeri

<400> 44

agtcgagcgg atgaagagag cttgctctct gattcagcgg cggaagggtg agtaatgcct 60

aggaatctgc ctgatagtgg gggacaacgt ttcgaaagga acgctaatac cgcatacgtc 120

ctacgggaga aagcagggga ccttcggggc ttgcgctatc agatgagcct aggtcggatt 180

agctagttagg tgaggtaatg gctcaccaag gcgacgatcc gtaactggtc tgagaggatg 240

atcagtcaca ctggaactga gacacggtcc agactcctac gggaggcagc agtggggaat 300

attggacaat gggcgaaagc ctgatccagc catgccgcgt gtgtgaagaa ggtcttcgga 360

ttgtaaagca ctttaagttg ggaggaaggg cattaacctt atacgttagt gttttgacgt 420

taccgacaga ataagcaccg gctaacttcg tgccagcagc cgcggttaata cgaaggggtgc	480
aagcgттаат cggaattact gggcgtaaag cgcgcgtagg tggtttgтта agttgaatgt	540
gaaagccccg ggctcaacct gggaactgca tccaaaactg gcaagctaga gtatggcaga	600
gggtggtgga atttcctgtg tagcggtgaa atgcgtagat ataggaagga acaccagtgg	660
cgaaggcgac cacctgggct aatactgaca ctgagggtgcg aaagcgthgg gagcaaacag	720
gattagatac cctggtagtc cacgccgtaa acgatgtcga ctagccgttg ggatccttgа	780
gatcttagtg ggcgagctaa cgcattaagt cgaccgcctg gggagtacgg ccgcaaggth	840
aaaactcaaa tgaattgacg ggggccccga caagcggtgg agcatgtggt ttaattcgaa	900
gcaacgcgaa gaaccttacc aggccttgac atgcagagaa ctttccagag atggattggt	960
gccttcggga actctgacac aggtgctgca tggtctgtct cagctcgtgt cgtgagatgt	1020
tgggttaagt cccgtaacga gcgcaaccct tgtccttagt taccagcacg ttaaggtggg	1080
cactctaagg agactgccg tgacaaaccg gaggaaggth gggatgacgt caagtcатca	1140
tggcccttac ggctgggct acacacgtgc tacaatggth ggtacaaagg gthgccaagc	1200
cgcgaggthg agctaатcc ataaaaccga tcgtagtccg gatcgacgtc tgcaactcga	1260
ctgcgtgaag tcggaatcg tagtaatcgt gaatcagaat gtcacggtga atacgthcc	1320

gggccttgta cacaccgcc gtcacaccat gggagtgggt tgctccagaa gtagctagtc 1380

taaccttcgg ggggacggtt accacggagt aattcatgac tggggtgaag tcgtaa 1436

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Colleen A. Taylor

3. acting in the capacity of Notary Public of the State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Colleen A. Taylor, Notary Public, Delaware

Certified


5. at Dover, Delaware

6. the thirtieth day of April, A.D. 2013


7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0493775

9. Seal/Stamp:



10. Signature:


Secretary of State

ASSIGNMENT

Robert D. FALLON; Edwin R. HENDRICKSON; Scott Christopher JACKSON; Sharon Jo KEELER; Bethany C. REES; Abigail K. LUCKRING

by means of this document assign to

E. I. du Pont de Nemours and Company

a corporation organized under the laws of

Delaware

domiciled in

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
United States of America

(hereinafter referred to as the "ASSIGNEE"),
all my (our) rights, title and interest in and to my
(our) invention for a new and useful
improvement entitled and as fully set forth and
described in:

METHODS, STRAINS AND COMPOSITIONS
USEFUL FOR MICROBIALY ENHANCED OIL
RECOVERY: PSEUDOMONAS STUTZERI

so far as the Republic of Colombia is concerned.

Place: Wilmington DE USA

Date: 11 Apr 2013

Robert D. Fallon
Robert D. FALLON

Scott Christopher JACKSON

Bethany C. REES

CESION

por medio de la presente cedo (cedemos) a

E. I. du Pont de Nemours and Company

una corporación organizada bajo las leyes de

Delaware

domiciliada en

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
Estados Unidos de América

(de ahora en adelante el "CESIONARIO"),
todos mis (nuestros) derechos, título e interés
sobre mi (nuestra) invención tal como describe
en:

en lo que concierne a la República de Colombia.

Lugar y fecha: _____

Edwin R. HENDRICKSON

Sharon Jo Keeler
Sharon Jo KEELER

Abigail K. LUCKRING

United States of America)
)
State of Delaware) ss.
)
County of New Castle)

On this 1th day of April, 2013, personally appeared
before me Robert D. Fallon; Shawn J. Keeler

to me known and known to me to be the individual__ described in and who executed the foregoing instrument, and who acknowledged to me that __ he __ executed the same.

Robert A. Taylor
Notary Public

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARY PUBLIC
STATE OF DELAWARE
My Commission Expires on January 25, 2014

ASSIGNMENT

Robert D. FALLON; Edwin R. HENDRICKSON; Scott Christopher JACKSON; Sharon Jo KEELER; Bethany C. REES; Abigail K. LUCKRING

by means of this document assign to

E. I. du Pont de Nemours and Company

a corporation organized under the laws of

Delaware

domiciled in

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
United States of America

(hereinafter referred to as the "ASSIGNEE"),
all my (our) rights, title and interest in and to my
(our) invention for a new and useful
improvement entitled and as fully set forth and
described in:

METHODS, STRAINS AND COMPOSITIONS
USEFUL FOR MICROBIALY ENHANCED OIL
RECOVERY: PSEUDOMONAS STUTZERI

so far as the Republic of Colombia is concerned.

Place: Wilmington DE USA

Date: 12 April 2013

Robert D. FALLON

Scott Christopher JACKSON

Bethany C. REES

CESION

por medio de la presente cedo (cedemos) a

E. I. du Pont de Nemours and Company

una corporación organizada bajo las leyes de

Delaware


domiciliada en

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
Estados Unidos de América

(de ahora en adelante el "CESIONARIO"),
todos mis (nuestros) derechos, título e interés
sobre mi (nuestra) invención tal como describe
en:

en lo que concierne a la República de Colombia.

Lugar y fecha: _____


Edwin R. HENDRICKSON

Sharon Jo KEELER


Abigail K. LUCKRING

United States of America)
)
State of Delaware)
)
County of New Castle)
)

ss.

On this 12th day of April, 2013, personally appeared
before me Edwin R. Hendrickson;
Abigail K. Luckring

to me known and known to me to be the individual__ described in and who executed the
foregoing instrument, and who acknowledged to me that __he__ executed the same.

Colleen A Taylor
Notary Public

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARY PUBLIC
STATE OF DELAWARE
My Commission Expires on January 25, 2014

ASSIGNMENT

Robert D. FALLON; Edwin R. HENDRICKSON; Scott Christopher JACKSON; Sharon Jo KEELER; Bethany C. REES; Abigail K. LUCKRING

by means of this document assign to
E. I. du Pont de Nemours and Company
a corporation organized under the laws of
Delaware
domiciled in

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
United States of America

(hereinafter referred to as the "ASSIGNEE"),
all my (our) rights, title and interest in and to my
(our) invention for a new and useful
improvement entitled and as fully set forth and
described in:

METHODS, STRAINS AND COMPOSITIONS
USEFUL FOR MICROBIOLOGICALLY ENHANCED OIL
RECOVERY: PSEUDOMONAS STUTZERI

so far as the Republic of Colombia is concerned.

Place: Wilmington DE USA

Date: April 14, 2013

Robert D. FALLON



Scott Christopher JACKSON

Bethany C. REES

CESION

por medio de la presente cedo (cedemos) a
E. I. du Pont de Nemours and Company
una corporación organizada bajo las leyes de
Delaware
domiciliada en

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
Estados Unidos de América

(de ahora en adelante el "CESIONARIO"),
todos mis (nuestros) derechos, título e interés
sobre mi (nuestra) invención tal como describe
en:

en lo que concierne a la República de Colombia.

Lugar y fecha: _____

Edwin R. HENDRICKSON

Sharon Jo KEELER

Abigail K. LUCKRING

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARY PUBLIC
STATE OF DELAWARE
My Commission Expires on January 25, 2014

ASSIGNMENT

Robert D. FALLON; Edwin R. HENDRICKSON; Scott Christopher JACKSON; Sharon Jo KEELER; Bethany C. REES; Abigail K. LUCKRING

by means of this document assign to
E. I. du Pont de Nemours and Company
a corporation organized under the laws of
Delaware
domiciled in

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
United States of America

(hereinafter referred to as the "ASSIGNEE"),
all my (our) rights, title and interest in and to my
(our) invention for a new and useful
improvement entitled and as fully set forth and
described in:

METHODS, STRAINS AND COMPOSITIONS
USEFUL FOR MICROBIALY ENHANCED OIL
RECOVERY: PSEUDOMONAS STUTZERI

so far as the Republic of Colombia is concerned.

Place: Wilmington DE USA

Date: 17 Apr 2013

Robert D. FALLON

Scott Christopher JACKSON

Bethany C. Rees
Bethany C. REES

CESION

por medio de la presente cedo (cedemos) a
E. I. du Pont de Nemours and Company
una corporación organizada bajo las leyes de
Delaware
domiciliada en

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898
Estados Unidos de América

(de ahora en adelante el "CESIONARIO"),
todos mis (nuestros) derechos, título e interés
sobre mi (nuestra) invención tal como describe
en:

en lo que concierne a la República de Colombia.

Lugar y fecha: _____

Edwin R. HENDRICKSON

Sharon Jo KEELER

Abigail K. LUCKRING

)

Delaware

1

SS.

New Castle

)

before me Bethany C. Rees

Colleen A Taylor
Notary Public

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARY PUBLIC
STATE OF DELAWARE
My Commission Expires on January 25, 2014

- APOSTILLA –

(Convención de la Haya del 5 de Octubre 1961)

1. **País:** Estado Unidos de América

- Este Documento Público

2. **Ha sido firmado por:** Colleen A. Taylor

3. **Actuando en su calidad de:** Notario Público del Estado de Delaware.

4. **Lleva el sello/timbre de:** Colleen A. Taylor, Notario Público,
Delaware.

Certifica

5. **En:** Dover, Delaware.

6. **El día:** 30 de abril de 2013.

7. **Por:** El Secretario de Estado, Delaware Departamento de Estado.

8. **Numero:** 0493775

9. **Sello:**



10. **Firma:**

Firmado
Secretario de Estado

Estados Unidos de América)
)
Estado de Delaware) ss.
)
Condado de New Castle)

En este día 11 del mes de abril del 2013, personalmente aparecieron ante mí Robert D. Fallon; Sharon Jo. Keeler; a quienes conozco y para mí son las personas_descritas y quienes ejecutaron el anterior instrumento, y quienes reconocieron ante mí que_él_(ellos)_ejecutó(aron) el mismo.

- firmado -
Notario Público

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARIO PÚBLICO
ESTADO DE DELAWARE
Mi cargo expira el 25 de enero de 2014.

Estados Unidos de América)
)
Estado de Delaware) ss.
)
Condado de New Castle)

En este día 12 del mes de abril del 2013, personalmente aparecieron ante mí Edwin R. Hendrickson; Abigail K. Luckring a quienes conozco y para mí son las personas_descritas y quienes ejecutaron el anterior instrumento, y quienes reconocieron ante mí que_él (ellos) ejecutó(aron) el mismo.

- firmado -
Notario Público

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARIO PÚBLICO
ESTADO DE DELAWARE
Mi cargo expira el 25 de enero de 2014.

Estados Unidos de América)
)
Estado de Delaware) ss.
)
Condado de New Castle)

En este día 16 del mes de abril del 2013, personalmente apareció ante mí Scott Christopher Jackson a quien conozco y para mí es la persona_descrita y quien ejecuto el anterior instrumento, y quien reconoció ante mí que_él_ejecutó el mismo.

- firmado -
Notario Público

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARIO PÚBLICO
ESTADO DE DELAWARE
Mi cargo expira el 25 de enero de 2014.

Estados Unidos de América)
)
Estado de Delaware) ss.
)
Condado de New Castle)

En este día 17 del mes de abril del 2013, personalmente apareció ante mí Bethany C. Rees a quien conozco y para mí es la persona_descrita y quien ejecuto el anterior instrumento, y quien reconoció ante mí que_él_ejecutó el mismo.

_____- firmado -_____
Notario Público

COLLEEN A. TAYLOR
NOTARIO PÚBLICO
ESTADO DE DELAWARE
Mi cargo expira el 25 de enero de 2014.

- Esta es una traducción fiel copia al documento enviado en pdf que se guarda en los archivos del traductor para futura referencia. Realizado en Bogotá D.C., el 22 de mayo de 2013 -

TRADUCCIÓN OFICIAL N° 2603081 al español de un documento escrito en inglés, efectuada por Jaime Armando Garavito Burgos, c.c. N° 19.130.702 de Bogotá, Traductor e Intérprete Oficial inglés-español-inglés según Resolución N° 034 de enero 11 de 1983 expedida por el Ministerio de Justicia de la República de Colombia

Traducción al español de legalizaciones en poder conferido por E.I. du Pont de Nemours and Company

APOSTILLA

- 1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
- 2. Ha sido firmado por Patricia Panariello
- 3. Quien actúa en calidad de Notario Público del Estado de Delaware
- 4. Lleva el sello de Patricia Panariello, Notario Público, Delaware

Certificado

- 5. En Dover, Delaware
- 6. El séptimo día de marzo 2008 A.D.
- 7. Por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware
- 8. N° 0345347
- 9. Sello (Aparece adherido sello dorado)
- 10. Firma (firmado) Harriet Smith Windsor, Secretario de Estado

Jaime A. Garavito
JAIIME A. GARAVITO B.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RES. 034 DE ENERO 11 DE 1983
MINISTERIO DE JUSTICIA

[No se traduce texto del poder por estar en inglés y en español]

Se traduce lo siguiente después del texto del poder:

Dado y suscrito en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América

El 26 de febrero de 2008

Firma de la persona que expide el poder
[Firmado] Miriam A. Mecoxnahey

CERTIFICACIÓN NOTARIAL


TRADUCCIÓN OFICIAL N° 2603081 al español de un documento escrito en inglés, efectuada por Jaime Armando Garavito Burgos, c.c. N° 19.130.702 de Bogotá, Traductor e Intérprete Oficial inglés-español-inglés según Resolución N° 034 de enero 11 de 1983 expedida por el Ministerio de Justicia de la República de Colombia

El 26 de febrero de 2008 el suscrito Notario

DA FE

1. Que **Miriam D. Meconnahey**, mayor y domiciliada en **1964 Lakeview Road, Wilmington, DE 19805**, suscribió de su puño y letra el documento que antecede.
2. Que conozco personalmente al otorgante y que éste tiene capacidad legal para el otorgamiento.
3. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en su carácter de **Subsecretario - Junta de Patentes** de la persona jurídica **E.I. du Pont de Nemours and Company**
4. Que la persona jurídica **E.I. du Pont de Nemours and Company** tiene sede en **1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898 Estados Unidos de América**, está legalmente constituida, que tiene existencia legal actual y que el acto para el cual se otorga el poder está comprendido entre los que constituyen su objeto social.
5. Que el otorgante tiene efectivamente la representación que ostenta y que ésta es legítima.
6. Que he basado las certificaciones 3, 4 y 5 anteriores en los siguientes documentos auténticos que al efecto se me exhibieron y que menciono específicamente con expresión de sus fechas y de su origen o procedencia:

Directrices de la Junta de Patentes de DuPont y Poder fechado junio 12, 2006.



JAIME A. GARAVITO B. 2
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
POR RESOLUCION 034 DE ENERO 11 DE 1983
MINISTERIO DE JUSTICIA

TRADUCCIÓN OFICIAL N° 2603081 al español de un documento escrito en inglés, efectuada por Jaime Armando Garavito Burgos, c.c. N° 19.130.702 de Bogotá, Traductor e Intérprete Oficial inglés-español-inglés según Resolución N° 034 de enero 11 de 1983 expedida por el Ministerio de Justicia de la República de Colombia

[Firmado] Patricia Panariello, Notario Público


[Aparece adherido sello dorado]

La anterior es traducción fiel y completa de la cual se deja copia en esta oficina para su confrontación.



Jaime Armando Garavito Burgos
c.c. N° 19.130.702 de Bogotá
Traductor e Intérprete Oficial según Resolución N° 034 de enero 11 de 1983 expedida por el Ministerio de Justicia

BOGDM5 # 107285



JAIME A. GARAVITO B
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
SEGUN RESOLUCION N° 034 DE ENERO 11 DE 1983
MINISTERIO DE JUSTICIA

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Patricia Panariello

3. acting in the capacity of Notary Public of the State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Patricia Panariello, Notary Public, Delaware

Certified

5. at Dover, Delaware

6. the seventh day of March, A.D. 2008

7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0345347

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Harriet Smith Windsor

Secretary of State

POWER OF ATTORNEY

The undersigned.

E.I. Du Pont de Nemours and Company
domiciled in

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898 US

declares that it hereby grants to

ALVARO CORREA-ORDOÑEZ and/or
OLGA GEORGETTE OTERO and/or
RICARDO METKE and/or
JUAN PABLO CONCHA

with domicile at Av. 82 No. 10 – 62, 6Th floor, of Bogotá D. C., Colombia, a full and sufficient power of attorney to obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I (we) authorize the said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons, with or without jurisdiction, specially those administrative, administrative contentious and judicial, as well as before Arbitration Court, in all matters concerning the following: a) Obtainment of patents, utility models, industrial designs, integrated circuits, layout-designs and vegetal varieties; the registration of trademarks, denominations of origin, commercial names, trade emblems, slogans and domain names; its renewal, assignments, change of name or domicile, voluntary cancellation; and the registration of licenses of use of the above rights; b) Processes of protection to the consumer, unfair competition, oppositions, cancellations, nullity, precautionary injunctions, infringement, granting of licenses, writ mandamus, the protection of trade secrets, and in general the civil, penal, an administrative processes relating to those rights. And that in all the above matters they may substitute this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done by representatives without a power of attorney.

I hereby ratify all actions previously taken on behalf of this company by the aforementioned attorneys with respect to the mentioned matters.

Done and subscribed in *Wilmington, DE USA*

On the *26* day of *February* of 2008

Signature of the person issuing the Power

Miriam A. Macenahey

PODER DE ABOGADO

La abajo firmada,

E.I. Du Pont de Nemours and Company
domiciliada en

1007 Market Street
Wilmington, Delaware 19898 US

declara por el presente que otorga a

ALVARO CORREA-ORDOÑEZ y/o
OLGA GEORGETTE OTERO y/o
RICARDO METKE y/o
JUAN PABLO CONCHA

con domicilio en la Av. 82 No. 10 – 62 Piso 6 en Bogotá D. C., Colombia, poder especial amplio y suficiente, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualesquiera autoridades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso-administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes asuntos: a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y variedades vegetales; el registro de marcas, denominaciones de origen, nombres comerciales, enseñas, lemas comerciales y nombres de dominio; su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria; y el registro de licencias de uso de esos derechos; b) Los procesos para la protección del consumidor, competencia desleal, oposiciones, cancelaciones, nulidades, medidas cautelares, infracciones, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos industriales, y en general procesos civiles, penales, administrativos relacionados con estos derechos. Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del caso, desistir, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

Igualmente, ratifico todo lo actuado hasta el momento en los mismos asuntos, por cualquiera de los mencionados apoderados en representación de ésta sociedad.

Dado y firmado en

A los _____ días del mes de _____ de 2008

Firma de la persona que firma el Poder

NOTARIAL CERTIFICATION

On this 22th day of February
2008, the undersigned Notary

CERTIFIES


1. That **Miriam D. Meconnahey**
of legal age and domiciled in
1964 Lakeview Road, Wilmington, DE 19805
set his hand on the foregoing document.
2. That the grantor is to me personally known and that he/she has legal capacity to execute the instrument.
3. That the grantor has executed the foregoing document as
Assistant Secretary – Patent Board
of the judicial person **E. I. duPont de Nemours and Company**
4. That the judicial person **E. I. duPont de Nemours and Company**
having its home office in
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898 USA
is duly organized, has present legal existence and that the purposes for which the power of attorney is granted are within the scope of its corporate purposes.
5. That the grantor has in fact the referred to authority and that his/her representation is legal.
6. That I have based certifications 3, 4 and 5 above on the following authentic documents for such purpose exhibited to me and which I mention specifically, giving their dates and their origin or source:
DuPont Patent Board Guidelines and Power of Attorney dated June 12, 2006.

CERTIFICACION NOTARIAL

A los _____ días del mes de _____
de 2008, el suscrito Notario


DA FE

1. Que **DA FE**
mayor y domiciliado en _____
suscribió de su puño y letra el documento que antecede.
2. Que conozco al otorgante y que éste tiene capacidad legal para el otorgamiento.
3. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en su carácter de _____
de la persona jurídica **E. I. duPont de Nemours and Company**
4. Que la persona jurídica **E. I. duPont de Nemours and Company**
con sede en _____
está legalmente constituida, que tiene existencia legal actual y que el acto para el cual se otorga el poder está comprendido entre los que constituyen su objeto social.
5. Que el otorgante tiene efectivamente la representación que ostenta y que ésta es legítima.
6. Que he basado las certificaciones 3, 4 y 5 anteriores en los siguientes documentos auténticos que al efecto se me exhibieron y que menciono específicamente con expresión de sus fechas y de su origen o procedencia:



Patricia Panariello, Notary Public

El Notario Público



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN THE APPLICATION OF:

ROBERT D. FALLON et al.

CASE NO.: CL5094USNA

APPLICATION NO.:

CONFIRMATION NO.:

GROUP ART UNIT:

EXAMINER:

FILED:

FOR: METHODS, STRAINS, AND COMPOSITIONS USEFUL FOR MICROBIALLY
ENHANCED OIL RECOVERY: PSEUDOMONAS STUTZERI

DECLARATION OF BIOLOGICAL CULTURE DEPOSIT**Via EFS-Web**

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I, ROGER W. HERRELL, JR., declare the following:

- a) I am an attorney/agent of record in the above-identified application;
- b) Pursuant to 37 CFR 1.804, cultures of the following biological materials have been deposited with the following international depository(ies):

American Type Culture Collection (ATCC)
10801 University Blvd., Manassas, VA 20110-2209, U.S.A.

under conditions that satisfy the requirements of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure ["the Treaty"];

- c) A copy of the receipt issued pursuant to Treaty Rules 7.3 and 10.2 is attached; and

<u>Depositor's Identification of Organism</u>	<u>International Depository Accession Number</u>	<u>Date of Deposit</u>
Pseudomonas stutzeri BR5311	PTA-11283	September 9, 2010
Pseudomonas stutzeri 89AC1-3	PTA-11284	September 9, 2010

- d) All restrictions on the availability to the public of the culture will be irrevocably removed upon the granting of a U.S. patent on the above-identified application.

Case No.: CL5094USNA
Declaration of Biological Culture Deposit

Page 2

Respectfully submitted,

/Roger W. Herrell, Jr/
ROGER W. HERRELL, JR.
ATTORNEY/AGENT FOR APPLICANTS
Registration No.: 62,228
Telephone: (302) 992-5463
Facsimile: (302) 355-3982

Dated: October 25, 2011
Attachment: Deposit Receipt



**BUDAPEST RESTRICTED CERTIFICATE OF DEPOSIT
BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF
THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE
INTERNATIONAL FORM
RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT ISSUED PURSUANT TO RULE 7.3
AND VIABILITY STATEMENT ISSUED PURSUANT TO RULE 10.2**

The American Type Culture Collection (ATCC®) has received your deposit of seeds/strain(s)/strain(s) in connection with the filing of an application for patent. The following information is provided to fulfill Patent Office requirements.

Mr. Robert S. Scott
E.I. duPont de Nemours & Co
DuPont Experimental Station
200 Powder Mill Rd
Wilmington, DE 19880-0301

Deposited on Behalf of: **E.I. duPont de Nemours & Co**

Date of Receipt of seeds/strain(s) by the ATCC®: **September 08, 2010**

<u>Identification Reference by Depositor:</u>	<u>ATCC ®Patent Deposit Designation:</u>	<u>Quantity Received:</u>
Pseudomonas stutzeri BR5311	PTA-11283	25 vials
Pseudomonas stutzeri 89AC1-3	PTA-11284	25 vials

The ATCC® understands that:

1. The deposit of these seeds/strain(s) does not grant ATCC® a license, either express or implied, to infringe the patent, and our release of these seeds/strain(s) to others does not grant them a license, either express or implied, to infringe the patent.
2. If the deposit should die or be destroyed during the effective term of the patent, it shall be your responsibility to replace it with viable material. It is also your responsibility to supply a sufficient quantity for distribution for the deposit term. ATCC® will distribute and maintain the material for 30 years or 5 years following the most recent request for the deposit, whichever is longer. The United States and many other countries are signatory to the Budapest Treaty.

Prior to the issuance of a U.S. Patent, the ATCC® agrees in consideration for a one-time service charge, not to distribute these seeds/strain(s) or any information relating thereto or to their deposit except as instructed by the depositor or relevant patent office. After relevant patent issues we are responsible to release the seeds/strain(s) and they will be made available for distribution to the public without any restrictions. We will inform you of requests for the seeds/strain(s) for 30 years from date of deposit.



The deposit was tested October 07, 2010 and on that date, the seeds/strain(s) were viable
International Depository Authority: American Type Culture Collection (ATCC®), Manassas, VA, USA

Signature of person having authority to represent ATCC®:

Latha Ramakrishnan

Digitally signed by Latha
Ramakrishnan
DN: cn=Latha Ramakrishnan,
o=ATCC, ou=PLS Department,
email=lramakrishnan@atcc.org, c=US
Date: 2010.10.08 14:30:29 -04'00'

October 08, 2010

ATCC® Patent Depository

Date

Ref: Docket or Case No: CL5094

EN LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

EN LA SOLICITUD DE:

ROBERT D. FALLON et al.

CASO No.: CL5094USNA

SOLICITUD No.:

CONFIRMACIÓN No:

UNIDAD DE GRUPO TECNICO:

EXAMINADOR:

PRESENTADA:

PARA: MÉTODOS, CEPAS Y COMPOSICIONES UTILES PARA LA
RECUPERACIÓN MICROBIALMENTE MEJORADA DEL PETROLEO:
PSEUDOMONAS STUTZERI

DECLARACION DEL DEPÓSITO DEL CULTIVO BIOLÓGICO

Via EFS-Web

Comisionado para patentes

P.O. Box1450

Alexandria, VA 22313-1450

Señor:

Yo, ROGER W. HERRELL, JR., declaro lo siguiente:

- a) Soy el apoderado registrado en la solicitud antes identificada;
- b) De acuerdo a la norma 37 CFR 1.804, los cultivos de los siguientes materiales biológicos han sido depositados con el (los) siguiente(s) depositario(s) internacional(es):

American Type Culture Collection (ATCC)

10801 University Blvd., Manassas, VA 20110, U.S.A.

Bajo condiciones que satisfacen los requerimientos del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de Depósitos de Microorganismos para el propósito de Procedimientos de patentes ["El Tratado"];

- c) Se adjunta una copia del recibo emitido de acuerdo con las Reglas del Tratado 7.3 y 10.2; y

Identificación del depositante del organismo	Número de acceso de depósito Internacional	Fecha del depósito
Pseudomonas stutzeri BR5311	PTA-11283	Septiembre 9, 2010
Pseudomonas stutzeri 89AC1-3	PTA-11284	Septiembre 9, 2010

- a) Todas las restricciones sobre la disponibilidad al público del cultivo serán removidas irrevocablemente luego del otorgamiento de la patente Estadounidense a la solicitud antes identificada.

PCT/US11/58729

Caso No.: CL5094USNA

Declaración del Depósito de Cultivo Biológico

Pág. 2

Atentamente.

/Roger W. Herrell, Jr/

ROGER W. HERRELL, JR.

APODERADO DE LOS
SOLICITANTES

Registro No.: 62.228

Teléfono: (302) 992-5463

Fax: (302) 355-3982

Fechado: Octubre 25, 2011

Anexo: Recibo del Depósito

CERTIFICADO DE DEPÓSITO BAJO BUDAPEST

**RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE DEPÓSITOS DE
MICROORGANISMOS PARA EL PROPÓSITO DE PROCEDIMIENTOS DE
PATENTES**

FORMA INTERNACIONAL

**RECIBO EN EL CASO DE UN DEPOSITO ORIGINAL EMITIDO DE
ACUERDO CON LA REGLA 7.3**

**Y DECLARACIÓN DE VIABILIDAD EMITIDA DE ACUERDO CON LA REGLA
10.2**

La American Type Culture Collection (ATCC®) ha recibido su depósito de semillas/cepas relacionadas con la presentación de una solicitud de patente. La siguiente información se suministra para cumplir con los requerimientos de la Oficina de Patentes.

Robert S. Scott

E. I. DuPont de Nemours and Company, Inc.

200 Powder Mill Road

Experimental Station E301/317

Wilmington, DE 19880-0301

Depositado a nombre de: **E. I. DuPont de Nemours & Co**

Fecha de Recepción de las semillas/cepas por ATCC®: **Septiembre 8, 2010**

Referencia Identificación	Designación del Depósito	Cantidad
<u>del Depositante</u>	<u>de Patente ATCC®</u>	<u>Recibida</u>
Pseudomonas stutzeri BR5311	PTA-11283	25 frascos
Pseudomonas stutzeri 89AC1-3	PTA-11410	25 frascos

La ATCC® entiende que:

1. El depósito de estas semillas/cepas no le otorga licencia a ATCC®, ni expresa ni implícita, para infringir la patente, y nuestra entrega de estas semillas/cepas a terceros no les otorga a estos una licencia, ni expresa ni implícita, para infringir la patente.
2. Si el depósito muriera o fuera destruido durante el término efectivo de vida de la patente, será su responsabilidad reemplazarlo con material viable. También será su responsabilidad suministrar una cantidad suficiente para su distribución durante el término del depósito. ATCC® distribuirá y mantendrá el material durante 30 años o 5 años según la solicitud más reciente para el depósito, el que sea más largo. Los Estados Unidos y muchos otros países son signatarios del Tratado de Budapest.

Antes del otorgamiento de una Patente Estadounidense, la ATCC® está de acuerdo en considerar un cargo por una vez por el servicio, no distribuir estas semillas/cepas o cualquier información relacionada con estas o su depósito excepto por instrucción del depositante o de la Oficina de patentes relevante. Después que la patente haya sido otorgada, nosotros somos responsables de liberar las semillas/cepas y por lo tanto estarán disponibles para su distribución al público sin restricciones. Les informaremos de las solicitudes de semillas/cepas durante 30 años a partir de la fecha del depósito.

El depósito fue probado el **7 de octubre de 2010** y en esa fecha, las semillas/cepas fueron consideradas viables

Autoridad Depositaria Internacional: American Type Culture Collection
(ATCC®), Manassas, VA, USA

Firma de la persona que tiene autoridad para representar a ATCC®:

Latha Ramakrishnan

Firmado digitalmente por Latha Ramakrishnan (Letra pequeña ilegible)

ATCC® Depositaria para patente

Octubre 8, 2010

Fecha

Ref: Expediente o caso No.: CL5094

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

HERRELL, Roger W.
E. I. du Pont de Nemours and Company
Legal Patent Records Center
4417 Lancaster Pike
Wilmington, Delaware 19805
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 11 April 2013 (11.04.2013)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference CL5094PCT	
International application No. PCT/US2011/058729	International filing date (day/month/year) 01 November 2011 (01.11.2011)

1. The following indications appeared on record concerning:		
☒ the applicant	☒ the inventor	☐ the agent
☐ the common representative		
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	E-mail address	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
☒ the person	☐ the name	☐ the address
☐ the nationality		
☐ the residence		
Name and Address LUCKRING, Abigail, K. 306 West Marshall Street West Chester, PA 19380 United States of America	State of Nationality US	State of Residence US
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	E-mail address ☐ Notifications by e-mail authorized	
3. Further observations, if necessary: The person identified in Box 2 has been added as applicant for US only and inventor for all designated States.		
4. A copy of this notification has been sent to:		
☒ the receiving Office	☐ the International Preliminary Examining Authority	
☐ the International Searching Authority	☒ the designated Offices concerned	
☐ the Authority(ies) specified for supplementary search	☐ the elected Offices concerned	
	☐ other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Deprez Isabelle
Facsimile No. +41 22 338 89 75	e-mail pt05.pct@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 05



10801 University Boulevard • Manassas, VA 20110-2209 USA • Telephone: 703-365-2700 • FAX: 703-334-2932

**BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF
THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE**

INTERNATIONAL FORM

**RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT ISSUED PURSUANT TO RULE 7.3
AND VIABILITY STATEMENT ISSUED PURSUANT TO RULE 10.2**

To: (Name and Address if Depositor or Attorney)

**E.I. du Pont de Nemours and Company
ATTN: Robert S. Scott
DuPont Experimental Station
E-301/317, 200 Powder Mill Road
P.O. Box 80301
Wilmington, DE 19880-0301**

Deposited on Behalf of: E.I. du Pont de Nemours and Company

Date of Receipt of Culture by the ATCC®: December 04, 2007

Identification Reference by Depositor:

**Shewanella putrefaciens
Pseudomonas stutzeri**

**LH4:18
LH4:15**

ATCC® Patent Deposit Designation:

**PTA-8822
PTA-8823**

The deposit was received by this International Depository Authority and has been accepted.

The strain will be made available if a patent office signatory to the Budapest Treaty certifies one's right to receive, or if a U.S. Patent is issued citing the strain, and ATCC® is instructed by the United States Patent & Trademark Office or the depositor to release said strain.

If the deposit should die or be destroyed during the effective term of the patent, it shall be your responsibility to replace it with viable material. It is also your responsibility to supply a sufficient quantity for distribution for the deposit term. ATCC® will distribute the material for 30 years or 5 years following the most recent request for the deposit, whichever is longer. The United States and many other countries are signatory to the Budapest Treaty.

We will inform you of requests for the strain for 30 years from date of deposit.

The deposit was tested December 18, 2007 and on that date, the culture was viable.

International Depository Authority: American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA

Signature of person having authority to represent ATCC®:

Date: December 19, 2007

ATCC Patent Depository

**cc: Chris Lhulier
Case or Docket No. CL4043: CL4096**

ATCC

10801 University Boulevard- Manassas, VA 20110-2209 USA – Teléfono 703-365-2700 – FAX: 703-334-2932

TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS PARA PROPÓSITOS DEL
PROCEDIMIENTO DE PATENTES

FORMATO INTERNACIONAL

RECIBO EN EL CASO DE UN DEPÓSITO ORIGINAL EMITIDO SEGÚN LA
REGLA 7.3 Y DECLARACIÓN DE VIABILIDAD EMITIDA SEGÚN LA REGLA 10.2

Para: (Nombre y dirección del Depositante o Abogado)

E.I. du Pont de Nemours and Company

ATT: Robert S. Scott

DuPont Experimental Station

E-301/317,200 Powder Mill Road

P.O. Box 80301

Wilmington, DE 19880-0301

Depositado a nombre de: E.I. du Pont de Nemours and Company

Fecha de recepción del cultivo por la ATCC®: **Diciembre 4, 2007**

Referencia de identificación por el Depositante		Designación del depósito de patente
		ATCC®
Shewanella putrefaciens	LH4:18	PTA-8822
Pseudomonas stutzeri	LH4:15	PTA-8823

El depósito fue recibido por esta Autoridad Depositaria Internacional y ha sido aceptado.

La cepa estará disponible si una oficina de patentes signataria al derecho de recibir del Tratado de Budapest, o si una patente Estadounidense ha sido emitida la cual cita la cepa, y la ATCC® ha recibido instrucciones de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o del depositante para liberar dicha cepa.

Si el depósito muere o es destruido durante el término efectivo de la patente, será su responsabilidad el remplazarlo con material viable. También será su responsabilidad suministrar una cantidad suficiente para su distribución durante el término del depósito, el que sea más largo. Los Estados Unidos y muchos otros países son signatarios del Tratado de Budapest.

Usted será informado de las solicitudes que se hagan para la cepa durante los 30 años siguientes a la fecha del depósito.

El depósito fue verificado el 18 de diciembre de 2007 y en esa fecha, el cultivo se encontró viable.

Autoridad Depositaria Internacional: American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA

Firma de la persona que tiene autoridad para representar la ATCC®:

Roxane Collins Firmado digitalmente por Roxane Collins

DN: cn=Roxane Collins, o=ATCC, ou=IP, Licenciamiento y

Servicios, [email=rcollins@atcc.org](mailto:rcollins@atcc.org), c=US

Fecha: 19 de diciembre de 2007

Fecha: 2007.12.20 12:00:56 – 05'00'

Depositorio de Patentes de la ATCC

Cc: Chris Lhulier

Caso o Expediente No. CL4043: CL4096