


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO


(Examen de Forma)

1. El compuesto de acuerdo con la fórmula (I)



(I),

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde
A se selecciona del grupo que consiste en



R^1 se selecciona entre el grupo que consiste en H y alquilo C_{1-4} ;

R^{1a} es alquilo C_{1-4} ;

R^2 es halógeno, -, $-CF_3$, $-CF_2H$, $-OCF_3$, $-OCF_2H$, $-OCH_3$, $-CH_3$ o CN, y R^3 , R^4 y R^5 son H; o

R^3 es halógeno y R^2 , R^4 y R^5 son H; o

R^4 es halógeno y R^2 , R^3 y R^5 son H; o

R^2 es halógeno, $-CF_3$, $-CF_2H$, $-OCF_3$, $-OCF_2H$, $-OCH_3$, $-CH_3$ o CN, R^3 es halógeno y R^4 y R^5 son H;

Y se selecciona del grupo que consiste en $-CH=CH-$, $-CH_2-CH_2-$, $-O-CH_2-$, $-CH_2-O-$, $-C(CH_3)=CH-$ y $-C=C(CH_3)-$;

B es un anillo heterocíclico nitrogenado de 4 a 8 miembros o un sistema de anillo nitrogenado heterocíclico con puente de 4 a 8 miembros, en el cual el anillo heterocíclico

6

nitrogenado de 4 a 8 miembros o el sistema de anillo nitrogenado heterocíclico con puente de 4 a 8 miembros sea no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en Q;

Q se selecciona del grupo que consiste en

(i) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heteroarilo de 5 ó 6 miembros en el que el heteroarilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste de X;

(ii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ fenilo o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ fenilo, en el cual el fenilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste X;

(iii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ - un sistema de anillo bicíclico fusionado de 9 a 10 miembros o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ - un sistema de anillo bicíclico fusionado de 9 a 10 miembros en el cual el sistema de anillo bicíclico fusionado de 9 a 10 miembros está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste de X;

(iv) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heterociclilo de 5 o 6 miembros o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heterociclilo de 5 ó 6 miembros donde el heterociclilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

(v) alquilo C_{1-4} ;

(vi) alcoxi C_{1-4} ;

(vii) alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} ;

(viii) haloalquilo C_{1-4} ;

(ix) hidroxialquilo C_{1-4} ;

(x) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n C_{3-6}$ cicloalquilo;

(xi) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)R^{Bc}$ o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)R^{Bc}$;

(xii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)OR^{Bc}$ o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)OR^{Bc}$;

(xiii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}-C(=O)R^{Bc}$ o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}-C(=O)R^{Bc}$;

(xiv) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}-C(=O)OR^{Bc}$ o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}-C(=O)OR^{Bc}$;

(xv) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)NR^{Bc}R^{Bd}$ o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)NR^{Bc}R^{Bd}$;

(xvi) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}R^{Bc}$ o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}R^{Bc}$;

(xvii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}-S(O)_2-R^{Bf}$;

(xviii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-S(O)_2-NR^{Bd}R^{Bc}$ o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-S(O)_2-NR^{Bd}R^{Bc}$;

(xix) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-S(O)_2-R^{Bf}$;

(xx) halógeno;

(xxi) OH;

(xxii) oxo; y

(xxiii) CN;

R^{Ba} , R^{Bb} , R^{Xa} , R^{Xb} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, OH, alquilo C_{1-4} y alcoxi C_{1-4} ;

R^{Bc} , R^{Be} y R^{Bf} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C_{1-4} , $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ - C_{3-6} cicloalquenilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, C_{1-4} alcoxi C_{1-4} alquilo, OH, $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ heteroarilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ -fenilo y $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ -heterociclilo de 5 o 6 miembros, en el cual el cicloalquilo C_{3-6} , el heteroarilo, el fenilo y el heterociclilo están no sustituidos o sustituidos por 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en X;

R^{Bd} se selecciona entre el grupo que consiste en H y alquilo C_{1-4} ; o

R^{Bc} y R^{Bd} o R^{Bd} y R^{Be} junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 5 a 6 miembros en el cual el heterociclilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en X;

X se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} alcoxi C_{1-4} alquilo, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - C_{3-6} cicloalquilo, $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ - C_{3-6} cicloalquenilo, halógeno, CN, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ heterociclilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ heteroarilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ -fenilo, oxo, OH, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - $C(=O)R^{Xc}$, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - $C(=O)OR^{Xc}$, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - $NR^{Xd}R^{Xe}$ y $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - $C(=O)NR^{Xd}R^{Xe}$; en el cual el cicloalquilo C_{3-6} , el heteroarilo, el fenilo y el heterociclilo están no sustituidos o sustituidos por 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - C_{3-6} cicloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH;

R^{Xc} , R^{Xd} y R^{Xe} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ - C_{3-6} cicloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , OH $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ heterociclilo de 5 o 6 miembros y $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ heteroarilo de 5 o 6 miembros; en el que el cicloalquilo C_{3-6} , el heterociclilo y el heteroarilo están no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste de alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ - C_{3-6} cicloalquilo, C_{1-4} haloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH; o

R^{Xd} y R^{Xe} junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 5 a 6 miembros en el cual el heterociclilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste de alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ - C_{3-6} cicloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, haloalquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH;


n y n1 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 0, 1, 2, 3, 4 y 5;

q y q1 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 0, 1 y 2;

con la condición de que el compuesto no sea 2-[4-cloro-2-(1H-tetrazol-5-ilmetil)-fenoxi]-1-[(cis)-3-(4-fluoro-fenoxi)-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-8-il]-etanona.

2. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la Reivindicación 1, en donde

A se selecciona del grupo que consiste en



R^1 se selecciona entre el grupo que consiste en H y alquilo C_{1-4} ;

R^{1a} es alquilo C_{1-4} ;

R^2 es halógeno, $-CF_3$, $-CF_2H$, $-OCF_3$, $-OCF_2H$, $-OCH_3$, $-CH_3$ o CN, y R^3 , R^4 y R^5 son H;

o

R^3 es halógeno y R^2 , R^4 y R^5 son H; o


R^4 es halógeno y R^2 , R^3 y R^5 son H; o

R^2 es halógeno, $-CF_3$, $-CF_2H$, $-OCF_3$, $-OCF_2H$, $-OCH_3$, $-CH_3$ o CN, R^3 es halógeno y R^4 y R^5 son H;

Y se selecciona del grupo que consiste en $-CH=CH-$, $-CH_2-CH_2-$, $-O-CH_2-$, $-CH_2-O-$, $-C(CH_3)=CH-$ y $-C=C(CH_3)-$;

B se selecciona entre el grupo que consiste en:

(1)



donde

(1.1) R^{B11} , R^{B12} , R^{B13} y R^{B14} son H; R^{B15} se selecciona entre el grupo que consiste en Q1; y R^{B16} se selecciona entre el grupo que consiste en H, OH, alquilo C_{1-4} y alcoxi C_{1-4} ; o

(1.2) R^{B12} , R^{B13} , R^{B14} , R^{B15} y R^{B16} son H; y R^{B11} se selecciona entre el grupo que consiste en Q1; o

(1.3) R^{B11} , R^{B13} , R^{B14} , R^{B15} y R^{B16} son H; y R^{B12} se selecciona entre el grupo que consiste en Q1; o

(1.4) R^{B12} , R^{B13} , R^{B14} , R^{B16} son H; R^{B11} se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , alcoxilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , hidroxilo C_{1-4} , alquilo y halógeno; y R^{B15} se selecciona entre el grupo que consiste en Q1;

Q1 se selecciona del grupo que consiste en

(i) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heteroarilo de 5 ó 6 miembros o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heteroarilo de 5 ó 6 miembros en el cual el heteroarilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

(ii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -fenilo o $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -fenilo en el cual el fenilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

(iii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ - un sistema de anillo bicíclico fusionado de 9 a 10 miembros o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ - un sistema de anillo bicíclico fusionado de 9 a 10 miembros en el cual el sistema de anillo bicíclico fusionado de 9 a 10 miembros está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste X;

(iv) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heterociclilo de 5 o 6 miembros o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heterociclilo de 5 ó 6 miembros en el cual el heterociclilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste X;

(v) haloalquilo C_{1-4} ;


(vi) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)OR^{Bc}$ o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)OR^{Bc}$;

(vii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}-C(=O)R^{Bc}$ o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-NR^{Bd}-C(=O)R^{Bc}$;

(viii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)NR^{Bd}R^{Bc}$ o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)NR^{Bd}R^{Bc}$; y

(ix) halógeno;

(2)



donde

(2.1) R^{B21} , R^{B22} , R^{B23} y R^{B24} son H; y R^{B25} se selecciona entre el grupo que consiste en Q2; o

(2.2) R^{B22} , R^{B23} , R^{B24} , R^{B25} son H; y R^{B21} se selecciona entre el grupo que consiste en Q2; o

(2.3) R^{B21} , R^{B23} , R^{B24} , R^{B25} son H; y R^{B22} se selecciona entre el grupo que consiste en Q2; o

(2.4) R^{B22} , R^{B23} y R^{B24} son H; R^{B21} se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , hidroxilo C_{1-4} alquilo y halógeno; y R^{B25} se selecciona entre el grupo que consiste en Q2;

Q2 se selecciona del grupo que consiste en

(i) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heteroarilo de 5 ó 6 miembros o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n$ -heteroarilo de 5 ó 6 miembros en el cual el heteroarilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

(ii) haloalquilo C_{1-4} ;

(iii) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)OR^{Bc}$ o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)OR^{Bc}$;

(iv) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_nNR^{Bd}-C(=O)R^{Bc}$ o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_nNR^{Bd}-C(=O)R^{Bc}$;

(v) $-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)NR^{Bd}R^{Bc}$ o $-O-(CR^{Ba}R^{Bb})_n-C(=O)NR^{Bd}R^{Bc}$; y

(vi) halógeno;

R^{Ba} , R^{Bb} , R^{Xa} , R^{Xb} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, OH, alquilo C_{1-4} y alcoxi C_{1-4} ;

R^{Bc} , R^{Be} y R^{Bf} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C_{1-4} , $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ - C_{3-6} cicloalqueno, hidroxilo C_{1-4} alquilo, haloalquilo C_{1-4} , C_{1-4} alcoxi C_{1-4} alquilo, OH, $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ heteroarilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ -fenilo y $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ -heterociclilo de 5 o 6 miembros, en el cual el cicloalquilo C_{3-6} , el heteroarilo, el fenilo y el heterociclilo están no sustituidos o sustituidos por 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en X;

R^{Bd} se selecciona entre el grupo que consiste en H y alquilo C_{1-4} ; o

R^{Bc} y R^{Bd} o R^{Bd} y R^{Bc} junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 5 a 6 miembros en el cual el heterociclilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en X;

X se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} alcoxi C_{1-4} alquilo, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - C_{3-6} cicloalquilo, $-(CR^{Ba}R^{Bb})_{n1}$ - C_{3-6} cicloalqueno, halógeno, CN, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ heterociclilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ -heteroarilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ -fenilo, oxo, OH, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)R^{Xc}$, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)OR^{Xc}$, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-NR^{Xd}R^{Xe}$ y $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)NR^{Xd}R^{Xe}$; en el cual el cicloalquilo C_{3-6} , el heteroarilo, el fenilo y el heterociclilo están no sustituidos o sustituidos por 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ - C_{3-6} cicloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH;

R^{Xc} , R^{Xd} y R^{Xe} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ - C_{3-6} cicloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo C_{1-4} alcoxi C_{1-4} alquilo, OH $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ heterociclilo de 5 o 6 miembros y $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}$ heteroarilo de 5 o 6 miembros; en el que el cicloalquilo C_{3-6} , el heterociclilo y el heteroarilo están no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que


consiste en alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, -(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}-C₃₋₆ cicloalquilo, C₁₋₄ haloalquilo, hidroxilo C₁₋₄ alquilo, alcoxi C₁₋₄ alquilo C₁₋₄, halógeno y OH; o

R^{Xd} y R^{Xe} junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 5 a 6 miembros en el cual el heterociclilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, -(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}-C₃₋₆ cicloalquilo, hidroxilo C₁₋₄ alquilo, haloalquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄ alquilo C₁₋₄, halógeno y OH;

n y n1 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 0, 1, 2, 3, 4 y 5;

q y q1 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 0, 1 y 2;

3. El compuesto según la Reivindicación 1, de fórmula (Ia)




(Ia),

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

donde

A se selecciona del grupo que consiste en



R¹ se selecciona entre el grupo que consiste en H y alquilo C₁₋₄;

R^{1a} es alquilo C₁₋₄;

R² es halógeno, -CF₃, -CF₂H, -OCF₃, -OCF₂H, -OCH₃, -CH₃ o CN;

Y se selecciona del grupo que consiste en -CH=CH-, -CH₂-CH₂-, -O-CH₂-, -CH₂-O-, -C(CH₃)=CH- y -C=C(CH₃)-;

A' es CR⁶ o N;

R⁶ se selecciona entre H, OH y alcoxi C₁₋₄;

Z se selecciona entre el grupo que consiste en -(CR^{7a}R^{7b})_m-, -(CH₂)_{m1}-C(=O)-(CH₂)_{m2}-, -(CH₂)_{m1}-O-(CH₂)_{m2}-, -(CH₂)_{m1}-NR⁸C(=O)-(CH₂)_{m2}-, -(CH₂)_{m1}-C(=O)NR⁸-(CH₂)_{m2}- y -(CH₂)_{m1}-NR⁸-(CH₂)_{m2}-;

R^{7a} y R^{7b} se seleccionan independientemente de H, OH, alquilo C₁₋₄ y alcoxi C₁₋₄;

R⁸ se selecciona entre H y alquilo C₁₋₄;

m, m1 y m2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 0, 1, 2, 3, 4 y 5;

E se selecciona entre el grupo que consiste en

(i) heteroarilo de 5 o 6 miembros, que está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

(ii) fenilo que está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

(iii) Un sistema de anillo bicíclico fusionado a 9 a 10 miembros el cual está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

(iv) heterociclilo de 5 o 6 miembros en el que el heterociclilo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

X se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, hidroxil alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄ alquilo C₁₋₄, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C₃₋₆ cicloalquilo, halógeno, CN, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q heterociclilo de 5 o 6 miembros, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q heteroarilo de 5 o 6 miembros, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q -fenilo, oxo, OH, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)R^{Xc}, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)OR^{Xc}, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q-NR^{Xd}R^{Xe} y -(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)NR^{Xd}R^{Xe}; en el que el cicloalquilo C₃₋₆, el heteroarilo, el fenilo y el heterociclilo están no sustituidos o sustituidos por 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, -(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C₃₋₆ cicloalquilo, hidroxil alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄ alquilo C₁₋₄, halógeno y OH;

R^{Xa} y R^{Xb} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, OH, alquilo C₁₋₄ y alcoxi C₁₋₄;

R^{Xc}, R^{Xd} y R^{Xe} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C₁₋₄, -(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}-C₃₋₆ cicloalquilo, hidroxil alquilo C₁₋₄, C₁₋₄ haloalquilo, C₁₋₄ alcoxi C₁₋₄ alquilo, OH -(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1} heterociclilo de 5 o 6 miembros y -(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1} heteroarilo de 5 o 6 miembros; en el que el cicloalquilo C₃₋₆, el heterociclilo y el heteroarilo están no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, -(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}-C₃₋₆ cicloalquilo, C₁₋₄ haloalquilo, hidroxil alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄ alquilo C₁₋₄, halógeno y OH; o

R^{Xd} y R^{Xe} junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 5 a 6 miembros en el cual el heterociclilo está no sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}-C_{3-6}$ cicloalquilo, hidroxi C_{1-4} alquilo, haloalquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH;

q y q1 se seleccionan del grupo que consiste en 0, 1 y 2.

4. El compuesto según la Reivindicación 1 o 3, de fórmula (Ia)




(Ia),

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

donde

A se selecciona del grupo que consiste en



R^1 se selecciona entre el grupo que consiste en H y alquilo C_{1-4} ;

R^{1a} es alquilo C_{1-4} ;

R^2 es halógeno, $-CF_3$, $-CF_2H$, $-OCF_3$, $-OCF_2H$, $-OCH_3$, $-CH_3$ o CN;

Y se selecciona del grupo que consiste en $-CH=CH-$, $-CH_2-CH_2-$, $-O-CH_2-$, $-CH_2-O-$, $-C(CH_3)=CH-$ y $-C=C(CH_3)-$;

A' es CR^6 o N;

R^6 se selecciona entre H, OH y alcoxi C_{1-4} ;

Z se selecciona entre el grupo que consiste en $-(CR^{7a}R^{7b})_m-$, $-(CH_2)_{m1}-C(=O)-(CH_2)_{m2}-$, $-(CH_2)_{m1}-O-(CH_2)_{m2}-$, $-(CH_2)_{m1}-NR^8C(=O)-(CH_2)_{m2}-$, $-(CH_2)_{m1}-C(=O)NR^8-(CH_2)_{m2}-$ y $-(CH_2)_{m1}-NR^8-(CH_2)_{m2}-$;

R^{7a} y R^{7b} se seleccionan independientemente de H, OH, alquilo C_{1-4} y alcoxi C_{1-4} ;

R^8 se selecciona entre H y alquilo C_{1-4} ;

m, m1 y m2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 0, 1, 2, 3, 4 y 5;

E se selecciona entre el grupo que consiste en

(i) oxadiazolilo;

(ii) pirazolilo;

(iii) oxazolilo;

(iv) isoxazolilo;

(v) piridinilo;

(vi) tiazolilo;

(vii) triazolilo;

(viii) pirimidinilo;

(ix) tetrazolilo;

(x) pirazinilo; y

(xi) furanilo;

donde cada anillo está no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en X;

X se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , hidroxilo C_{1-4} alquilo, alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C_{3-6}$ cicloalquilo, halógeno, CN, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ heterociclilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ heteroarilo de 5 o 6 miembros, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ -fenilo, oxo, OH, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)R^{Xc}$, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)OR^{Xc}$, $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-NR^{Xd}R^{Xe}$ y $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C(=O)NR^{Xd}R^{Xe}$; en el que el cicloalquilo C_{3-6} , el heteroarilo, el fenilo y el heterociclilo están no sustituidos o sustituidos por 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C_{3-6}$ cicloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, haloalquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH;

R^{Xa} y R^{Xb} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, OH, alquilo C_{1-4} y alcoxi C_{1-4} ;

R^{Xc} , R^{Xd} y R^{Xe} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q-C_{3-6}$ cicloalquilo, hidroxilo C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, C_{1-4} alcoxi C_{1-4} alquilo, OH y $-(CR^{Xa}R^{Xb})_q$ heterociclilo de 5 o 6 miembros; en el que el cicloalquilo C_{3-6} y el heterociclilo están no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados

independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}-C_{3-6}$ cicloalquilo, C_{1-4} haloalquilo, hidroxil C_{1-4} alquilo, alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH; o

R^{Xd} y R^{Xe} junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 5 a 6 miembros en el cual el heterociclilo está no sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-(CR^{Xa}R^{Xb})_{q1}-C_{3-6}$ cicloalquilo, hidroxil C_{1-4} alquilo, haloalquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} alquilo C_{1-4} , halógeno y OH;

q y q1 se seleccionan del grupo que consiste en 0, 1 y 2.

5. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste en (S,E)-1-(2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometoxi)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(S,E)-N-metil-1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acrililo)piperidina-2-carboxamida;

(R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(S,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metil-1H-tetrazol-1-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-hidroxi-4-((4-(morfolin-4-carbonilo)-1H-pirazol-1-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-((1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-ol)metil)fenil)acrililo)-4-hidroxipiperidin-4-il)metil)-N,N-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-hidroxi-4-((4-(piperidina-1-carbonilo)-1H-pirazol-1-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metil-2H-tetrazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-hidroxi-4-((4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)etilo)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metiloxazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)propil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(2-metiloxazol-4-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-metil-1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-2-carboxilato de etilo;

((E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-(3-isopropilo-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

((E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-(3-isopropilo-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

((E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-(3-isopropilo-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metiloxazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-etil-1-((1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acrililoil)-4-hidroxipiperidin-4-il)metil)-1H-pirazol-4-carboxilato;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(2-(4-metil-1H-pirazol-1-il)etilo)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(3-isopropilo-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(3-isopropilo-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(3-isopropilo-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-((1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acrililoil)-4-hidroxipiperidin-4-il)metil)-1H-pirazol-4-ácido carboxílico;

1-(4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)-2-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenoxi)etanona;

(E)-1-(4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(2-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(2-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(2-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)but-2-en-1-ona;

1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propan-1-ona;

(E)-3-(4-fluoro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4,5-difluoro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(5-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(2-fluoro-6-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metiloxazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(2-cloro-6-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)bencil4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidina-1-carboxilato de etilo;

4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)bencil4-(5-metiloxazol-2-il)piperidina-1-carboxilato de etilo;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(metilsulfonil)azetidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)imidazolidin-2-ona;

(E)-1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)azetidin-3-il)metilcarbamato de terc-butilo;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-fluoropirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(2-hidroxietil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-hidroxipiperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-3-carboxamida;

(E)-etil-1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-carboxilato de etilo;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(2-oxo-2-(piperidin-1-il)etoxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((1H-pirazol-1-il)metil)piperidin-1-il)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(trifluorometil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-2-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-iloxi)-N,N-dimetilbenzamida;

(R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-metilpiperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(3-acetilpiperidin-1-il)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(4-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(metoximetil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(S,E)-N-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)pirrolidin-3-il)-2,2,2-trifluoroacetamida;

(E)-2-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-iloxi)-N-metilacetamida;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(furan-2-carbonil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-hidroxi-2-metilpiperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-hidroxi-2-metilpiperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-metil-4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-ácido carboxílico;

(E)-3-(4-(difluorometil)-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometoxi)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-(difluorometil)-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometoxi)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-(difluorometoxi)-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-(difluorometil)-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(5-((2-metiloxazol-4-il)metil)-2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-il)prop-2-en-1-ona;

(R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-metil-4-((2-metiloxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(hidroxi(4-metiltiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(4-fluorofenil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(R,E)-2-(3-metil-4-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperazin-1-il)acetato de terc-butilo;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((4-clorofenil)(hidroxi)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((4-clorofenil)(hidroxi)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((4-clorofenil)(hidroxi)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-metil 1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-carboxilato;

(E)-4-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperazin-1-carboxilato de terc-butilo;

(R,E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(2-metil-4-((2-metiloxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(R,E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(2-metil-4-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)-3-(4-metil-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-metil-4-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(4-((2-metiloxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(2-((2H-1,2,3-triazol-2-il)metil)-4-clorofenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)fenil)-1-(4-((2-metiloxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(2-((2H-tetrazol-2-il)metil)-4-clorofenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(3-fluoro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(5-fluoro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-4-(3-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)-3-oxoprop-1-enil)-3-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)benzonitrile;

(E)-3-(4-metoxi-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-2-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-3-iloxi)-N-etilacetamida;

(E)-metil-4-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)morfolina-3-carboxilato de etilo;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(metoximetil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(pirimidin-2-il)-1,4-diazepan-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-acetil-1,4-diazepan-1-il)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-metil-3-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)tiazolidina-2-carboxilato de etilo;

(E)-2-(4-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperazin-1-il)nicotinonitrile;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(3-(pirrolidin-1-carbonil)piridin-2-il)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-2-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-iloxi)-N-propilacetamida;

(E)-2-metoxi-N-metil-N-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)acetamida;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)azetidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-4-fluoro-N-metil-N-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)benzamida;

(E)-1-(4-((3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(S,E)-N-metil-1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)pirrolidina-2-carboxamida;

(S,E)-4,4-difluoro-N-metil-1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)pirrolidina-2-carboxamida;

(E)-1-(4-(5-etil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-etil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-N-metil-N-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)-2-(3-metilisoxazol-5-il)acetamida;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1'-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)-1,4'-bipiperidin-2-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-metil-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(metoximetil)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-isopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(4-((3-metilisoxazol-5-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(etilsulfonil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-1-(4-(5-ciclobutil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-metil-4-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(4-((5-metilisoxazol-3-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

(S,E)-1-(2-(metoximetil)-4-((2-metiloxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

- (E)-1-(3-metoxipiperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-(3-metoxipiperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-(3-metoxipiperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (S,E)-1-(2-(metoximetil)pirrolidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-N-metil-N-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acrilol)piperidin-4-il)ciclopropansulfonamida;
- (E)-1-(3-fluoropiperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(2-metil-4-((3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-(3-fluoropiperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-(3-fluoropiperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-(4-((4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-il)metil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (R,E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(2-metilpirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-4-fluoro-N-metil-N-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acrilol)piperidin-4-il)benzensulfonamida;
- (E)-1-(4-((4-metoxibenzil)(metil)amino)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (S,E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(2-(trifluorometil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-(piperidin-1-il)metil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metoxipiridin-2-il)metil)-2-metilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

24

- (E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(2-(trifluorometil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-N-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)acetamida;
- (E)-1-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)pirrolidin-2-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-metil-1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-carboxilato de etilo;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(2-morfolino-2-oxoetil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(3-(4-fluorofenoxi)azetidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-((2S,4S)-4-fluoro-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (S,E)-1-(2-(hidroximetil)-4-((2-metiloxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (S,E)-1-(2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-(morfolinometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-(trifluorometil)piridin-2-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-(morfolinometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (S,E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-(4-benzil-4-hidroxipiperidin-1-il)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-1-(4-benzilpiperidin-1-il)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metoxipiridin-2-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((3-metilisoxazol-5-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((2-metiloxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;

- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((1-metil-5-fenil-1H-pirazol-3-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((5-metoxipirazin-2-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((2-morfolinopirimidin-5-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)-1-(4-(5-(2,2,2-trifluoroetil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-1-(3-(trifluorometil)morfolino)prop-2-en-1-ona;
- (R,E)-3-(4-cloro-2-((2-metil-2H-tetrazol-5-il)metil)fenil)-1-(4-(4-fluorobenzil)-2-metilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (R,E)-3-(4-cloro-2-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)fenil)-1-(4-(4-fluorobenzil)-2-metilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona;
- (E)-N-(2-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)etil)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;
- (E)-N-(2-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)etil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (E)-N-((1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)metil)-3-(3-hidroxiisoxazol-5-il)propanamida;
- (E)-N-(2-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)etil)-N-metil-2-oxo-2,3-dihidrooxazol-5-carboxamida;
- (E)-1-(4-(1-(1H-1,2,3-triazol-4-carbonil)piperidin-4-il)piperazin-1-il)-3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)prop-2-en-1-ona;
- (E)-3-(2-(4-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)morfolin-2-il)etilamino)-4-etoxiciclobut-3-en-1,2-diona;
- (E)-N-(1-(3-(4-cloro-2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)-4-(1H-1,2,3-triazol-4-il)butanamida;
- (E)-N-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)-4-(1H-1,2,3-triazol-4-il)butanamida;
- 1-(4-(5-(1H-1,2,3-triazol-4-il)pentil)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propan-1-ona;

1-(4-(5-(1H-1,2,3-triazol-4-il)pentil)piperidin-1-il)-2-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenoxi)etanona;

(E)-1-(4-(4-(1H-1,2,3-triazol-4-il)butilamino)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

(E)-N-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)acriloil)piperidin-4-il)-6-(1H-1,2,3-triazol-5-il)hexanamida;y

(E)-1-(4-(2-(2-(1H-1,2,3-triazol-5-il)etoxi)etil)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. El compuesto que es (E)-1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. El compuesto que es (E)-1-(4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. El compuesto que es 1-(4-(5-Metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propan-1-ona o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

10. Una combinación farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más co-agentes terapéuticamente activos.
