


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la siguiente Fórmula (I-A):



en donde:

El anillo A' y el anillo B' son cada uno de manera independiente un arilo o heteroarilo monocíclico o bicíclico; en donde uno del anillo A' y el anillo B' es un arilo o heteroarilo monocíclico y el otro es un heteroarilo bicíclico; y al menos uno del anillo A' y el anillo B' comprende al menos uno miembro de anillo de nitrógeno;

cada L1 y L2 es, de manera independiente, -C(R1')(R2')-, -O-, -N(Rk')-, -S-, -S(O)- o -S(O)2-;

cada R1' y R2' son, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, -ORa', -OC(O)Ra', -OC(O)NRa'Rb', -OS(O)Ra', -OS(O)2Ra', -SRa', -S(O)Ra', -S(O)2Ra', -S(O)NRa'Rb', -S(O)2NRa'Rb', -OS(O)NRa'Rb', -OS(O)2NRa'Rb', -NRa'Rb', -NRa'C(O)Rb', -NRa'C(O)ORb', -NRa'C(O)NRa'Rb', -NRa'S(O)Rb', -NRa'S(O)2Rb', -NRa'S(O)NRa'Rb', -NRa'S(O)2NRa'Rb', -C(O)Ra', -C(O)ORa', -C(O)NRa'Rb', -PRa'Rb', -P(O)Ra'Rb', -P(O)2Ra'Rb',

-P(0)NRa'Rb', -P(0)2NRa'Rb', -P(0)ORa', -P(0)2ORa', -CN, o -N02, o R1' y R2' tomados junto con el carbono o los carbonos a los que se hallan unidos forman un cicloalquilo C3-6 o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo monocíclico o bicíclico, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, de manera independiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -ORe', -OC(0)Re', -OC(0)NRe'Rf', -OS(0)Re', -OS(0)2Re', -OS(0)NRe'Rf', -OS(0)2NRe'Rf', -SRe', -S(0)Re', -S(0)2Re', -S(0)NRe'Rf', -S(0)2NRe'Rf', -NRe'Rf', -NRe'C(0)Rf', -NRe'C(0)ORf', -NRe'C(0)NRe'Rf', -NRe'S(0)Rf', -NRe'S(0)2Rf', -NRe'S(0)NRe'Rf', -NRe'S(0)2NRe'Rf', -C(0)Re', -C(0)ORe', -C(0)NRe'Rf', -PRe'Rf', -P(0)Re'Rf', -P(0)2Re'Rf', -P(0)NRe'Rf', -P(0)2NRe'Rf', -P(0)ORe', -P(0)2ORe', -CN, o -N02;

cada Rk' es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera

independiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -ORe', -OC(O)Re', -OC(O)NRe'Rf', -OS(O)Re', -OS(O)2Re', -OS(O)NRe'Rf', -OS(O)2NRe'Rf', -SRe', -S(O)Re', -S(O)2Re', -S(O)NRe'Rf', -S(O)2NRe'Rf', -NRe'Rf', -NRe'C(O)Rf', -NRe'C(O)ORf', NRe'C(O)NRe'Rf', -NRe'S(O)Rf', -NRe'S(O)2Rf', -NRe'S(O)NRe'Rf', -NRe'S(O)2NRe'Rf', -C(O)Re', -C(O)ORe', -C(O)NRe'Rf', -Pre'Rf', -P(O)Re'Rf', -P(O)2Re'Rf', -P(O)NRe'Rf', -P(O)2NRe'Rf', -P(O)ORe', -P(O)2ORe', -CN, o -NO2;

cada R3' y R4' es, de manera independiente, deuterio, halógeno, -ORc', -OC(O)Rc', OC(O)NRc'Rd', -OC(=N)NRc'Rd', -OS(O)Rc', -OS(O)2Rc', -OS(O)NRc'Rd', -OS(O)2NRc'Rd', -SRc', -S(O)Rc', -S(O)2Rc', -S(O)NRc'Rd', -S(O)2NRc'Rd', -NRc'Rd', -NRc'C(O)Rd', -NRc'C(O)ORd', -NRc'C(O)NRc'Rd', -NRc'C(=N)NRc'Rd', -NRc'S(O)Rd', -NRc'S(O)2Rd', -NRc'S(O)NRc'Rd', -NRc'S(O)2NRc'Rd', -C(O)Rc', -C(O)ORc', -C(O)NRc'Rd', -C(=N)NRc'Rd', -PRc'Rd', -P(O)Rc'Rd', -P(O)2Rc'Rd', -P(O)NRc'Rd', -P(O)2NRc'Rd', -P(O)ORc', -P(O)2ORc', -CN, -NO2, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, o dos grupos cualesquiera R3' o dos grupos R4' cualesquiera tomados junto con el anillo al que se encuentran unidos forman un cicloalquilo C5-8 o un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros,

en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo monocíclico o bicíclico cicloalquilo C5-8 forman un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -ORe', -OC(O)Re', -OC(O)NRe'Rf', -OS(O)Re', -OS(O)2Re', -OS(O)NRe'Rf', -OS(O)2NRe'Rf', -SRe', -S(O)Re', -S(O)2Re', -S(O)NRe'Rf', -S(O)2NRe'Rf', -NRe'Rf', -NRe'C(O)Rf', -NRe'C(O)ORf', -NRe'C(O)NRe'Rf', -NRe'S(O)Rf', -NRe'S(O)2Rf', -NRe'S(O)NRe'Rf', -NRe'S(O)2NRe'Rf', -C(O)Re', -C(O)ORe', -C(O)NRe'Rf', -PRe'Rf', -P(O)Re'Rf', -P(O)2Re'Rf', -P(O)NRe'Rf', -P(O)2NRe'Rf', -P(O)ORe', -P(O)2ORe', -CN, o -NO2;

R7' es H, deuterio, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera independiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, -ORi', -OC(O)Ri', -OC(O)NRi'Rj', -OS(O)Ri', -OS(O)2Ri', -OS(O)NRi'Rj', -OS(O)2NRi'Rj', -SRi', -S(O)Ri', -S(O)2Ri', -S(O)NRi'Rj', -S(O)2NRi'Rj', -NRi'Rj', -NRi'C(O)Rj',

-NRi'C(O)ORj', -NRi'C(O)NRi'Rj', -NRi'S(O)Rj', -NRi'S(O)2Rj',
 -NRi'S(O)NRi'Rj', -NRi'S(O)2NRi'Rj', -C(O)Ri', -C(O)ORi',
 -C(O)NRi'Rj', -PRi'Rj', -P(O)Ri'Rj', -P(O)2Ri'Rj', -
 P(O)NRi'Rj',
 -P(O)2NRi'Rj', -P(O)ORi', -P(O)2ORi', -CN, o -NO2;

cada Ra', Rb', Rc', Rd', Re', Rf', Ri' y Rj', de manera independiente, se selecciona del grupo que consta de H, deuterio, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo;

m' es 2, 3, 4, o 5;

n' es 2, 3, o 4;

p' es 0, 1, 2, 3, o 4; y

q' es 0, 1, 2, 3, o 4;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es arilo o heteroarilo monocíclico y el anillo B' es heteroarilo bicíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es un heteroarilo bicíclico y el anillo B' es arilo o heteroarilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

5. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo B' es heteroarilo bicíclico que contiene 1, 2, o 3 átomos de anillo de nitrógeno, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

6. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es fenilo o piridilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


7. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' es fenilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

8. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' sustituido con $-(R^3')_{p'}$ es




, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo A' sustituido con $-(R^3')_{p'}$ es




, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo B' es:




en donde Z1-Z7 se definen de acuerdo con lo descrito en la presente, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


11. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo B' es:



en donde Z1-7 se definen de otro modo de acuerdo con lo descrito en la presente, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


12. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo B' es:





o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

13. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el anillo B' es



aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-13, en donde cada R3' es, de manera independiente, deuterio, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, -CF3, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -CO2alquiloC1-4, -CO2H, -NHC(O)alquilo C1-4, -SO2alquiloC1-4, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)2, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, o tiomorfolinilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

15. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde cada R3' es, de manera independiente, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, o -CF3, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

16. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en donde cada R3' es flúor o cloro, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

17. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde R7' es H, deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, pirrolidinilo, furanilo, tiofuranilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, fenilo, o heteroarilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

18. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-17, en donde R7' es H, o es metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

19. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-18, en donde R7' es H o es metilo o etilo, cada uno no sustituido o sustituido con halógeno, -OH, -Oalquilo C1-4, -NH₂, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)₂, -CO₂H, -CO₂alquilo C1-4, -CONH₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

20. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-19, en donde R7' es H, metilo, hidroxietilo, -CH₂CONH₂, o 3-pirrolidinilmetilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

21. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-20, en donde R7' es H o metilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
22. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-21, en donde R1' y R2' son cada uno de manera independiente H, deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, pirrolidinilo, furanilo, tiofuranilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, fenilo, o heteroarilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
23. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-22, en donde R1' es H, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
24. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-23, en donde R2' es deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, pirrolidinilo, furanilo, tiofuranilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, fenilo, o heteroarilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
25. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-24, en donde R2' es H o es metilo o etilo, cada uno no sustituido o sustituido con halógeno, -OH, -Oalquilo C1-4, -NH₂, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)₂, -CO₂H, -CO₂alquilo C1-4, -CONH₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

26. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-25, en donde $R2'$ es H, metilo, fluorometilo, hidroximetilo o ciclopropilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

27. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-26, en donde cada Rk' es, de manera independiente, H, metilo, etilo, propilo, isopropilo, o ciclopropilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

28. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-27, en donde cada $L1$ y $L2$ es, de manera independiente, $-CH_2-$, $-CH(\text{metil})-$, $-CH(\text{metilo sustituido})-$, $-CH(\text{cicloalquilo } C3-6)-$, $-O-$, $-NH-$, $-N(\text{alquilo } C1-4)$, $-N(\text{cicloalquilo } C3-6)$, $-S-$, $-S(O)-$, o $-SO_2-$, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

29. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-28, en donde $-(L1)n'$ es $-CH_2-O-$, $-CH(\text{alquilo } C1-4)-O-$, $-CH(\text{cicloalquilo } C3-6)-O-$; o $-CH(H \text{ o } \text{alquilo } C1-4 \text{ opcionalmente sustituido})-N(H \text{ } \text{alquilo } C1-4 \text{ opcionalmente sustituido})-$, $-CH(CO_2\text{alquilo } C1-4 \text{ o } C(O)N(H \text{ o } \text{alquilo } C1-4)_2)-N(H \text{ o } \text{alquilo } C1-4 \text{ opcionalmente sustituido})$, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

30. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde $-(L2)m'$ es $-O-(C(R1')(R2'))_2-3-$, $-O-(CH_2)_2-3-$, $-N(Rk')-(C(R1')(R2'))_2-3-$, $-N(H \text{ o } \text{alquilo } C1-4)-(CH_2)_2-3-$, $-S-(C(R1')(R2'))_2-3-$, $-SO_2-(C(R1')(R2'))_2-3-$, $-SO_2-N(Rk')-(C(R1')(R2'))_2-$ o

-(C(R1')(R2'))₃-, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


31. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-30, en donde m' es 3; o 4; o 5, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

32. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-31, en donde n' es 2; 3; o 4, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

33. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-32, en donde p' es 0, 1, o 2, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

34. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-33, en donde q' es 0; 1; o 2, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

35. Un compuesto de la Fórmula (IV):



en donde:

M es CH o N;

X1 y X1' son, de manera independiente, -C(R1a)(R2a)-, -S-,
-S(O)-, -S(O)₂-, -O- o -N(Rk')-;

cada R1a y R2a es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, -C(O)ORa', -C(O)NRa'Rb', -NRa'Rb', -SRa', -S(O)Ra', -S(O)NRa', -S(O)2Ra', -S(O)2NRa' o -ORa' en donde cada átomo de hidrógeno en alquilo C1-6, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, -OH, -Oalquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, NHC(O)alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O)alquilo C1-4, -NHC(O)NHalquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O)NHalquilo C1-4, NHC(O)N(alquilo C1-4)2, -N(alquilo C1-4)C(O)N(alquilo C1-4)2, -NHC(O)Oalquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O)Oalquilo C1-4, -CO2H, -CO2alquiloC1-4, -CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, -Salquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -S(O)2alquilo C1-4, -S(O)NH(alquilo C1-4), -S(O)2NH(alquilo C1-4), -S(O)N(alquilo C1-4)2, -S(O)2N(alquilo C1-4)2, cicloalquilo C3-6, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R3a y R3b son cada uno de manera independiente H, deuterio, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, o -CF3;

R7a es H, alquilo C1-6 o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en alquilo C1-6 o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, -CN, -OH, -Oalquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -CO2H, -CO2alquilo C1-4, -CONH2, -CONH(alquilo C1-4),

-CON(alquilo C1-4)₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico;

cada Rk' es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico; en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico en Rk', de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o -ORa';


en donde cada Ra' y Rb' es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo;

cada Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 o Z7 es, de manera independiente, N, NH, o C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -OH, -NH₂, -NH(alquilo C1-4), -NH(fenilo), -NH(heteroarilo), CN, o -CF₃, con la condición que al menos uno de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 o Z7 sea N o NH; y

m' es 2 o 3;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

36. Un compuesto de la Fórmula (V):



en donde:

M es CH o N;

X1 y X1' son, de manera independiente, -C(R1a)(R2a)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -O- o -N(Rk')-;

cada R1a y R2a es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, -C(O)ORa', -C(O)NRA'Rb', -NRA'Rb', -SRA', -S(O)Ra', -S(O)NRA', -S(O)2Ra', -S(O)2NRA' o -ORa' en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, -OH, -O alquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, NHC(O) alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O) alquilo C1-4, -NHC(O)NHalquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O)NHalquilo C1-4, NHC(O)N(alquilo C1-4)2, -N(alquilo C1-4)C(O)N(alquilo C1-4)2, -NHC(O)Oalquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O)Oalquilo C1-4, -CO2H, -CO2alquilo C1-4, -CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, -Salquilo C1-4, -S(O) alquilo C1-4, -S(O)2alquilo C1-4, -S(O)NH(alquilo C1-4),

-S(0)2NH(alquilo C1-4), -S(0)N(alquilo C1-4)2, -S(0)2N(alquilo C1-4)2, cicloalquilo C3-6, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R3a y R3b son cada uno de manera independiente H, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, o -CF₃;

R7a es H, alquilo C1-6 o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6 o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por halógeno, -OH, -Oalquilo C1-4, -NH₂, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)₂, -CO₂H, -CO₂ alquilo C1-4, -CONH₂, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico;

cada Rk' es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico; en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico en Rk', de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 u -ORa';







en donde cada Ra' y Rb' es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo;


cada Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 o Z7 es, de manera independiente, N, NH, o C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -OH, -NH₂, -NH(alquilo C1-4), -NH(fenilo), -NH(heteroarilo), CN, o -CF₃, con la condición de que al menos uno de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 o Z7 sea N o NH; y

m' es 2 o 3;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

37. Un compuesto seleccionado del grupo que consta de:





en donde

M es CH o N;

X1 y X1' son, de manera independiente, -C(R1a)(R2a)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -O- o -N(Rk')-;

cada R1a y R2a es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, -C(O)ORa', -C(O)NRa'Rb', -NRa'Rb', -SRa', -S(O)Ra', -S(O)NRa', -S(O)2Ra', -S(O)2NRa' o -ORa' en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, -OH, -Oalquilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, NHC(O) alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O) alquilo C1-4, -NHC(O)NHalquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O)NHalquilo C1-4, -NHC(O)N(alquilo C1-4)2, -

N(alquilo C1-4)C(O)N(alquilo C1-4)₂ , -NHC(O)Oalquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)C(O)Oalquilo C1-4, -CO₂H, -CO₂alquilo C1-4, -CONH₂, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)₂, -Salquilo C1-4, -S(O) alquilo C1-4, -S(O)₂alquilo C1-4, -S(O)NH(alquilo C1-4), -S(O)₂NH(alquilo C1-4), -S(O)N(alquilo C1-4)₂, -S(O)₂N(alquilo C1-4)₂, cicloalquilo C3-6, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R3a y R3b son cada uno de manera independiente H, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, -CN, o -CF₃;

R7a es H, alquilo C1-6 o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6 o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, de manera independiente, se sustituye opcionalmente por halógeno, -OH, -Oalquilo C1-4, -NH₂, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)₂, -CO₂H, -CO₂alquilo C1-4, -CONH₂, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)₂, cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico;

cada Rk' es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico; en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alqueno C2-6, alquino C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico en Rk', de manera independiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o -ORa';

en donde cada Ra' y Rb' es, de manera independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo;

cada Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 o Z7 es, de manera independiente, N, NH, o C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es, de manera independiente, H, deuterio, halógeno, alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -OH, -NH₂, -NH(alquilo C1-4), -NH(fenilo), -NH(heteroarilo), CN, o -CF₃, con la condición de que al menos uno de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 o Z7 sea N o NH; y

m' es 2 o 3;

o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

38. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 35-37, en donde Z1, Z4 y Z7 son N, y Z2, Z3, Z5 y Z6 son C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es H, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

39. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 35-37, en donde M es CH, Z1, Z4 y Z7 son N, y Z2, Z3, Z5 y Z6 son C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es H, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

40. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 35-37, en donde M es CH, Z1, Z4 y Z7 son N, Z2, Z3, Z5 y Z6 son C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es H, y X1 es -N(Rk')-, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

41. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 35-37, en donde M es CH, Z1, Z4 y Z7 son N, Z2, Z3, Z5 y Z6 son C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es H, X1 es -N(Rk')-, y X1' es -O-, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

42. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 35-37, en donde M es CH, Z1, Z4 y Z7 son N, Z2, Z3, Z5 y Z6 son C(Rx), en donde cada Rx cuando se halla presente es H, X1 es -C(R1a)(R2a)-, y X1' es -O-, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

43. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 35-42, en donde Rk' se selecciona del grupo que consta de H, metilo, etilo, propilo, iso-propilo, ciclopropilo, 2-hidroxietilo, 2-hidroximetilpropilo, y N-metil-pirrol-3-ilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

44. El compuesto de las reivindicaciones 35-43, en donde Rk' es H o metilo, o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

45. El compuesto de la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consta de:

(13R)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;
5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

(13R)-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-
4(5H)-ona;

11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

(13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-
4(5H)-ona;

12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-
4(5H)-ona;

(13R)-12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietil)-13-metil-6,7-
dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]
benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

12-cloro-11-fluoro-5-(2-hidroxietil)-13-metil-6,7-dihidro-13H-
1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]
benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 2-[(13R)-12-cloro-11-
fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-5(4H)-il]acetamida; 2-
[12-cloro-11-fluoro-13-metil-4-oxo-6,7-dihidro-13H-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-
5(4H)-il]acetamida; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-
(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-
f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona;

12-cloro-11-fluoro-13-metil-5-(pirrolidin-2-ilmetil)-6,7-
dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]

benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-7-(hidroximetil)-5,13-dimetil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13S)-11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(fluorometil)-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-5-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-6-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-7-metil-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-

4(5H)-ona; (8R)-9-cloro-10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8] benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8] benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; (7R)-8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol [3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-7-metil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; (5R)-3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclotridecin-12(13H)-ona; 3-fluoro-5-metil-14,15-dihidro-5H,10H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,10,3,7]dioxadiazaciclotridecin-12(13H)-ona; (5R)-3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriazaciclotridecin-12(10H)-ona; 3-fluoro-5,16-dimetil-13,14,15,16-tetrahidro-5H-9,7-(azenometeno)pirido[2,3-k]pirrol[3,4-d][1,3,7,10]oxatriazaciclotridecin-12(10H)-ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-5,13-dimetil-6,7-dihidro-2H,13H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-4(5H)-ona; (7R)-8-cloro-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-

fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-
 (azenometeno)pirazol[3,4-f][1,10,4]benzodioxazaciclotridecin-
 16(13H)-ona; 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
 ona; (13R)-12-cloro-11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]
 benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13,14-
 dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-
 fluoro-5,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-15,1-
 (azenometeno)pirazol[4,3-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-
 4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-
 15,1-(azenometeno)pirazol[4,3-f][1,4,8,10]
 benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-14-
 metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol[3,2-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-
 fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-(azenometeno)pirrol
 [3,2-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 9-cloro-10-
 fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-etenoimidazo[5,1-
 f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-
 cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-
 (azenometeno)imidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraaza
 ciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-
 tetrahidro-6,3-(azenometeno)imidazo[5,1-f][1,4,7,10]
 benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-
 metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-(azenometeno)pirrol[2,1-

f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-(azenometeno)imidazo[2,1-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-eteno[1,2,4]triazol[3,4-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclotridecin-17(14H)-ona; 9-cloro-10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-6,3-(azenometeno)[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,4,7,10]benzoxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-16(13H)-ona; 8-cloro-9-fluoro-6-metil-6,7,14,15-tetrahidro-2H-3,5-(azenometeno)pirazol[3,4-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-5,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-2H-1,15-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,4,10]benzoxadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; (8R)-10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; 10-fluoro-8,16-dimetil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclotridecin-17(14H)-ona; (7R)-9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclotridecin-16(13H)-ona; y 9-fluoro-7,15-dimetil-14,15-dihidro-2H,7H-3,5-(azenometeno)pirrol[3,4-f][1,10,4,8]benzodioxadiazaciclo

tridecin-16(13H)-ona; o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

46. El compuesto de la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consta de 12-cloro-11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-3,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 10-fluoro-8-metil-15,16-dihidro-8H-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,10,4,7,8]benzodioxatriazaciclo tridecin-17(14H)-ona; 10-fluoro-7-metil-7,8,15,16-tetrahidro-3,6-etenoimidazo[5,1-f][1,4,7,8,10]benzoxatetraazaciclo tridecin-17(14H)-ona; 14-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-propil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-(2-hidroxietil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxa

triazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; (13R)-11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; 12-cloro-11-fluoro-13-metil-6,7,13,14-
 -tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-14-metil-4-oxo-
 4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-carboxamida; 11-
 fluoro-7-(hidroximetil)-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
 ona; 11-fluoro-13-metil-4-oxo-4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecina-7-
 carboxamida; 11-fluoro-7-(hidroximetil)-13-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-
 hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecina-7-carboxamida; 11-fluoro-7-(hidroximetil)-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxa
 triazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-4-oxo-4,5,6,7,13,14-
 hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclo
 tridecina-13-carboxilato de metilo; 11-fluoro-4-oxo-
 4,5,6,7,13,14-hexahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]
 benzoxatriazaciclotridecina-13-carboxamida; 11-fluoro-14-metil-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-
 l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-

metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f]pirido[3,2-l][1,4,8,10]oxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13-ciclopropil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-13-(propan-2-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,10,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona 14,14-dioxido; 6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-f][10,1,4,8]benzoxatiadiazaciclotridecin-4(5H)-ona; 14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriaza ciclotridecin-4(5H)-ona; 13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 13,13-dióxido de 11-fluoro-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatiatriazaciclotridecin-4(14H)-ona; 13,13-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7-dihidro-5H-1,15-etenopirazol[3,4-e][11,1,2,4,8]benzoxatiatriazaciclotridecin-4(14H)-ona; 12-fluoro-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza ciclotetradecin-4-ona; 12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-

hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza
 ciclotetradecin-4-ona; (14R)-12-fluoro-14-metil-5,6,7,8,14,15-
 hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriaza
 ciclotetradecin-4-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-
 hexahidro-8H-1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,10]benzotriazaciclo
 tridecin-8-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-
 1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzoxatriazaciclotridecin-
 8(5H)-ona; 11-fluoro-7,14-dimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-
 1,15-etenopirazol[3,4-e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-
 ona; 11-fluoro-4,7,14-trimetil-4,5,6,7,13,14-hexahidro-8H-1,15-
 etenopirazol[3,4-e][2,4,7,10]benzotetraazaciclotridecin-8-ona;
 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzotriazaciclotridecin-8(5H)-
 ona; 4,4-dióxido de 11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[3,4-e][7,2,4,10]benzotriazaza
 ciclotridecin-8(5H)-ona; y 4,4-dióxido de 12-fluoro-8,15-
 dimetil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-9H-1,16-etenopirazol[3,4-
 e][7,2,4,8,11]benzotiatetraazaciclotetradecin-9-ona; o una de
 sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


47. El compuesto de la reivindicación 1 seleccionado del grupo
 que consta de 11-cloro-13-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
 ona; 13-etil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
 ona; 13-ciclobutil-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-

ona; 11-fluoro-14-metil(6,6,7,7-2H₄)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
ona; 11-fluoro-13-fenil6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
ona; 13-(ciclopropilmetil)-11-fluoro-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
ona; (7R,14R)-12-fluoro-7-hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-
hexahidro-4H-1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]
benzoxatriazaciclotetradecin-4-ona; (7S,14R)-12-fluoro-7-
hidroxi-14-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-1,16-
etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriazaciclotetradecin-4-
ona; (7R,13R)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
ona; (7S,13R)-11-fluoro-7,13-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-
ona; (7R)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14 -tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza ciclotridecin-4(5H)-
ona; (6R)-11-fluoro-6,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxa triazaciclotridecin-4(5H)-
ona; 12-fluoro-7-hidroxi-15-metil-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-
1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriazaciclotetradecin-
4-ona; (7S)-11-fluoro-7,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol [4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
ona; 11-fluoro-13-(hidroximetil)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
ona; 12-fluoro-14-(hidroximetil)-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-

1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9,11]benzoxatriazaciclo
 tetradecin-4-ona; 11-fluoro-13,14-dimetil-6,7,13,14-tetrahidro
 -1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-
 4(5H)-ona; 11-fluoro-14-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; 12-fluoro-5,6,7,8,14,15-hexahidro-4H-
 1,16-etenopirazol[4,3-g][1,5,9]benzoxadiazaciclotetradecin-4-
 ona; 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol
 [4,3-f][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-4(5H)-ona; 11-
 fluoro-14-(1-metilpirrolidin-3-il)-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
 ona; 8-óxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol [4,3-f][1,4,8,10]benzotriazaciclotridecin-
 4(5H)-ona; 8,8-dióxido de 11-fluoro-14-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzotriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; (7S)-11-fluoro-7-metil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8]benzoxadiazaciclo
 tridecin-4(5H)-ona; (6S,13R)-11-fluoro-6,13-dimetil-6,7,13,14-
 tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriaza
 ciclotridecin-4(5H)-ona; (6R,13R)-11-fluoro-6,13-dimetil-
 6,7,13,14-tetrahidro-1,15-etenopirazol[4,3-
 f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-ona; (7S,13S)-11-
 fluoro-13-(hidroximetil)-7-metil-6,7,13,14-tetrahidro-1,15-
 etenopirazol[4,3-f][1,4,8,10]benzoxatriazaciclotridecin-4(5H)-
 ona; y 11-fluoro-6,7-dihidro-13H-1,15-etenopirazol[4,3-

f][1,10,4,8]benzoxatiazaciclotridecin-4(5*H*)-ona; o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


48. El compuesto de la reivindicación 1 que posee la fórmula:



o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.


49. Una forma cristalina de la base libre del compuesto de la reivindicación 48, que posee un patrón de difracción de rayos X sustancialmente igual que la Fig. 1.

50. El compuesto de la reivindicación 1, que posee la fórmula:




o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

51. El compuesto de la reivindicación 1 que posee la fórmula:




o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

52. El compuesto de la reivindicación 1 que posee la fórmula




o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

53. El compuesto de la reivindicación 1 que posee la fórmula



o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

54. El compuesto de la reivindicación 1 que posee la fórmula



o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

55. Una composición farmacéutica que comprende (a) al menos un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-54 o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico , y (b) un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

56. Un método para tratar cáncer, dolor, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, e inflamación, que comprende administrar a un individuo que necesite dicho tratamiento una cantidad efectiva de al menos un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-54 o una de sus sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico.