


REIVINDICACIONES:

1. Un compuesto de la Fórmula I



o un sal farmacéuticamente aceptable del mismo
en donde:

R¹ y R² son cada uno de manera independiente -C₁₋₆alquilo, opcionalmente mono-, di- o tri-sustituido con halógeno, o

R¹ y R² se unen conjuntamente para formar -C₃₋₆cicloalquilo, opcionalmente mono- o di-sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -C₁₋₆alquilo y -CF₃;

R³ se selecciona del grupo que consiste de:

- (a)
- (b) arilo,
- (c) heteroarilo,
- (d)
- (e)

en donde el arilo de la opción (b) y el heteroarilo de la opción (c) están mono- o di-sustituidos opcionalmente con sustituyentes seleccionados independientemente de -N(H)R⁸, -C₁₋₆alquilo, -C₁₋₆alquilo-C(=O)OH, C₁₋₆alcoxi, halo-C₁₋₆alquilo, halo-

C₁₋₆alcoxi, y

R⁴ se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) arilo,
- (b) heteroarilo,
- (c) -C₁₋₂alquilo-arilo, y
- (d) -C₁₋₂alquilo-heteroarilo,

en donde el arilo de las opciones (a) y (c), y el heteroarilo de las opciones (b) y (d), están mono- o di-sustituidos opcionalmente con sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, -C₁₋₆alquilo, -CF₃, -OCF₃ C₁₋₆alcoxi, -C₃-

₆cicloalcoxi, halo-C₁₋₆alquilo, arilo, heteroarilo, heterociclo, -C₃₋₆cicloalquilo, y -C₃₋₆cicloalquenilo;

R⁵ y R⁶ se seleccionan cada uno de manera independiente del grupo que consiste de:

- (a) hidrógeno,
- (b) -C₁₋₆alquilo,
- (c) arilo, y
- (d) heteroarilo,

en donde el arilo de la opción (c) y heteroarilo de la opción (d) están mono- o di-sustituídos opcionalmente con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -C₁₋₆alquilo y -CF₃ o

R⁵ y R⁶ se unen conjuntamente para formar un -C₃₋₆cicloalquilo opcionalmente mono- o di-sustituído con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -C₁₋₆alquilo y -CF₃;

R⁷ se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) hidroxilo,
- (b) -N(H)S(=O)₂arilo,
- (c) -N(H)S(=O)₂heteroarilo,
- (d) -N(H)S(=O)₂-C₃₋₆cicloalquilo,
- (e) -N(H)S(=O)₂-C₁₋₆alquilo,
- (f) -N(H)-arilo,
- (g) -N(H)-heteroarilo,
- (h) -N(H)-C₃₋₆cicloalquilo,
- (i) -N(H)-C₁₋₆alquilo, y
- (j) -CF₃,

en donde el arilo de las opciones (b) y (f), el heteroarilo de las opciones (c) y (g), la porción alquilo de las opciones (e) y (i), y la porción cicloalquilo de las opciones (d) y (h), están mono- o di-sustituídos opcionalmente con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -C₁₋₆alquilo, -CF₃, -C₃₋₆cicloalquilo, C₁₋₆alcoxi, C₃₋₆cicloalcoxi, arilo, heteroarilo, e hidroxilo; y

R⁸ se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) hidrógeno,
- (b) -S(=O)₂arilo,
- (c) -S(=O)₂heteroarilo,
- (d) -C(=O)arilo,
- (e) -C(=O)heteroarilo,
- (f) -S(=O)₂-C₁₋₆alquilo,

(g) $-S(=O)_2-C_{3-6}$ cicloalquilo,

(h) $-C(=O)-C_{1-6}$ alquilo, y

(i) $-C(=O)-C_{3-6}$ cicloalquilo,

en donde el arilo de las opciones (b) y (d), y el heteroarilo de las opciones (c) y (e), la porción alquilo de las opciones (f) y (h), y la porción cicloalquilo de las opciones (g) y (i), están mono- o di-sustituídos opcionalmente con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo, $-CF_3$, $-C_{3-6}$ cicloalquilo, C_{1-6} alcoxi, C_{3-6} cicloalcoxi, arilo, heteroarilo, e hidroxilo.

2. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R^1 y R^2 son cada uno de manera independiente metilo, opcionalmente mono-, di- o tri-sustituído con halógeno o

R^1 y R^2 se unen conjuntamente para formar $-C_{3-6}$ cicloalquilo, opcionalmente mono o di-sustituído con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo y $-CF_3$.

3. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 2 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 y R^2 son cada uno de manera independiente metilo, opcionalmente mono-, di- o tri-sustituído con halógeno.

4. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 de la fórmula Ia:



Ia

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:

R^4 se selecciona del grupo que consiste de:

(a) -fenilo,

(b) -piridilo,

(c) $-CH_2$ -fenilo, y

(d) $-CH_2$ -piridilo,

en donde la porción fenilo de las opciones (a) y (c), y la porción piridilo de las opciones (b) y (d), están mono- o di-sustituídas opcionalmente con sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-C_{1-6}$ alcoxi, $-C_{3-6}$ cicloalquilo, C_{3-6} cicloalcoxi, y halo- C_{1-6} alquilo.

6. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^5 y R^6 se unen conjuntamente para formar un $-C_{3-6}$ cicloalquilo.

7. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^7 se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) hidroxilo,
- (b) $-N(H)S(=O)_2$ arilo,
- (c) $-N(H)S(=O)_2$ heteroarilo,
- (d) $-N(H)S(=O)_2-C_{3-6}$ cicloalquilo, y
- (e) $-N(H)S(=O)_2-C_{1-6}$ alquilo,

en donde la porción arilo de la opción (b), la porción heteroarilo de la opción (c), la porción cicloalquilo de la opción (d) y la porción alquilo de la opción (e) están mono- o di-sustituidas opcionalmente con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo, $-CF_3$, $-C_{3-6}$ cicloalquilo, C_{1-6} alcoxi, C_{3-6} cicloalcoxi, arilo, heteroarilo, e hidroxilo.

8. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^7 es hidroxilo.


9. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^8 se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) hidrógeno,
- (b) $-S(=O)_2$ arilo,
- (c) $-S(=O)_2$ heteroarilo,
- (d) $-C(=O)$ arilo, y
- (e) $-C(=O)$ heteroarilo,

en donde el arilo de las opciones (b) y (d), y el heteroarilo de las opciones (c) y (e), están mono- o di-sustituidos opcionalmente con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo, $-CF_3$, $-C_{3-6}$ cicloalquilo, C_{1-6} alcoxi, C_{3-6} cicloalcoxi, arilo, heteroarilo, e hidroxilo.

10. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 de la fórmula Ia:



Ia

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 y R^2 son cada uno de manera independiente metilo, opcionalmente mono-, di- o tri-sustituido con halógeno, o

R^1 y R^2 se unen conjuntamente para formar $-C_{3-6}$ cicloalquilo, opcionalmente mono o di-sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo y $-CF_3$;

R^4 se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) -fenil,
- (b) -piridilo,
- (c) $-CH_2$ -fenil, y
- (d) $-CH_2$ -piridilo,

en donde la porción fenilo de las opciones (a) y (c), y la porción piridilo de las opciones (b) y (d), están mono- o di-sustituidas opcionalmente con sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo, $-CF_3$, $-OCF_3$, C_{1-6} alcoxi, $-C_{3-6}$ cicloalquilo, C_{3-6} cicloalcoxi, y halo- C_{1-6} alquilo;

R^5 y R^6 se unen conjuntamente para formar un $-C_{3-6}$ cicloalquilo; y

R^7 se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) hidroxilo,
- (b) $-N(H)S(=O)_2$ arilo,
- (c) $-N(H)S(=O)_2$ heteroarilo,
- (d) $-N(H)S(=O)_2-C_{3-6}$ cicloalquilo, y
- (e) $-N(H)S(=O)_2-C_{1-6}$ alquilo,

en donde la porción arilo de la opción (b), la porción heteroarilo de la opción (c), la porción cicloalquilo de la opción (d) y la porción alquilo de la opción (e) están mono- o di-sustituidas opcionalmente con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo, $-CF_3$, $-C_{3-6}$ cicloalquilo, $-C_{1-6}$ alcoxi, C_{3-6} cicloalcoxi, arilo, heteroarilo, e hidroxilo.

11. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^7 es hidroxilo.

12. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste de

ácido 2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(fenilsulfonil)propanamida,

N-bencil-2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-

1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanamida,
 2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(piridin-2-ilmetil)propanamida,
 2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(piridin-4-ilmetil)propanamida,
 2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-*N*-(ciclohexilmetil)-2-metilpropanamida,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)bencil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)bencil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)fenil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-isopropilbencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-bromobencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-((2',3',4',5'-tetrahidro-[1,1'-bifenil]-4-il)metil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-ciclopropilbencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-ciclohexilbencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(3-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(5-(trifluoro-metil)piridin-2-il)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(fenilsulfonil)propanamida,

ácido 2-(4-(3-(3-(4-(*ter*-butil)bencil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)-fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,

2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-*N*-(fenilsulfonil)propanamida,

N-ciclopropil-2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanamida,

2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)propanamida,

ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,

N-ciclopropil-2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanamida,

2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)propanamida,

ácido 2-(4-(3-(3-(3,4-dimetilfenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

N-ciclopropil-2-(4-(3-(3-(3,4-dimetilfenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanamida,

2-(4-(3-(3-(3,4-dimetilfenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)propanamida,

ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)bencil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,

ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(3-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,

ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(3-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,

ácido 2-metil-2-(4-(3-(3-(naftalen-2-il)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,

ácido 2-(4-(3-(3-([1,1'-bifenil]-3-il)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

ácido 2-metil-2-(4-(3-(3-(4-metil-3-(trifluorometil)fenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,

ácido 2-(4-(3-(3-(3-(*ter*-butil)fenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-

en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(5-oxo-4,4-dipropil-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)propanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(5-oxo-4,4-dipropil-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)propanóico,
 4,4-dimetil-3-(3-(4-((4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-2-metilbutan-2-il)oxi)fenil)propil)-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1*H*-pirazol-5(4*H*)-ona,
 4,4-dimetil-3-(3-(4-((4,4,4-trifluoro-2-metil-3-oxobutan-2-il)oxi)fenil)propil)-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1*H*-pirazol-5(4*H*)-ona,
 4-(3-(4-((1-amino-2-metilpropan-2-il)oxi)fenil)propil)-2-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-3-en-1-ona,
N-(2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propil)bencenosulfonamida,
N-(2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propil)benzamida,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilacético,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)acético,
 ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclobutanocarbóxico,
 ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclobutanocarbóxico,
 ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclopentanocarboxílico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilpropanóico,
 ácido 2-(4'-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)-4-etoxi-[1,1'-bifenil]-3-il)acético,
 ácido 2-(4'-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)-4-etoxi-[1,1'-bifenil]-3-il)acético,
 3-(3-(4'-(3-fluorooxetan-3-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)propil)-4,4-dimetil-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1*H*-pirazol-5(4*H*)-ona,
N-(6-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenil)piridin-3-il)bencenosulfonamida, y

N-(6-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenil)-3-metoxipiridin-2-il)bencenosulfonamida, o una sal de los mismos farmacéuticamente aceptable.

13. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal de la misma farmacéuticamente aceptable, y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.

14. Un método de tratamiento de un cáncer en un mamífero, en donde el cáncer se impacta negativamente por la disminución en su metabolismo de oxidación de ácidos grasos, el cual comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, al mamífero en necesidad del mismo.

15. El método de acuerdo a la reivindicación 14, en donde el cáncer se selecciona de cáncer de próstata, mama, ovario, hígado, riñón, colon, pancreático, leucemia linfocítica crónica humana, y melanoma.

16. Un método de tratamiento de cáncer en un mamífero, el cual comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, al mamífero con necesidad del mismo.

17. El método de acuerdo a la reivindicación 16, en donde el cáncer es de próstata, mama, ovario, hígado, riñón, colon, pancreático, leucemia linfocítica crónica humana, o melanoma.

18. Un método de tratamiento de infección viral en un mamífero, el cual comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, al mamífero con necesidad del mismo.

19. El método de tratamiento de infección viral de la reivindicación 18, en donde la infección viral es infección de virus de hepatitis C (VHC) o infección de virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

20. Un método de tratamiento de un trastorno metabólico en un mamífero, el cual comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, al mamífero con necesidad del mismo.

21. Un método de prevención del comienzo de y/o reaparición de cáncer en un mamífero a través de la administración de una cantidad

terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, al mamífero con necesidad del mismo.

22. El método de la reivindicación 21, en donde el cáncer es una leucemia.

23. El método de la reivindicación 22 en donde el cáncer es leucemia mieloide crónica o aguda.

24. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o la composición farmacéutica de la reivindicación 13, para uso en el tratamiento de cáncer en un mamífero, en donde el cáncer se impacta negativamente por la disminución en su metabolismo de oxidación de ácidos grasos, el uso que comprende administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o la composición farmacéutica de la reivindicación 13, al mamífero.

25. El uso de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para la preparación de un medicamento para el uso en el tratamiento de cáncer, que comprende los pasos de identificación de un mamífero en la necesidad de una terapia de cáncer; en donde el cáncer se impacta negativamente por la disminución en su metabolismo de oxidación de ácidos grasos, el uso que comprende administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, al mamífero.