


REIVINDICACIONES

(modificadas para forma)

1. Un compuesto peptídico de la fórmula:



en la que:

R^1 y R^2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; $-OR^x$, $-NO_2$, $-N_3$, $-CN$, $-SCN$, $-SR^x$, $-C(O)R^x$, $-CO_2(R^x)$, $-C(O)N(R^x)_2$, $-C(NR^x)N(R^x)_2$, $-OC(O)R^x$, $-OCO_2R^x$, $-OC(O)N(R^x)_2$, $-N(R^x)_2$, $-SOR^x$, $-S(O)_2R^x$, $-NR^xC(O)R^x$, $-NR^xC(O)N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)OR^x$, $-NR^xC(NR^x)N(R^x)_2$ y $-C(R^x)_3$, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, acilo, alifático sustituido o no sustituido,

heteroalifático sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo sustituido o no sustituido,

R^5 y R^6 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en $-Q-Ar$ e hidrógeno, en el que Q se selecciona independientemente del grupo que consiste en alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; y un enlace, y en el que Ar se selecciona del grupo que consiste en arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido o R^5 y R^6 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido y arilo sustituido o no sustituido, o R^7 y R^8 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^{16} y R^{17} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido por uno o

más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo e hidroxilo, alqueniloC₂₋₆, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo e hidroxilo; alquiniloC₂₋₆, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo e hidroxilo; cicloalquiloC₃₋₆, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en alquiloC₁₋₆, halógeno, oxo e hidroxilo; fenilo, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en alquiloC₁₋₆, alcoxiC₁₋₆, halógeno e hidroxilo; -C(O)R^x, -CO₂(R^x), -C(O)N(R^x)₂, -C(NR^x)N(R^x)₂ y -C(R^x)₃, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquiloC₁₋₆, alqueniloC₂₋₆, alquiniloC₂₋₆, cicloalquiloC₃₋₆ y fenilo, o R¹⁶ y R¹⁷, junto con N, forman un anillo heterocíclico de 4-6 miembros, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en alquiloC₁₋₆, halógeno, oxo e hidroxilo,

L se selecciona del grupo que consiste en alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico;

heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido, y

sales, estereoisómeros, metabolitos e hidratos farmacéuticamente aceptables de estos.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que L es -O-(alquiloC₁-C₂₀)-O-.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en el que L es -O-[(alquiloC₁-C₆)-O]_n-, en el que n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

4. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 1-3, en el que al menos uno de R¹ y R² es hidroxilo.

5. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 1-4, en el que al menos uno de R¹ y R² es alquiloC₁-C₆.


6. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 1-5, en el que al menos uno de R⁵ y R⁶ es -alquiloC₁-C₆-Ar.

7. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 1-6, en el que al menos uno de R⁵ y R⁶ es -(CH₂)-Ar.

8. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 1-7, en el que al menos uno de R^5 y R^6 es -Q-fenilo.


9. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 1-8, en el que almenos uno de R^5 y R^6 es hidrógeno.

10. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:




en el que n es un entero de 0-9.

11. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:




en el que n es un entero de 1-5.


12. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:



13. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:



14. Un compuesto peptídico de la fórmula:



en la que:

R^1 , R^2 , R^3 y R^4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; $-OR^x$, $-NO_2$, $-N_3$, $-CN$, $-SCN$, $-SR^x$, $-C(O)R^x$, $-CO_2(R^x)$, $-C(O)N(R^x)_2$, $-C(NR^x)N(R^x)_2$, $-OC(O)R^x$, $-OCO_2R^x$, $-OC(O)N(R^x)_2$, $-N(R^x)_2$, $-SOR^x$, $-S(O)_2R^x$, $-NR^xC(O)R^x$, $-NR^xC(O)N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)OR^x$, $-NR^xC(NR^x)N(R^x)_2$ y $-C(R^x)_3$, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, acilo, alifático sustituido o no sustituido, heteroalifático sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo sustituido o no sustituido,

R^5 y R^6 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en $-Q-Ar$ e hidrógeno, en el que Q se selecciona independientemente del grupo que consiste en alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; y un enlace, y en el que Ar se selecciona del grupo que consiste en arilo sustituido o no

sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido o R^5 y R^6 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido y arilo sustituido o no sustituido, o R^7 y R^8 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^9 y R^{10} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; $-OR^x$, $-NO_2$, $-N_3$, $-CN$, $-SCN$, $-SR^x$, $-C(O)R^x$, $-CO_2(R^x)$, $-C(O)N(R^x)_2$, $-C(NR^x)N(R^x)_2$, $-OC(O)R^x$, $-OCO_2R^x$, $-OC(O)N(R^x)_2$, $-N(R^x)_2$, $-SOR^x$, $-S(O)_2R^x$, $-NR^xC(O)R^x$, $-NR^xC(O)N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)OR^x$, $-NR^xC(NR^x)N(R^x)_2$ y $-C(R^x)_3$, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, acilo, alifático sustituido o no sustituido, heteroalifático sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no

sustituido, y heteroarilo sustituido o no sustituido, o R^9 y R^{10} , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo de 4-6 miembros sustituido o no sustituido y

sales, estereoisómeros, metabolitos e hidratos farmacéuticamente aceptables de estos.

15. El compuesto de la reivindicación 14, en el que R^9 es hidrógeno.

16. El compuesto de la reivindicación 14 o 15, en el que R^{10} es hidrógeno.

17. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 14-16, en el que al menos uno de R^1 , R^2 , R^3 y R^4 es hidroxilo.

18. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 14-17, en el que al menos uno de R^1 , R^2 , R^3 y R^4 es alquilo C_1-C_6 .

19. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 14-18, en el que al menos uno de R^5 y R^6 es -alquilo C_1-C_6 -Ar.

20. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 14-19, en el que al menos uno de R^5 y R^6 es $-(CH_2)-Ar$.


21. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 14-20, en el que al menos uno de R^5 y R^6 es -Q-fenilo.

22. El compuesto de cualquierade las reivindicaciones 14-21, en el que al menos uno de R^5 y R^6 es hidrógeno.


23. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-22, en que R^9 y R^{10} , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo de 4-6 miembros sustituido o no sustituido.

24. El compuesto de la reivindicación 23, donde R^9 y R^{10} , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo de 4 miembros.


25. El compuesto de la reivindicación 14 representado por:




26. El compuesto de la reivindicación 14 representado por:




27. El compuesto de la reivindicación 14 representado por:



28. El compuesto de la reivindicación 14 representado por:



29. Un compuesto peptídico de la fórmula:



en la que:

R^1 , R^2 y R^3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; $-OR^x$, $-NO_2$, $-N_3$, $-CN$, $-SCN$, $-SR^x$, $-C(O)R^x$, $-CO_2(R^x)$, $-C(O)N(R^x)_2$, $-C(NR^x)N(R^x)_2$, $-OC(O)R^x$, $-OCO_2R^x$, $-OC(O)N(R^x)_2$, $-N(R^x)_2$, $-SOR^x$, $-S(O)_2R^x$, $-NR^xC(O)R^x$, $-NR^xC(O)N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)OR^x$, $-NR^xC(NR^x)N(R^x)_2$ y $-C(R^x)_3$, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, acilo, alifático sustituido o no sustituido, heteroalifático sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo sustituido o no sustituido,

R^5 y R^6 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en $-Q-Ar$ e hidrógeno, en el que Q se selecciona independientemente del grupo que consiste en alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico, heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico, y un enlace, y en el que Ar se selecciona del grupo que consiste en arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido o R^5 y R^6 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido y arilo sustituido o no sustituido, o R^7 y R^8 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^{16} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_6 , sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo e hidroxilo; alqueni C_{2-6} , sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado

independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo e hidroxilo; alquíniloC₂₋₆, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo e hidroxilo; cicloalquiloC₃₋₆, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en alquiloC₁₋₆, halógeno, oxo e hidroxilo; fenilo, sustituido o no sustituido por uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en alquiloC₁₋₆, alcoxiC₁₋₆, halógeno e hidroxilo; -C(O)R^x, -CO₂(R^x), -C(O)N(R^x)₂, -C(NR^x)N(R^x)₂ y -C(R^x)₃, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquiloC₁₋₆, alquéniloC₂₋₆, alquíniloC₂₋₆, cicloalquiloC₃₋₆ y fenilo,

L se selecciona del grupo que consiste en alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido, y

sales, estereoisómeros, metabolitos e hidratos farmacéuticamente aceptables de estos.


31. El compuesto de la reivindicación 29, en el que L es -O-
[(alquiloC₁-C₆)-O]n-, en el que n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

33. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 29-32, en el que al menos uno de R^1 y R^2 es alquilo C_1 - C_6 .

34. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 29-33, en el que R⁵ y R⁶ son hidrógeno.


35. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 29-34, en el que R^7 y R^8 son hidrógeno.

36. El compuesto de la reivindicación 29 representado por:




en el que n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

37. El compuesto de la reivindicación 29 representado por:




38. El compuesto de la reivindicación 29 representado por:




en el que:

A¹ es -(alquiloC₁-C₆)-arilo-.


39. El compuesto de la reivindicación 38 representado por:



40. El compuesto de la reivindicación 38 representado por:



41. Un compuesto peptídico de la fórmula:



en la que:

R^1 , R^2 , R^3 y R^4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alifático ramificado o no

ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; $-OR^x$, $-NO_2$, $-N_3$, $-CN$, $-SCN$, $-SR^x$, $-C(O)R^x$, $-CO_2(R^x)$, $-C(O)N(R^x)_2$, $-C(NR^x)N(R^x)_2$, $-OC(O)R^x$, $-OCO_2R^x$, $-OC(O)N(R^x)_2$, $-N(R^x)_2$, $-SOR^x$, $-S(O)_2R^x$, $-NR^xC(O)R^x$, $-NR^xC(O)N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)OR^x$, $-NR^xC(NR^x)N(R^x)_2$ y $-C(R^x)_3$, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, acilo, alifático sustituido o no sustituido, heteroalifático sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo sustituido o no sustituido,

R^5 y R^6 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en $-Q-Ar$ e hidrógeno, en el que Q se selecciona independientemente del grupo que consiste en alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; y un enlace, y en el que Ar se selecciona del grupo que consiste en arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido o R^5 y R^6 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido y arilo sustituido o no sustituido, o R^7 y R^8 , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocíclico de 4-6 miembros sustituido o no sustituido,

R^{11} se selecciona del grupo que consiste en alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -alquilo C_1-C_6 -fosfato, - $C(O)R^x$, $-CO_2(R^x)$, $-C(O)N(R^x)_2$, $-C(NR^x)N(R^x)_2$, $-N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)R^x$, $-NR^xC(O)N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)OR^x$, $-NR^xC(NR^x)N(R^x)_2$ y $-C(R^x)_3$, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, acilo, alifático sustituido o no sustituido, heteroalifático sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo sustituido o no sustituido,

R^{12} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido o R^{12} está ausente cuando


sales, estereoisómeros, metabolitos e hidratos farmacéuticamente aceptables de estos.

C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)CCN)C(=O)[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)N1CCCC1C(=O)[C@@H]2CCCC2C(=O)N3CCCC3C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C=Cc1ccccc1C(=O)R13)C(=O)N[C@@H](C)[C@H](O)C(=O)NCC(=O)N2CCCC2C(=O)N3CCCC3C(=O)N4CCCC4


20

heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; arilo sustituido o no sustituido; heteroarilo sustituido o no sustituido; $-OR^x$, $-SR^x$, $-C(O)R^x$, $-CO_2(R^x)$, $-C(O)N(R^x)_2$, $-C(NR^x)N(R^x)_2$, $-OC(O)R^x$, $-OCO_2R^x$, $-OC(O)N(R^x)_2$, $-N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)R^x$, $-NR^xC(O)N(R^x)_2$, $-NR^xC(O)OR^x$, $-NR^xC(NR^x)N(R^x)_2$ y $-C(R^x)_3$, en el que cada aparición de R^x se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, acilo, alifático sustituido o no sustituido, heteroalifático sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido.


44. Un compuesto peptídico de la fórmula:



45. Un compuesto peptídico de la fórmula:




46. Un compuesto peptídico de la fórmula:



en la que X_2 es un catión divalente o se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, un catión monovalente, un par de electrones o una combinación de estos.

47. Un compuesto peptídico de la fórmula:




en la que n es un entero de 1-20.

48. El compuesto peptidilo de la reivindicación 47, en el que n es 10.

49. El compuesto peptidilo de la reivindicación 47, en el que n es 15.

50. El compuesto peptidilo de la reivindicación 47, en el que n es 17.


51. Un compuesto peptidilo de la fórmula:



en la que n es un entero de 1-20.

52. El compuesto peptidilo de la reivindicación 51, en el que n es 15.


53. Un compuesto peptídico de la fórmula:



en la que n es un entero de 1-20.

54. El compuesto peptídico de la reivindicación 53, en el que n es 13.


55. Un compuesto peptídico de la fórmula:




en la que n es un entero de 1-20.

56. El compuesto peptídico de la reivindicación 55, en el que n es 13.

57. Un compuesto representado por:



en el que X se selecciona del grupo que consiste en:



en el que:

n es un entero de 8-20,


R¹⁴ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquiloC₁-C₆, -(alquiloC₁-C₆)-fenilo, -(alquiloC₁-C₆)-fenol, -(alquiloC₁-C₆)-heteroarilo, -(alquiloC₁-C₆)-SH; -(alquiloC₁-C₆)-S-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-OH, -(alquiloC₁-C₆)-O-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-NH₂, -(alquiloC₁-C₆)-NH-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-guanidina, -(alquiloC₁-C₆)-C(O)OH, -(alquiloC₁-C₆)-C(O)O-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-C(O)NH₂,

R^{15} se selecciona del grupo que consiste en acilo, alquilsulfonilo y arilsulfonilo,

R^{18} es hidrógeno, o R^{14} y R^{18} , junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo de 4-7 miembros y


estereoisómeros, metabolitos e hidratos de estos.

58. Un complejo químico que comprende un primer compuesto:



y

un segundo compuesto en complejo con el primero, en el que el segundo compuesto se selecciona del grupo que consiste en:



en el que:

n es un entero de 8-20,

R¹⁴ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquiloC₁-C₆, -(alquiloC₁-C₆)-fenilo, -(alquiloC₁-C₆)-fenol, -(alquiloC₁-C₆)-heteroarilo, -(alquiloC₁-C₆)-SH, -(alquiloC₁-C₆)-S-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-OH, -(alquiloC₁-C₆)-O-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-NH₂; -(alquiloC₁-C₆)-NH-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-guanidina, -(alquiloC₁-C₆)-C(O)OH, -(alquiloC₁-C₆)-C(O)O-(alquiloC₁-C₆), -(alquiloC₁-C₆)-C(O)NH₂,

R¹⁵ se selecciona del grupo que consiste en acilo, alquilsulfonilo y arilsulfonilo,

R¹⁸ es hidrógeno, o R¹⁴ y R¹⁸, junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo de 4-7 miembros y estereoisómeros, metabolitos e hidratos de estos.

59. El compuesto de la reivindicación 57 o 58, en el que acilo se selecciona del grupo que consiste en acetilo, benzoilo y 4-nitrobenzoilo.

60. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 57-59, en el que arilsulfonilo es toluensulfonilo.

61. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 57-60, en el que R¹⁴ se selecciona de grupo que consiste en hidrógeno, 2-butanilo y bencilo.

62. El compuesto de la reivindicación 57, en el que n se selecciona del grupo que consiste en 14 y 16.

63. El compuesto de la reivindicación 57, en el que el contraión se selecciona del grupo que consiste en:

