


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula 1



en donde

A se selecciona del grupo que consiste en N y CH

D es CH,

E se selecciona del grupo que consiste en C y N,

T es C

G se selecciona del grupo que consiste en C y N,

y en donde cada uno de los enlaces dobles discontinuos (punteados) en el anillo 1 se selecciona de un enlace simple o un enlace doble siempre que todos los enlaces simples o dobles del anillo 1 estén dispuestos de manera que formen, junto con el anillo 2, un sistema de anillos aromáticos,

y en donde

M se selecciona del grupo que consiste en -CH₂-, -O-, -NH- y -N(C₁₋₄-alquilo)-;

R³ se selecciona del grupo que consiste en metilo y etilo;

Het se selecciona del grupo que consiste en

un heterociclo monocíclico de 5 a 6 miembros con 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre sí de N, S y O,

y un heterociclo bicíclico de 9 a 11 miembros con 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre sí de N, S y O;

Hetarilo se selecciona del grupo que consiste en

un heteroaromato monocíclico de 5 a 6 miembros con 1, 2, 3 o 4 heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente entre sí de N, S y O;

y un heteroaromato bicíclico de 9 a 11 miembros con 1, 2, 3 o 4 heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente entre sí de N, S y O;

y en donde

R¹ se selecciona del grupo que consiste en

C₆₋₁₀-arilo, Het y Hetarilo;

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en


-OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, -OH, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂, -NH(CH₃), -N(CH₃)₂,

en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, -OH, halógeno y C₁₋₃-alquilo, y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

2. El compuesto de la Fórmula **1'**



en donde **A**, **D**, **E**, **T**, **G**, **Het**, **Hetarilo**, **R¹** y **R³** se definen de acuerdo con la reivindicación 1,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

3. El compuesto de la Fórmula **1** de acuerdo con la reivindicación 1 o de la Fórmula **1'** de acuerdo con la reivindicación 2, en donde

D es CH

y en donde **E** es N

y en donde

M es -CH₂-

y en donde

R³ es metilo,

y en donde

G es C (carbono)

R¹ se selecciona del grupo que consiste en

fenilo, **Het** y **Hetarilo**;

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en

-OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,


que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂,


en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

4. El compuesto de la Fórmula **1a** de acuerdo con la reivindicación 1



o de la Fórmula **1a'** de acuerdo con la reivindicación 2,



en donde

R¹ se selecciona del grupo que consiste en

fenilo, **Het** y **Hetarilo**;

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en

-OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂,

en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

5. El compuesto de la Fórmula **1a** o de la Fórmula **1a'** de acuerdo con la reivindicación 4, en donde

R¹ es

a) se selecciona del grupo que consiste en **Het** y **Hetarilo**;

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en -

OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo,

-O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂,

en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

o en donde **R**¹ es

b) fenilo,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -(C₁₋₃-alquilen)-**Hetarilo**, -(C₁₋₃-alquilen)-**Het**, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo y -C₁₋₄-alquilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

6. El compuesto de la Fórmula **1a** o de la Fórmula **1a'** de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 o 5, en donde

R¹ es

un heteroaromato monocíclico de 5 a 6 miembros con 1, 2 o 3 heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente entre sí del grupo que consiste en N, O y S,

o un heteroaromato bicíclico de 9 a 11 miembros con 1, 2, 3 o 4 heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente entre sí del grupo que consiste en N, O y S,

en donde este residuo **R**¹ se une al resto de la molécula mediante un átomo de C o mediante un átomo de N y se sustituye opcionalmente con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en

-OH, oxo, -CN, halógeno, -metilo, -etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, ter-butilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂,

en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,
y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

7. El compuesto de la Fórmula **1a** o de la Fórmula **1a'** de acuerdo con la reivindicación 4, en donde

R¹ se selecciona del grupo que consiste en piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, pirrolilo, imidazolilo, pirazolilo, tiofenilo, furanilo, pirazolopiridinilo, indazolilo, tiazolilo, imidazopiridinilo e indolilo,

en donde este residuo **R¹** se une al resto de la molécula mediante un átomo de C o mediante un átomo de N y se sustituye opcionalmente con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en

-OH, oxo, -CN, halógeno, -metilo, -etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, ter-butilo, -O-metilo, -O-etilo, O-propilo, O-butilo, -C₁₋₃-haloalquilo, cicloalquilo de 3, 4, 5 o 6 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂,

en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

8. El compuesto de la Fórmula **1a** o de la Fórmula **1a'** de acuerdo con la reivindicación 4, en donde

R¹ es fenilo,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en


-OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,


que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,










en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo,


-O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂,
 en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3
 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-
 butilo, isobutilo y ter-butilo,
 y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes
 mencionados.

9. El compuesto de la Fórmula **1a** o de la Fórmula **1a'** de acuerdo con la
 reivindicación 4, que se selecciona del grupo que consiste en











y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

10. El compuesto de la Fórmula **1c** de acuerdo con la reivindicación 1



o de la Fórmula **1c'** de acuerdo con la reivindicación 2



en donde

R¹ se selecciona del grupo que consiste en

fenilo, **Het** y **Hetarilo**;

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en

-OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo,

-O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, -NH₂,

en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes

mencionados.

11. El compuesto de la Fórmula **1c** o de la Fórmula **1c'** de acuerdo con la reivindicación 10, en donde

R¹ es

- a) se selecciona del grupo que consiste en **Het** y **Hetarilo**;
que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,
en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en -OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,
que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,
en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo,
-O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, **Hetarilo**, -NH₂,
en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

o en donde **R¹** es

- b) fenilo,
que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,
en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -(C₁₋₃-alquilen)-**Hetarilo**, -(C₁₋₃-alquilen)-**Het**, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**,
que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,
en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo y -C₁₋₄-alquilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

12. El compuesto de la Fórmula **1c** o de la Fórmula **1c'** de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 u 11, en donde

R¹ es

un heteroaromato monocíclico de 5 a 6 miembros con 1, 2 o 3 heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente entre sí del grupo que consiste en N, O y S,
o un heteroaromato bicíclico de 9 a 11 miembros con 1, 2, 3 o 4 heteroátomos,

cada uno seleccionado independientemente entre sí del grupo que consiste en N, O y S,

en donde este residuo **R¹** se une al resto de la molécula mediante un átomo de C o mediante un átomo de N y se sustituye opcionalmente con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**, en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en -OH, oxo, -CN, halógeno, -metilo, -etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, ter-butilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 5 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**, que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**, en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, -NH₂, en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo, y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

13. El compuesto de la Fórmula **1c** o de la Fórmula **1c'** de acuerdo con la reivindicación 10, en donde

R¹ se selecciona del grupo que consiste en piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, pirrolilo, imidazolilo, pirazolilo, tiofenilo, furanilo, pirazolopiridinilo, indazolilo, tiazolilo, imidazopiridinilo e indolilo,

en donde este residuo **R¹** se une al resto de la molécula mediante un átomo de C o mediante un átomo de N y se sustituye opcionalmente con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**, en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en -OH, oxo, -CN, halógeno, -metilo, -etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, ter-butilo, -O-metilo, -O-etilo, O-propilo, O-butilo, -C₁₋₃-haloalquilo, cicloalquilo de 3, 4, 5 o 6 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,

en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, -NH₂,

en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes

mencionados.

14. El compuesto de la Fórmula **1c** o de la Fórmula **1c'** de acuerdo con la reivindicación 10, en donde

R¹ es fenilo,

que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **Z**,

en donde cada **Z** es un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en

-OH, oxo, -CN, halógeno, -C₁₋₆-alquilo, -O-C₁₋₆-alquilo, -C₁₋₆-haloalquilo, cicloalquilo de 3 a 7 miembros, **Het**, **Hetarilo**, -CO-N(CH₃)₂, -CO-NHCH₃, -CO-NH₂, -(C₁₋₃-alquilen)-O-(C₁₋₃-alquilo), -O-**Het**,


que se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes **X**,


en donde cada **X** se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, -C₁₋₄-alquilo, -O-C₁₋₄-alquilo, -C₁₋₄-haloalquilo, -O-(C₁₋₄-alquilen)-**Het**, **Het**, -NH₂,


en donde el sustituyente **X** se sustituye opcionalmente también con 1, 2 o 3 sustituyentes de un grupo seleccionado de oxo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo y ter-butilo,

y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.

15. El compuesto de la Fórmula **1c** o de la Fórmula **1c'** de acuerdo con la reivindicación 10, que se selecciona del grupo que consiste en









y las sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos antes mencionados.


16. Un compuesto del intermediario seleccionado del grupo que consiste en la Fórmula 6




de la Fórmula 7



de la Fórmula 8




y de la Fórmula 11




en donde **E**, **D**, **G**, **T** y **R**¹ se definen de acuerdo con la reivindicación 1 y en donde **Hal** es Cl o Br

y en donde **PG** es un grupo protector seleccionado del grupo que consiste en bencilo, 1-feniletilo, 1-(4-metoxifenil)etilo.

17. Un compuesto del intermediario seleccionado del grupo que consiste en la Fórmula 5.1



de la Fórmula 10.2



18. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 para el tratamiento de una enfermedad que se puede tratar mediante la inhibición de la enzima SYK.

19. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 para el tratamiento de una enfermedad seleccionada del grupo que consiste en rinitis alérgica, asma, EPOC, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, bronquitis, linfoma linfocítico B, dermatitis y dermatitis por contacto, dermatitis alérgica, rinoconjuntivitis alérgica, artritis reumatoide, síndrome antifosfolípido, enfermedad de Berger, síndrome de Evans, colitis ulcerosa, glomerulonefritis alérgica basada en anticuerpos, granulocitopenia, síndrome de Goodpasture, hepatitis, púrpura de Henoch-Schönlein, vasculitis por hipersensibilidad, anemia inmuno hemolítica, anemia hemolítica autoinmunitaria, púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome de Kawasaki, conjuntivitis alérgica, lupus eritematoso, nefritis lúpica, linfoma celular capsular, neutropenia, esclerosis lateral no familiar, arteriosclerosis, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, miastenia grave, osteoporosis, enfermedades osteolíticas, osteopenia, soriasis, síndrome de Sjögren, esclerodermia, linfoma linfocítico T, urticaria / angioedema, granulomatosis de Wegener y celiaquía.

20. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 para el tratamiento de una enfermedad seleccionada del grupo que consiste en asma, EPOC,

rinitis alérgica, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, bronquitis, dermatitis alérgica, dermatitis por contacto, púrpura trombocitopénica idiopática, artritis reumatoide, lupus eritematoso, nefritis lúpica y rinoconjuntivitis alérgica.

21. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 para el tratamiento de una enfermedad seleccionada del grupo que consiste en asma, EPOC, rinitis alérgica, dermatitis alérgica, lupus eritematoso, nefritis lúpica y artritis reumatoide.

22. Las formulaciones farmacéuticas, caracterizadas porque contienen uno o más compuestos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 15 y un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

23. Las formulaciones farmacéuticas, caracterizadas porque contienen uno o más compuestos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 15 en combinación con una sustancia activa seleccionada del grupo que consiste en anticolinérgicos, betamiméticos, corticosteroides, inhibidores de PDE4, inhibidores de EGFR, antagonistas de LTD4, inhibidores de CCR3, inhibidores de iNOS, antagonistas de CRTH2, inhibidores de la HMG-CoA reductasa y NSAID.