



REIVINDICACIONES

1. Compuesto de fórmula (I) en forma cristalina del polimorfo I



caracterizado porque el difractograma en rayos X del compuesto presenta valores máximos de pico del ángulo 2 theta a 5.9, 6.9, 8.3, 10.4, 10.5, 11.3, 11.6, 11.9, 12.2, 14.5, 14.7, 15.1, 16.2, 16.5, 20.0, 21.9, 22.7, 23.5, 24.1, 24.7, 25.4, 25.7, 26.6, 28.0, 30.2.

2. Compuesto de fórmula (I) en forma cristalina del polimorfo I




caracterizado porque el espectro IR del compuesto presenta valores máximos de bandas a 690, 744, 761, 774, 810, 845, 872, 899, 960, 1059, 1072,

1112, 1157, 1208, 1223, 1255, 1305, 1319, 1353, 1370, 1435, 1475, 1566, 1620, 1633, 1707, 2956, 3130, 3277, 3332, 3385, 3490 cm^{-1} .

3. Formulaci3n farmac3utica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y/o 2.


4. Formulaci3n farmac3utica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y/o 2 en m1s del 9% en peso con base en la cantidad total del compuesto de f3rmula (I) presente.

5. Compuesto de sustancia cristalina de la f3rmula (I) en la forma de solvato de di-dimetilsulf3xido,



caracterizado porque el difractograma en rayos X del compuesto presenta valores m1ximos de pico del 1ngulo 2 theta a 6.9, 11.0, 12.0, 13.8, 14.1, 15.7, 16.1, 16.2, 16.6, 17.1, 17.7, 17.8, 18.8, 19.9, 20.3, 20.7, 21.3, 21.7, 21.9, 22.4, 22.8, 23.6, 24.1, 24.4, 25.2, 25.5, 25.9, 26.6, 26.9, 28.9, 29.9, 30.9, 33.2, 33.4, 33.9.

6. Compuesto de sustancia cristalina de la f3rmula (I) en la forma de solvato de di-dimetilsulf3xido,



caracterizado porque el espectro IR del compuesto presenta valores máximos de bandas a 713, 762, 778, 811, 873, 902, 953, 1017, 1041, 1078, 1111, 1164, 1210, 1234, 1281, 1321, 1364, 1432, 1457, 1481, 1521, 1569, 1628, 1720, 3144, 3288, 3423 cm^{-1} .