



REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de Fórmula (Ia) o (Ib):




con:



n:	0,1
m:	1,2,3,4
Z:	-CO ₂ H, -SO ₂ H, -SO ₃ H, -SO ₄ H, -PO ₂ H, -PO ₃ H, -PO ₄ H ₂
X:	Naftilo, Fenilo, Bifenilo, Indolilo (=2,3-benzopirrolilo), Benzotiazolilo
Y:	Arilo, Alquilarilo, Ciclopentilo, Ciclohexilo, Cicloheptilo
Quelante:	Ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-N,N',N'',N'''-tetraacético (= DOTA), Ácido N,N''-bis[2-hidroxi-5-(carboxietil)bencil]etilendiamina-N,N''-diacético (= HBED-CC), Ácido 1,4,7-triazaciclononano-1,4,7-triacético (= NOTA), Ácido 2-(4,7-bis(carboximetil)-1,4,7-triazonan-1-il)pentanodioico (NODAGA),



	Ácido 2-(4,7,10-tris(carboximetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1-il)pentanodioico (DOTAGA), Ácido 1,4,7-triazaciclononano-fosfínico (TRAP), 1,4,7-triazaciclononano-1-[ácido metil(2-carboxietil)fosfínico]-4,7-bis[ácido metil(2-hidroximetil)fosfínico] (NOPO), Ácido 3,6,9,15-tetraazabicyclo[9.3.1.] pentadeca-1(15),11,13-trieno-3,6,9-triacético (= PCTA), N'-{5-[acetil(hidroxi)amino]pentil}-N-[5-({4-[(5-aminopentil)(hidroxi)amino]-4-oxobutanoil}amino)pentil]-N-hidroxisuccinamida(DFO), Ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA) Ácido trans-ciclohexil-dietilentriaminopentaacético (CHX-DTPA) Ácido 1-oxa-4,7,10-triazaciclododecano-4,7,10-triacético(oxo-Do3A) p-isotiocianatobencil-DTPA (SCN-Bz-DTPA) 1-(p-isotiocianatobencil)-3-metil-DTPA (1B3M) 2-(p-isotiocianatobencil)-4-metil-DTPA (1M3B) 1-(2)-metil-4-isocianatobencil-DTPA (MX-DTPA)
--	---





2. El compuesto de la reivindicación 1, que tiene la estructura R'-enlazador-R, con R' = DOTA y R = Glu-Urea-Lys:




en donde el enlazador se selecciona de:











3. El compuesto de la reivindicación 1 ó 2, seleccionado de los siguientes:





0











4. Un compuesto radiomarcado que comprende el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.

5. Un complejo de metal, que comprende un radionucleido y un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.

6. El complejo de metal de la reivindicación 5, en donde el radionucleido es

^{111}In , ^{90}Y , ^{68}Ga , ^{177}Lu , $^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{64}Cu , ^{153}Gd , ^{155}Gd , ^{157}Gd , ^{213}Bi , ^{225}Ac o Fe .

7. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o un complejo de metal de la reivindicación 5 ó 6, o una sal farmacéuticamente aceptable o éster del mismo y un soporte farmacéuticamente aceptable.