


Reivindicaciones

(MODIFICADO PARA FORMA)

1. Una forma cristalina del compuesto:



que tiene un patrón de difracción de rayos X con pico de alrededor de 7,4, 10,2, 11,4, 12,4, 14,3, 14,7, 17,4, 20,2, 22,4 y 31,6 grados 2θ .

2. La forma cristalina de la reivindicación 1 que tiene el patrón de difracción de rayos X sustancialmente como se muestra en la Figura 1.

3. La forma cristalina de la reivindicación 1 que tiene una fusión endotérmica de alrededor de 221 °C.

4. La forma cristalina de la reivindicación 1 que tiene un perfil de DSC tal como se muestra en la Figura 2.

5. La forma cristalina de la reivindicación 1, donde los cristales tienen un grupo de espacio ortorrómbico $P2_12_12_1$ con dimensiones de células unitarias:

$$a = 10,1122(5) \text{ \AA},$$

$$b = 10,2108(4) \text{ \AA},$$

$$c = 47,7048(13) \text{ \AA},$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ,$$


$$V = 4925,7(3) \text{ \AA}^3, Z = 8, \text{ Densidad} = 1,258 \text{ g/cm}^3 \text{ y } T = 100(2) \text{ K}.$$

6. La forma cristalina de la reivindicación 1 tal como se describe por las coordenadas de rayos X establecidas en la Tabla 1.

7. La forma cristalina de la reivindicación 1, donde dicha forma cristalina comprende configuraciones moleculares A y B tal como están establecidas en la Figura 3.

8. La forma cristalina de la reivindicación 1 que carece sustancialmente de otras formas cristalinas.


9. Una forma sustancialmente amorfa del compuesto:



10. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de la forma cristalina de la reivindicación 1 en un portador oftálmicamente aceptable de este.

11. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de la forma amorfa de la reivindicación 9 en un portador oftálmicamente aceptable de este.

12. Un método para preparar una forma sustancialmente cristalina del compuesto:



dicho método comprende someter una suspensión y/o solución de dicho compuesto en un diluyente adecuado a:

(i) condiciones adecuadas para la evaporación del diluyente de este,


(ii) termociclado/maduración (entre la temperatura ambiente y 50 °C) en un solvente no polar en presencia de formas amorfas o cristalinas del compuesto similar a un esteroide, y

(iii) gradualmente:

reducir la temperatura de este, y/o

agregar suficiente no solvente a este para promover la precipitación de dicho compuesto de este.

13. Un método para convertir una forma amorfa del compuesto:



en forma cristalina, dicho método comprende someter dicho compuesto a una humedad elevada y/o temperatura por al menos 72 horas.