

REIVINDICACIONES

1. Composición farmacéutica para la disfunción eréctil masculina de administración transdérmica vía uretral en gotas **CARACTERIZADA PORQUE** comprende por peso total, dodecil-2-N,N-dimetilaminopropionato hidrocioruro en una cantidad entre 0,2% y 0,4%, hidroxipropil goma guar en una cantidad de 2% a 10% y EDTA disódico en una cantidad de 0,01% a 0,09%, donde dicha composición comprende adicionalmente en combinación una protaglandina E1 en una cantidad entre 0,2% y 0,4%; papaverina en una cantidad de 0,009% a 0,02%; fentolamina en una cantidad de 0,09% a 0,2%; y, atropina en una cantidad de 0,009% a 0,2%; donde dicha composición adicionalmente comprende un soporte farmacéutico acuoso que incluye como preservativo, metilparabeno sódico en una cantidad de 0,09% a 0,2% y propilparabeno sódico en una cantidad de 0,009% a 0,02% y como estabilizante, dehidrogenado de potasio en una cantidad de 0,1% a 0,5%.
2. Composición farmacéutica para la disfunción eréctil de administración transdérmica de acuerdo con la reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** adicionalmente comprende agua estéril CSP en una proporción para conformar una forma farmacéutica acuosa.
3. Composición farmacéutica para la disfunción eréctil de administración transdérmica de acuerdo con la reivindicación 1 y 2 **CARACTERIZADA PORQUE** el dodecil-2-N,N-dimetilaminopropionato hidrocioruro está presente en una cantidad de 0,3%; el hidroxipropil goma guar comprende una cantidad de 8%; y, EDTA disódico está en una cantidad de 0,02%.
4. Composición farmacéutica para la disfunción eréctil de administración transdérmica de acuerdo con la reivindicación 1 y 2, **CARACTERIZADA PORQUE** la protaglandina E1 comprende una cantidad de 0,3%; la papaverina está presente en una cantidad de 0,01%; la fentolamina

comprende una cantidad de 0,13%; y, atropina está en una cantidad de 0,015%.

5. La composición farmacéutica de administración tópica de acuerdo con la reivindicación 1 y 2, **CARACTERIZADA PORQUE** el metilparabeno sódico está en una cantidad de 0,1%; el propilparabeno sódico está en una cantidad de 0,01%; y, el dehidrogenado de potasio está presente en una cantidad de 0,3%.