


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula I




o un sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 y R^2 son cada uno de manera independiente $-C_{1-6}$ alquilo, o



R^1 y R^2 se unen conjuntamente para formar $-C_{3-6}$ cicloalquilo;

R^3 se selecciona del grupo que consiste de:




(b) fenilo,

(c) piridilo,



en donde el fenilo de la opción (b) y el piridilo de la opción (c) están no sustituidos o sustituidos con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre $-N(H)R^8$, $-C_{1-6}$ alquilo- $C(=O)OH$, C_{1-6} alcoxi, halo- C_{1-6}



R^4 se selecciona del grupo que consiste de:

(a) fenilo,

(b) piridilo no sustituido,

(c) $-C_{1-2}$ alquil-fenilo,

(d) naftilo, y,

(e) piridilo mono-sustituido con $-CF_3$,

en donde el fenilo de las opciones (a) y (c) es no sustituido o sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, $-C_{1-6}$ alquilo, $-CF_3$, $-OCF_3$, fenilo, $-C_{3-6}$ cicloalquilo, y $-C_{3-6}$ cicloalqueno;

R^5 y R^6 se seleccionan cada uno de manera independiente del grupo que consiste de:

(a) hidrógeno,

(b) $-C_{1-6}$ alquilo, y

(c) fenilo,

o donde R^5 y R^6 se unen conjuntamente para formar un $-C_{3-6}$ cicloalquilo;

R^7 se selecciona del grupo que consiste de:

(a) hidroxilo,

(b) $-N(H)S(=O)_2$ fenilo,

(c) $-N(H)-C_{3-6}$ cicloalquilo,

(d) $-N(H)-C_{1-6}$ alquilo,

(e) $-N(H)-C_{1-6}$ alquilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo conformado por piridilo, fenilo, C_{3-6} cicloalquilo y CF_3 ; y

(f) $-CF_3$,

R^8 se selecciona del grupo que consiste de:

(a) hidrógeno,

(b) $-S(=O)_2$ fenilo, y

(c) $-C(=O)$ fenilo,

2. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R^1 y R^2 son cada uno de manera independiente metilo, o

R^1 y R^2 se unen conjuntamente para formar $-C_{3-6}$ cicloalquilo.

3. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 2 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 y R^2 son cada uno de manera independiente metilo.

4. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 de la fórmula Ia:



Ia

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:

R^4 se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) -fenilo,
- (b) -piridilo no sustituido,
- (c) $-\text{CH}_2$ -fenilo, y
- (d) $-\text{CH}_2$ -piridilo mono-sustituido con CF_3 ,

en donde la porción fenilo de las opciones (a) y (c), es no sustituida o sustituida con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno, $-\text{C}_{1-6}$ alquilo, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, y $-\text{C}_{3-6}$ cicloalquilo.

6. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R^5 y R^6 se unen conjuntamente para formar un $-\text{C}_{3-6}$ cicloalquilo.

7. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^7 se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) hidroxilo, y,
- (b) $-\text{N}(\text{H})\text{S}(=\text{O})_2$ fenilo

8. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^7 es hidroxilo.

9. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 de la fórmula Ia:



Ia

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 y R^2 son cada uno de manera independiente metilo, o,

R^1 y R^2 se unen conjuntamente para formar $-\text{C}_{3-6}$ cicloalquilo;

R^4 se selecciona del grupo que consiste de:

- (a) -fenil,
- (b) -piridilo no sustituido,
- (c) $-\text{CH}_2$ -fenil, y

(d) -piridilo mono-sustituido con $-\text{CF}_3$,

en donde la porción fenilo de las opciones (a) y (c), es no sustituida o sustituida con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halógeno,

$-\text{C}_{1-6}$ alquilo, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, y $-\text{C}_{3-6}$ cicloalquilo;

R^5 y R^6 se unen conjuntamente para formar un $-\text{C}_{3-6}$ cicloalquilo; y

R^7 se selecciona del grupo que consiste de:

(a) hidroxilo, y,

(b) $-\text{N}(\text{H})\text{S}(=\text{O})_2$ fenilo

10. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 9 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^7 es hidroxilo.

11. Un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste de:

ácido 2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(fenilsulfonil)propanamida,

N-bencil-2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanamida,

2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(piridin-2-ilmetil)propanamida,

2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(piridin-4-ilmetil)propanamida,

2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-*N*-(ciclohexilmetil)-2-metilpropanamida,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)bencil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)bencil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-fenil-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

ácido 2-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)fenil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,

ácido 2-(4-(3-(1-(4-isopropilbencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-bromobencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-((2',3',4',5'-tetrahidro-[1,1'-bifenil]-4-il)metil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-ciclopropilbencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(4-ciclohexilbencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(1-(3-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(5-(trifluoro-metil)piridin-2-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-metil-N-(fenilsulfonil)propanamida,
 ácido 2-(4-(3-(3-(4-(*ter*-butil)bencil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)-fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,
 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-N-(fenilsulfonil)propanamida,
 N-ciclopropil-2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanamida,
 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-N-(2,2,2-trifluoroetil)propanamida,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,
 N-ciclopropil-2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanamida,

2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)propanamida,
 ácido 2-(4-(3-(3-(3,4-dimetilfenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
N-ciclopropil-2-(4-(3-(3-(3,4-dimetilfenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanamida,
 2-(4-(3-(3-(3,4-dimetilfenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metil-*N*-(2,2,2-trifluoroetil)propanamida,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)bencil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(3-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(3-(trifluorometoxi)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(3-(naftalen-2-il)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,
 ácido 2-(4-(3-(3-([1,1'-bifenil]-3-il)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(3-(4-metil-3-(trifluorometil)fenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanóico,
 ácido 2-(4-(3-(3-(3-(*ter*-butil)fenil)-4-oxo-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)-2-metilpropanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(5-oxo-4,4-dipropil-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)propanóico,
 ácido 2-metil-2-(4-(3-(5-oxo-4,4-dipropil-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)propanóico,
 4,4-dimetil-3-(3-(4-((4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-2-metilbutan-2-il)oxi)fenil)propil)-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1*H*-pirazol-5(4*H*)-ona,
 4,4-dimetil-3-(3-(4-((4,4,4-trifluoro-2-metil-3-oxobutan-2-il)oxi)fenil)propil)-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1*H*-pirazol-5(4*H*)-ona,
 4-(3-(4-((1-amino-2-metilpropan-2-il)oxi)fenil)propil)-2-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-3-en-1-ona,
N-(2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propil)bencenosulfonamida,
N-(2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaespiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propil)benzamida,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilacético,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)acético,

ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclobutanocarboxílico,

ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclobutanocarboxílico,

ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclopentanocarboxílico,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilpropanóico,

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilpropanóico,

ácido 2-(4'-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)-4-etoxi-[1,1'-bifenil]-3-il)acético,

ácido 2-(4'-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)-4-etoxi-[1,1'-bifenil]-3-il)acético,

3-(3-(4'-(3-fluorooxetan-3-il)-[1,1'bifenil]-4-il)propil)-4,4-dimetil-1-(4-(trifluorometil)fenil)-1*H*-pirazol-5(4*H*)-ona,

N-(6-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenil)piridin-3-il)bencenosulfonamida, y

N-(6-(4-(3-(1-(4-(*ter*-butil)bencil)-4,4-dimetil-5-oxo-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenil)-3-metoxipiridin-2-il)bencenosulfonamida,

o una sal de los mismos farmacéuticamente aceptable.

12. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una sal de la misma farmacéuticamente aceptable, y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.

13. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual es seleccionado del grupo conformado por:

ácido 2-metil-2-(4-(3-(4-oxo-3-(4-(trifluorometil)fenil)-2,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-1-il)propil)fenoxi)propanoico;

ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclobutancarboxílico;

ácido 1-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)ciclopentanecarboxílico;

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(4-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilpropanoico; y

ácido 2-(4-(3-(4,4-dimetil-5-oxo-1-(3-(trifluorometil)fenil)-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-3-il)propil)fenoxi)-2-fenilpropanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.