

REIVINDICACIONES

Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes.

5 1. (2S)-3-[(3S,4S)-3-[(1R)-1-hidroxietil]-4-(4-metoxi-3-{[1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il]oxi}fenil)-3-metilpirrolidin-1-il]-3-oxopropano-1,2-diol cristalino.

 2. (2S)-3-[(3S,4S)-3-[(1R)-1-hidroxietil]-4-(4-metoxi-3-{[1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il]oxi}fenil)-3-
10 metilpirrolidin-1-il]-3-oxopropano-1,2-diol cristalino, caracterizado porque un patrón de difracción en polvo de rayos X usando radiación CuK α que tiene un pico de difracción en ángulo de difracción 2-teta de 18.5° en combinación con uno o más de los picos seleccionado del grupo que consiste de
15 16.2°, 20.2°, y 14.4°; con una tolerancia para los ángulos de difracción de 0.2 grados.

 3. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con las reivindicaciones 1 o 2, y un portador, diluyente o excipiente
20 farmacéuticamente aceptable.

 4. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un primer componente el cual es un compuesto de conformidad con reivindicaciones 1 o 2, y un segundo componente el cual es tadalafil, y un portador, diluyente o
25 excipiente farmacéuticamente aceptable.

5. Un método para el tratamiento de vejiga hiperactiva, caracterizado porque comprende administrar a un paciente en necesidad del mismo una cantidad efectiva de un compuesto de conformidad con reivindicaciones 1 o 2.

5 6. Un método para el tratamiento de vejiga hiperactiva, caracterizado porque comprende administrar a un paciente en necesidad del mismo una cantidad efectiva de un compuesto de conformidad con reivindicaciones 1 o 2, en combinación con una cantidad efectiva de tadalafil.

10 7. Un compuesto como se reivindica en las reivindicaciones 1 o 2 para uso en terapia.

8. Un compuesto como se reivindica en las reivindicaciones 1 o 2 para uso en el tratamiento de vejiga hiperactiva.

15 9. Un compuesto como se reivindica en las reivindicaciones 1 o 2 para uso simultáneo, separado o secuencial en combinación con tadalafil en el tratamiento de vejiga hiperactiva.

20

25