

REIVINDICACIONES

- 1) Un método de tratamiento de la caquexia en un paciente humano con cáncer, CARACTERIZADO porque comprende la administración a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina una vez al día durante un período terapéuticamente efectivo.
- 2) Un método de tratamiento de la caquexia en un paciente humano que sufra de cáncer pulmonar de células no pequeñas en etapa III o IV inextirpable y caquexia, que se define como una baja de peso corporal mayor o igual que 5 % en los últimos 6 meses o un índice de masa corporal menor que 20 kg/m², mediante el aumento de la masa corporal magra de dicho paciente, CARACTERIZADO porque comprende la administración a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina una vez al día durante un período terapéuticamente efectivo.
- 3) Un método de tratamiento de la saciedad prematura que produce la caquexia en un paciente humano con cáncer, CARACTERIZADO porque comprende la administración diaria a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina durante un período terapéuticamente efectivo.
- 4) Un método de tratamiento de la fatiga que produce la caquexia en un paciente humano con cáncer, CARACTERIZADO porque comprende la administración diaria a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina durante un período terapéuticamente efectivo.

- 5) Un método de aumento de la supervivencia de un paciente humano con cáncer terminal, CARACTERIZADO porque comprende la administración diaria a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina durante un período terapéuticamente efectivo.
- 6) Un método de mejora de la calidad de vida medida con la evaluación FAACT en el dominio de anorexia/caquexia en un paciente humano con cáncer, CARACTERIZADO porque comprende la administración diaria a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina durante un período terapéuticamente efectivo.
- 7) Un método de aumento de la masa corporal total, la masa corporal magra y la masa adiposa en un paciente humano que sufre de caquexia causada por el cáncer, CARACTERIZADO porque comprende la administración diaria a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina durante un período terapéuticamente efectivo.
- 8) Un método de mejora de la calidad de vida de un paciente humano con cáncer, que comprende la administración a dicho paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina durante un período terapéuticamente efectivo, donde la mejora de la calidad de vida se mide con los siguientes instrumentos:

Evaluación FAACT (puntaje total o TOI)

Puntaje SEA

Puntaje SEF

Evaluación FACIT-G (puntaje total o TOI)

Evaluación FACIT-F (puntaje total o TOI)

- 9) El método de la reivindicación 4, CARACTERIZADO porque dicha fatiga es causada por depresión, anemia, sarcopenia, anorexia, desnutrición relacionada con vómitos, quimiotoxicidad, consumo de opioides y/o trastornos del sueño.
- 10) El método de cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8, CARACTERIZADO porque dicho paciente humano con cáncer sufre de cáncer pulmonar de células no pequeñas en etapa III o IV inextirpable y caquexia, que se define como una baja de peso corporal mayor o igual que 5 % en los últimos 6 meses o un índice de masa corporal menor que 20 kg/m².
- 11) El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque dicha cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina comprende 100 mg de HCl de anamorelina con respecto al peso de la sal.
- 12) El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque dicha cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina comprende 100 mg de HCl de anamorelina con respecto al peso de la sal administrados por vía oral una vez al día una hora antes de la primera comida.
- 13) El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 u 8, CARACTERIZADO porque dicha cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina aumenta efectivamente la masa corporal magra de dicho paciente.
- 14) El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 u 8, CARACTERIZADO porque dicha cantidad terapéuticamente

efectiva de anamorelina aumenta efectivamente la masa corporal total y la masa corporal magra de dicho paciente.

- 15) El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 u 8, CARACTERIZADO porque dicha cantidad terapéuticamente efectiva de anamorelina aumenta efectivamente la masa corporal total, la masa corporal magra y la masa adiposa de dicho paciente.
- 16) El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque el período terapéuticamente efectivo es doce semanas.
- 17) El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque el período terapéuticamente efectivo va de 13 a 24 semanas.
- 18) El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque dicho paciente tiene un estado funcional en la escala ECOG mayor o igual que 2.
- 19) El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque los análisis histológicos de dicho paciente revelan un tumor escamoso.
- 20) El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque dicho cáncer tiene metástasis.
- 21) El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque dicho paciente no está recibiendo quimioterapia ni radioterapia.
- 22) El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADO porque dicho paciente está recibiendo quimioterapia o radioterapia.

23) El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8,
CARACTERIZADO porque dicho paciente está recibiendo opioides
y/o antieméticos.