

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. (2S)-3-[(3S,4S)-3-[(1R)-1-hidroxietil]-4-(4-metoxi-3-{[1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il]oxi}fenil)-3-metilpirrolidin-1-il]-3-oxopropano-1,2-diol cristalino.
2. (2S)-3-[(3S,4S)-3-[(1R)-1-hidroxietil]-4-(4-metoxi-3-{[1-(5-metilpiridin-2-il)azetidin-3-il]oxi}fenil)-3-metilpirrolidin-1-il]-3-oxopropano-1,2-diol cristalino, caracterizado porque un patrón de difracción en polvo de rayos X usando radiación $\text{CuK}\alpha$ que tiene un pico de difracción en ángulo de difracción 2-teta de 18.5° en combinación con uno o más de los picos seleccionado del grupo que consiste de 16.2° , 20.2° , y 14.4° ; con una tolerancia para los ángulos de difracción de 0.2 grados.
3. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con las Reivindicaciones 1 o 2, y un portador, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable.
4. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un primer componente el cual es un compuesto de conformidad con Reivindicaciones 1 o 2, y un segundo componente el cual es tadalafil, y un portador, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable.
