


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde


R² es (C₁-C₃)alquilo, hidroxi(C₁-C₃)alquilo, halo(C₁-C₃)alquilo, bencilo, (C₁-C₃)alcoxi(C₁-C₃)alquilo, tetrahidropiraniolo, o -CH₂-tetrahidropiraniolo;

R³ y R⁴ son en forma independiente entre sí hidrógeno o metilo;

Cy¹ es fenilo o piridilo, cada uno sustituido con (C₁-C₃)alquilsulfonilo; y


Cy² es hidrógeno, halo(C₁-C₃)alquilo, ciclohexilo, o tetrahidropiraniolo, donde ciclohexilo y tetrahidropiraniolo están opcionalmente sustituidos en cada caso con uno o más grupos seleccionados entre halo(C₁-C₃)alquilo y C₁-C₃(alcoxi).

2. El compuesto de la reivindicación 1, donde el compuesto es de la Fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de la reivindicación 1 o 2, donde el compuesto es de la Fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


4. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el compuesto es de la Fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde Cy² es ciclohexilo o tetrahidropiraniilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados entre halo(C₁-C₃)alquilo y C₁-C₃(alcoxi).

6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde el compuesto es de la Fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde


X es CH o N;

Y¹ es O y Y² es CH₂, Y¹ es CH₂ y Y² es O, o Y¹ y Y² son en cada caso CH₂;

R⁹ es halo(C₁-C₃)alquilo; y


R¹⁰ es (C₁-C₃)alquilsulfonilo.

7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde el compuesto es de la Fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde el compuesto es de la Fórmula:







o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde R² es metilo, etilo, bencilo, o isopropilo.


10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, donde R² es etilo o isopropilo.


11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10, donde R⁹ es CF₃; y R¹⁰ es SO₂Et o SO₂Me.


12. El compuesto de la reivindicación 1, donde el compuesto se selecciona entre





















; y

; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

13. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

14. Un método para tratar una o más enfermedades o trastornos en un sujeto, que comprende la administración al sujeto de una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de la reivindicaciones 1 a 12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

15. El método de la reivindicación 13, en donde la enfermedad o trastorno se selecciona de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis, rinitis alérgica, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, acné, urticaria, fibrosis quística, rechazo de aloinjerto, esclerosis múltiple, escleroderma, artritis, artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, osteoartritis, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico (LES), psoriasis, enfermedad Hashimoto, pancreatitis, diabetes autoinmunitológica, diabetes tipo I, enfermedad ocular autoinmunitológica, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, enteritis regional, enfermedad inflamatoria intestinal (IBD), síndrome de intestino inflamatorio (IBS), síndrome de Sjögren, neuritis óptica, obesidad, hepatoesteatosis, inflamación asociada a tejido adiposo, resistencia a insulina, diabetes tipo II, neuromielitis óptica, miastenia gravis, degeneración macular relacionada con la edad, sequedad ocular, uveítis, síndrome de Guillain-Barré, psoriasis, artritis psoriática (PsA), asma resistente a esteroides, enfermedad de Graves, escleritis, depresión severa, trastorno afectivo estacional, PTSD, trastorno bipolar, autismo, epilepsia, Alzheimer, trastornos del SNC asociados con sueño alterado y/o ritmos circadianos, endometriosis, síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), enfermedad de Behçet, dermatomiositis, polimiositis, enfermedad de injerto contra huésped, cirrosis biliar primaria, fibrosis hepática, enfermedad de hígado graso no alcohólica (HEGNA), sarcoidosis, colangitis esclerosante primaria, enfermedad tiroidea autoinmunitológica, síndrome poliendocrino autoinmunitológico tipo I, síndrome poliendocrino autoinmunitológico tipo II, enfermedad celíaca, neuromielitis, artritis idiopática juvenil, esclerosis sistémica, infarto de miocardio, hipertensión pulmonar, osteoartritis, leishmaniasis cutánea, poliposis nasosinusal, y cáncer.

16. El método de la reivindicación 15, en donde la enfermedad o trastorno se selecciona de asma, dermatitis atópica, acné, enfermedad de Crohn, enteritis regional, colitis ulcerativa, síndrome de Sjögren, uveítis, enfermedad de Behçet, dermatomiositis, esclerosis múltiple, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico (LES), escleroderma, psoriasis, artritis psoriática (PsA), asma resistente a esteroides, y artritis reumatoide.