


REIVINDICACIONES

[Reivindicación 1]

Una forma cristalina A de un compuesto representado por la siguiente fórmula 1 que tiene un patrón de difracción de rayos X de polvo con picos en ángulos de difracción de $8,1^{\circ}$, $10,0^{\circ}$, $12,6^{\circ}$, $14,9^{\circ}$, $15,6^{\circ}$, $16,5^{\circ}$, $17,2^{\circ}$, $19,6^{\circ}$, $23,1^{\circ}$, $24,2^{\circ}$, $28,1^{\circ}$, $30,2^{\circ}$ y $31,6^{\circ}$ ($2\theta \pm 0,2^{\circ}$):

[Fórmula 1]



[Reivindicación 2]

La forma cristalina A de la reivindicación 1, en donde la forma cristalina A tiene un pico endotérmico a una temperatura entre 220°C y 225°C en calorimetría de barrido diferencial.

[Reivindicación 3]

La forma cristalina A de reivindicación 1, en donde la forma cristalina A tiene un espectro IR con picos de absorción característicos a 832 cm^{-1} , 1071 cm^{-1} , 1127 cm^{-1} , 1326 cm^{-1} , 1403 cm^{-1} , 1440 cm^{-1} , 1598 cm^{-1} , 2934 cm^{-1} , 3062 cm^{-1} , y 3124 cm^{-1} .

[Reivindicación 4]


Un procedimiento de preparar una forma cristalina A de un compuesto representado por la siguiente fórmula 1, que comprende:

suspender el compuesto representado por la Fórmula 1 en cualquier forma aleatoria en un solvente seleccionado del grupo que consiste en acetonitrilo, acetato de alquilo C₁₋₄, dicloroalcano C₁₋₄, cloroformo, tetrahidrofurano, tolueno, di(alquil C₁₋₄)éter, (alquil C₁₋₄)(alquil C₁₋₄)éter, alquil C₁₋₄ éter, agua y una mezcla de estos;

someter la solución resultante a tratamiento térmico mientras que se agita durante entre 1 hora y 24 horas; y

enfriar la solución resultante a temperatura ambiente seguido por la maduración de cristales mientras que se agita durante entre 1 hora y 48 horas:

[Fórmula 1]



[Reivindicación 5]

El procedimiento de la reivindicación 4, en el que el disolvente es acetonitrilo, acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de isopropilo, 1,2-dicloroetano, cloruro de metileno, cloroformo, tetrahidrofurano, tolueno, dietil éter, isopropil éter, *ter*-butil metil éter, agua o una mezcla de estos.

[Reivindicación 6]

El procedimiento de la reivindicación 4, en el que el tratamiento térmico es para aumentar la temperatura hasta entre 50 °C y 120 °C.

[Reivindicación 7]


Un procedimiento de preparar una forma cristalina A de un compuesto representado por la siguiente fórmula 1, que comprende:

disolver el compuesto representado por la Fórmula 1 en cualquier forma aleatoria en un disolvente seleccionado del grupo que consiste en alcohol C₁₋₄, acetona y una mezcla de estos;

cristalizar el compuesto mediante la adición de un antidisolvente a la solución resultante; y

madurar el cristal resultante mientras que se agita durante entre 6 horas y 24 horas a temperatura ambiente:

[Fórmula 1]



[Reivindicación 8]

El procedimiento de la reivindicación 7, en el que el disolvente es metanol, etanol, isopropanol, n-propanol, n-butanol, isobutanol, t-butanol, acetona o una mezcla de estos.

[Reivindicación 9]

El procedimiento de la reivindicación 7, en el que el antidisolvente es agua, isopropil éter, acetonitrilo, dietil éter, *ter*-butil metil éter o una mezcla de estos.

[Reivindicación 10]

El procedimiento de las reivindicaciones 4 o 7, que además comprende filtrado o secado.