

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

- 1.** Una composición de rehidratación oral, caracterizado por dicha composición ingredientes seleccionados del grupo que consta de: agua, monohidrato de glucosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio, glicina, fosfato dihidrógeno sódico, goma xantana, monohidrato de ácido cítrico, proteína hidrolizada de suero, extracto de glucósido de esteviol, 1-ácido glutámico en una proporción de aproximadamente 0,01% a 0,40% m/m y glutamato monosódico en una proporción de aproximadamente 0,05% a 0,80% m/m y cualquier combinación del mismo.
- 2.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición se compone de l-ácido glutámico en una proporción de aproximadamente 0,01% a 0,40% m/m y glutamato monosódico en una proporción de aproximadamente 0,05% a 0,80% m/m.
- 3.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición se compone de alrededor del 1,50% m/m de monohidrato de glucosa.
- 4.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye aproximadamente 0,20% m/m de cloruro de sodio.
- 5.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye aproximadamente 0,15% m/m de cloruro de potasio.
- 6.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye aproximadamente 0,15% m/m de fosfato dihidrógeno sódico.
- 7.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye aproximadamente 0,10% m/m de goma xantana.



- 8.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye aproximadamente 0,35% m/m de glicina.
- 9.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye aproximadamente 0,30% m/m de citrato de trisodio.
- 10.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición se compone de alrededor del 0,20% m/m de monohidrato de ácido cítrico.
- 11.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye 85% de extracto de glucósido de esteviol en una proporción de aproximadamente 0,01% a 0,03% m/m.
- 12.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye suero hidrolizado en una proporción de aproximadamente 0,15% a 1,00% m/m.
- 13.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye aproximadamente 1,00% m/m de trigo hidrolizado.
- 14.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición incluye cereales como fuente de proteínas.
- 15.** La composición de rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición se adapta para satisfacer las preferencias de sabor de las diferentes especies o individuos.
- 16.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición es un compuesto listo para usar.



17. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición es un concentrado en polvo.

18. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 17, caracterizado por dicho concentrado se diluye en agua.

19. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición contiene cofactores enzimáticos.

20. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicho concentrado contiene un monosacárido.

21. La composición de rehidratación oral de cualquiera de los ejemplos 1 a 5.

22. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición es una solución isotónica.

23. La composición de rehidratación oral de la reivindicación 22, caracterizado por dicha solución isotónica se compara con la isotonicidad de una solución de cloruro de sodio del 0,9%.

24. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición es una solución hipotónica.

25. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición es una solución hipertónica.

26. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1, caracterizado por dicha composición puede presentarse como gel, aerosol o una tableta de rápida disolución.

27. Un método para prevenir la deshidratación comprende los siguientes pasos:



preparación de una solución de rehidratación oral

administración de dicha solución de rehidratación oral al individuo

caracterizado por dicha composición contiene ingredientes seleccionados del grupo que consta de: agua, monohidrato de glucosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio, glicina, fosfato dihidrógeno sódico, goma xantana, monohidrato de ácido cítrico, proteína hidrolizada de suero, extracto de glucósido de esteviol, 1-ácido glutámico en una proporción de aproximadamente 0,01% a 0,40% m/m y glutamato monosódico en una proporción de aproximadamente 0,05% a 0,80% m/m y cualquier combinación del mismo.

28. El procedimiento de la reivindicación 27 caracterizado por dicho individuo es un ser humano.

29. El procedimiento de la reivindicación 27 caracterizado por dicho individuo es un animal.

30. El procedimiento de la reivindicación 27 caracterizado por dicho sujeto sufre de diarrea.

