


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO porque tiene la fórmula general (I):



(I)

o una sal, hidrato, derivado, o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, donde:

R^1 es seleccionado del grupo consistente en: H y C_1 - C_6 alquilo,


R^2 es seleccionado del grupo consistente en: OH y C_1 - C_6 alcoxi,

R^3 es seleccionado del grupo consistente en: H, C_1 - C_6 alquilo y halo,

R^{13} es seleccionado del grupo consistente en: OH, C_1 - C_6 alcoxi, NH_2 , $NHMe$, $NHEt$, $N(Me)_2$ y $N(Et)_2$,

R^{14} y R^{15} son independientemente seleccionados del grupo consistente en: H, OH, C_1 - C_6 alquilo y halo, o

R^{13} y uno de R^{14} y R^{15} forman la siguiente estructura:



R^{10} es OH, y

R^{11} y R^{12} son independientemente seleccionados del grupo consistente en: OH, C_1 - C_4 alquilo y F.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque R^1 es seleccionado del grupo consistente en: H y C_1 - C_3 alquilo.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, CARACTERIZADO porque R^2 es OH.

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 3, CARACTERIZADO porque R^3 es seleccionado del grupo consistente en: H, C_1 - C_3 alquilo y halo.


5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, CARACTERIZADO porque R^{11} y R^{12} son independientemente seleccionados del grupo consistente en: OH, OMe, *ter*-butilo, metilo y F.

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO porque R^{11} y R^{12} son independientemente seleccionados del grupo consistente en: OMe, *ter*-butilo y F.

7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 6, CARACTERIZADO porque R^{13} es seleccionado del grupo consistente en: OH, OMe, NH_2 , $NHEt$ y $N(Et)_2$.






8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 7, CARACTERIZADO porque R^{14} y R^{15} son independientemente seleccionados del grupo consistente en: H, F, Cl y metilo.


9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el compuesto es de fórmula (Ia), que tiene la siguiente estructura:




donde R^1 , R^3 y R^{10} a R^{15} son como se definió en la reivindicación 1.

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el compuesto es seleccionado del grupo consistente en:







13




15




16




17




18




19




20




21




22



23




24




25

P-11953


Modificación voluntaria 09/06/2017




26




27




28




29




30





31



32





33





34

35





36

37



38

39



40

41

11. Una composición farmacéutica, CARACTERIZADA porque comprende un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 10, junto con un vehículo, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable.