


REIVINDICACIONES:

1. Un compuesto de la Fórmula (I)



(I)

o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde:

R¹ se selecciona del grupo que consiste en (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)haloalquilo, hidroxilo, (C₁-C₈)alcoxi, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR⁴, SR⁴ y N(R⁴)₂, en donde cada R⁴ es independientemente A-R¹⁴, en donde A está ausente, (C₁-C₃)alquilo, -C(O)- o -SO₂-, y R¹⁴ es hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R⁴ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

R² es hidrógeno, halógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxilo, (C₁-C₈)alcoxi o N(R⁵)₂, en donde cada R⁵ es independientemente hidrógeno o (C₁-C₈)alquilo, o dos R⁵ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

R³ es hidrógeno, hidroxilo o NH₂, o R³ está ausente si m es 0;

Q está ausente o es una porción divalente seleccionada de O, S, NH y (C₁-C₈)alquilenos;

U se selecciona del grupo que consiste en OR⁶, SR⁶, N(R⁶)₂, (C₁-C₈)alquil-N(R⁶)₂, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12

miembros, (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)heteroalquilo y (C₁-C₈)haloalquilo, en donde U no es CH₂-hidroxi si m+n=0, y en donde U no es hidroxi si m+n=1, y R³ es hidrógeno, en donde U se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados, cada uno independientemente, de (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁶)₂, O(C₂-C₈)alquil-N(R⁶)₂, (C₁-C₈)haloalquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR⁶, N(R⁶)₂ y SO₂R⁶, y en donde cada R⁶ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁷)₂, en donde cada R⁷ es hidrógeno o (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R⁶ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

V es N o C, en donde, si V forma un enlace doble, V es carbono;

W es N o C, en donde, si W forma un enlace doble, W es carbono;

X es N o C, en donde, si X forma un enlace doble, X es carbono;

Y es CR¹⁰, N, NR¹⁰, O o S, en donde cada R¹⁰ se selecciona independientemente de hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, SH, S-(C₁-C₈)alquilo y N(R¹¹)₂ si Y es CR¹⁰, en donde Y forma un [omisión en el texto fuente] doble con un miembro del anillo adyacente, cuando Y es CR¹⁰ o N, y en donde cada R¹¹ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, o dos R¹¹ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o Y es C(R¹⁰)₂, y los dos R¹⁰ y el carbono al que están asociados forman un carbonilo o un tiocarbonilo;


Z es CR¹², N, NR¹², O o S, en donde R¹² se selecciona independientemente de hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, fluoro, cloro, bromo, SH, S-(C₁-C₈)alquilo y N(R¹³)₂, en donde Z forma un enlace doble con un miembro del anillo adyacente si es CR¹² o N, en donde cada R¹³ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, o dos R¹³ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde Z no es NR¹² si X es N, V es C, W es C e Y es CR¹⁰, o Z es C(R¹²)₂, y los dos R¹² y el carbono al que están asociados forman un carbonilo o un tiocarbonilo;

cada ----- es un enlace opcional, en donde no más de dos ----- no adyacentes pueden estar presentes;

m es 0-1; y

n es 0-1.

2. Un compuesto de la Fórmula (I)



(I)

o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde:

R¹ se selecciona del grupo que consiste en (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)haloalquilo, hidroxilo, (C₁-C₈)alcoxi, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR⁴, SR⁴ y N(R⁴)₂, en donde cada R⁴ es independientemente A-R¹⁴, en donde A está ausente, (C₁-C₃)alquilo, -C(O)- o -SO₂-, y R¹⁴ es hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R⁴ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;


R² es hidrógeno, halógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxilo, (C₁-C₈)alcoxi o N(R⁵)₂, en donde cada R⁵ es independientemente hidrógeno o (C₁-C₈)alquilo, o dos R⁵ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

R³ es hidrógeno, hidroxilo o NH₂, o R³ está ausente si m es 0;

Q está ausente o es una porción divalente seleccionada de O, S, NH y (C₁-C₈)alquileno;

U se selecciona del grupo que consiste en OR⁶, SR⁶, N(R⁶)₂, (C₁-C₈)alquil-N(R⁶)₂, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)heteroalquilo y (C₁-C₈)haloalquilo, en donde U no es

CH₂-hidroxi si m+n=0, y en donde U no es hidroxi si m+n=1, y R³ es hidrógeno, en donde U se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados, cada uno independientemente, de (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁶)₂, O(C₂-C₈)alquil-N(R⁶)₂, (C₁-C₈)haloalquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR⁶, N(R⁶)₂ y SO₂R⁶, y en donde cada R⁶ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁷)₂, en donde cada R⁷ es hidrógeno o (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R⁶ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos



seleccionados de N, O y S, en donde, si -Q-R¹ es NH₂ o H, U no es -CH₂-SH, -CH₂-S-(C₁-C₈ alquilo), -CH₂-NH₂, -CH₂(H)(C₁-C₈alquilo o -CH₂-(C₁-C₈ alquilo)₂;

V es N o C, en donde, si V forma un enlace doble, V es carbono;

W es N o C, en donde, si W forma un enlace doble, W es carbono;

X es N o C, en donde, si X forma un enlace doble, X es carbono;

Y es CR¹⁰, N, NR¹⁰, O o S, en donde cada R¹⁰ se selecciona independientemente de hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, SH, S-(C₁-C₈)alquilo y N(R¹¹)₂ si Y es CR¹⁰, en donde Y forma un [omisión en el texto fuente] doble con un miembro del anillo adyacente, cuando Y es CR¹⁰ o N, y en donde cada R¹¹ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, o dos R¹¹ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o Y es C(R¹⁰)₂, y los dos R¹⁰ y el carbono al que están asociados forman un carbonilo o un tiocarbonilo;

Z es CR¹², N, NR¹², O o S, en donde R¹² se selecciona independientemente de hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, fluoro, cloro, bromo, SH, S-(C₁-C₈)alquilo y N(R¹³)₂, en donde Z forma un enlace doble con un miembro del anillo adyacente si es CR¹² o N, en donde cada R¹³ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, o dos R¹³ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde Z no es NR¹² si X es N, V es C, W es C e Y es CR¹⁰, o Z es C(R¹²)₂, y los dos R¹² y el carbono al que están asociados forman un carbonilo o un


tiocarbonilo;

cada ----- es un enlace opcional, en donde no más de dos ----- no adyacentes pueden estar presentes;

m es 0-1; y

n es 0-1.

3. Un compuesto de la Fórmula (I)



(I)

o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde:

R^1 se selecciona del grupo que consiste en (C_1-C_8) alquilo, (C_1-C_8) haloalquilo, hidroxilo, (C_1-C_8) alcoxi, (C_5-C_{12}) arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C_3-C_{10}) cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR^4 , SR^4 y $N(R^4)_2$, en donde cada R^4 es independientemente $A-R^{14}$, en donde A está ausente, (C_1-C_3) alquilo, $-C(O)-$ o $-SO_2-$, y R^{14} es hidrógeno, (C_1-C_8) alquilo, (C_5-C_{12}) arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C_3-C_{10}) cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R^4 se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

R^2 es hidrógeno, halógeno, (C_1-C_8) alquilo, hidroxilo, (C_1-C_8) alcoxi o $N(R^5)_2$, en donde cada R^5 es independientemente hidrógeno o (C_1-C_8) alquilo, o dos R^5 se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

R^3 es hidrógeno, hidroxilo o NH_2 , o R^3 está ausente si m es 0;

Q está ausente o es una porción divalente seleccionada de O, S, NH y (C₁-C₈)alquileo;

U se selecciona del grupo que consiste en OR⁶, (C₁-C₈)alquil-N(R⁶)₂, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)heteroalquilo y (C₁-C₈)haloalquilo, en donde U no es CH₂-hidroxi si m+n=0, y en donde U no es hidroxi si m+n=1, y R³ es hidrógeno, en donde U se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados, cada uno independientemente, de (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁶)₂, O(C₂-C₈)alquil-N(R⁶)₂, (C₁-C₈)haloalquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR⁶, N(R⁶)₂ y SO₂R⁶, y en donde cada R⁶ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁷)₂, en donde cada R⁷ es hidrógeno o (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R⁶ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

V es N o C, en donde, si V forma un enlace doble, V es carbono;

W es N o C, en donde, si W forma un enlace doble, W es carbono;

X es N o C, en donde, si X forma un enlace doble, X es carbono;

Y es CR¹⁰, N, NR¹⁰, O o S, en donde cada R¹⁰ se selecciona independientemente de hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, SH, S-(C₁-C₈)alquilo y N(R¹¹)₂ si Y es CR¹⁰, en donde Y forma un *[omisión en el texto fuente]* doble con un miembro del anillo adyacente, cuando Y es CR¹⁰ o N, y en donde cada R¹¹ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, o dos R¹¹ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o Y es C(R¹⁰)₂, y los dos R¹⁰ y el carbono al que están asociados forman un carbonilo o un tiocarbonilo;


Z es CR¹², N, NR¹², O o S, en donde R¹² se selecciona independientemente de hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, fluoro, cloro, bromo, SH, S-(C₁-C₈)alquilo y N(R¹³)₂, en donde Z forma un enlace doble con un miembro del anillo adyacente si es CR¹² o N, en donde cada R¹³ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, o dos R¹³ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde Z no es NR¹² si X es N, V es C, W es C e Y es CR¹⁰, o Z es C(R¹²)₂, y los dos R¹² y el carbono al que están asociados forman un carbonilo o un tiocarbonilo;

cada ----- es un enlace opcional, en donde no más de dos ----- no adyacentes pueden estar presentes;

m es 0-1; y

n es 0-1.

4. Un compuesto de la Fórmula (I)



(I)

o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde:

R¹ se selecciona del grupo que consiste en (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)haloalquilo, hidroxi, (C₁-C₈)alcoxi, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR⁴, SR⁴ y N(R⁴)₂, en donde cada R⁴ es independientemente A-R¹⁴, en donde A está ausente, (C₁-C₃)alquilo, -C(O)- o -SO₂-, y R¹⁴ es hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R⁴ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

R² es hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo o N(R⁵)₂, en donde cada R⁵ es independientemente hidrógeno o (C₁-C₈)alquilo, o dos R⁵ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

R³ es hidrógeno, hidroxi o NH₂, o R³ está ausente si m es 0;

Q está ausente o es una porción divalente seleccionada de O, S, NH y (C₁-

C₈)alquileo;

U es (C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, en donde U se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados, cada uno independientemente, de (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁶)₂, O(C₂-C₈)alquil-N(R⁶)₂, (C₁-C₈)haloalquilo, hidroxilo, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR⁶, N(R⁶)₂ y SO₂R⁶, en donde cada R⁶ es independientemente hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, (C₁-C₈)alquil-N(R⁷)₂, en donde cada R⁷ es hidrógeno o (C₁-C₈)alquilo, (C₅-C₁₂)arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C₃-C₁₀)cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R⁶ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

V es N o C, en donde, si V forma un enlace doble, V es carbono;

W es N o C, en donde, si W forma un enlace doble, W es carbono;

X es N o C, en donde, si X forma un enlace doble, X es carbono;

Y es CH, C(O), C(S), N o NR¹⁰, en donde R¹⁰ es hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo, hidroxilo, (C₁-C₈)alcoxi, halógeno, SH, S-(C₁-C₈)alquilo, y en donde Y forma un [omisión en el texto fuente] doble con un miembro del anillo adyacente si es CH o N;


Z es CR¹², N, NR¹² u O, en donde cada R¹² es hidrógeno, (C₁-C₈)alquilo o halógeno, y en donde Z forma un enlace doble con un miembro del anillo adyacente si es CR¹² o N;

cada ----- es un enlace opcional, en donde no más de dos ----- no adyacentes pueden estar presentes;

m es 0-1; y

n es 0-1.

5. Un compuesto de la Fórmula (II):



(II)

o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde:

R^1 se selecciona del grupo que consiste en (C_1-C_8) alquilo, $N(R^4)_2$ o (C_3-C_{10}) cicloalquilo, en donde cada R^4 es independientemente hidrógeno, (C_1-C_8) alquilo, (C_5-C_{12}) arilo o heteroarilo de 5-12 miembros;

R^2 es hidrógeno, metilo o NH_2 ;

R^3 es hidroxilo o NH_2 ;


U es (C_5-C_{12}) arilo o heteroarilo de 5-12 miembros, en donde U se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados, cada uno independientemente, de (C_1-C_8) alquilo, (C_1-C_8) alquil- $N(R^6)_2$, $O(C_2-C_8)$ alquil- $N(R^6)_2$, (C_1-C_8) haloalquilo, hidroxilo, (C_1-C_8) alcoxi, halógeno, (C_5-C_{12}) arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C_3-C_{10}) cicloalquilo, heterociclilo de 3-12 miembros, OR^6 , $N(R^6)_2$ y SO_2R^6 , en donde cada R^6 es independientemente hidrógeno, (C_1-C_8) alquilo, (C_1-C_8) alquil- $N(R^7)_2$, en donde cada R^7 es hidrógeno o (C_1-C_8) alquilo, (C_5-C_{12}) arilo, heteroarilo de 5-12 miembros, (C_3-C_{10}) cicloalquilo o heterociclilo de 3-12 miembros, o dos R^6 se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-6 miembros que contiene 1-3 heteroátomos seleccionados de N, O y S;

Z es CR^{12} , en donde cada R^{12} es hidrógeno, (C_1-C_8) alquilo o halógeno;


m es 0-1; y

n es 0-1.


6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la Fórmula (II) es:



7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la Fórmula (II) es:




8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la Fórmula (II) es:




9. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^1 es NH_2 , Z es CF , R^2 es hidrógeno, R^3 es hidroxilo, m es 1, y n es 0.
10. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^1 es NH_2 , Z es CH , R^2 es hidrógeno, R^3 es hidroxilo, m es 1, y n es 0.
11. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^1 es CH_3 , Z es CH , R^2 es hidrógeno, R^3 es hidroxilo, m es 1, y n es 0.
12. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^1 es CH_3 , Z es CF , R^2 es hidrógeno, R^3 es hidroxilo, m es 1, y n es 0.
13. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^1 es CH_3 , Z es CH , R^2 es NH_2 , R^3 es hidroxilo, m es 1, y n es 0.
14. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^1 es CH_3 , Z es CH , R^2 es CH_3 , R^3 es hidroxilo, m es 1, y n es 0.
15. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde U se sustituye opcionalmente con

(C₅-C₁₂)arilo o heteroarilo de 5-12 miembros.


16. El compuesto o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde




se selecciona de:




17. Un compuesto seleccionado de:




,




,




,









,

















,



















,

















,




,




,











,











,













,










































































o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico.





18. Un compuesto seleccionado de:













































,




,




,









,




,




,







,







,











,











,























































,




,




,









,




,



,





o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

19. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-18, o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, y un portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
20. Un método para tratar el crecimiento celular anormal en un mamífero, en donde el método comprende administrar al mamífero una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-18 o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
21. El método de acuerdo con la reivindicación 20, en donde el crecimiento celular anormal es cáncer.
22. El método de acuerdo con la reivindicación 21, en donde el cáncer es cáncer de pulmón, cáncer óseo, cáncer de páncreas, cáncer de piel, cáncer de cabeza o de cuello, melanoma cutáneo o intraocular, cáncer de útero, cáncer de ovarios, cáncer rectal, cáncer de la región anal, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de útero, carcinoma de las trompas de Falopio, carcinoma del endometrio, carcinoma del cuello uterino, carcinoma de la vagina, carcinoma de la vulva, enfermedad de Hodgkin, cáncer de esófago, cáncer del intestino delgado, cáncer del sistema endócrino, cáncer de la glándula tiroidea, cáncer de la glándula paratiroidea, cáncer de la glándula suprarrenal, sarcoma del tejido blando, cáncer de uretra, cáncer de pene, cáncer de próstata, leucemia crónica o aguda, linfomas linfocíticos, cáncer de vejiga, cáncer de riñón o de uretra, carcinoma de células renales, carcinoma de la pelvis renal, neoplasia del sistema nervioso central (SNC), linfoma primario del SNC, tumores del eje espinal, glioma del tronco encefálico o adenoma pituitario.

23. Uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-18, o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, para la preparación de un medicamento útil en el tratamiento del crecimiento celular anormal en un mamífero.
24. El uso de acuerdo con la reivindicación 23, en donde el crecimiento celular anormal es cáncer.
25. El uso de acuerdo con la reivindicación 24, en donde el cáncer es cáncer de pulmón, cáncer óseo, cáncer de páncreas, cáncer de piel, cáncer de cabeza o de cuello, melanoma cutáneo o intraocular, cáncer de útero, cáncer de ovarios, cáncer rectal, cáncer de la región anal, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de útero, carcinoma de las trompas de Falopio, carcinoma del endometrio, carcinoma del cuello uterino, carcinoma de la vagina, carcinoma de la vulva, enfermedad de Hodgkin, cáncer de esófago, cáncer del intestino delgado, cáncer del sistema endócrino, cáncer de la glándula tiroidea, cáncer de la glándula paratiroidea, cáncer de la glándula suprarrenal, sarcoma del tejido blando, cáncer de uretra, cáncer de pene, cáncer de próstata, leucemia crónica o aguda, linfomas linfocíticos, cáncer de vejiga, cáncer de riñón o de uretra, carcinoma de células renales, carcinoma de la pelvis renal, neoplasia del sistema nervioso central (SNC), linfoma primario del SNC, tumores del eje espinal, glioma del tronco encefálico o adenoma pituitario.