

REIVINDICACIONES

1. Una formulación farmacéutica administrable oralmente, que comprende:
 - (a) un ácido acetilsalicílico como primer agente activo; y
 - (b) un inhibidor de la HMG-CoA reductasa como segundo agente activo, en la que dicho inhibidor de la HMG-CoA reductasa se selecciona de entre atorvastatina y rosuvastatina y sales de las mismas,

En donde

Dicho ácido acetilsalicílico está en forma de

dos o más unidades de dosificación recubiertas separadas individualmente que comprenden uno o más polímeros hidrosolubles en dicho recubrimiento, en donde dicho recubrimiento contiene un polímero no hidrosoluble o un polímero entérico en una cantidad comprendida en el rango entre el 0% y el 5% en peso de la composición del recubrimiento y en donde la cantidad del recubrimiento está comprendida entre 8 mg/cm² y 12 mg/cm²; y en donde dichas dos o más unidades de dosificación presentan una curva de liberación no modificada;

dicho inhibidor de la HMG-CoA reductasa está en forma de una o más unidades de dosificación recubiertas separadas individualmente;

dichas unidades de dosificación están en la forma de comprimidos; y

el polímero hidrosoluble presente en el recubrimiento de las unidades de dosificación de ácido acetilsalicílico se encuentra en una cantidad en peso por encima del 40 % del peso total del recubrimiento y se selecciona del grupo que consiste de un derivado polivinílico hidrosoluble seleccionado de entre polivinil pirrolidona, poli(alcohol vinílico) y poli(alcohol vinílico) parcialmente hidrolizado y mezclas de los mismos.

2. Formulaci3n farmac3utica seg3n cualquiera de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque est3 en una forma de dosificaci3n farmac3utica que consiste en una c3psula.
3. Formulaci3n farmac3utica seg3n cualquiera de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque el pol3mero hidrosoluble se selecciona del grupo que consiste en poli(alcohol vin3lico) y poli(alcohol vin3lico) parcialmente hidrolizado y mezclas de los mismos.
4. Formulaci3n farmac3utica seg3n cualquiera de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque la cantidad de 3cido acetilsalic3lico de dicha forma de dosificaci3n est3 en el intervalo de 10 a 400 mg por unidad de dosificaci3n.
5. Formulaci3n farmac3utica seg3n cualquiera de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque la cantidad de inhibidor de la HMG-CoA reductasa de dicha forma de dosificaci3n est3 en el intervalo de 5 a 40 mg por unidad de dosificaci3n.
6. Formulaci3n farmac3utica seg3n cualquiera de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque el inhibidor de la HMG-CoA reductasa est3 en forma de dos o m3s unidades de dosificaci3n.
7. Formulaci3n farmac3utica seg3n cualquiera de las reivindicaciones anteriores, CARACTERIZADA porque comprende adem3s una o m3s unidades de dosificaci3n de un inhibidor del sistema renina-angiotensina como tercer agente activo.
8. Formulaci3n farmac3utica seg3n la reivindicaci3n 7, CARACTERIZADA porque el inhibidor del sistema renina-angiotensina es un inhibidor de la ACE seleccionado del grupo que consiste en ramipril, captopril, cilazapril, delapril,

enalapril, fentiapril, fosinopril, indolapril, lisinopril, perindopril, pivopril, quinapril, espirapril, trandolapril y zofenopril y sales y ésteres farmacéuticamente aceptables de los mismos, o un bloqueante del receptor de angiotensina seleccionado del grupo que consiste en losartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, eprosartán, tasosartán, zolarsartán, azilsartán, olmesartán, saprisartán, forasartán, E-4177 y ZD-8731, y sales y ésteres farmacéuticamente aceptables de los mismos.

9. Formulación farmacéutica según la reivindicación 8, CARACTERIZADA porque dicho inhibidor de la ACE es ramipril y sales y ésteres farmacéuticamente aceptables del mismo.