


REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Una formulación farmacéutica líquida inyectable que comprende AMG 416



presente en una concentración de 0.1 mg/mL a 20 mg/mL en solución acuosa, un tampón farmacéuticamente aceptable seleccionado entre succinato y lactato y un modificador de la tonicidad farmacéuticamente aceptable seleccionado entre NaCl y manitol, en la que la formulación farmacéutica líquida inyectable tiene un pH de 2.0 a 5.0.

2. La formulación de la reivindicación 1, en la que la formulación tiene un pH de 2.5 a 4.5.
3. La formulación de la reivindicación 1, en la que la formulación tiene un pH de 2.5 a 4.0.
4. La formulación de la reivindicación 1, en la que la formulación tiene un pH de 3.0 a 3.5.
5. La formulación de la reivindicación 1, en la que el pH es mantenido por el tampón farmacéuticamente aceptable.
6. La formulación de la reivindicación 5, en la que el tampón es succinato.
7. La formulación de la reivindicación 1, en la que el AMG 416 está presente en la formulación a una concentración de 1 mg/mL a 15 mg/mL.

8. La formulación de la reivindicación 1, en la que el AMG 416 está presente en la formulación a una concentración de 2.5 mg/mL a 10 mg/mL.
9. La formulación de la reivindicación 1, en la que el modificador de la tonicidad está presente en la formulación a una concentración suficiente para que la formulación sea isotónica.
10. La formulación de la reivindicación 1, en la que el tonificador es NaCl.
11. La formulación de la reivindicación 1, en la que la formulación tiene menos del 10% de degradación cuando se almacena de 2 a 8°C por 2 años.
12. La formulación de la reivindicación 1, en la que la formulación tiene menos del 10% de degradación cuando se almacena a temperatura ambiente por 2 años.
13. Una formulación farmacéutica líquida que comprende de 2 mg/mL a 20 mg/mL de AMG 416 en solución acuosa, un tampón que es de succinato que mantiene la formulación líquida a un pH de 3.0 a 3.5, y una concentración suficiente de cloruro de sodio para que la formulación líquida sea isotónica.