

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Composición para la higiene íntima caracterizada porque comprende, en un vehículo cosméticamente aceptable, la combinación de:

una fragancia que comprende, mediante análisis cromatográfico, tiempos de retención e intensidad de las señales de acuerdo con la tabla abajo:

Tiempo de retención (minutos)	Intensidad de la señal (abundancia)
18.8	Abajo de 5×10^6
19.8	Abajo de 5×10^6
19.9	1×10^7
20.15	Abajo de 5×10^6
21.2	5×10^7
21.8	1×10^7
22.6	1.8×10^7
22.8	2.7×10^7
23.0	5×10^6
25.2	1.2×10^7
25.5	Abajo de 5×10^6
25.7	3×10^7
25.8	5×10^6
26.0	Abajo de 5×10^6
26.4	1×10^7
27.5	3×10^7
27.8	Abajo de 5×10^6
29.7	1×10^7
30.1	1.8×10^7

30.3	Abajo de 5×10^6
30.4	2.1×10^7
30.8	3.6×10^7
31.4	1.3×10^7
32.3	2.5×10^7
32.4	Abajo de 5×10^6
32.5	8×10^6
32.6	3.6×10^7
32.8	Abajo de 5×10^6
33.1	Abajo de 5×10^6
34.5	Abajo de 5×10^6
35.2	1.5×10^7
35.7	Abajo de 5×10^6
35.9	Abajo de 5×10^6

y

- una composición base que comprende:
 - un regulador de pH para la región mucosa elegido del grupo que comprende ácido láctico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido maleico, ácido succínico y sus combinaciones;
 - componente hidratante, que es suero de leche;
 - y un componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita que es un alfa glucano.

2. Composición de acuerdo con la Reivindicación 1 caracterizada porque comprende del 0,2% al 0,7% en peso de fragancia.

3. Composición de acuerdo con cualquier reivindicación anterior caracterizada porque comprende:

- del 0,1% al 20% en peso regulador de pH para la región mucosa;

- del 0,1% al 20%; en peso componente hidratante;
- del 0,1% al 10% en peso un componente selectivo para o crecimiento de la flora saprófita; y
- del 0,2% al 0,7% en peso de fragancia.

4. Proceso de producción de una composición para higiene íntima prolongada caracterizado porque comprende las etapas de:

- mezclar una fragancia a una composición base comprendiendo: regulador de pH para la región mucosa; un componente hidratante; y un componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita; y
- ajustar el pH para el rango de 4,2 a 4,8.
