

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de forma)

1. Una composición farmacéutica tópica en emulsión que comprende:
el ingrediente activo 3,5-dihidroxi-4-isopropil-*trans*-estilbeno o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, presente en una cantidad de 0,05% a 2 % en peso, basado en el peso total de la composición, una fase oleosa, una fase acuosa, un tensioactivo, y un antioxidante, y opcionalmente comprende un conservante, un agente de ajuste de pH, un agente quelante o un co-disolvente; y en donde la composición en emulsión es homogénea y está formulada como una crema, pomada o loción.
2. La composición farmacéutica tópica en emulsión según la Reivindicación 1, en donde el antioxidante se selecciona del grupo que consiste en galato de propilo, hidroxitolueno butilado y tocoferol.
3. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, en donde la fase oleosa comprende un éster de glicerina.
4. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según la Reivindicación 3, en donde el éster de glicerina es un triglicérido de cadena media.
5. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el tensioactivo se selecciona del grupo que consiste en éteres de alcoholes grasos etoxilados, PEG aceites de ricino, PEG ésteres, ésteres de propilenglicol, ésteres y derivados de glicerilo, éteres poliméricos, derivados de sorbitán, alcoholes grasos y ceras emulsionantes, y mezclas de los mismos.
6. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según la Reivindicación 5, en donde el tensioactivo comprende al menos un éter de alcohol graso etoxilado.
7. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según la Reivindicación 6, en donde el éter de alcohol graso etoxilado es una mezcla de steareth-2 y steareth-20.

8. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el tensioactivo comprende una mezcla de steareth-2, steareth-20 y polisorbato 80.

9. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el tensioactivo comprende una mezcla de steareth-2, steareth-20, polisorbato 80 y alcohol cetearílico.

10. La composición farmacéutica tópica en emulsión, según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el tensioactivo comprende una mezcla de steareth-2, steareth-20, polisorbato 80 y cera emulsionante NF.
