


REIVINDICACIONES

1. Compuestos de fórmula (I)



en la que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C_1-C_6 ,
- ii) ciano-alquilo C_1-C_6 ,
- iii) cicloalquilo C_3-C_8 ,
- iv) halo-alcoxi C_1-C_6 ,
- v) halo-alquilo C_1-C_6 ,
- vi) y arilo sustituido con R_G , R_{G1} y R_{G2} ,
- vii) heterocicloalquilo sustituido con R_G , R_{G1} y R_{G2} , y
- viii) heteroarilo sustituido con R_G , R_{G1} y R_{G2} ;

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C_1-C_6 ,
- ii) cicloalquilo C_3-C_8 ,
- iii) alquilsulfonilo C_1-C_6 ,
- iv) cicloalquilsulfonilo C_3-C_8 ,
- v) alquilsulfonilamino C_1-C_6 ,
- vi) cicloalquilsulfonilamino C_3-C_8 ,
- vii) aminocarbonilo,

- viii) ciano,
- ix) halógeno,
- x) halo-alcoxi C₁-C₆,
- xi) halo-alquilo C₁-C₆,
- xii) heterocicloalquilo, y
- xiii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C₁-C₆ o trialquilsilil-alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆;


R_C y R_{C1} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C₁-C₆,
- iii) cicloalquilo C₃-C₈,
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆,
- v) halo-alquilo C₁-C₆, y
- vi) halógeno;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en

- i) cicloalquilo C₃-C₈ sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, halo-alquilo C₁-C₆ y cicloalquilo C₃-C₈,
- ii) heterocicloalquilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, halo-alquilo C₁-C₆ y cicloalquilo C₃-C₈,
- iii) arilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, halógeno, alquilo C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, halo-alquilo C₁-C₆ y cicloalquilo C₃-C₈, y
- iv) heteroarilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, halógeno, alquilo C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, halo-alquilo C₁-C₆ y cicloalquilo C₃-C₈;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D, E, F y G;



A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$,

A^1 es $-\text{N}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$, A^3 es $-\text{CH}-$ o $-\text{N}-$ y A^4 es $-\text{CH}-$,

A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{N}-$,

A^1 , A^2 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^3 es $-\text{N}-$, o

A^1 y A^3 son $-\text{CH}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$ y A^4 es $-\text{N}-$;

uno de A^5 y A^6 es $-\text{NR}_{\text{D}3}-$ y el otro es $-\text{CR}_{\text{L}}\text{R}_{\text{M}}-$;

$\text{R}_{\text{D}1}$ se selecciona entre el grupo que consiste en

i) H,

ii) alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$,

- iii) halo-alcoxi C_1-C_6 ,
- iv) halo-alquilo C_1-C_6 , y
- v) cicloalquilo C_3-C_8 ,

R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilo C_1-C_6 ,
- iv) alcoxycarbonilo C_1-C_6 ,
- v) alquilcarbonilo (C_1-C_6),
- vi) cicloalquilcarbonilo C_3-C_8 ,
- vii) alquilo C_1-C_6 ,
- viii) cicloalquilo C_3-C_8 ,
- ix) hidroxialcoxi C_1-C_6 ,
- x) hidroxialquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino,
- xi) hidroxialquilamino C_1-C_6 ,
- xii) hidroxialquilo C_1-C_6 ,
- xiii) dihidroxialcoxi C_1-C_6 ,
- xiv) dihidroxialquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino,
- xv) dihidroxialquilamino C_1-C_6 ,
- xvi) dihidroxialquilo C_1-C_6 ,
- xvii) halo-alcoxi C_1-C_6 ,
- xviii) halo-alquilo C_1-C_6 ,
- xix) heterocicloalquilo,
- xx) heterocicloalquilcarbonilo, y

- xxi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente;

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilo C₁-C₆,
- iii) alcoxycarbonilo C₁-C₆,
- iv) alquilcarbonilo (C₁-C₆),
- v) cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
- vi) alquilo C₁-C₆,
- vii) cicloalquilo C₃-C₈,
- viii) halo-alcoxi C₁-C₆,
- ix) halo-alquilo C₁-C₆,
- x) hidroxialquilo C₁-C₆, y
- xi) dihidroxialquilo C₁-C₆;

R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilo C₁-C₆,
- iii) alcoxycarbonilo C₁-C₆,
- iv) alquilcarbonilo (C₁-C₆),
- v) cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
- vi) alquilo C₁-C₆,
- vii) cicloalquilo C₃-C₈,
- viii) halo-alcoxi C₁-C₆,
- ix) halo-alquilo C₁-C₆,

- x) heterocicloalquilcarbonilo,
- xi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente, y
- xii) arilo sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halo-alquilo C₁-C₆ y halo-alcoxi C₁-C₆;

R_{D5}, R_{D6} y R_{D7} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆,
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆,
- v) halo-alquilo C₁-C₆,
- vi) cicloalquilo C₃-C₈, y
- vii) cicloalcoxi C₃-C₈;

R_{D8} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆,
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆,
- v) halo-alquilo C₁-C₆,
- vi) cicloalquilo C₃-C₈,
- vii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilo C₁-C₆,
- viii) alcoxycarbonilo C₁-C₆,
- ix) alquilcarbonilo (C₁-C₆),

- x) cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
- xi) heterocicloalquilcarbonilo, y
- xii) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente;

R_G se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilamino C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- iv) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonil C₁-C₆-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- v) alcoxycarbonilo C₁-C₆,
- vi) alquilo C₁-C₆,
- vii) alquilsulfonilo C₁-C₆,
- viii) cicloalquilsulfonilo C₃-C₈,
- ix) carboxi,
- x) ciano,
- xi) cicloalquilo C₃-C₈,
- xii) cicloalcoxi C₃-C₈,
- xiii) cicloalquilcarbonilamino C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,
- xiv) cicloalquilcarbonil C₃-C₈-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- xv) alquilcarbonilamino C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- xvi) alquilcarbonil C₁-C₆-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- xvii) halo-alquilo C₁-C₆,
- xviii) halo-alcoxi C₁-C₆,
- xix) halógeno,

- xx) hidroxí,
- xxi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O ,
- xxii) aminocarbonil-alcoxi C_1-C_6 sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O ,
- xxiii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halo-alquilo C_1-C_6 , halo-alcoxi C_1-C_6 , bencilo o arilo, en el que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halo-alquilo C_1-C_6 y halo-alcoxi C_1-C_6 ,
- xxiv) heterocicloalquil-alcoxi C_1-C_6 sustituido con un H, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halo-alquilo C_1-C_6 , halo-alcoxi C_1-C_6 , bencilo o arilo, en el que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halo-alquilo C_1-C_6 y halo-alcoxi C_1-C_6 , y
- xxv) heterocicloalquil-alquilo C_1-C_6 sustituido con un H, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halo-alquilo C_1-C_6 , halo-alcoxi C_1-C_6 , bencilo o arilo, en el que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halo-alquilo C_1-C_6 y halo-alcoxi C_1-C_6 ;

R_{G1} y R_{G2} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) alquilo C_1-C_6 ,
- iv) cicloalquilo C_3-C_8 ,
- v) halo-alcoxi C_1-C_6 , y
- vi) halo-alquilo C_1-C_6 ;

R_L y R_M se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H, y
- ii) alquilo C_1-C_6 ;

R_N se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C_1-C_6 ,
- iii) alcoxi C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 ,
- iv) alcoxicarbonil C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 ,
- v) alquilo C_1-C_6 ,
- vi) carboxi-alquilo C_1-C_6 ,
- vii) cicloalquilo C_3-C_8 ,
- viii) cicloalquil C_3-C_8 -alquilo C_1-C_6 ,
- ix) hidroxialquilo C_1-C_6 ,
- x) fenilo, y
- xi) heteroaril-alquilo C_1-C_6 ;

R_O se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H, y
- ii) alquilo C_1-C_6 ;

o R_N y R_O , junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterocicloalquilo;

o sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C_1-C_6 ,
- ii) ciano-alquilo C_1-C_6 ,
- iii) cicloalquilo C_3-C_8 ,
- iv) halo-alcoxi C_1-C_6 ,

- v) halo-alquilo C₁-C₆,
- vi) arilo sustituido con R_G, R_{G1} y R_{G2},
- vii) heterocicloalquilo sustituido con R_G, R_{G1} y R_{G2}, y
- viii) heteroarilo sustituido con R_G, R_{G1} y R_{G2};

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en

- i)alquilo C₁-C₆,
- ii) cicloalquilo C₃-C₈,
- iii) alquilsulfonilo C₁-C₆,
- iv) cicloalquilsulfonilo C₃-C₈,
- v) alquilsulfonilamino C₁-C₆,
- vi) cicloalquilsulfonilamino C₃-C₈,
- vii) aminocarbonilo,
- viii) ciano,
- ix) halógeno,
- x) halo-alcoxi C₁-C₆,
- xi) halo-alquilo C₁-C₆,
- xii) heterocicloalquilo, y
- xiii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C₁-C₆ o trialquilsilil-alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆;

R_C y R_{C1} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i)H,
- ii) alquilo C₁-C₆,
- iii) cicloalquilo C₃-C₈,
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆,

v) halo-alquilo C_1-C_6 , y

vi) halógeno;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en


v) cicloalquilo C_3-C_8 sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C_1-C_6 , halo-alcoxi C_1-C_6 , halo-alquilo C_1-C_6 y cicloalquilo C_3-C_8 ,

vi) heterocicloalquilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C_1-C_6 , halo-alcoxi C_1-C_6 , halo-alquilo C_1-C_6 y cicloalquilo C_3-C_8 ,

vii) arilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, halógeno, alquilo C_1-C_6 , halo-alcoxi C_1-C_6 , halo-alquilo C_1-C_6 y cicloalquilo C_3-C_8 , y

viii) heteroarilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre H, halógeno, alquilo C_1-C_6 , halo-alcoxi C_1-C_6 , halo-alquilo C_1-C_6 y cicloalquilo C_3-C_8 ;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D y E;



A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$,

A^1 es $-\text{N}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$, A^3 es $-\text{CH}-$ o $-\text{N}-$ y A^4 es $-\text{CH}-$,

A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{N}-$,

A^1 , A^2 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^3 es $-\text{N}-$, o

A^1 y A^3 son $-\text{CH}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$ y A^4 es $-\text{N}-$;

uno de A^5 y A^6 es $-\text{NR}_{\text{D}3}-$ y el otro es $-\text{CR}_{\text{L}}\text{R}_{\text{M}}-$;

$\text{R}_{\text{D}1}$ se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$,
- iii) halo-alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$,

iv) halo-alquilo C_1-C_6 , y

v) cicloalquilo C_3-C_8 ,

R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en

i) H,

ii) halógeno,

iii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilo C_1-C_6 ,

iv) alcoxycarbonilo C_1-C_6 ,

v) alquilcarbonilo (C_1-C_6),

vi) cicloalquilcarbonilo C_3-C_8 ,

vii) alquilo C_1-C_6 ,

viii) cicloalquilo C_3-C_8 ,

ix) hidroxialcoxi C_1-C_6 ,

x) hidroxialquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino,

xi) hidroxialquilamino C_1-C_6 ,

xii) hidroxialquilo C_1-C_6 ,

xiii) dihidroxialcoxi C_1-C_6 ,

xiv) dihidroxialquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino,

xv) dihidroxialquilamino C_1-C_6 ,

xvi) dihidroxialquilo C_1-C_6 ,

xvii) haloalcoxi C_1-C_6 ,

xviii) haloalquilo C_1-C_6 ,

xix) heterocicloalquilo,

xx) heterocicloalquilcarbonilo, y

xxi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos

alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente;

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilo C₁-C₆,
- iii) alcoxicarbonilo C₁-C₆,
- iv) alquilcarbonilo (C₁-C₆),
- v) cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
- vi) alquilo C₁-C₆,
- vii) cicloalquilo C₃-C₈,
- viii) halo-alcoxi C₁-C₆,
- ix) halo-alquilo C₁-C₆,
- x) hidroxialquilo C₁-C₆, y
- xi) dihidroxialquilo C₁-C₆;

R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilo C₁-C₆,
- iii) alcoxicarbonilo C₁-C₆,
- iv) alquilcarbonilo (C₁-C₆),
- v) cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
- vi) alquilo C₁-C₆,
- vii) cicloalquilo C₃-C₈,
- viii) halo-alcoxi C₁-C₆,
- ix) halo-alquilo C₁-C₆,
- x) heterocicloalquilcarbonilo, y

- xi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente;

R_{D5}, R_{D6} y R_{D7} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆,
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆,
- v) halo-alquilo C₁-C₆,
- vi) cicloalquilo C₃-C₈, y
- vii) cicloalcoxi C₃-C₈;

R_{D8} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆,
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆,
- v) halo-alquilo C₁-C₆,
- vi) cicloalquilo C₃-C₈,
- vii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilo C₁-C₆,
- viii) alcoxycarbonilo C₁-C₆,
- ix) alquilcarbonilo (C₁-C₆),
- x) cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
- xi) heterocicloalquilcarbonilo, y
- xii) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente;

R_G se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C_1-C_6 ,
- iii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilamino C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 ,
- iv) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonil C_1-C_6 -(alquil C_1-C_6)amino-alquilo C_1-C_6 ,
- v) alcoxycarbonilo C_1-C_6 ,
- vi) alquilo C_1-C_6 ,
- vii) alquilsulfonilo C_1-C_6 ,
- viii) cicloalquilsulfonilo C_3-C_8 ,
- ix) carboxi,
- x) ciano,
- xi) cicloalquilo C_3-C_8 ,
- xii) cicloalcoxi C_3-C_8 ,
- xiii) cicloalquilcarbonilamino C_3-C_8 -alquilo C_1-C_6 ,
- xiv) cicloalquilcarbonil C_3-C_8 -(alquil C_1-C_6)amino-alquilo C_1-C_6 ,
- xv) alquilcarbonilamino C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 ,
- xvi) alquilcarbonil C_1-C_6 -(alquil C_1-C_6)amino-alquilo C_1-C_6 ,
- xvii) halo-alquilo C_1-C_6 ,
- xviii) halo-alcoxi C_1-C_6 ,
- xix) halógeno,
- xx) hidroxí,
- xxi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O ,
- xxii) aminocarbonil-alcoxi C_1-C_6 sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O ,

- xxiii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halo-alquilo C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, bencilo o arilo, en el que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halo-alquilo C₁-C₆ y halo-alcoxi C₁-C₆,
- xxiv) heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ sustituido con un H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halo-alquilo C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, bencilo o arilo, en el que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halo-alquilo C₁-C₆ y halo-alcoxi C₁-C₆, y
- xxv) heterocicloalquil-alquilo C₁-C₆ sustituido con un H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halo-alquilo C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, bencilo o arilo, en el que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halo-alquilo C₁-C₆ y halo-alcoxi C₁-C₆;

R_{G1} y R_{G2} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) alquilo C₁-C₆,
- iv) cicloalquilo C₃-C₈,
- v) halo-alcoxi C₁-C₆, y
- vi) halo-alquilo C₁-C₆;

R_L y R_M se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H, y
- ii) alquilo C₁-C₆;

R_N se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆,

- iii) alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- iv) alcoxycarbonil C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- v) alquilo C₁-C₆,
- vi) carboxi-alquilo C₁-C₆,
- vii) cicloalquilo C₃-C₈,
- viii) cicloalquil C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,
- ix) hidroxialquilo C₁-C₆,
- x) fenilo, y
- xi) heteroaril-alquilo C₁-C₆;

R_O se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H, y
- ii) alquilo C₁-C₆;

o R_N y R_O, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterocicloalquilo;

o sales farmacéuticamente aceptables.

3. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, en el que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C₁-C₆,
- ii) ciano-alquilo C₁-C₆,
- iii) cicloalquilo C₃-C₈,
- iv) arilo sustituido con R_G y R_{G1},
- v) heterocicloalquilo sustituido con R_G y R_{G1}, y
- vi) heteroarilo sustituido con R_G y R_{G1};

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C₁-C₆,
- ii) alquilsulfonilo C₁-C₆,
- iii) alquilsulfonilamino C₁-C₆,
- iv) aminocarbonilo,
- v) ciano,
- vi) halógeno,
- vii) heterocicloalquilo, y
- viii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C₁-C₆ o trialquilsilil-alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆;


R_{C1} es H y R_C se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C₁-C₆, y
- iii) halógeno;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en

- i) heterocicloalquilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados entre H y alquilo C₁-C₆, y
- ii) heteroarilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados entre H y alquilo C₁-C₆;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D, E y F;



A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$,

A^1 es $-\text{N}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$, A^3 es $-\text{CH}-$ o $-\text{N}-$ y A^4 es $-\text{CH}-$,

A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{N}-$, o

A^1 y A^3 son $-\text{CH}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$ y A^4 es $-\text{N}-$;

uno de A^5 y A^6 es $-\text{NR}_{\text{D}3}-$ y el otro es $-\text{CR}_{\text{L}}\text{R}_{\text{M}}-$;

$\text{R}_{\text{D}1}$ es alquilo C_1-C_6 ;

$\text{R}_{\text{D}2}$ se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) hidroxi-alcoxi C_1-C_6 ,
- iv) hidroxi-alquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino,
- v) hidroxi-alquilamino C_1-C_6 ,
- vi) dihidroxi-alcoxi C_1-C_6 ,
- vii) dihidroxi-alquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino, y

viii) heterocicloalquilo;

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilo C₁-C₆,
- iii) alcoxycarbonilo C₁-C₆, y
- iv) alquilcarbonilo C₁-C₆;

R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxycarbonilo C₁-C₆,
- iii) heterocicloalquilcarbonilo,
- iv) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente, y
- v) arilo sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, haloalquilo C₁-C₆ y halo-alcoxi C₁-C₆;

R_G se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonilamino C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- iv) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonil C₁-C₆-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- v) alcoxycarbonilo C₁-C₆,
- vi) alquilo C₁-C₆,
- vii) alquilsulfonilo C₁-C₆,
- viii) carboxi,
- ix) ciano,

- x) cicloalcoxi C₃-C₈,
- xi) cicloalquilcarbonilamino C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,
- xii) cicloalquilcarbonil C₃-C₈-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- xiii) halo-alquilo C₁-C₆,
- xiv) halógeno,
- xv) hidroxilo,
- xvi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xvii) aminocarbonil-alcoxi C₁-C₆ sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xviii) heteroarilo sustituido con un H o alquilo C₁-C₆,
- xix) heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ sustituido con un H o alquilo C₁-C₆, y
- xx) heterocicloalquil-alquilo C₁-C₆ sustituido con un H o alquilo C₁-C₆;

R_{G1} y R_{G2} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i)H,
- ii) halógeno,
- iii) alquilo C₁-C₆, y
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆;

R_L y R_M son H;

R_N se selecciona entre el grupo que consiste en

- i)H,
- ii) alcoxi C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- iv) alcóxicarbonil C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- v) alquilo C₁-C₆,

- vi) carboxi-alquilo C₁-C₆,
- vii) cicloalquilo C₃-C₈,
- viii) cicloalquil C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,
- ix) hidroxialquilo C₁-C₆,
- x) fenilo, y
- xi) heteroaril-alquilo C₁-C₆;

R_O se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H, y
- ii) alquilo C₁-C₆;

o R_N y R_O, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterocicloalquilo;

o sales farmacéuticamente aceptables.

4. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C₁-C₆,
- ii) ciano-alquilo C₁-C₆,
- iii) cicloalquilo C₃-C₈,
- iv) arilo sustituido con R_G y R_{G1},
- v) heterocicloalquilo sustituido con R_G y R_{G1}, y
- vi) heteroarilo sustituido con R_G y R_{G1};

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C₁-C₆,
- ii) alquilsulfonilo C₁-C₆,
- iii) alquilsulfonilamino C₁-C₆,

- iv) aminocarbonilo,
- v) ciano,
- vi) halógeno,
- vii) heterocicloalquilo, y
- viii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C₁-C₆ o trialquilsilil-alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆;


R_{C1} es H y R_C se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C₁-C₆, y
- iii) halógeno;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en

- i) heterocicloalquilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados entre H y alquilo C₁-C₆, y
- ii) heteroarilo sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados entre H y alquilo C₁-C₆;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D y E;



A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$,

A^1 es $-\text{N}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$, A^3 es $-\text{CH}-$ o $-\text{N}-$ y A^4 es $-\text{CH}-$,

A^1 , A^3 y A^4 son $-\text{CH}-$ y A^2 es $-\text{N}-$, o

A^1 y A^3 son $-\text{CH}-$, A^2 es $-\text{CR}_{\text{D}2}-$ y A^4 es $-\text{N}-$;

uno de A^5 y A^6 es $-\text{NR}_{\text{D}3}-$ y el otro es $-\text{CR}_{\text{L}}\text{R}_{\text{M}}-$;

$\text{R}_{\text{D}1}$ es alquilo C_1-C_6 ;

$\text{R}_{\text{D}2}$ se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) hidroxi-alcoxi C_1-C_6 ,
- iv) hidroxi-alquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino,
- v) hidroxi-alquilamino C_1-C_6 ,
- vi) dihidroxi-alcoxi C_1-C_6 ,
- vii) dihidroxi-alquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino, y

viii) heterocicloalquilo;

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilo C_1-C_6 ,
- iii) alcoxycarbonilo C_1-C_6 , y
- iv) alquilcarbonilo C_1-C_6 ;

R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxycarbonilo C_1-C_6 ,
- iii) heterocicloalquilcarbonilo, y
- iv) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C_1-C_6 seleccionados independientemente;

R_G se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C_1-C_6 ,
- iii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilamino C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 ,
- iv) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonil C_1-C_6 -(alquil C_1-C_6)amino-alquilo C_1-C_6 ,
- v) alcoxycarbonilo C_1-C_6 ,
- vi) alquilo C_1-C_6 ,
- vii) alquilsulfonilo C_1-C_6 ,
- viii) carboxi,
- ix) ciano,
- x) cicloalcoxi C_3-C_8 ,
- xi) cicloalquilcarbonilamino C_3-C_8 -alquilo C_1-C_6 ,

- xii) cicloalquilcarbonil C₃-C₈-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- xiii) halo-alquilo C₁-C₆,
- xiv) halógeno,
- xv) hidroxilo,
- xvi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xvii) aminocarbonil-alcoxi C₁-C₆ sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xviii) heteroarilo sustituido con un H o alquilo C₁-C₆,
- xix) heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ sustituido con un H o alquilo C₁-C₆, y
- xx) heterocicloalquil-alquilo C₁-C₆ sustituido con un H o alquilo C₁-C₆;

R_{G1} y R_{G2} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) alquilo C₁-C₆, y
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆;

R_L y R_M son H;

R_N se selecciona entre el grupo que consiste en

- xii) H,
- xiii) alcoxi C₁-C₆,
- xiv) alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- xv) alcóxicarbonil C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- xvi) alquilo C₁-C₆,
- xvii) carboxi-alquilo C₁-C₆,
- xviii) cicloalquilo C₃-C₈,

xix) cicloalquil C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,

xx) hidroxialquilo C₁-C₆,

xxi) fenilo, y

xxii) heteroaril-alquilo C₁-C₆;

R_O se selecciona entre el grupo que consiste en

i) H, y

ii) alquilo C₁-C₆;

o R_N y R_O, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterocicloalquilo;

o sales farmacéuticamente aceptables.

5. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

i) alquilo C₁-C₆,

ii) cianoalquilo C₁-C₆,

iii) cicloalquilo C₃-C₈,

iv) arilo sustituido con R_G y R_{G1},

v) heterocicloalquilo sustituido con R_G y R_{G1}, y

vi) heteroarilo sustituido con R_G y R_{G1}.

6. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

i) alquilo C₁-C₆,

ii) cianoalquilo C₁-C₆,

iii) cicloalquilo C₃-C₈,

iv) fenilo sustituido con R_G y R_{G1},

v) tetrahidropiranilo sustituido con R_G y R_{G1}, y

- vi) heteroarilo sustituido con R_G y R_{G1} , en el que el heteroarilo se selecciona entre benzoxazonilo, imidazolilo, isoxazolilo, oxazolilo, pirazinilo, pirazolilo, piridinilo y pirimidinilo.
7. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que R_A se selecciona entre el grupo que consiste en
- i) alquilo C_1-C_6 ,
 - ii) cicloalquilo C_3-C_8 ,
 - iii) fenilo sustituido con R_G y R_{G1} , y
 - iv) heteroarilo sustituido con R_G y R_{G1} , en el que el heteroarilo se selecciona entre isoxazolilo y piridinilo.
8. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que R_A se selecciona entre el grupo que consiste en
- i) alquilo C_1-C_6 , y
 - ii) fenilo sustituido con R_G y R_{G1} .
9. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que R_A es alquilo C_1-C_6 .
10. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que R_A es fenilo sustituido con R_G y R_{G1} .
11. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en la que R_G se selecciona entre el grupo que consiste en
- i) H,
 - ii) alcoxi C_1-C_6 ,
 - iii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilamino C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 ,
 - iv) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonil C_1-C_6 -(alquil C_1-C_6)amino-alquilo C_1-C_6 ,
 - v) alcóxicarbonilo C_1-C_6 ,
 - vi) alquilo C_1-C_6 ,
 - vii) alquilsulfonilo C_1-C_6 ,

- viii) carboxi,
- ix) ciano,
- x) cicloalcoxi C₃-C₈,
- xi) cicloalquilcarbonilamino C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,
- xii) cicloalquilcarbonil C₃-C₈-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- xiii) halo-alquilo C₁-C₆,
- xiv) halógeno,
- xv) hidroxí,
- xvi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xvii) aminocarbonil-alcoxi C₁-C₆ sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xviii) heteroarilo sustituido con un H o alquilo C₁-C₆,
- xix) heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ sustituido con un H o alquilo C₁-C₆, y
- xx) heterocicloalquil-alquilo C₁-C₆ sustituido con un H o alquilo C₁-C₆.

12. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en la que R_G se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonil C₁-C₆-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- iv) cicloalcoxi C₃-C₈,
- v) halógeno,
- vi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- vii) aminocarbonil-alcoxi C₁-C₆ sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- viii) heteroarilo sustituido con un H o alquilo C₁-C₆, y

- ix) heterocicloalquil-alquilo C_1-C_6 sustituido con un H o alquilo C_1-C_6 .
13. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en la que R_{G1} se selecciona entre el grupo que consiste en
- i) H,
 - ii) halógeno,
 - iii) alquilo C_1-C_6 , y
 - iv) halo-alcoxi C_1-C_6 .
14. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en la que R_{G1} se selecciona entre el grupo que consiste en
- i) H, y
 - ii) halógeno.
15. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en la que R_{G2} es H.
16. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en la que R_L y R_M son H.
17. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en la que R_N se selecciona entre el grupo que consiste en
- i) alcoxi C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 , y
 - ii) alquilo C_1-C_6 .
18. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en la que R_O es alquilo C_1-C_6 .
19. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en la que R_N y R_O , junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman morfolinilo, pirrolidinilo o metilpiperazinonilo.
20. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en la que R_B se selecciona entre el grupo que consiste en
- i) alquilo C_1-C_6 ,

- ii) alquilsulfonilo C_1-C_6 ,
- iii) alquilsulfonilamino C_1-C_6 ,
- iv) aminocarbonilo,
- v) ciano,
- vi) halógeno,
- vii) heterocicloalquilo, y
- viii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C_1-C_6 o trialquilsilil-alcoxi C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 .

21. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en la que R_B se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) ciano, y
- ii) halógeno.

22. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en la que R_B es halógeno.

23. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, en la que R_C se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alquilo C_1-C_6 , y
- iii) halógeno.

24. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, en la que R_C es alquilo C_1-C_6 .

25. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24, en la que R_{C1} es H.

26. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25, en la que W se selecciona entre los sistemas de anillo A y C.

27. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26, en la que W es el sistema de anillos A.

28. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, en la que R_{D1} es alquilo C_1-C_6 .

29. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, en la que R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) hidroxi-alcoxi C_1-C_6 ,
- iv) hidroxi-alquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino,
- v) hidroxi-alquilamino C_1-C_6 ,
- vi) dihidroxi-alcoxi C_1-C_6 ,
- vii) dihidroxi-alquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino, y
- viii) heterocicloalquilo.

30. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, en la que R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) hidroxi-alcoxi C_1-C_6 , y
- iii) hidroxi-alquil C_1-C_6 (alquil C_1-C_6)amino.

31. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 30, en la que R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en


- i) H,
- ii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilo C_1-C_6 ,
- iii) alcóxicarbonilo C_1-C_6 , y
- iv) alquilcarbonilo C_1-C_6 .

32. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31, en la que R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,


- ii) alcoxicarbonilo C₁-C₆,
- iii) heterocicloalquilcarbonilo, y
- iv) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C₁-C₆ seleccionados independientemente.

33. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(a),



o sales farmacéuticamente aceptables.

34. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(b),



en la que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C₁-C₆, y
- ii) fenilo sustituido con R_G y R_{G1};

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) ciano, y
- ii) halógeno;

R_C se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,

ii) alquilo C₁-C₆, y

iii) halógeno;

R_{D1} es alquilo C₁-C₆;

R_G se selecciona entre el grupo que consiste en

i)H,

ii) alcoxi C₁-C₆,

iii) alcoxi C₁-C₆-alquilcarbonil C₁-C₆-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,

iv) halógeno,

v) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,

vi) aminocarbonil-alcoxi C₁-C₆ sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,

vii) heteroarilo sustituido con un H o alquilo C₁-C₆, en la que el heteroarilo es isoxazolilo, oxazolilo o pirazolilo, y

viii) heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ sustituido con un H o alquilo C₁-C₆, en la que heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ es tetrahidropiranilmetoxi o tetrahidrofuranilmetoxi;

R_{G2} es H y R_{G1} se selecciona entre el grupo que consiste en

i) H, y

ii) halógeno;

R_N se selecciona entre el grupo que consiste en

i)alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆, y


ii) alquilo C₁-C₆;

R_O es alquilo C₁-C₆;

o R_N y R_O, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman morfolinilo, pirrolidinilo o metilpiperazinonilo;

o sales farmacéuticamente aceptables.

35. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(b),



en la que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C_1-C_6 , y
- ii) fenilo sustituido con R_G y R_{G1} ;

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) ciano, y
- ii) halógeno;

R_{D1} es alquilo C_1-C_6 ;

R_G se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H,
- ii) alcoxi C_1-C_6 ,
- iii) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonilamino C_1-C_6 -alquilo C_1-C_6 ,
- iv) alcoxi C_1-C_6 -alquilcarbonil C_1-C_6 -(alquil C_1-C_6)amino-alquilo C_1-C_6 ,
- v) alcóxicarbonilo C_1-C_6 ,
- vi) alquilo C_1-C_6 ,
- vii) alquilsulfonilo C_1-C_6 ,
- viii) carboxi,
- ix) ciano,
- x) cicloalcoxi C_3-C_8 ,

- xi) cicloalquilcarbonilamino C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,
- xii) cicloalquilcarbonil C₃-C₈-(alquil C₁-C₆)amino-alquilo C₁-C₆,
- xiii) halo-alquilo C₁-C₆,
- xiv) halógeno,
- xv) aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xvi) aminocarbonil-alcoxi C₁-C₆ sustituido en el átomo de nitrógeno con R_N y R_O,
- xvii) heteroarilo sustituido con un H, alquilo C₁-C₆, en la que el heteroarilo es isoxazolilo, oxazolilo o pirazolilo,
- xviii) heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ sustituido con un H, alquilo C₁-C₆, en la que heterocicloalquil-alcoxi C₁-C₆ es tetrahidropiranilmetoxi o tetrahidrofuránilmetoxi; y
- xix) heterocicloalquil-alquilo C₁-C₆ sustituido con un H, alquilo C₁-C₆, en la que heterocicloalquil-alquilo C₁-C₆ es metildioxopiperazinilmetilo, oxopirrolidinilmetilo u oxooxazolidinilmetilo;

R_{G2} es H y R_{G1} se selecciona entre el grupo que consiste en

- i)H,
- ii) halógeno,
- iii) alquilo C₁-C₆, y
- iv) halo-alcoxi C₁-C₆;

R_N se selecciona entre el grupo que consiste en


- i)H,
- ii) alcoxi C₁-C₆,
- iii) alcoxi C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- iv) alcoxycarbonil C₁-C₆-alquilo C₁-C₆,
- v) alquilo C₁-C₆,

- vi) carboxi-alquilo C₁-C₆,
- vii) cicloalquilo C₃-C₈,
- viii) cicloalquil C₃-C₈-alquilo C₁-C₆,
- ix) hidroxi-alquilo C₁-C₆,
- x) fenilo, y
- xi) heteroaril-alquilo C₁-C₆, en la que heteroaril-alquilo C₁-C₆ es piridinilalquilo o tiofenilalquilo;

R_O se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) H, y
 - ii) alquilo C₁-C₆;
- o R_N y R_O, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman piperidinilo, morfolinilo, pirrolidinilo o metilpiperazinonilo;
- o sales farmacéuticamente aceptables.

36. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(c),



en la que

R_A es alquilo C₁-C₆;

R_C se selecciona entre el grupo que consiste en

- i) alquilo C₁-C₆, y
- ii) halógeno;

R_{D1} es alquilo C₁-C₆;

o sales farmacéuticamente aceptables.

37. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, seleccionado entre

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(3,3-dimetil-6-propan-2-il-1,2-dihidroinden-5-il)oximetil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-[1-(2-trimetilsililetoximetil)imidazol-2-il]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(1-metilimidazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(1,3-oxazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(2-terc-butil-4-morfolin-4-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(3-metilimidazol-4-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-3-propan-2-ilbenzonitrilo;

2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-propan-2-ilbenzonitrilo;

3-terc-butil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[(4-cloro-2-ciclopropil-5-metilsulfonilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(2-terc-butil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

5-terc-butil-2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

4-terc-butil-2-metil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[2-terc-butil-4-[3-(2-trimetilsilil-etoximetil)imidazol-4-il]fenoxi]-metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclopropil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclohexil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-5-metil-2-(oxan-4-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-4-ciclopropil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

N-[2-cloro-4-ciclopropil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]metanosulfonamida;

4-terc-butil-3-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

4-terc-butil-3-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzamide;

5-terc-butil-2-metil-4-[(5-oxo-4-propan-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

4-metil-3-[(5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(6-ciclopropil-2-metil-1,3-benzotiazol-5-il)oximetil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclobutil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(1H-imidazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(1H-imidazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-5-metil-2-fenilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(2-clorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(3-clorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(4-clorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-5-metil-2-(3-metilsulfonilfenil)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-5-metil-2-(2-metilsulfonilfenil)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-5-metil-2-[3-(piperidin-1-carbonil)fenil]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclohexilbenzamida;

3-[[4-cloro-5-metil-2-[3-(morfolin-4-carbonil)fenil]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N,N-dimetilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-fenilbenzamida;

3-cloro-5-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclopropil-4-fluorobenzamida;

4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-3-fenilbenzonitrilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(2-metoxietil)benzamida;

3-[[4-cloro-2-(2-cloropiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(6-cloropiridin-2-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

5-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]piridin-3-carboxamida;

3-[[4-cloro-2-(6-metoxipiridin-2-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-5-metil-2-pirazin-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

- 3-[(4-cloro-5-metil-2-pirimidin-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,2-oxazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,3-oxazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(3-metilimidazol-4-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-2-(1H-imidazol-5-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,3-oxazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(2-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-fenilbenzonitrilo;
- 2-cloro-5-(4-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[4-cloro-5-ciano-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-metilbenzamida,
- 2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-[3-(1H-pirazol-3-il)fenil]benzonitrilo;
- 2-cloro-5-[3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(2-idroxi)etilbenzamida;
- 2-cloro-5-[3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;
- 3-[4-cloro-5-ciano-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N,N-dimetilbenzamida;
- 3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(morfolin-4-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-

1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-[3-(morfolin-4-carbonil)fenil]benzonitrilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoato de metilo;

ácido 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoico;

3-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]propanoato de metilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(2-hidroxietil)-N-metilbenzamida;

2-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]acetato de etilo;

ácido 3-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]propanoico;

ácido 2-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]acético;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-metilbenzoato de metilo;

ácido 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-metilbenzoico;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N,N,4-trimetilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-(trifluorometoxi)benzamida;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-(2-metoxipiridin-3-il)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-(5-etoxi-2-fluorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(2-metilpropoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxi-5-propan-2-ilfenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(morfolin-4-carbonil)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclopropil-4-fluoro-N-metilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-(2-idroxi-etil)-N-metilbenzamida;

4-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorobenzoil]-1-metilpiperazin-2-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclopentil-4-fluoro-N-metilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxolan-3-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-metil-N-(tiofen-2-ilmetil)benzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(piperidin-1-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(ciclopropilmetil)-4-fluoro-N-metilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-metil-N-(piridin-2-ilmetil)benzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxan-4-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxolan-2-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenoxi]-N,N-dimetilacetamida;

1-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-4-metilpiperazin-2,5-diona;

7-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-6-fluoro-3-metil-1,3-benzoxazol-2-ona;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-2-metoxi-N-metilacetamida;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]ciclopropanocarboxamida;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-N-metilciclopropanocarboxamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-[(2-oxopirrolidin-1-il)metil]fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-1,3-oxazolidin-2-ona;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-2-metoxiacetamida;

2-cloro-5-(2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(3-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-(trifluorometoxi)benzonitrilo;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(oxolan-2-ilmetoxi)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2-fluoro-3-metoxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-(2-fluoro-3-metoxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-(2,3-difluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-(5-cloro-2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2,5-difluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclopropil-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(4-cloro-5-fluoro-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(5-cloro-4-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclobutil-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

- 3-[(4-cloro-2-ciclohexil-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(oxan-4-il)fenoxi]metil]-1H-piridazin-6-ona;
- 3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;
- 2-[5-cloro-4-metil-2-[(6-oxo-1H-piridazin-3-il)metoxi]fenil]-2-metilpropanonitrilo;
- 3-[(2-terc-butil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-1H-indazol;
- 3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-indazol;
- 3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;
- 5-terc-butil-2-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;
- 5-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-1,2-oxazol;
- 3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-6-fluoro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]amino]etanol;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]-metilamino]etanol;
- 3-[(2-terc-butil-5-metil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;
- 3-[(2-terc-butil-5-metil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-1H-indazol;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]amino]etanol;
- 3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-6-fluoro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]oxi]etanol;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]-metilamino]etanol;
- 3-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]oxi]propano-1,2-diol;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N-(2-metoxietil)benzamida;

[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]fenil]-morfolin-4-ilmetanona;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N,N-dimetilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N-(2-idroxi-etil)-benzamida;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;

[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluorofenil]-morfolin-4-ilmetanona;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[4,3-b]piridina;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N,N-dimetilbenzamida;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-1H-pirazolo[4,3-b]piridina;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]-metilamino]etanol;

3-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]-metilamino]propano-1,2-diol;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;

1-[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]azetidina-3-ol;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]amino]etanol;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]oxi]etanol;

5-terc-butil-4-[[6-(3-idroxi-azetidina-1-il)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoxi]-2-metilbenzonitrilo;

5-terc-butil-4-[[6-[2-idroxiutil(metil)amino]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoksi]-2-metilbenzonitrilo;

3-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoksi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]oksi]propano-1,2-diol;

5-terc-butil-4-[[6-(2-idroxiutilamino)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoksi]-2-metilbenzonitrilo;

5-terc-butil-4-[[6-[2,3-diidroxiutil(metil)amino]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoksi]-2-metilbenzonitrilo;

5-terc-butil-4-[[6-(2,3-diidroxiutilossi)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoksi]-2-metilbenzonitrilo;

5-terc-butil-4-[[6-(2-idroxiutilossi)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoksi]-2-metilbenzonitrilo;

4-[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoksi)fenil]-4-fluorobenzoil]-1-metilpiperazin-2-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoksi)fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxiutil)-N-metilbenzamida;

4-[3-[5-cloro-2-(1H-indazol-3-ilmetoksi)-4-metilfenil]-4-fluorobenzoil]-1-metilpiperazin-2-ona;

[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoksi)fenil]-4-fluorofenil]-pirrolidin-1-ilmetanona;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoksi)benzonitrilo;

4-[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoksi)fenil]-4-fluorobenzoil]-1-metilpiperazin-2-ona;

3-[(2-terc-butil-4-metilsulfonilfenoksi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoksi)fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxiutil)-N-metilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoksi]metil]-1H-pirazolo[3,4-c]piridina;

4-terc-butil-2-metil-5-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoksi)benzonitrilo;

4-terc-butil-2-metil-5-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;

3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin-5(4H)-carboxilato de terc-butilo;

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin-5(4H)-il)etanona;

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin-5(4H)-il)-2-metoxietanona;

3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina;

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-6(7H)-il)etanona;

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-6(7H)-il)-2-metoxietanona;

3-((4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi)metil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina;

1-(3-((4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi)metil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-6(7H)-il)etanona;

3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-1H-pirazol;

4-((1H-pirazol-3-il)metoxi)-5-terc-butil-2-metilbenzonitrilo;

3-((2-(terc-butil)-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo;

(3-((2-(terc-butil)-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-1H-pirazol-5-il)(pirrolidin-1-il)metanona;

3-((2-(terc-butil)-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-N,N-dimetil-1H-pirazol-5-carboxamida;

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

38. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 37, seleccionado entre

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

- 3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-terc-butil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 5-terc-butil-2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 4-terc-butil-2-metil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[(4-cloro-2-ciclohexil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 5-terc-butil-2-metil-4-[(5-oxo-4-propan-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[(4-cloro-2-ciclobutil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-[3-(morfolin-4-carbonil)fenil]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,2-oxazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-fenilbenzonitrilo;
- 2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-[3-(1H-pirazol-3-il)fenil]benzonitrilo;
- 2-cloro-5-[3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;
- 3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-2-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 4-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorobenzoil]-1-metilpiperazin-2-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxolan-2-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenoxi]-N,N-dimetilacetamida;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-2-metoxi-N-metilacetamida;

2-cloro-5-(2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2-fluoro-3-metoxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

5-terc-butil-2-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]-metilamino]etanol;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]oxi]etanol;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

39. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, seleccionado entre

4-[(2-terc-Butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-2H-triazol;

3-[(2-terc-Butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-5-fenil-1H-pirazol; y

5-terc-Butil-2-metil-4-[(5-fenil-1H-pirazol-3-il)metoxi]benzonitrilo.


40. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, seleccionado entre

5-terc-butil-2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

5-terc-butil-2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo; y

5-terc-butil-2-fluoro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

41. Un proceso para preparar un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40 que comprende la reacción de un compuesto de fórmula (II) en presencia de un compuesto de fórmula (III), en la que R_A , R_B , R_C y W son como se han definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 34 y X es halógeno, mesilato o tosilato.



42. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40 y un vehículo terapéuticamente inerte.
43. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40, cuando se fabrica de acuerdo con un proceso de la reivindicación 41.