

REIVINDICACIONES

1. Un método para la inhibición de la absorción de lípidos ingeridos por un sujeto y/o promoción de la excreción de los lípidos ingeridos, que comprende administrar D-psicosa al sujeto.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde la D-psicosa es administrada en una cantidad de 10 a 50 partes en peso, con respecto a 100 partes en peso de los lípidos ingeridos por el sujeto.

3. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde la D-psicosa es usada en una cantidad de 10 a 50 partes en peso, con respecto a 100 partes en peso de los lípidos.

4. El método de conformidad con la reivindicación 1, en donde la absorción es absorción en el intestino delgado.

5. Uso de una composición que comprende D-psicosa para la reducción de la absorción de lípidos alimentarios y/o promoción de la excreción de lípidos alimentarios.

6. Un inhibidor de la ácido graso sintasa (FAS) que

comprende D-psicosa.

7. Un método para la inhibición de una actividad de la ácido graso sintasa en un sujeto que comprende
5 administrar D-psicosa al sujeto.

8. Un método para la prevención o tratamiento de la hiperlipidemia, la arteriosclerosis o el hígado graso que comprende administrar una cantidad farmacéuticamente
10 efectiva de D-psicosa a un sujeto que lo necesite.

9. Una composición para la prevención, mejora o tratamiento de la hiperlipidemia, la arteriosclerosis o el hígado graso, que comprende D-psicosa.

15

20

25