

## REIVINDICACIONES

1. Composición sinérgica con Emamectina Benzoato y un segundo insecticida compuesto **caracterizada porque** donde el segundo insecticida compuesto es seleccionado entre Imidacloprid, Tiametoxam, Teflubenzuron de forma separada o combinada y donde la Emamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 40% en peso en forma de gránulos dispersables en agua (WG) y el segundo insecticida seleccionado tiene una proporción entre el 5% al 70% en peso, en forma de gránulos dispersables en agua (WG).
2. Composición sinérgica con Emamectina Benzoato de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** la Emamectina Benzoato es una mezcla que contiene 90% de Emamectina B1a y 10% de Emamectina B1b.
3. Composición sinérgica con Emamectina Benzoato de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** la Emamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 20% en peso en forma de gránulos dispersables en agua (WG) y el segundo insecticida compuesto es seleccionado entre Imidacloprid, Tiametoxam, Teflubenzuron combinaciones de los insecticidas tiene una proporción entre el 5% al 50% en peso en forma de gránulos dispersables en agua (WG).
4. Composición sinérgica con Emamectina Benzoato y un segundo insecticida **caracterizada porque** donde el segundo insecticida es Clorpirifos y donde la Emamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 40% en peso y el insecticida Clorpirifos tiene una proporción entre el 5% al 70% en peso, en forma de micro emulsión (ME).

5. Composición sinérgica con Eamectina Benzoato de acuerdo con la reivindicación 4 **caracterizada porque** la Eamectina Benzoato es una mezcla que contiene 90% de Eamectina B1a y 10% de Eamectina B1b.
6. Composición sinérgica con Eamectina Benzoato de acuerdo con la reivindicación 4 **caracterizada porque** donde el segundo insecticida es Clorpyrifos y donde la Eamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 20% en peso y el segundo insecticida Clorpyrifos tiene una proporción entre el 5% al 50% en peso, en forma de micro emulsión (ME).
7. Composición sinérgica con Eamectina Benzoato y un segundo insecticida compuesto **caracterizada porque** el segundo insecticida compuesto es Fipronil y Bifentrina, combinados donde la Eamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 40% en peso, en forma de gránulos dispersables en agua (WG), Fipronil en proporción entre el 5% al 70% en peso en forma de suspensión concentrada (SC) y Bifentrina en una proporción entre el 5% al 70% en peso en forma suspensión concentrada (SC).
8. Composición sinérgica con Eamectina Benzoato de acuerdo con la reivindicación 7 **caracterizada porque** el insecticida es Fipronil y Bifentrina, combinados donde la Eamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 15% en peso, en forma de gránulos dispersables en agua (WG), Fipronil en proporción entre el 5% al 50% en peso en forma suspensión concentrada(SC) y Bifentrina en una proporción entre el 5% al 50% en peso en forma suspensión concentrada(SC)
9. Composición sinérgica con Eamectina Benzoato de acuerdo con la reivindicación 7 **caracterizada porque** el insecticida es Fipronil y Bifentrina, combinados donde la Eamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.5% a 7% en peso, Fipronil en proporción entre el 10% al 35% en peso, en forma de forma suspensión concentrada (SC) y Bifentrina en una

proporción entre el 10% al 35% en peso a forma de forma suspensión concentrada (SC).

10. Composición sinérgica con Eamectina Benzoato y un segundo insecticida **caracterizada porque** donde el segundo insecticida es seleccionado entre Imidacloprid, Tiametoxam, Teflubenzuron de forma separada y donde la Eamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 40% en peso en forma de gránulos dispersables en agua (WG) y el segundo insecticida seleccionado tiene una proporción entre el 5% al 70% en peso, en forma de gránulos dispersables en agua (WG).
11. Composición sinérgica con Eamectina Benzoato de acuerdo con la reivindicación 10 **caracterizada porque** la Eamectina Benzoato tiene una proporción entre el 0.2% a 20% en peso en forma de gránulos dispersables en agua (WG) y el segundo insecticida es seleccionado entre Imidacloprid, Tiametoxam, Teflubenzuron tiene una proporción entre el 5% al 50% en peso, en forma de gránulos dispersables en agua (WG).